Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

ANA CAROLINA ZANIN SACOMAN KURIHARA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SEU ENFRENTAMENTO

FRANCA
2020

ANA CAROLINA ZANIN SACOMAN KURIHARA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SEU ENFRENTAMENTO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional - Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF,* para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo.

FRANCA
2020

Kurihara, Ana Carolina Zanin Sacoman
K98d Dependência química e as políticas públicas para seu enfrentamento. / Ana Carolina Zanin Sacoman Kurihara. – Franca: Uni-Facef, 2020.
61 p. ; il.

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espirito Santo
Dissertação de Mestrado – Uni-Facef
Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento social – Políticas públicas. 2.Dependencia química. 3.Transtornos – uso de substâncias. 4.Promoção de saúde. I.T.

CDD 616.89

ANA CAROLINA ZANIN SACOMAN KURIHARA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SEU ENFRENTAMENTO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional - Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF,* para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.

Orientadora: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo.

Franca, 17 de abril de 2020.

Orientador: _____
Nome: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF

Examinadora: _____
Nome: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF

Examinadora:_____
Nome: Profa. Dra. Valéria Beghelli Ferreira
Instituição: UNESP - Franca

Aos meus pais, Luiz Roberto e Maria Teresinha, meu esposo Rodrigo, meus filhos Maria Luisa e Mateus, todos os meus familiares e meu amigo Thiago, que me apoiaram ao longo desse processo de formação.

AGRADECIMENTOS

Agradeço:

- À Deus que está sempre o meu lado e nunca me deixa desistir dos meus propósitos;

- Ao meu orientador, o Prof. Dr. Manoel Jorge, pela dedicação, conhecimento e paciência;

- Aos meus familiares que sempre trazem uma palavra de apoio e me motivam a seguir em frente;

- Ao meu amigo Thiago que trilhou este caminho de aprendizado ao meu lado e nunca me deixou desanimar;

- À Profa. Dra. Raquel e à Profa. Dra. Valéria, por disponibilizarem seu tempo e contribuírem com um vasto conhecimento nas bancas de qualificação e defesa;

- Às secretárias da pós-graduação do Uni-FACEF.

Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade.

Albert Einstein

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABORDA - Associação Brasileira de Redutores de Danos
III CNSM - III Conferência Nacional de Saúde Mental
CAPS-AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
CONFEN - Conselho Federal de Entorpecentes
CONAD - Conselho Nacional Antidrogas
CRM - Conselho Regional de Medicina
DSM – IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
GABA - Ácido gama-aminobutírico
GM - Gabinete do Ministro
IHRA - International Harm Reduction Association
LTP - Long-term potentiation
MDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
OMS - Organização Mundial de Saúde
ONU - Organização das Nações Unidas
PTS - Projeto Terapêutico Singular
SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde
WONCA - Organização Mundial dos Médicos de Família
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

RESUMO

Dentre as estratégias utilizadas para o enfrentamento das consequências relacionadas ao abuso de drogas, duas linhas se destacam: a abstinência (proibicionismo) e a política de redução de danos. A primeira apresenta a característica de focar no controle (redução) da oferta e da demanda de drogas. Dentre as estratégias utilizadas, estão a repressão e criminalização da produção, tráfico, porte e consumo de drogas ilícitas. A segunda, por sua vez, concentra suas ações na disseminação de formas de intervenção focadas na minimização dos danos à saúde e nos prejuízos sociais e econômicos relacionados ao consumo de drogas, aí incluídos o álcool etílico e o tabaco, sem necessariamente sustentar a repressão do uso. Portanto, essa estratégia se apresenta como um conjunto de direcionamentos, regras e práticas com o objetivo fundamental de reduzir os danos associados ao abuso de substâncias psicoativas em indivíduos que, por razões diversas, tem dificuldade ou não conseguem interromper seu uso, compreendendo que, apesar do esforço consciente para minimizar ou mesmo abolir o uso crônico, muitas pessoas, em diversos lugares do mundo, seguem utilizando drogas. Esta dificuldade, portanto, revela certo tipo de descompasso entre o desejo voluntário e consciente de evitar o uso da substância em questão e uma incapacidade real de poder fazê-lo. Esta incapacidade, sobre o controle do comportamento motivado, gera uma dissonância entre aquilo que é regido pela escritura legal e as possibilidades efetivas do dependente químico, para o qual, a liberdade de escolha não se vincula voluntariamente a esta doutrina, mas, antes, e principalmente, à escravidão resultante de alterações promovidas pela droga em sistemas corporais, psicológicos, cognitivos e motivacionais, incondicionadamente aprendidos, que se revela no vínculo inquestionável e indissociável deste com a droga e seus efeitos. Dito isso, essa dissertação tem como objetivos verificar se as políticas públicas direcionadas ao controle e/ou tratamento de dependentes químicos se inserem dentro de um contexto de promoção de saúde ao dependente químico; explorar os aspectos biológicos que determinam a relação do indivíduo com a droga, explorar a eficácia da abstinência, criminalização e reclusão forçada como forma de deter a busca e o consumo de drogas em indivíduos dependentes químicos e compreender a política de redução de danos como forma de abordar o problema de dependência química. O procedimento metodológico utilizado foi o levantamento bibliográfico. Como conclusão observou-se que, para que alcancem sucesso, as políticas públicas devem levar em conta a realidade do dependente químico, os fatores biológicos e sociais que o levam ao uso, o meio em que está inserido e as possibilidades existentes de tratamento e sua real eficácia. Infelizmente, o rumo atual da política pública sobre dependência química no Brasil, não se insere no contexto de promoção da saúde ao dependente químico, uma vez que ocorreu importante aumento no número de vagas em comunidades terapêuticas ao invés de privilegiar o tratamento ambulatorial.

Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Fissura. Redução de danos. Promoção da saúde. Política Pública.

ABSTRACT

Among the strategies used to face the consequences related to drug abuse, two lines stand out: abstinence (prohibitionism) and the harm reduction policy. The first has the characteristic of focusing on controlling (reducing) the supply and demand for drugs. Among the strategies used are the repression and criminalization of the production, trafficking, possession and consumption of illicit drugs. The second, in turn, focuses its actions on the dissemination of forms of intervention focused on minimizing damage to health, and on the social and economic losses related to drug use, including ethyl alcohol and tobacco, without necessarily sustaining repression of use. Therefore, this strategy presents itself as a set of guidelines, rules and practices with the fundamental objective of reducing the damage associated with the abuse of psychoactive substances in individuals who, for different reasons, have difficulty or are unable to stop their use, understanding that, despite from the conscious effort to minimize or even abolish chronic use, many people, in different parts of the world, continue using drugs. This difficulty, therefore, reveals a certain mismatch between the voluntary and conscious desire to avoid using the substance in question and a real inability to do so. This inability, over the control of motivated behavior, generates a dissonance between what is governed by the legal deed and the effective possibilities of the drug addict, for whom freedom of choice is not voluntarily linked to this doctrine but, rather, and mainly, to slavery resulting from alterations promoted by the drug in bodily, psychological, cognitive and motivational systems, unconditionally learned, which is revealed in the unquestionable and inseparable link between it and the drug and its effects. This dissertation aims to verify whether public policies aimed at the control and / or treatment of drug addicts fall within the context of health promotion for drug addicts; explore the biological aspects that determine the individual's relationship with drugs, explore the effectiveness of abstinence, criminalization and forced imprisonment as a way to stop the search for and use of drugs in addicts and understand the harm reduction policy as a way of address the problem of chemical dependency. The methodological procedure used was the bibliographic survey. As a conclusion, it was observed that for public policies to be successful, they must take into account the reality of the drug addict, the biological and social factors that lead to use, the environment in which they are inserted and the existing treatment possibilities and their real effectiveness. Unfortunately, the current direction of public policy on chemical dependency in Brazil does not fall within the context of health promotion for drug addicts, since there has been an important increase in the number of places in therapeutic communities instead of privileging outpatient treatment.

Keywords: Substance-related disorders. Craving. Harm reduction. Health promotion. Public policy.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....12

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA.....14

2 DEPENDÊNCIA QUÍMICA: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO.....17

2.1 CARACTERÍSTICAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.....18

2.2 A DROGA COMO REFORÇO.....19

2.3 CIRCUITOS E SISTEMAS NEURAIS.....20

2.4 BASES BIOLÓGICAS DOS PROCESSOS MOTIVACIONAIS.....21

2.5 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE OS SISTEMAS MOTIVACIONAIS.....22

2.6 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE A COGNIÇÃO.....23

2.7 DROGAS E PERSONALIDADE.....24

2.8 EVENTOS TRAUMÁTICOS NA INFÂNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA.....25

2.9 O SUJEITO CLIVADO: QUERER E NÃO PODER.....26

3 PROMOÇÃO DA SAÚDE.....28

4 POLÍTICAS PÚBLICAS.....31

5 A LEI E O DEPENDENTE QUÍMICO.....35

6 ABORDAGEM DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 40

6.1 A CRIMINALIZAÇÃO DO ATO (ABSTINÊNCIA/PROIBICIONISMO).....40

6.2 A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS (O INDIVÍDUO E SEU BEM-ESTAR).....43

7 CAUSAS E CONSEQUÊNCIA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.....46

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....48

REFERÊNCIAS.....50

1 INTRODUÇÃO

A utilização de drogas com padrão de abuso na sociedade brasileira, em nada destoa daquilo que se observou e se observa em outros países. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas, realizado pelo *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (2019, p. 1), “35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas e requerem tratamento.”

Segundo dados do III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira (2015), 9,9% das pessoas entrevistadas disseram ter utilizado alguma substância ilícita pelo menos uma vez na vida e 1,7% haviam utilizado nos últimos 30 dias. Quanto à faixa etária, a maior prevalência foi entre os 25 e 34 anos. Quanto ao tipo de substância, a maioria das pessoas já utilizou maconha, seguido de cocaína, solventes, crack e similares, LSD, ecstasy e MDMA, drogas injetáveis, heroína, chá de Ayahuasca e quetamina, levando em consideração os últimos 12 meses do ano de 2015 (BASTOS, 2017).

Utilizando os critérios do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-IV):

> Aproximadamente 1,2 milhões de indivíduos de 12 a 65 anos apresentaram dependência de alguma substância, que não álcool ou tabaco, nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso representa uma prevalência de 0,8% de dependentes na população geral e uma prevalência de 13,6% entre indivíduos que consumiram alguma substância nos últimos 12 meses [...] sendo que as dependências de maconha, benzodiazepínicos e cocaína foram as mais frequentes (BASTOS, 2017, p. 131).

No Brasil, como um todo, são escassos os estudos epidemiológicos focados na construção de uma base de dados nacional. A maioria dos estudos encontrados tem enfoque regional em um grupo específico, como, por exemplo, estudantes, caminhoneiros, entre outros (NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007; MALTA et al. 2018; SILVA et al. 2019). Este fato dificulta o entendimento da dependência química a partir de suas vertentes individuais e sociais, e não especificamente sob o paradigma da criminalização do uso de substâncias.

Esse tipo de abordagem (epidemiológica) se faz necessária, dado que é no entendimento desta realidade que repousa a possibilidade do estabelecimento de programas de prevenção relacionados ao entendimento das necessidades de seu

uso, assim como de suas consequências sociais e seus efeitos sobre a saúde física e mental dos usuários. E é justamente sua ausência que implica na flagrante dissonância entre as políticas existentes para seu enfrentamento, assim como na eficácia de suas aplicações. Necessário se torna, portanto, que a promoção e aplicação de Políticas Públicas de Saúde orientadas para o dependente químico, tenham em foco, necessariamente, as possibilidades e o discurso do próprio indivíduo. Esta possibilidade se faz presente no entendimento e aceitação de que a droga interfere em sistemas físicos, emocionais e cognitivos que aprisionam o sujeito na rede irracional da motivação para o uso da droga, fortalecida pela mais absoluta falta de controle sobre essa demanda.

Portanto, o primeiro ponto a ser entendido é a forma utilizada para este enfrentamento no Brasil, ou seja, as políticas públicas criadas para administrar este crescente número de indivíduos dependentes de drogas, para os quais a marginalização e criminalização parecem ser a tônica. Isto leva necessariamente à reflexão sobre quais são as alterações promovidas no indivíduo pelo uso continuado de substâncias que o levam de um uso ocasional, pontual e meramente recreativo ao uso exagerado, contínuo e descontrolado. Quais fatores estão subjacentes a este desejo irrefreável que o conduz ao uso e abuso de substâncias, e que o torna presa fácil das demandas motivacionais (reforçadoras negativas) que mantém seu uso contínuo, apesar da absoluta consciência de seus efeitos prejudiciais sobre todos os aspectos da sua vida (sociais, afetivos, familiares, etc). Por fim, é de grande importância o contraponto destas duas realidades para o entendimento de como, e se, as políticas públicas vigentes se adequam a abordagem e tratamento da dependência química.

O segundo capítulo conceitua e classifica a dependência química, destacando suas características biológicas e seus efeitos sobre os sistemas neurais, cognitivos, motivacionais e personalidade. Ressalta, também, a influência das experiências traumáticas vivenciadas na infância sobre o aumento da prevalência da dependência química.

O terceiro capítulo conceitua a promoção da saúde e a diferencia da prevenção. Ressalta a importância das ações de promoção da saúde para o tratamento do dependente químico, destacando a redução de danos como a principal ação neste sentido.

O quarto capítulo fala sobre políticas públicas, destacando as políticas existentes sobre drogas. Ressalta os paradigmas do proibicionismo ou “Guerra às Drogas” e antiproibicionismo no setor da justiça e segurança pública; e o paradigma asilar e o psicossocial no setor da saúde e assistência social.

O quinto capítulo fala sobre as Leis que regulamentaram e regulamentam a temática das drogas no Brasil. Mostra um panorama histórico do ano de 2001 a 2019, destacando os avanços e retrocessos que ocorreram na Legislação sobre drogas no país.

O sexto capítulo fala sobre duas formas de abordagem da dependência química: a criminalização do uso de substâncias - baseada na abstinência e proibicionismo e a redução de danos - baseada no indivíduo e no seu bem-estar.

O sétimo capítulo fala sobre as causas e as consequências do uso de drogas para o dependente químico, sua família e a comunidade em que vive. Destaca também a importância da família no processo de tratamento.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA

As pesquisas atuais que envolvem o estudo de transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias enfocam particularmente nos mecanismos motivacionais subjacentes ao seu uso. Esse é um tópico importante na pesquisa sobre a manutenção do uso e abuso de substâncias, uma vez que a maioria dos modelos psicobiológicos de dependência consideram os aspectos motivacionais ou reforçadores das drogas como o motor central neste processo (SKINNER; AUBIN, 2010). No entanto, apenas modelos motivacionais parecem não cobrir completamente a complexidade dos comportamentos obsessivos observados em humanos, especialmente em relação aos padrões mais crônicos e altamente recorrentes de dependência. Nos últimos anos, a Teoria da Formação de Hábito tornou-se mais proeminente para explicar o padrão persistente de dependência, apesar de diminuir as propriedades de reforço da droga e aumentar as consequências negativas de seu uso continuado (SCHWABE; DICKINSON; WOLF, 2011; SJOERDS et al. 2014; WOOD; RÜNGER, 2016). De acordo com esse modelo, a utilização crônica de substâncias produz uma transição do controle e

expressão do comportamento motivado por metas para um comportamento mais automático e habitual como resultado da utilização de drogas por longo prazo (RAHMAN et al. 2001; KOOB et al. 2004; ROBINSON; KOLB, 2004; EVERITT; ROBBINS, 2016).

Baseado nesses fatos, o presente estudo tem como problema central o abuso e dependência de drogas e está circunscrito à análise dos modelos de abordagem prática de tal fenômeno, assim como das políticas públicas e saberes teóricos que as têm subsidiado. Para tal aborda:

1) Os aspectos biológicos da dependência às drogas e as formas de tratamento existentes.

2) Políticas públicas que as regulamentam e se, de fato, estas promovem saúde ao dependente.

Os objetivos deste estudo foram:

- Objetivo geral: verificar se as políticas públicas direcionadas ao controle e/ou tratamento de dependentes químicos se inserem dentro de um contexto de promoção de saúde ao dependente químico.
- Objetivos específicos:

1) Explorar os aspectos biológicos que determinam a relação do indivíduo com a droga.

2) Explorar a eficácia da abstinência, criminalização e reclusão forçada como forma de deter a busca e o consumo de drogas em indivíduos dependentes químicos.

3) Compreender a política de redução de danos como forma de abordar o problema da dependência química.

A pesquisa tem natureza exploratória, visto que busca aprimorar os conhecimentos acerca do problema em estudo e o procedimento técnico utilizado foi o levantamento bibliográfico (GIL, 2002).

Para Gil (2008, p.50), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

Para o levantamento bibliográfico, foram realizadas buscas nas bases de dados Pubmed, Medline, Bireme, Scielo e Google Acadêmico, utilizando como descritores de busca: fisiologia, uso/abuso de substâncias, dependência química, abstinência, políticas públicas, proibicionismo e redução dos danos. Também foram

utilizados artigos encontrados em revistas e livros pertencentes aos pesquisadores, Leis, Projetos de Lei e Portarias sobre a regulamentação do tratamento da dependência química no Brasil. Foram excluídos os artigos que não responderam ao problema da pesquisa.

2 A DEPENDÊNCIA QUÍMICA: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

Apesar dos termos dependência química, drogadição e abuso de substâncias serem utilizados de forma intercambiável, eles se referem a fenômenos diferentes. No contexto deste trabalho, utilizaremos o termo dependência química para nos referirmos a uma doença crônica, a qual subjaz profundas alterações neurobiológicas associadas a fatores genéticos, psicossociais e ambientais que influenciam tanto seu desenvolvimento quanto sua manifestação (NIDA, 2018). Esta doença, caracterizada pela expressão de comportamentos diversos, tem como base a perda do controle sobre o uso da droga, decorrente da intensa motivação por sua busca e uso contínuo; a despeito de seus efeitos claramente prejudiciais sobre todos os aspectos da vida do indivíduo (pessoal, familiar, social e de trabalho); além do aparecimento de uma síndrome de abstinência quando da interrupção de seu uso (KOOB, 2000; ADINOFF, 2004; ALI et al. 2011).

A atribuição do caráter de doença à dependência química não é algo recente, e sua abordagem, dentro de uma visão mais humanitária, já foi implementada anteriormente. De fato, a Portaria nº 1028, de 1º de julho de 2005, que regula as ações de redução de danos no Brasil, nos seus artigos 2º e 3º, define que:

> - Definir que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolva-se por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.
> - Definir que as ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, compreendam uma ou mais das medidas de atenção integral à saúde, listadas a seguir, praticadas respeitando as necessidades do público alvo e da comunidade: I - informação, educação e aconselhamento; II - assistência social e à saúde; e III - disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites (BRASIL, 2005).

Como doença, a dependência química tem seu diagnóstico explicitado em diversos tratados nosológicos, dentre os quais, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, agora em sua 5ª edição (DSM-5, 2014). Segundo o DSM-5:

> Os transtornos relacionados a substâncias dividem-se em dois grupos: transtornos por uso de substância e transtornos induzidos por substância. As condições a seguir podem ser classificadas como induzidas por substância: intoxicação, abstinência e outros transtornos mentais induzidos por substância/medicamento (transtornos psicóticos, transtorno bipolar e transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, transtornos do sono, disfunções sexuais, delirium e transtornos neurocognitivos) (DSM-5, 2014, p. 481).

Portanto, podemos aí perceber que, não apenas a dependência química apresenta suas próprias características, como parte de seus sintomas transitam também por outros transtornos, mais particularmente, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e os de personalidade.

2.1 CARACTERÍSTICAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Em geral, os sintomas apresentados pelos dependentes químicos variam de sujeito para sujeito sendo invariavelmente classificados, de forma grosseira, em sintomas físicos e psíquicos. Cada uma dessas classes se bifurca em outros tantos sintomas secundários mais específicos. Devido aos sintomas que causa, podemos caracterizar a dependência química como um tipo de doença que surge em consequência de mudanças severas na estrutura neurológica e no comportamento. Os prejuízos causados pelo uso crônico de drogas inibem certos aspectos do funcionamento encefálico e são responsáveis pela desestruturação psíquica observada no dependente, além do completo declínio de sua saúde em geral, incluindo aspectos relacionados à absorção de nutrientes (RUIZ et al. 1990), funções cardiovascular (DAY; RUDD, 2019) e pulmonar (KARIMI; RAZAGHI, 2018), resposta imunológica (KOHNO et al. 2019), além de prejuízos em outras funções viscerais. Entretanto, dentre os mais importantes sintomas da dependência química, está o surgimento de “fissura” *(cravings)*, associada a uma crise de abstinência em decorrência da interrupção de seu uso (CHILDRESS; MCLELLAN; O’BRIEN, 1986; AURIACOMBE; TIGNOL, 1995; GEORGE; KOOB, 2011). Este é o momento em que a dependência química mostra de fato o quão perversa ela se torna para o sujeito, já que, neste momento, o indivíduo procura a substância não mais como fonte de reforço positivo, mas, mais especificamente por suas características reforçadoras

negativas (AHMED; KOOB, 2005; KOOB, 2020). Dentre estes efeitos compensatórios notados durante a abstinência, resultantes da promoção de ações contrárias àquelas observadas durante os efeitos agudos da substância, estão: ataques de pânico (LEYRO; ZVOLENSKY, 2013), insônia (WILKERSON et al. 2019), aumento no tônus cardiovascular (VANDREY; UMBRICHT; STRAIN, 2011), cãibras musculares (COSKUN; KAYA, 2015), dores de cabeça (MARINIS; JANIRI; AGNOLI, 1991), hiper-reatividade táctil e sensorial (HALLSTROM; LADER, 1981; BUSTO; FORNAZZARI; NARANJO, 1988; MAINEROVA et al. 2015), ansiedade (BRADY et al. 2013), sintomas depressivos (QUELLO; BRADY; SONNE, 2005), desrealização e despersonalização (SIRVENT; FERNANDEZ, 2015), alucinações (STEPHANE; ARNAOUT; YOON, 2018), dentre outros. Esses sintomas variam em função do tipo de substância utilizada, dosagem e frequência de uso.

Do ponto de vista do tratamento, são os efeitos perversos que estas drogas promovem sobre os aspectos motivacionais e cognitivos do indivíduo que mais prejudicam o bom prognóstico. Com relação aos aspectos motivacionais e cognitivos, estão incluídas, alterações na percepção, distorção do pensamento lógico, prejuízos na homeostasia emocional e humoral e inibição da habilidade de controle motivacional como observado acima. Dado que, em indivíduos “normais”, a expressão das diversas motivações (ou pulsões) relacionadas ao prazer imediato ou como forma de evitar a dor estão sob controle de estruturas encefálicas primitivas, basicamente aquelas localizadas no tronco cerebral e diencéfalo, o valor hedônico de tais comportamentos frequentemente se torna fundamento da ação primeira (*bottom-up*) se não forem devidamente controlados. Por outro lado, o controle dessas motivações é executado rostralmente por estruturas mais recentes na filogenia, localizadas no neocórtex (*top-down*) (POTENZA et al. 2011; HAMMOND; MAYES; POTENZA, 2014). Portanto, para cada ação impulsiva, existe um controle cognitivo que atenua seu aparecimento fora do contexto necessário. Em indivíduos dependentes químicos, este controle está prejudicado ou mesmo inexiste (DALLEY; EVERITT; ROBBINS, 2011; GRANT; CHAMBERLAIN, 2014).

2.2 A DROGA COMO REFORÇO

Apesar dos questionamentos levantados acerca de sua divisão (BARON; GALIZIO, 2005), em termo gerais, “reforço” é todo e qualquer estímulo que, quando apresentado, aumenta a possibilidade de ocorrência de uma resposta. Esta afirmação se adequa a ambos os tipos de reforço, positivo e negativo (CHASE, 2006). No campo da dependência química, portanto, as drogas atuam como reforço, aumentando a frequência de ocorrência de sua busca e consumo, seja para induzir prazer físico e mental, ou para retirar o desprazer gerado pela interrupção de seu uso contínuo. A interrupção do uso resulta em um desequilíbrio homeostático corporal que se revela pelo aparecimento de estados humorais e emocionais desagradáveis. Este desequilíbrio se deve particularmente à tolerância aos efeitos da substância (farmacocinética, farmacodinâmica, enzimática, comportamental e psicológica), induzida por seu uso contínuo, o que leva ao aumento na frequência de consumo e na quantidade de droga ingerida. Isto ocorre pela tentativa de recuperar os efeitos iniciais obtidos na ingestão aguda, condição que jamais será alcançada (KOOB; LE MOAL, 1997).

2.3 CIRCUITOS E SISTEMAS NEURAIS

Drogas psicotrópicas em geral afetam os mesmos circuitos neurais envolvidos na modulação de reforçadores naturais, como a água, alimento, prazer sexual, etc. Entretanto, para estes casos, normalmente ocorre saciação, na medida em que os *drives* motivacionais subjacentes vão sendo resolvidos. O grande problema da droga é que para ela não existe saciação. É justamente, o quanto mais, mais se quer. As drogas afetam basicamente quatro tipos de circuitos neurais: aqueles relacionados à aprendizagem e reforço, aqueles relacionados aos aspectos da motricidade, os vinculados aos processos emocionais e, principalmente, aqueles vinculados ao controle da memória, função executiva e motivação (GOLDSTEIN; VOLKOW, 2002; VOLKOW et al. 2010; VOLKOW et al. 2012; VOLKOW et al. 2013). Como exemplo, diversos estudos tem demonstrado a presença de impulsividade (incompetência em inibir motivações em excesso) (BECHARA, 2005); déficits no reforço (BLUM et al. 2012); reduzida atividade dopaminérgica diante de reforços naturais e aprendizagem não adaptativa (BERRIDGE, 2007); surgimento de

processos oponentes aos efeitos da droga na ausência desta, como intenso estado emocional negativo durante a abstinência (KOOB et al. 1993); prejuízo na tomada de decisão (REDISH; JENSEN; JOHNSON, 2008), a menos que esta esteja relacionada com a droga e/ou seus efeitos; inflexibilidade e respostas automáticas (BELIN et al. 2009).

2.4 BASES BIOLÓGICAS DOS PROCESSOS MOTIVACIONAIS

Estar motivado a algo significa apresentar uma forte tendência a realização de determinada ação, cuja consequência principal é a redução da motivação que a gerou. Este tipo de processo mental está fortemente conectado com outros aspectos da vida psíquica do indivíduo, aí incluídos o foco atencional (frequentemente oscilando entre a habilidade cognitiva de ler e codificar e a atividade motora fina de escrever), e a capacidade de deliberadamente flexibilizar a atividade mental de forma a poder lidar com diversas demandas cognitivas que se apresentam no campo do sujeito, mesmo na presença de distratores (POSNER; DEHAENE, 1994; DUNCAN, 2013).

A modulação normal dos processos anteriormente citados, denominados cognitivos, envolve a associação de uma série de outras habilidades (memória de trabalho, representação de regras e contexto, conflito e detecção de erro etc.), estando a cargo de estruturas encefálicas recentes na filogenia, mais particularmente o córtex pré-frontal. De fato, as fortes tensões geradas em estruturas evolutivamente ancestrais no sistema nervoso de vertebrados, particularmente de primatas, e que, como tal, apresentam a característica de incondicionada e reflexa (aí incluídas a expressão do pânico, da raiva, agressão, medo intenso, e do prazer), encontram-se sob forte controle de estruturas encefálicas mais rostrais que, ao longo da evolução, surgem para dar o contraponto à expressão pouco adaptativa desses processos emocionais em qualquer contexto. Dentre estes últimos, podemos citar as vias mesolímbica, mesocortical, e nigroestriatal como as mais importantes (ADINOFF, 2004). A via mesolímbica é caracterizada pela projeção da área tegmental ventral para regiões límbicas, incluindo o núcleo *accumbens* e a amígdala. Esta via está relacionada com as

emoções e memória. A via mesocortical é caracterizada pela projeção da área tegmental ventral para o córtex cerebral, especialmente o córtex pré-frontal. Esta via está relacionada à regulação do afeto e ao pensamento orientado para metas, entre outros. A via nigroestriatal é caracterizada pela projeção dos neurônios dopaminérgicos da susbtância negra compacta para o núcleo caudado-putamen (também chamado de estriado). Esta via está relacionada com a facilitação de movimentos voluntários através das ações do neurotransmissor dopamina sobre receptores dopaminérgicos (STANDAERT E GALANTER, 2009). Dentre as estruturas, o córtex pré-frontal e suas subdivisões apresentam papel primordial na adiccção (GOLDSTEIN; VOLKOW, 2011).

2.5 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE OS SISTEMAS MOTIVACIONAIS

Apesar do distanciamento conceitual, é bastante difícil, ou sequer possível, dissociar emoção de motivação. Emoções são, grosso modo, “sentimentos” intrinsicamente associados com respostas fisiológicas que se desenvolvem na interação entre organismo e seu contexto. Motivação, por outro lado, é um estado persistente que induz o indivíduo a produzir uma atividade organizada (KOOB, 2015). Em qualquer um dos casos, ambas são variáveis intimamente relacionadas, as quais subjazem áreas neurais específicas que as modulam. Portanto, emoções geram motivações (ou *drives*), e motivações se realizam na forma de comportamentos. No campo da dependência química, drogas produzem sensações (ou alteram emoções). As sensações geradas, que se refletem na forma de prazer intenso ou remoção de desconforto (físico ou emocional), geram motivações para sua busca e consumo que resultam no aumento da frequência de seu uso (comportamento de ingestão da substância) sempre que situações de desconforto similares se apresentem no contexto existencial do indivíduo (KOOB et al. 1993; KOOB 2015; KOOB; LE MOAL, 1997; CHARTOFF; CARLEZON, 2014; AGUIRRE; MADRID; LEVENTHAL, 2015; PIPER, 2015).

A ausência da droga (abstinência) no corpo de um usuário crônico produz sintomas físicos e emocionais. Agregado a isto está todo um processo de aprendizagem associativa que se intensifica pela utilização crônica da substância, e

é justamente este tipo de aprendizagem que vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida; razão pela qual se torna inconcebível a noção de ex-usuário ou ex-dependente, e razão que também estrutura o conceito de dependência enquanto desordem (HEATHER, 2017) ou, para outros autores, doença (VOLKOW; KOOB; MCLELLAN, 2016). Estas conceptualizações, apesar das mais variadas críticas (HAMMER et al. 2013; LEVY, 2013), têm grande implicação na visão social e política da dependência química, porque colocam limite à criminalização e punição do dependente. De fato, como descrito por Pickard:

> *The moral model of addiction has two distinctive features. First, it views drug use as a choice, even for addicts. Second, it adopts a critical moral stance against this choice. Addicts are considered people of bad character with antisocial values: selfish and lazy, they supposedly value pleasure, idleness and escape above all else, and are willing to pursue these at any cost to themselves or others. In contemporary Western culture, we typically hold people responsible for actions if they have a choice and so could do otherwise, and we excuse people from responsibility if they don't. Because the moral model of addiction sees drug use as a choice, it views addicts as responsible; because it condemns this choice, it views them as to blame – potentially deserving of the stigma and harsh treatment they in fact receive. For this reason, in so far as the moral model continues to influence – whether implicitly or explicitly – conceptions of drug use and drug addiction, the prejudice and injustices to which drug users and addicts are subjected around the world may appear justifiable* (PICKARD, 2017, p.170).

2.6 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE A COGNIÇÃO

Um dos fenômenos mais observados em indivíduos que se submetem ao tratamento da dependência química é sua grande vulnerabilidade à recaída quando expostos ao contexto, ambiente(s) nos quais usualmente faziam uso da substância, ou, em outras palavras, quando expostos às pistas contextuais associadas à droga e seus efeitos (HYMAN, 2005). Este tipo de comportamento se deve basicamente à capacidade desses estímulos de eliciar respostas fisiológicas e "fissura" pela droga, como resultado da aprendizagem incondicionada gerada por associação de estímulos (droga/ambiente) (HYMAN, 2005; HEINZ et al. 2019). Este fenômeno, cuja base principal é o condicionamento de preferência ao lugar, está descrito para todas as substâncias psicoativas que apresentam a característica de reforço, incluindo os estimulantes (cocaína, anfetamina, metanfetamina, crack, etc) e

depressores do sistema nervoso central (álcool, ópio, morfina, heroína, etc.), assim como para a maconha, tabaco, dentre outros (BARDO; BEVINS, 2001). Essas substâncias apresentam a característica de induzir aprendizagem associativa pavloviana, expressa na ausência do controle voluntário (perda do controle cognitivo sobre a capacidade de fazer escolhas), e pelos potentes efeitos fisiológicos que, na abstinência, se apresentam como estímulos reforçadores negativos. Dessa forma, a probabilidade de que sintomas de abstinência sejam eliciados sempre que o indivíduo for exposto a contextos relacionados à droga e seus efeitos é muito alta. Tudo isto acontece pelo prejuízo causado devido o uso crônico de drogas sobre três aspectos da cognição do indivíduo, a saber: o controle da impulsividade, a atenção, e a tomada de decisão (MEYER; KING; FERRARIO, 2016).

Sabe-se que o prejuízo no autocontrole tem um papel fundamental na dependência química e em outros tipos de dependência não especificamente química, como jogos, prazer sexual, entre outros, ainda que estes sejam francamente devido a efeitos do ambiente sobre sistemas farmacológicos endógenos (VERDEJO-GARCÍA; LAWRENCE; CLARK, 2008; CADET; BISAGNO, 2013). Tomando como base o que já foi descrito mais acima, no campo da aprendizagem, a impulsividade é também referida pelo termo desinibição. A utilização do termo desinibição resulta da capacidade que as drogas de abuso têm de “inibir” o controle de mecanismos *top-down* corticais que, dentre outras características, suprimem respostas motivacionais não adaptativas, particularmente aquelas relacionadas ou “dirigidas” pelos efeitos reforçadores de drogas em geral (ARON et al. 2007). No entanto, é fato que, da imensidão de pessoas que utilizam drogas de alguma forma, poucas vão adentrar num esquema de uso crônico e menos ainda se tornarão dependentes de fato (ANTHONY; WARNER; KESSLER, 1994). Isto indica que outras características intrínsecas ao indivíduo podem influenciar o estabelecimento da dependência química. Dentre estas, algumas disfunções previamente existentes, clínicas ou subclínicas, podem ser decisivas para o quadro aberrante observado em dependentes químicos — incluindo os traços de personalidade, para os quais mesmo a percepção das consequências adversas do uso de drogas não inibe a motivação para seu consumo.

2.7 DROGAS E PERSONALIDADE

No contexto da influência da personalidade do indivíduo sobre a probabilidade dele vir a se tornar dependente químico ou sob as alterações que as drogas promovem na personalidade de indivíduos antes “normais”, são importantes os estudos orientados ao entendimento do efeito de drogas em crianças e adolescentes, sobretudo, se a exposição destes a estas substâncias se dá de forma crônica. Dentre os efeitos de drogas observados em crianças e adolescentes podemos citar: prejuízo no desenvolvimento psicossocial (NARDI et al. 2012), comportamento sexual de alto-risco (MORRISON; SMITH; AKERS, 2014), comportamento criminoso e violento (CLARO et al. 2015), ideação suicida (CANTÃO; BOTTI, 2016), além do estabelecimento de transtornos mentais na vida adulta (KESSLER et al. 2010). Dessa forma, o uso e abuso de substâncias está diretamente relacionado a problemas sociais e de saúde adversos (NUTT et al. 2007). Este tipo desviante de comportamento, no qual a maioria das drogas utilizadas é de fonte ilícita, está associado, além dos danos causados no próprio sujeito, há um enorme custo social, aí incluído a assistência à saúde, a aplicação da Lei e também os sistemas legais que a embasam (REUTER, 2006; NUTT et al. 2007; GALLASSI et al. 2008). A redução destes gastos e, mais importante, promoção de saúde do dependente está necessariamente relacionada à necessidade do entendimento dos fatores relacionados, particularmente levando em consideração que cada indivíduo tem suas peculiaridades. Como exemplo, existe uma alta comorbidade entre o uso, abuso e dependência de drogas com uma série de transtornos mentais (GRANT et al. 2004; LINGFORD-HUGHES; WELCH; NUTT, 2004; BAKKEN; LANDHEIM; VAGLUM, 2007). Isto indica que o entendimento dos transtornos de humor, ansiedade e personalidade, assim como dos aspectos neurofisiológicos e comportamentais da dependência química, pode ajudar no estabelecimento de políticas de prevenção mais adequadas e eficazes.

2.8 EVENTOS TRAUMÁTICOS NA INFÂNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Eventos estressores na infância reduzem o número de receptores de opióides e dopamina no cérebro. Estes receptores são responsáveis por emoções essenciais como: amor, alívio da dor, prazer e motivação. Essas alterações podem gerar

adolescentes mais ansiosos, com baixa tolerância a frustrações, o que aumenta a chance de se tornarem dependentes de substâncias químicas (MATÉ, 2012).

Dube e colaboradores realizaram um estudo nos Estados Unidos mostrando a relação entre 10 categorias de experiências adversas na infância com o abuso de substâncias ilícitas. Entre as experiências consideradas, destacam-se: violência familiar, divórcio dos pais, abuso de álcool ou drogas na família, morte dos pais e abuso físico ou sexual. Os resultados mostraram que pessoas com uma experiência adversa, apresentaram risco duas a quatro vezes maior de tornarem-se dependentes químicos; e pessoas com mais de cinco experiências adversas, apresentaram risco sete a 10 vezes maior de tornarem-se dependentes, em relação àquelas sem nenhuma experiência adversa na infância (DUBE et al. 2003).

Os sistemas responsáveis pela resposta ao estresse são alterados pelo abandono, negligência e abuso (físico, sexual e emocional) na infância. Como estes sistemas estão envolvidos na dependência química, estas pessoas são mais propensas a tornarem-se dependentes na adolescência e fase adulta (MATÉ, 2012).

2.9 O SUJEITO CLIVADO: QUERER E NÃO PODER

Uma das questões mais frustrantes para o dependente químico é sua plena consciência, na ausência de sintomas de abstinência, de que sua motivação para a busca e consumo de droga(s) é francamente superior ao seu forte desejo de não o fazer. Esta dissonância entre querer e não poder está fortemente associada a uma série de alterações neurofisiológicas causadas pelo uso da(s) substância(s), assim como uma intensa tendência do indivíduo a experienciar a droga e seus efeitos para evitar toda a gama de sintomas desagradáveis que surgem durante a abstinência. Dizemos, por isso mesmo, que a droga, para o dependente químico, apresenta uma característica reforçadora negativa (KOOB, 2013), e os sintomas de abstinência a ela associados, a qualidade de estressores incondicionados (YANG et al. 2015). Esta dissociação pode ser aventada tomando como base alguns estudos nos quais foram verificadas remodelações de sistemas neurais subjacentes a expressão de comportamentos não adaptativos. Por exemplo, estimulantes do sistema nervoso como a cocaína e a nicotina induzem potencialização de longo prazo (do inglês *long-*

term potentiation-LTP) de circuitos neurais da área tegmental ventral do mesencéfalo (ARGILLI et al. 2008) e do hipocampo (KENNEY; GOULD, 2008), respectivamente. Da mesma forma, depressores do sistema nervoso central, como o álcool etílico, induzem potente LTP em áreas do estriado dorsal, uma das principais aferências dopaminérgicas dos neurônios da área tegmental ventral (LOVINGER; PARTRIDGE; TANG, 2003). Vale ressaltar que a tolerância gerada pela contínua utilização de agentes mediadores do ácido gama-aminobutírico (GABA) tem como consequência um pronunciado aumento na excitação geral do encéfalo e a promoção de aprendizagem associativa não adaptativa, como aquela verificada entre os efeitos das drogas e o contexto (LOVINGER; PARTRIDGE; TANG, 2003). Por isso mesmo ocorre a grande motivação do dependente químico na direção da droga e seus efeitos, e sua absoluta falta de controle sobre esta motivação.

3 PROMOÇÃO DA SAÚDE

O termo promoção da saúde é constantemente empregado como se fosse sinônimo de prevenção, no entanto, seu significado é mais amplo e complexo. A própria palavra saúde tem várias interpretações. Segundo Christopher Boorse (1977, apud Scliar, 2007, p. 37) “saúde é ausência de doença”. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como: “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 1946, p. 1).

Segundo Leavell & Clark (1976, apud Czeresnia, 2004, p. 214) o conceito de prevenção é definido como: “ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural afim de tornar improvável o progresso posterior da doença”.

> A prevenção apresenta-se em três fases: primária, secundária e terciária. A prevenção primária é a realizada no período da pré-patogênese. O conceito de *promoção da saúde* aparece como um dos níveis de prevenção primária, definido como “medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima”. Um segundo nível da prevenção primária seria a *proteção específica “contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente”*. A fase da *prevenção secundária* também se apresenta em dois níveis: o primeiro, *diagnóstico e tratamento precoce* e o segundo, *limitação da invalidez*. Por fim a *prevenção terciária* que diz respeito a ações de *reabilitação* (LEAVELL & CLARK, 1976 apud CZERESNIA, 2004, p. 214).

Em 1986, surgiu o conceito de prevenção quaternária, que, segundo a WONCA (Organização Mundial dos Médicos de Família) é definida como: “ação tomada para identificar o paciente em risco de excesso de medicalização, para protegê-lo de novas invasões médicas e para sugerir-lhe intervenções, eticamente aceitáveis”.

Também, em 1986, surge a definição de promoção da saúde, segundo a carta de Otawa:

> o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso

> para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global (CARTA DE OTAWA, 1986).

A promoção da saúde vai além da prevenção, engloba os indivíduos, as comunidades, o governo, o setor da saúde, outros setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não-governamentais, autoridades locais, indústria e mídia, com intuito de compartilhar seus conhecimentos, capacitar as pessoas a exercer maior controle sobre sua própria saúde, seus direitos e sobre o meio-ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor e contribuam para o desenvolvimento pessoal e global, possibilitando uma ruptura de paradigma no campo da saúde, considerando a realidade objetiva da sociedade globalizada (CARTA DE OTAWA, 1986; BUCHELE; COELHO; LINDNER, 2009; GELBECKE; PADILHA, 2004).

As práticas de promoção da saúde envolvem mudanças de hábitos, constroem a autonomia do sujeito através de ações que possibilitem a passagem da passividade para a atividade (MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016).

Para Teixeira:

> O debate em torno da Promoção da Saúde subsidia, principalmente, a incorporação de propostas que dizem respeito à mudança no conteúdo das práticas de saúde, contribuindo para a redefinição dos objetos das práticas, e dos meios de trabalho empregados no desenvolvimento de ações em vários níveis organizacionais. Trata-se, portanto, de incluir no leque de ações realizadas pelo sistema de saúde, ações de educação, comunicação e mobilização social voltadas ao “empoderamento” de indivíduos e grupos de modo a que possam vir a desenvolver práticas que resultem na promoção, proteção e defesa de suas condições de vida e saúde. Estas ações podem se concretizar enquanto processos mais amplos dirigidos à formulação e implementação de políticas, ao nível municipal, estadual ou nacional, ou restringir-se a práticas localizadas em função da natureza dos problemas ou das características dos sujeitos que decidam empreendê-las (TEIXEIRA, 2006, p. 101).

Para que ocorra a promoção da saúde do dependente químico são necessárias ações que possibilitem seu empoderamento no tocante à tomada de decisões quanto a sua saúde. O indivíduo deve fazer parte do seu tratamento e não ser mero expectador. No contexto das políticas públicas para o enfrentamento do uso e abuso de drogas, uma das principais ações de promoção de saúde é a proposta da redução de danos, visto que esta busca o bem-estar físico e social dos

usuários, minimizando os prejuízos causados pelo uso das substâncias (MOREIRA, 2006).

4 POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas podem ser definidas como um conjunto de ações do governo, com o intuito de garantir os direitos sociais. Possibilitam que os governos coloquem seus planejamentos em prática. Essas ações são passíveis de acompanhamento e avaliações, possibilitando mudança de estratégia caso não alcancem o efeito inicialmente desejado (PEREIRA, 2005; SANTOS; OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 2006).

Segundo Souza (2006) os elementos principais das políticas públicas são:

> • A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.
> • A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também importantes
> • A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.
> • A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.
> • A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo.
> • A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação (SOUZA, 2006, p. 36-37).

As políticas públicas sobre drogas envolvem tanto o Setor da Justiça e Segurança Pública, quanto o Setor da Saúde e Assistência Social. No Setor da Justiça e Segurança Pública, destacam-se dois paradigmas: o do proibicionismo ou “Guerra às Drogas”, que visa o combate ao tráfico e a criminalização de usuários e traficantes; e o antiproibicionismo, que visa a descriminalização e a legalização das drogas. No Setor da Saúde e Assistência Social, destacam-se também dois paradigmas: o asilar, de caráter orgânico, colocando o dependente químico como passivo em relação ao seu tratamento, isolando-o do convívio social e familiar, tendo a internação como modelo; e o psicossocial, centrado na autonomia do dependente químico, visando a inclusão e reinserção social, tendo como modelo a redução de riscos e danos (TEIXEIRA et al. 2017).

Até a década de 1980, as políticas públicas sobre drogas no Brasil eram de cunho proibicionista. Eram baseadas nas políticas internacionais, que

desde 1909, no encontro da Comissão do Ópio de Xangai, perpassando pelas Convenções Internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque (1961) e Viena (1971 e 1988), visavam o combate ao uso e ao tráfico de drogas (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).

Após 1980, as políticas públicas para o enfrentamento das drogas passaram a ser formuladas pelo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN). Privilegiavam a repressão ao consumo, tráfico e produção de drogas. Algumas de suas ações, porém, promoviam a atenção ao dependente químico, como apoio aos centros de referência, à pesquisa em prevenção, às comunidades terapêuticas e aos programas de redução de danos, voltados para a prevenção da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, do inglês, *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), entre os usuários de drogas injetáveis (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).

No Brasil, o olhar clínico para o uso de drogas na esfera pública até o início da década de 1990, estava a cargo do que se chamava “Centros de Referência Nacional”. Estes centros, em número de seis, adotaram a influência do pensamento do médico alemão Claude Olivenstein para o qual, a abstinência é necessária para o tratamento. Seguindo a linha de outros países, no final dos anos 1980, sob coordenação do Ministério da Saúde, mais especificamente do atual Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, começaram as primeiras reuniões motivadas pelo aumento da prevalência de AIDS entre usuários de drogas injetáveis — o que gerou, em 1989, a primeira tentativa brasileira de fazer funcionar um programa de trocas de seringas entre usuários de drogas injetáveis, em Santos/SP, tentativa esta, rapidamente abortada pela autoridade jurídica local. Este episódio sinalizava, já naquele momento, a resistência do sistema jurídico brasileiro em travar qualquer tipo de abordagem que não privilegiasse a criminalização do usuário, em detrimento de seu bem estar, condição inversa daquela posteriormente observada com a política de redução de danos levada a cabo pelo Ministério da Saúde. Na primeira metade da década de 1990, entretanto, com a utilização de recursos do *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), foi estabelecido no Brasil, uma série de Projetos de Atenção ao Uso de Drogas Injetáveis, incluindo trocas de seringas (DONEDA; GANDOLFI, 2006).

Iniciou-se, então, através da Coordenação Nacional Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS), um conjunto de ações de redução de

danos voltados para o controle do vírus causador da AIDS, HIV (do inglês *Human Immunodeficiency Virus*) e de outras infecções de transmissão parenteral entre estes usuários. A prosperidade do programa se revelou tanto pela própria multiplicação dos Programas de Redução de Danos - entre os anos 1995 a 2003, foram abertos mais de 200 programas, muitos deles incluindo troca de seringas - quanto pelo surgimento de associações organizadas como a ABORDA (Associação Brasileira de Redutores de Danos) em 1998, e outras associações estaduais (ANDRADE, 1998).

O CONFEN foi substituído em 1998 pelo Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que formulou a Política Nacional Antidrogas, instituída pelo Decreto 4.345/2002. Esta política era essencialmente proibicionista e visava uma sociedade livre de drogas ilícitas. Paradoxalmente, neste mesmo ano, a Lei 10.409 institui o tratamento multiprofissional ao dependente químico, sendo a primeira menção sobre redução de danos na Legislação brasileira (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).

No ano de 2005, o CONAD aprovou a Política Nacional sobre Drogas, que tinha como diretrizes principais:

> atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas; reconhecer o direito de toda pessoa receber tratamento para drogadição; reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o traficante; priorizar ações de prevenção; incentivar ações integradas aos setores de educação, saúde e segurança pública; promover ações de redução de danos; garantir ações para reduzir a oferta de drogas no país, entre outras orientações (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 85).

Em 2006 foi instituída a Lei 11.343, que orientava a prevenção do uso indevido de drogas, tratamento aos dependentes, visando a reinserção social e utilização das redes de apoio e distinguia o usuário de traficante, estabelecendo suas respectivas penas (TEIXEIRA, 2017).

A despeito das críticas recebidas por pelo menos 70 entidades, além do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos (vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), a política de redução de danos foi colocada para trás como ferramenta para a abordagem e intervenção no plano do abuso de drogas em favor da política de abstinência e criminalização, como revelado pela Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019. Além da não liberação de qualquer droga no país e mais rigor na punição para pequenos

traficantes, esta Lei permite a internação compulsória de usuários crônicos, acentuando o caos na política criminal brasileira, além de pôr um freio nos avanços conseguidos tanto nas questões relacionadas à saúde pública quanto à política antimanicomial. Desta forma, criou-se uma dissonância entre aquilo que é regido pela escritura legal e as possibilidades efetivas do sujeito dependente químico, para o qual a liberdade de escolha não se vincula à doutrina legal presente, mas, antes, às alterações promovidas pela droga em sistemas corporais, psicológicos, cognitivos e motivacionais, estes últimos incondicionadamente aprendidos, coisa que se revela no vínculo inquestionável e indissociável do indivíduo com a droga e seus efeitos.

5 A LEI E O DEPENDENTE QUÍMICO

No ano de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.216/01, positivando os direitos humanos para os portadores de transtornos mentais e realizou-se o Seminário Nacional sobre Atendimento aos Usuários de Álcool e outras Drogas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), que antecedeu a III Conferência Nacional de Saúde Mental (III CNSM). Este evento promoveu a discussão sobre a configuração de uma rede de atenção a usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na reabilitação e reinserção social, no âmbito do SUS. Dentre as recomendações pactuadas, destacam-se: uma rede assistencial centrada na comunidade com possibilidade de acesso a diversos serviços de saúde; articulação com serviços sociais não diretamente relacionados com a saúde e que promovam o exercício da cidadania e reinserção social; modelo assistencial fundamentalmente ambulatorial, estando as internações indicadas somente em quadros de emergência, com risco de auto ou heteroagressão, quadros graves de intoxicação e abstinência (ALVES; LIMA, 2013). A indicação de internação deve seguir os preceitos da OMS e Tratados Internacionais de Direitos Humanos, ou seja, por curtos períodos, em caso de surtos ou para desintoxicação, se possível, de forma voluntária, utilizando a técnica de motivação (NOVAES, 2014).

Em 2002, foram regulamentadas as Portarias Gabinete do Ministro (Portarias GM n° 336/02 e GM n° 817/02, que regulamentaram o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) e os mecanismos de financiamento do SUS para a atenção aos usuários de álcool e outras drogas). Neste mesmo ano, foi instituído pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas. Este programa estabelecia uma rede assistencial centrada na atenção comunitária e serviços sociais e de saúde, que atendessem de forma integral os usuários e suas famílias, promovendo sua inclusão social, considerando a estratégia de redução de danos (ALVES; LIMA, 2013).

Em 2005, a Secretaria Nacional Antidrogas publicou a Política Nacional sobre Drogas. Destacam-se entre os objetivos dessa política: a conscientização da sociedade sobre os prejuízos e implicações negativas e consequências do uso

indevido de drogas; educação, capacitação e formação de pessoas em todos os seguimentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, baseada em conhecimentos científicos e experiências bem sucedidas; implantar e implementar rede de assistência integrada, pública e privada para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, integrando os esforços desenvolvidos no tratamento (BRASIL, 2011).

Em 23 de agosto de 2006, o Presidente da República sancionou a Lei 11.343 que instituía o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, cuja finalidade, além da repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas era: “articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas” (Lei 11.343, 23 de agosto de 2006, art. 3º, inciso I), em cooperação com o SUS e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (art. 3º, §2º). Em seu artigo 4º, a Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, apresenta os princípios do SISNAD, e aqui citamos apenas alguns:

> Inciso I [...] o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade[...], inciso VII [...] a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito[...], inciso IX [...] a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2006).

Dentre seus objetivos figuram (art. 5º):

> Inciso I [...] contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados[...], inciso II [...] promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país[...], inciso III [...] promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios (BRASIL, 2006).

Como visto então, a Lei privilegia, no âmbito do indivíduo, o respeito à liberdade individual e a adoção de estratégias multidisciplinares para prevenção do uso indevido de drogas e a atenção e reinserção social dos usuários.

Em 23 de dezembro de 2011, foi regulamentada a Portaria nº 3088, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Em seu Art. 2º traz as seguintes diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial:

> I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas;
> II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;
> III - combate a estigmas e preconceitos;
> IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar;
> V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
> VI - diversificação das estratégias de cuidado;
> VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania;
> VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;
> IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares;
> X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado;
> XI - promoção de estratégias de educação permanente; e
> XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011, p. 3).

Contudo, em 5 de junho de 2019, a Presidência da República sancionou a Lei 13.840 que, no seu teor, através do art. 1º, alterava a Lei 11.343. Esta Lei tem sua raiz no Projeto de Lei Complementar nº 37 de 2013, de autoria do Deputado Federal Osmar Terra (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB). No seu artigo 23-A, §2º, está descrito:

> A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (BRASIL, 2019).

Segue no §3º:

> Inciso I [...] São considerados 2 (dois) tipos de internação: internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas,[...] Inciso II [...]internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal

> ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida (BRASIL, 2019).

Ainda, no que diz respeito à internação não voluntária, na Lei 13.840 de 2019, artigo 23-A, §5º lê-se, dentre outros que: "a internação *deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável"* (inciso I), e "*perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável"* (inciso III).

Dessa forma, como reiterado pelo secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro:

> a lei reforça a política já executada pelo governo federal, que valoriza as comunidades terapêuticas e o trabalho em prol da abstinência no tratamento de dependentes químicos. Sai o modelo que antes era focado, de maneira totalmente equivocada, na redução de danos; e entra o tratamento que promove a abstinência, fazendo com que o indivíduo possa viver livre das drogas, com sobriedade (GOMES; GARCIA, 2019).

Em março de 2019, o atual governo, aumentou o número de vagas financiadas em comunidades terapêuticas chegando a um total de 11 mil. Assinou também 216 novos contratos com instituições que prestam serviços de acolhimento aos dependentes químicos (GOMES, 2019).

As informações acima nos permitem perceber a transição de um modelo que privilegiava o indivíduo dependente químico e a preocupação com seu bem-estar, liberdade e tratamento, para um outro, sabidamente fracassado, de criminalização e abstinência. Uma mudança de paradigma que envolve o retorno a uma política de criminalização e segregação, em detrimento de outra, focada no respeito às liberdades individuais e no reconhecimento e humanização do dependente químico.

> O Relatório Global sobre Descriminalização de Drogas, de 2016, aponta os danos provocados pela criminalização: aumento da população prisional, aumento de doenças infectocontagiosas e contribuição para o aumento do número de mortes relacionadas às drogas que, em 2013, chegou perto de 200 mil no mundo. Devido a esses danos, o paradigma do proibicionismo tem sido bem debatido em nível global. A redução de danos, como medida de saúde pública tem sido considerada como a abordagem mais adequada ao problema das drogas com respeito aos direitos humanos. Nos últimos 15 anos, uma nova onda de países rumou em direção ao modelo descriminalizatório das drogas sugerindo um reconhecimento em nível global das falhas da abordagem criminalizatória e reforçando uma vertente

política em direção a uma guinada histórica de paradigma (TEIXEIRA et al. 2017).

6 A ABORDAGEM DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Dentre os posicionamentos políticos conhecidos para a abordagem das questões relacionadas ao abuso e dependência de drogas, duas ações se destacam: a abstinência (proibicionismo) e a política redução e danos (CANTY; SUTTON; JAMES, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO; ARAÚJO, 2006; TAMMI; HURME, 2007). De um lado, a abstinência (proibicionismo) concentra suas ações no controle (redução) da oferta e da demanda de drogas. Para isso se utilizam de estratégias que frequentemente envolvem a repressão e criminalização da produção, tráfico, porte e consumo de drogas ilícitas. A política redução e danos, por sua vez, concentra suas ações na disseminação de formas de intervenção orientadas para a minimização dos danos à saúde e nos prejuízos sociais e econômicos relacionados ao consumo de drogas, incluindo o álcool etílico e tabaco, sem necessariamente pregar a repressão de seu uso (TAMMI; HURME, 2007; WODAK, 2009). Todos estes pressupostos, associados aos benefícios e danos decorrentes da manutenção de diferentes tônicas das políticas públicas sobre drogas têm fomentado um profícuo debate (WEATHERBURN, 2009), particularmente no que concerne ao modelo de atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas (BALL, 2007; TAMMI; HURME, 2007).

6.1 A CRIMINALIZAÇÃO DO ATO (ABSTINÊNCIA/PROIBICIONISMO)

Segundo Karam:

> O proibicionismo, em uma primeira aproximação, pode ser entendido, como um posicionamento ideológico de fundo moral, que se traduz em ações políticas voltadas para a regulação de fenômenos, comportamentos ou produtos vistos como negativos, através de proibições estabelecidas notadamente com a intervenção do sistema penal — e, assim, com a criminalização de condutas através da edição de leis penais —, sem deixar espaço para as escolhas individuais, para o âmbito de liberdade de cada um, ainda quando os comportamentos regulados não impliquem em um dano ou em um perigo concreto de dano para terceiros (KARAM, 2007, p. 181-182).

O proibicionismo constitui-se, ainda hoje, no alicerce ideológico da política pública norte-americana sobre drogas (CANTY; SUTTON; JAMES 2005; MACMASTER, 2004; PERDUCA, 2005; WODAK, 2009), movimento particularmente decorrente de sua primeira investida contra o crescimento da industrialização e consumo de álcool, entre os anos de 1920 e 1932, o que gerou inclusive a fundação do próprio Partido proibicionista e a consequente Lei Seca, que conferiu ao álcool o status de droga ilícita naquele país. Ao longo deste processo e em função da grande influência norte-americana na política mundial, um regime de proibição global começou a ser desenhado pelas Nações Unidas (*The International Drug Control Conventions*), culminando então com o estabelecimento da *Single Convention on Drugs of the United Nations* ratificada no ano de 1961, seguida pela primeira Convenção sobre Drogas Psicotrópicas (*Convention on Psychotropic Substances of 1971*), e a denominada Convenção de Viena (*United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*), de 1988. Todas estas “referências”, fontes básicas para a adoção de marcos legais, relevantes para a elaboração e aplicação de Leis para o combate ao uso e abuso de drogas, foram ratificadas pelo Brasil, sendo profundamente influentes ainda hoje na legislação de políticas públicas nacionais relacionadas às drogas (RIBEIRO, 2006; RIBEIRO; ARAÚJO, 2006).

Apesar do século XX ser considerado o século do proibicionismo, este apresentou um grande crescimento no consumo de drogas, mostrando que esta estratégia falhou no intuito de erradicar e conter o consumo (FIORI, 2012). Em contrapartida, a Holanda, que apresenta política mais tolerante em relação às drogas, o consumo manteve-se estável (CRUZ; MACHADO, 2013).

Contraditoriamente ao que se espera com a aplicação de políticas proibicionistas, a proibição acaba por aumentar a marginalização do dependente, o uso de forma adversa e perigosa, o surgimento de mercados ilícitos de drogas, a estruturação do tráfico na forma de crime organizado, a corrupção do Estado, a violência e o número de crimes cometidos (CRUZ; MACHADO, 2013; AZEVEDO; CRUZ, 2015). O proibicionismo no Brasil está relacionado com a superlotação carcerária, sobretudo entre as mulheres, que em sua maioria são presas por crimes relacionados à entorpecentes (AZEVEDO; CRUZ, 2015).

O modelo proibicionista considera a dependência como uma patologia biologicamente determinada, sendo necessária a oferta de tratamento e reabilitação. Esse tratamento tem como propósito a abstinência, seja pelo encarceramento ou

pelo tratamento (ALVES, 2009). O tratamento baseado exclusivamente na abstinência pode se tornar uma barreira para o dependente químico, tornando os serviços de saúde pouco acolhedores. Com a finalidade de auxiliar no tratamento baseado no proibicionismo, muitas comunidades terapêuticas foram criadas a partir da década de 1970. Essas comunidades são, na maioria das vezes, Instituições de natureza não governamental. Um fator que contribuiu para a grande expansão do número de comunidades terapêuticas foi a lacuna existente no setor assistencial público de saúde no tocante ao tratamento aos dependentes químicos (ALVES, 2009).

Em 2011, durante a 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos, foi identificado um conjunto de práticas de violação de direitos nos locais de internação de usuários de drogas, nas chamadas comunidades terapêuticas (LIMA; TAVARES, 2012).

> Segundo este relatório os usuários internados sofrem diversas violações de seus direitos como a interceptação e violação das correspondências, violência física, castigos, torturas, exposição a situações de humilhação, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o anti-HIV − exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à orientação sexual, revista vexatória de familiares, violação de privacidade, entre outras (LIMA; TAVARES, 2012, p.13).

Lima e Tavares (2012) disseram que as comunidades terapêuticas lembram os hospitais gerais descritos por Focault (1972, apud Lima e Tavares, 2012, p. 21): “espaços dos pobres, cuidados por autoridades religiosas, o refugo da sociedade, que se aproximando da morte, recolhiam-se a esses espaços”.

Observa-se elevada taxa de abandono ao tratamento e recaídas em torno de 60 a 80% quando utiliza-se a abstinência como foco principal, mostrando a baixa resposta terapêutica deste tipo de tratamento (SCHNEIDER, 2010). São atribuídas como causa das recaídas: o meio social em que vivem, o não reconhecimento da impotência perante o vício, dificuldade de lidar com as frustrações, falta de trabalho, perdas, entre outros motivos (CARVALHO, 2011).

Uma das maiores dificuldades apresentadas pelos dependentes químicos na manutenção da abstinência é a necessidade de modificar o círculo social de amizades com as quais compartilhava o uso das drogas (CARVALHO, 2011).

De acordo com Carvalho:

> Conquanto a abstinência seja a condição desejada para o dependente químico, tão indispensável quanto ela são os tratamentos que auxiliam no desenvolvimento de habilidades do usuário para enfrentar a vida sem a droga, a busca de novas formas de relacionamento com familiares e outras pessoas que não sejam usuárias e a reinserção social (CARVALHO, 2011, p. 61).

Em um estudo realizado com 440 pacientes maiores de 18 anos, internados por problemas sociais e psicológicos decorrentes do uso de cocaína cheirada (pó) e/ou fumada (crack), em seis hospitais psiquiátricos da Grande São Paulo, 232 (52,7%) estavam na sua primeira internação por consumo de drogas, 171 (38,9%) já haviam sido internados anteriormente de uma a três vezes e 37 (8,4%) já haviam sido internados mais de três vezes (FERREIRA FILHO et al. 2003).

Segundo Ferreira:

> Ao sair do meio hospitalar, o dependente, na maioria das vezes, tem dificuldade em tolerar os problemas e, como consequência, retoma o uso da substância, o que leva à recaída(14). A reincidência do consumo de drogas faz com que o dependente químico procure novamente o tratamento e seja reinternado. Nesse sentido, a participação de pessoas com transtorno mentais em serviços extra-hospitalares, entre elas os dependentes químicos, mostra-se essencial para a redução do número de hospitalizações, pois ajuda a romper o ciclo de reinternações(5). Ao participar destes serviços, o indivíduo pode conciliar o tratamento com sua vida social sem precisar se afastar integralmente de determinadas ocupações cotidianas (FERREIRA et al. 2012, p. 449)

6.2 A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS (O INDIVÍDUO E SEU BEM-ESTAR)

A redução de danos, como definida pela Associação Internacional de Redução de Danos (*International Harm Reduction Association* - IHRA), diz respeito a um conjunto de direcionamentos, regras e práticas que tem como objetivo fundamental reduzir os danos associados ao abuso de substâncias psicoativas em indivíduos que, por razões diversas, tem dificuldade ou não conseguem interromper seu uso. Como a própria palavra informa, esta redução tem seu foco na prevenção aos danos relacionados à droga, mais do que a prevenção de sua utilização; além do que foca em usuários ativos. Este tipo de visão ganhou maior dimensão depois do reconhecimento da ameaça de disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas.

Andrade (2004) cita como práticas de redução de danos:

> troca de seringas usadas por novas, uso de hipoclorito de sódio para limpeza de agulhas e seringas usadas, ações dos agentes comunitários de saúde ou redutores de danos, como são chamados no Brasil, salas de tolerância (espaços onde o uso de droga é permitido e se fazem os cuidados de prevenção) terapia de substituição de uma droga por outra com menos consequências negativas para a saúde, e a prescrição da própria droga de consumo, em serviços públicos que, além de oferecer a droga de forma gratuita - o que evita a intermediação do tráfico e todas as suas consequências – propicia condições seguras e protegidas de uso. Estes são serviços que por sua natureza se constituem num meio de educação para autocuidados com a saúde (ANDRADE, 2004, p. 88).

A redução de danos não exige a abstinência, porém, isso não significa que esta estratégia se opõe a ela como resultado ideal de tratamento. Propõe estratégias para minimizar o dano causado pelo consumo, levando em conta as necessidades sociais do dependente químico, respeitando-o e tornando-o participante ativo de seu tratamento (ALVES, 2009).

Os países que adotaram políticas de redução de danos para o enfrentamento das drogas, não tiveram aumento do consumo de drogas ilícitas e nem aumento da escalada de drogas “leves” para “pesadas”; além do que, apresentaram aumento da busca por tratamento por parte dos dependentes químicos (ALVES, 2009).

Pode-se destacar a experiência de Portugal iniciada em 2001 baseada em cinco pilares: prevenção, dissuasão, redução de danos, tratamento e reinserção social. Na prevenção, destaca-se a informação dos malefícios à saúde causados pelas drogas. Na dissuasão, o consumo e a posse para consumo de drogas deixaram de ser crimes, mas ainda são ilícitos, podendo sofrer sanções administrativas. Na redução de danos, destaca-se a distribuição de kits com seringas e agulhas descartáveis e o programa de substituição de heroína por metadona. No tratamento, destacam-se os Centros de Tratamento, que oferecem consultas, tratamento psicológico, auxílio da assistência social, cursos de formação em artes ou tecnologia da informação, e nos casos mais graves, internações para desintoxicações (prazo de duas semanas), sendo o tratamento posteriormente, continuado de forma voluntária. Na reinserção social, destaca-se o auxílio à busca por empregos e programas de aluguel social por um período de seis a 12 meses (AZEVEDO; CRUZ, 2015).

A política de descriminalização implantada por Portugal vem mostrando dados promissores, como redução de crimes relacionados às drogas, redução do

número de infectados por HIV e outras doenças causadas pelo consumo de drogas, além da redução do tráfico de heroína (AZEVEDO; CRUZ, 2015).

Segundo Andrade (2004, p. 88), o objetivo maior da redução de danos é:

> preservar a vida de milhares de pessoas [...] durante o ato de consumir drogas ou devido aos estados alterados de consciência por elas propiciados, e que não desejam, ou se desejam não conseguem, através dos recursos habitualmente disponíveis, abandonar o seu consumo (ANDRADE, 2004, p. 88).

A redução de danos beneficia não somente o dependente químico como sua família e a comunidade, visto que suas intervenções apresentam compromisso com a saúde pública e os direitos humanos. Oferece cuidado integral, busca reduzir os prejuízos que ocorrem em função do uso de drogas e prevenir aqueles que ainda não se instalaram, sem necessariamente interferir no uso das drogas (TEIXEIRA, 2017).

Esta forma de abordagem se fundamenta na compreensão de que, apesar de seus esforços para minimizar ou mesmo abolir seu uso contínuo, muitas pessoas, no Brasil e em diversos lugares do mundo, seguem utilizando as drogas. Esta dificuldade revela certo tipo de descompasso entre o desejo voluntário, logo consciente, de evitar a substância em questão e uma incapacidade real de poder fazê-lo.

7 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Estudos mostraram que os dependentes químicos identificam como causas de sua dependência: curiosidade, dificuldade de relacionamento familiar, rebeldia, morte de um familiar, separação dos pais, depressão, diversão ou prazer, busca de aceitação, entre outros (PRATTA; SANTOS, 2006; ALVAREZ; GOMES; XAVIER, 2014).

As famílias podem atuar como protetoras, quando apresentam bom relacionamento entre os seus membros através de relações afetuosas, protetoras e de reciprocidade com seus filhos. Por outro lado, os pais podem atuar como facilitadores para a dependência, quando são omissos, quando não impõem disciplina, quando são muito irritados e/ou quando há dependentes químicos no meio da família (SCHENKER; MINAYO, 2003).

É sabido que, o consumo de substâncias psicoativas traz sérias consequências aos dependentes químicos. Alves destaca como riscos e danos causados pelo consumo:

> exposição a situações de violência, como acidentes de trânsito, conflitos interpessoais e familiares, traumatismos, homicídios, suicídios, envolvimento com o tráfico e outras atividades delituosas, práticas sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e agulhas, além de exposição a infecções de transmissão sexual e parenteral, a exemplo do HIV, hepatites B e C, HTLV e sífilis, comorbidades ou agravamento de condições clínicas e psiquiátricas, intoxicação aguda por uso de drogas (overdose); uso abusivo e dependência, entre outros. Em relação ao álcool, admite-se que o seu consumo constitua importante causa de adoecimento, mortalidade precoce e incapacidade, sendo apontado como fator determinante de mais de 10% do total dos problemas de saúde do país (ALVES, 2013, p. 12-13).

Dados apresentados no Relatório Brasileiro sobre drogas - levando em conta os indicadores: taxas de casos de AIDS entre usuários de drogas injetáveis, hepatites com provável infecção pelo uso de drogas, mortalidade, internações, afastamentos do trabalho e aposentadoria associada ao uso de drogas - mostram que o consumo afeta tanto as pessoas que as utilizam quanto os grupos nas quais elas estão inseridas (BRASIL, 2009).

O uso das drogas também gera revolta, vergonha, roubo de pertences, prejudicando e desestruturando as famílias dos dependentes (ALVAREZ; GOMES;

XAVIER, 2014). Por estarem intimamente ligadas aos problemas gerados pela dependência, as famílias devem fazer parte do tratamento, tanto dando apoio ao dependente químico em seu tratamento como para sua própria recuperação (ALVAREZ; GOMES; XAVIER, 2014; SCHENKER; MINAYO, 2003).

Por vezes, as famílias procuram os serviços de saúde e o judiciário solicitando a internação involuntária dos seus parentes dependentes químicos, por acreditarem que dessa forma, estarão livres do problema e pelo descrédito no tratamento disponibilizado na rede pública, que muitas vezes é demorado (NOVAES, 2014).

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas estas informações parecem indicar que, qualquer regra ou política estabelecida a partir de padrões que não observem a natureza intrínseca da dependência química, as alterações neurobiológicas e psicofisiológicas, os aspectos sociais, afetivos, familiares e a violência subjacentes a ela, estarão fadadas ao insucesso.

Para que, de fato, ocorra a promoção da saúde do dependente químico, este deve ser encorajado a fazer parte de seu tratamento e deve ter seus direitos respeitados. Analisando as políticas públicas existentes sobre a temática das drogas, a estratégia de redução de danos parece ser a que mais se insere no contexto de promoção da saúde. O tratamento deve ser baseado no atendimento ambulatorial (CAPSad, Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), o usuário deve ser empoderado, deve fazer parte do seu tratamento e deve ter sua vontade levada em conta.

A abstinência deve ser almejada, porém, devido aos aspectos biológicos, psicológicos, afetivos e sociais da dependência química, nem sempre é alcançada. Não há comprovação que internações hospitalares ou em comunidades terapêuticas, principalmente involuntárias, sejam eficazes. Além de não serem eficazes ainda violam os direitos humanos, portanto, devem ser evitadas. As internações devem ser realizadas somente em casos extremos, com risco de auto e heteroagressão, intoxicações e abstinências graves, e devem ser por curto período.

Outro ponto a ser considerado no tratamento da dependência química é a necessidade de envolvimento da família. O apoio familiar traz maiores chances de sucesso no tratamento, auxilia na prevenção das recaídas e contribui para a reinserção do dependente químico na comunidade.

Para que alcancem sucesso, as políticas públicas devem levar em conta a realidade do dependente químico, os fatores biológicos e sociais que o levam ao uso, o meio em que está inserido e as possibilidades existentes de tratamento e sua real eficácia.

Infelizmente, o rumo atual da política pública sobre dependência química no Brasil, não se insere no contexto de promoção da saúde ao dependente

químico, um vez que ocorreu importante aumento no número de vagas em comunidades terapêuticas ao invés de privilegiar o tratamento ambulatorial.

REFERÊNCIAS

ADINOFF, B. Neurobiologic Processes in Drug Reward and Addiction. *Harv Rev Psychiatry*, v. 12, n. 6, p. 305–320, 2004.

AGUIRRE, C.; MADRID, J.; LEVENTHAL, A. M. Tobacco Withdrawal Symptoms Mediate Motivation to Reinstate Smoking During Abstinence. *J Abnorm Psychol*, v. 124, n. 3, p. 623–634, Ago. 2015.

AHMED, S. H; KOOB, G. F. Transition to drug addiction: a negative reinforcement model based on an allostatic decrease in reward function. *Psychopharmacology*, v. 180, p. 473–490, 2005.

ALI, S. F. et al. Understanding the Global Problem of Drug Addiction is a Challenge for IDARS Scientists. *Curr Neuropharmacol*, v. 9, n. 1, p. 2–7, mar. 2011.

ALVAREZ, S.Q.; GOMES, G.C.; XAVIER, D.M. Causas da dependência química e suas consequências para o usuário e a família. *Revista de Enfermagem UFPE on* line, v. 8, n. 3, p. 641-648, mar. 2014. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/9720/9804. Acesso em: 25 fev. 2020.

ALVES, V. S. Modelos de atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas: discursos políticos, saberes e práticas. *Cad. Saúde Pública*, v. 5, n. 11, p. 2309-2319, nov. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n11/02.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

ALVES, V. S.; LIMA, I. M. S. O. Atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas no brasil: convergência entre a saúde pública e os direitos humanos. *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 9-32, nov./fev. 2013. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/56241/59451. Acesso em: 17 fev. 2020.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *DSM-5:* Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5. ed. Artmed, 2014.

ANDRADE, T. M. Princípios e Perspectivas da Redução de Danos entre Usuários de Drogas no Brasil. Álcool e Drogas. *Revista da ABEAD*, v. 1, n. 1-2, p. 51-58, 1998.

ANDRADE, T. M. Redução de danos: um novo paradigma? *In*: A. R. B. Alemeida et al. (Orgs.), *Drogas: tempos, lugares e olhares sobre seu consumo*, Salvador: EDUFBA; CETAD/UFBA, p. 87-95, 2004.

ANTHONY, J. C.; WARNER, L. A.; KESSLER, R. C. Comparative epidemiology of dependence on tobacco, alcohol, controlled substances, and inhalants: Basic findings from the National Comorbidity Survey. *Experimental and Clinical Psychopharmacology*, v. 2, p. 244–268, 1994.

ARGILLI, E. et al. Mechanism and time course of cocaine-induced long-term potentiation in the ventral tegmental area. *J Neurosci,* v. 28, n. 37, p. 9092–9100, set. 2008.

ARON, A.R. et al. Converging Evidence for a Fronto-Basal-Ganglia Network for Inhibitory Control of Action and Cognition. *J Neurosci*, v.27, n. 44, p.11860–11864, out. 2007.

AURIACOMBE, M; TIGNOL, J. Withdrawal and management of opiate addicts. *Rev Prat*, v. 45, n. 11, p. 1383–1387, 1995.

AZEVEDO, G.; CRUZ, J. H. T. Proibição, descriminalização e legalização: alternativas de enfrentamento à crise do proibicionismo. *Conhecimento Online*, Novo Hamburgo, v. 1, p. 104-118, abr. 2015. Disponível em: https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/91/1597. Acesso em: 28 fev. 2020.

BAKKEN, K.; LANDHEIM, A. S.; VAGLUM, P. Axis I and II disorders as long-term predictors of mental distress: a six-year prospective follow-up of substance-dependent patients. *BMC Psychiatry,* v.7, n. 29, p. 1-12, 2007.

BALL, A. L. HIV, injecting drug use and harm reduction: a public health response. *Addiction,* v. 102, n. 5, p. 684–690, mai. 2007.

BARDO, M.T.; BEVINS, R. A. Conditioned place preference: what does it add to our preclinical understanding of drug reward? *Psychopharmacology*, v. 153, n. 1, p. 31–43, jan. 2001.

BARON, A.; GALIZIO, M. Positive and negative reinforcement: Should the distinction be preserved? *Behav Anal*, v.28, n. 2, p. 85–98, 2005.

BASTOS, F. I. P. M. et al. (Org.). *III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/34614/1/III%20LNUD_PORTUGU%C3%8AS.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

BECHARA, A. Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive perspective*. Nat Neurosci*, v. 8, n. 11, p. 1458–1463, 2005.

BELIN, D. et al. Parallel and interactive learning processes within the basal ganglia: relevance for the understanding of addiction. *Behav Brain Res*, v. 199, n. 1, p. 89–102, abr. 2009.

BERRIDGE, K. C. The debate over dopamine's role in reward: the case for incentive salience. *Psychopharmacology,* v. 191, p. 391–431, 2007.

BLUM, K. et al. "Liking" and "wanting" linked to Reward Deficiency Syndrome (RDS): hypothesizing differential responsivity in brain reward circuitry. *Curr Pharm Des,* v. 18, p. 113–118, 2012.

BRADY, K. T. et al. Substance Use Disorders and Anxiety: A Treatment Challenge for Social Workers. *Soc Work Public Health*, v. 28, p. 407–423, 2013.

BRASIL. Portaria nº 1028, de 01 de julho de 2005. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html. Acesso em: 10 out. 2019.

_____.Lei nº 11.343, de 23 agosto de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm. Acesso em 10 out. 2019.

_____. Presidência da República. *Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas.* Brasília: SENAD, 2009. Disponível em: http://conselheiros6.nute.ufsc.br/ebook/medias/pdf/Relat%C3%B3rio%20brasileiro%20sobre%20drogas.compressed.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

_____. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm. Acesso em 10 out. 2019.

_____. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. *Legislação e políticas públicas sobre drogas no Brasil*. Brasília, 2011. Disponível em: < https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/cartilhas-politicas-sobre-drogas/2011legislacaopoliticaspublicas.pdf>. Acesso em 17 fev. 2020.

_____.Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: 17 fev. 2020.

_____.Projeto de Lei nº 37, de 05 de junho de 2013. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3745225&ts=1567535512773&disposition=inline. Acesso em: 10 out. 2019.

_____.Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm. Acesso em 10 out. 2019.

BÜCHELE, F.; COELHO, E. B. S.; LINDNER, S. R. A. Promoção de saúde enquanto estratégia de prevenção ao uso das drogas. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 267-273, jan./fev. 2009. Disponível em: <https://cetadobserva.ufba.br/sites/cetadobserva.ufba.br/files/340.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020

BUSTO, U; FORNAZZARI, L; NARANJO, C. A. Protracted tinnitus after discontinuation of long-term therapeutic use of benzodiazepines. *J Clin Psychopharmacol*, v. 8, p. 359–362, 1988.

CADET, J. L.; BISAGNO, V. The Primacy of Cognition in the Manifestations of Substance Use Disorders. *Front Neurol*, v. 4, n. 189, p. 1-4, nov. 2013.

CANTÃO, L.; BOTTI, N. C. L. Suicidal behavior among drug addicts. *Revista Brasileira de Enfermagem* , v. 69, p. 389–396, 2016.

CANTY, C.; SUTTON, A.; JAMES, S. Strategies for community-based drug law enforcement: from prohibition to harm reduction. *In*: STOCKWELL, T.; GRUENEWALD, P. J.; TOUMBOUROU, J. M.; LOXLEY, W. editors. *Preventing harmful substance use: the evidence base for policy and practice*. Chichester: John Wiley & Sons, p. 225-36, 2005.

CARTA DE OTTAWA. Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção da Saúde. Ottawa, novembro de 1986. Disponivel em : http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf

CARVALHO, J. C. Uma história política da criminalização das drogas no Brasil; a construção de uma política nacional. *In: VI Semana de História e III Seminário Nacional de História: Política, cultura e sociedade.* Rio de Janeiro, RJ: Programa de Pós-Graduação em História, Midiatização da Cultura, Criminalização e Patologização dos Usuários de Crack. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 17 a 21 de outubro de 2011. Disponível em: https://neip.info/novo/wp-content/uploads/2015/04/carvalho_histria_poltica_criminalizao_drogas_brasil.pdf. Acesso em: 28 fev. 2020.

CHARTOFF, E. H.; CARLEZON, W. A. Drug withdrawal conceptualized as a stressor. *Behav Pharmacol*, v. 25, n. 5-6, p. 473–492, set. 2014.

CHASE, P. N. Teaching the Distinction Between Positive and Negative *Reinforcement. Behav Anal*, v. 29, n. 1, p. 113–115, 2006.

CHILDRESS, A.R; MCLELLAN, A. T; O'BRIEN, C. P. Abstinent opiate abusers exhibit conditioned craving, conditioned withdrawal and reductions in both through extinction. *British journal of addiction,* v. 81, n. 5, p. 655–660, out. 1986.

CLARO, H. G. et al. Drug use, mental health and problems related to crime and violence: cross-sectional study. *Revista Latino-Americana de Enfermagem,* v. 23, n. 6, p. 1173–1180, nov./dez. 2015.

COSKUN, M; KAYA, I. Painful Muscle Cramps Possibly Associated with Withdrawal from Methylphenidate*. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, v. 26, n. 7, p. 658–659, jun. 2015.

CRUZ, O. S.; MACHADO, C. Intervenção no fenómeno das drogas: algumas reflexões e contributos para a definição de boas práticas. *Psicologia,* Lisboa*,* v. 27, n. 1, p. 13-31, 2013. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/psi/v27n1/v27n1a02.pdf. Acesso em: 28 fev. 2020.

CZERESNIA, D. Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças: o papel da ANS. *In:* MONTONE, J.; CASTRO, J. W. (Orgs.) *Documentos Técnicos de apoio ao*

Fórum de Saúde Suplemetar de 2003. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, p. 211-240, 2004.

DALLEY, J. W.; EVERITT, B. J.; ROBBINS, T. W. Impulsivity, Compulsivity, and Top-Down Cognitive Control. *Neuron,* v. 69, n. 4, p. 680–694, fev. 2011.

DAY, E; RUDD, J. H. F. Alcohol use disorders and the heart. *Addiction*, v.114, n. 9, p. 1670–1678, set. 2019.

DONEDA, D.; GANDOLFI, D. O início da Redução de Danos no Brasil na Perspectiva governamental: Ação local com impacto Nacional. *In*: SILVEIRA, D. X.; MOREIRA, F. G. organizadores. *Panorama Atual de Drogas e Dependências*. São Paulo: Atheneu, p. 358-360, 2006.

DUBE, S. R. et al. Childhood Abuse, Neglect, and Household Dysfunction and the Risk of Illicit Drug Use: The Adverse Childhood Experiences Study. *Pediatrics*, v.111, n. 3, p. 564-572, mar. 2003. Disponível em: https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/ACE-and-Illicit-Drug-Use-Pediatrics-2003.pdf . Acesso em: 20 fev. 2020.

DUNCAN, J. The structure of cognition: attentional episodes in mind and brain. *Neuron*, v. 80, p. 35–50, 2013.

EVERITT, B. J; ROBBINS, T. W. Drug Addiction: Updating Actions to Habits to Compulsions Ten Years On. *Annu Rev Psychol*, v. 67, p. 23–50, 2016.

FERRREIRA, A. C. Z. et al. Caracterização de internações de dependentes químicos em uma unidade de reabilitação. *Cogitare Enferm*, v. 17, n. 3, p. 444-451, jul./set., 2012. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/fde4/f777ae48fc6cab838966f99c7c78247b5300.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

FERREIRA FILHO, O. F. et al. Perfil sociodemográfico e de padrões de uso entre dependentes de cocaína hospitalizados. *Rev Saúde Pública*, v. 37, n. 6, p. 751-759, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v37n6/18018.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

GALLASSI, A. D. et al. Custos dos problemas causados pelo abuso do álcool. *Archives of Clinical Psychiatry*, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 25–30, 2008.

GELBCKE, F. L.; PADILHA, M. I. C. S. O fenômeno das drogas no contexto da promoção da saúde. *Texto Contexto Enferm*, v. 13, n. 2, p. 272-279, abr./jun. 2004. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/714/71413211.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

GEORGE, O.; KOOB, G. F. Craving, context and the cortex. *Nat Neurosci*, v. 14, p. 409–410, mar. 2011.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.* 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLDSTEIN, R. Z.; VOLKOW, N. D. Drug addiction and its underlying neurobiological basis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. *Am J Psychiatry*, v. 159, n. 10, p. 1642–1652, out. 2002.

GOLDSTEIN, R. Z.; VOLKOW, N. D. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. *Nat Rev Neurosci*, v. 12, n. 11, p. 652–669, out. 2011.

GOMES, A. L.; GARCIA, R. *Lei que altera a política sobre drogas á aprovada no Senado Federal*. 2019a. Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/maio/lei-que-altera-a-politica-sobre-drogas-e-aprovada-no-senado-federal. Acesso em: 10 out. 2019.

GOMES, A. L. Prevenção às drogas e reinserção de usuários recebem investimento de mais de R$ 150 milhões em março. 2019b. Disponível em: http://desenvolvimentosocial.gov.br/noticias/prevencao-as-drogas-e-reinsercao-de-usuarios-recebem-investimento-de-mais-de-r-150-milhoes-em-marco. Acesso em 18 fev. 2020.

GRANT, B. F. et al. Prevalence and co-occurrence of substance use disorders and independent mood and anxiety disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *Arch Gen Psychiatry*, v. 61, n. 8, p. 807–816, 2004.

GRANT, J. E.; CHAMBERLAIN, S. R. Impulsive action and impulsive choice across substance and behavioral addictions: cause or consequence? *Addict Behav*, v. 39, p. 1632–1639, 2014.

HALLSTROM, C; LADER, M. Benzodiazepine withdrawal phenomena. *Int Pharmacopsychiatry*, v. 16, p. 235–244, 1981.

HAMMER, R. et al. Addiction: Current Criticism of the Brain Disease Paradigm. *AJOB Neurosci*, v. 4, p. 27–32, 2013.

HAMMOND, C. J.; MAYES, L. C.; POTENZA, M. N. Neurobiology of Adolescent Substance Use and Addictive Behaviors: Prevention and Treatment Implications. *Adolesc Med State Art Rev,* v. 25, p. 15–32, 2014.

HEATHER, N. Q: Is Addiction a Brain Disease or a Moral Failing? A: Neither. *Neuroethics*, v. 10, p. 115–124, 2017.

HEINZ, A. et al. Addiction as Learned Behavior Patterns. *J Clin Med,* v. 8, n. 1086, p. 1-9, jul. 2019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723628/pdf/jcm-08-01086.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

HYMAN, S. E. Addiction: a disease of learning and memory. *Am J Psychiatry*, v. 162, n. 8, p. 1414–1422, ago. 2005.

KARAM, M. L. Legislações proibicionistas em matéria de drogas e danos aos direitos fundamentais. *Verve,* v. 12, p. 181-212, 2007. Disponível em: http://revistas.pucsp.br/verve/article/view/5208/3741. Acesso em: 17 fev. 2020.

KARIMI, A; RAZAGHI, R. The role of smoking on the mechanical properties of the human lung. *Technology and Health Care*, v.26, p. 963–972, n. 9859, jul. 2018.

KENNEY, J. W.; GOULD, T. J. Modulation of hippocampus-dependent learning and synaptic plasticity by nicotine. *Mol Neurobiol* , v. 38, n. 1, p. 101–121, ago. 2008.

KESSLER, R. C. et al. Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys. *Br J Psychiatry*, v. 197, n. 5, p. 378–385, nov. 2010.

KOHNO, M. et al. Neurobiology of addiction. Toward the development of new therapies. *Ann N Y Acad Sci*, v. 909, p. 170–185, 2000.

_____. Negative reinforcement in drug addiction: the darkness within. *Curr Opin Neurobiol*, v. 23, n. 4, p. 559–563, abr. 2013.

_____. The dark side of emotion: the addiction perspective. *Eur J Pharmacol*, v. 753, p. 73–87, abr. 2015.

_____. Neuroinflammation in addiction: A review of neuroimaging studies and potential immunotherapies. *Pharmacol Biochem Behav*, v. 179, p. 34–42, abr. 2019.

_____. Neurobiology of Opioid Addiction: Opponent Process, Hyperkatifeia, and Negative Reinforcement. *Biological Psychiatry,* v. 87, n. 1, p. 44-53, jan. 2020. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322319314350. Acesso em: 10 out. 2019.

KOOB, G. F.; LE MOAL, M. Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. *Science*, v. 278, n. 5335, p. 52–58, out. 1997.

KOOB, G. F. et al. Opponent process and drug dependence: Neurobiological mechanisms. Seminars in *Neuroscience*, v. 5, n. 5, p. 351–358, out. 1993.

_____. Neurobiological mechanisms in the transition from drug use to drug dependence*. Neurosci Biobehav Rev*, v.27, n. 8, p. 739–749, jan. 2004.

LEVY, N. Addiction is Not a Brain Disease (and it Matters). *Front Psychiatry*, v. 4, n. 24, p.1-7, abr. 2013.

LEYRO, T. M; ZVOLENSKY, M. J. The Interaction of Nicotine Withdrawal and Panic Disorder in the Prediction of Panic-relevant Responding to a Biological Challenge. *Psychol Addict Behav*, v. 27, n. 1, p. 90–101, mar. 2013.

LIMA, R. C. C.; TAVARES, P. Desafios recentes às políticas sociais brasileiras sobre as drogas: enfrentamento ao crack e proibicionismo. *Argumentum,* Vitória , v. 4, n. 2, p. 6-23, jul./dez. 2012. Disponível em: http://abramd.org/wp-

content/uploads/2014/06/2013_Artigo_Enfrentamento_ao_crack_e_proibicionismo.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

LINGFORD-HUGHES, A. R.; WELCH, S.; NUTT, D. J. Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol*, v. 18, p. 293–335, 2004.

LOVINGER, D. M.; PARTRIDGE, J. G.; TANG, K-C. Plastic Control of Striatal Glutamatergic Transmission by Ensemble Actions of Several Neurotransmitters and Targets for Drugs of Abuse. *Ann N Y Acad Sci, v.* 1003, p. 226-240, nov. 2003.

MACMASTER, S. A. Harm Reduction: A New Perspective on Substance Abuse Services. *Soc Work*, v. 49, p. 356–363, 2004.

MAINEROVA, B. et al. Alcohol withdrawal delirium - diagnosis, course and treatment. *Biomedical Papers*, v. 159, n. 1, p. 44–52, mar. 2015.

MALTA, D. C. et al. Uso de substâncias psicoativas em adolescentes brasileiros e fatores associados: Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, 2015. *Rev Bras Epidemiol*, v. 21, s.1, p. 1-16 , nov. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2018000200400. Acesso em: 20 fev. 2020.

MARINIS, M. D.; JANIRI, L.; AGNOLI, A. Headache in the Use and Withdrawal of Opiates and Other Associated Substances of Abuse. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, v. 31, p. 159–163, 1991.

MATÉ, G. Addiction: Childhood Trauma, Stress and the Biology of Addiction. *Journal of Restorative Medicine*, v.1, p. 55-63, 2012. Disponível em: https://journal.restorativemedicine.org/index.php/journal/article/view/12/19. Acesso em: 20 fev. 2020.

MENDES, R. M.; FERNANDEZ, J. C. A.; SACARDO, D. P. Promoção da saúde e participação: abordagens e indagações. *Saúde Debate*, v. 40, n. 108, p. 190-203, jan./mar. 2016.

MEYER, P. J.; King, C. P.; Ferrario, C. R. Motivational Processes Underlying Substance Abuse Disorder. Curr Top Behav Neurosci, v. 27, p. 473-506, 2016.

MOREIRA, F. G.; SILVEIRA, D. X.; ANDREOLI, S. B. Redução de danos do uso indevido de drogas no contexto da escola promotora de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 11, n. 3, p. 807-816, 2006.

MORRISON, P.; SMITH, A. E.; AKERS, A. (2014) Substance use and sexual risk among at-risk adolescents in Juiz de Fora, Minas Gerais State, Brazil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 30, n. 4, p. 794–804, abr. 2014.

NARDI, F. L. et al. Drug use and antisocial behavior among adolescents attending public schools in Brazil. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, v. 34, n. 2, p. 80–86, 2012.

NASCIMENTO, E. C; NASCIMENTO, E; SILVA, J. P. Uso de álcool e anfetaminas entre caminhoneiros de estrada. *Rev Saúde Pública*,v. 41, n. 2, p. 290-293, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41n2/5846.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (NIDA). Drugs, Brains, and Behavior: The Sciences of Addiction. 2018.

NOVAES, P. S. O tratamento da dependência química e o ordenamento jurídico brasileiro. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. 17, n. 2, p. 342-356, jun. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v17n2/1415-4714-rlpf-17-02-00342.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

NUTT, D. et al. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. *Lancet*, v. 369, n. 9566, p. 1047–1053, mar. 2007.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde, de 22 de julho de 1946. Disponível em: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

PERDUCA, M. Vamos criminalizar a proibição! *In:* ACSELRAD, G., organizador. *Avessos do prazer: drogas, AIDS e direitos humanos*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p. 51-63, 2005.

PEREIRA, O. P. Políticas públicas e coesão social. *Estudios Económicos de Desarrollo Internacional- AEEADE*, v. 5, n. 2, p. 123-142, 2005. Disponível em : http://www.usc.es/economet/reviews/eedi527.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

PICKARD, H. Responsibility without Blame for Addiction. *Neuroethics,* v. 10, p. 169–180, 2017.

PIPER, M. E. Withdrawal: Expanding a Key Addiction Construct. *Nicotine Tob* Res, v. 17, n. 12, p. 1405–1415, dez. 2015.

POSNER, M. I.; DEHAENE, S. Attentional networks*. Trends Neurosci*, v. 17, n. 2, p. 75–79, 1994.

POTENZA, M. N. et al. Neuroscience of behavioral and pharmacological treatments for addictions. *Neuron*, v. 69, n. 4, p. 695–712, fev. 2011.

PRATTA, E. M. M.; SANTOS, M.A. Levantamento dos motivos e dos responsáveis pelo primeiro contato de adolescentes do ensino médio com substâncias psicoativas. *Revista eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (SMAD)*, v. 2, n. 2, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/803/80320204.pdf. Acesso em: 25 fev. 2020.

QUELLO, S. B; BRADY, K. T; SONNE, S. C. Mood Disorders and Substance Use Disorder: A Complex Comorbidity. *Sci Pract Perspect*, v. 3, n. 1, p. 13–21, dez. 2005.

RAHMAN, S. J. et al. Decision making and neuropsychiatry. *Trends Cogn Sci***,** v.5, p. 271–277, jun. 2001.

REDISH, A. D.; JENSEN, S.; JOHNSON, A. A unified framework for addiction: vulnerabilities in the decision process. *Behav Brain Sci*, v. 31, n. 4, p. 415–487, aug. 2008.

REUTER, P. What drug policies cost: estimating government drug policy expenditures. *Addiction,* v. 101, n. 3, p. 315–322, mar. 2006.

RIBEIRO, M. M. Aspectos legais. *In:* SILVEIRA, D. X.; MOREIRA, F.G.; organizadores. *Panorama atual de drogas e dependências*. São Paulo: Editora Atheneu, p. 469-76, 2006.

RIBEIRO, M. M.; ARAÚJO, M. R. Política mundial de drogas ilícitas: uma reflexão histórica. *In:* SILVEIRA, D. X.; MOREIRA, F. G., organizadores. *Panorama atual de drogas e dependências.* São Paulo: Editora Atheneu, p. 457-68, 2006.

ROBINSON, T. E. E; KOLB, B. Structural plasticity associated with exposure to drugs of abuse. *Neuropharmacology***,** v. 47, n. 1, p.33–46, 2004.

RUIZ, M. M. et al. Trace elements in drug addicts. *Klin Wochenschr*, v. 68, p. 507–511, mai. 1990.

SANTOS, J. A. T.; OLIVEIRA, M. L. F. Políticas públicas sobre álcool e outras drogas: breve resgate histórico. *Saúde & Tranformação Social*, Florianópolis, v.4, n.1, p. 82-89, 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/2653/265325753014.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

SCHNEIDER, D. R. Horizonte de racionalidade acerca da dependência de drogas nos serviços de saúde: implicações para o tratamento. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. 3, p. 687-698, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n3/v15n3a11.pdf. Acesso em: 28 fev. 2020.

SCHENKER, M.; MINAYO, M. C. S. A implicação da família no uso abusivo de drogas: uma revisão crítica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 8, n. 1, p. 299-306, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a22v08n1.pdf. Acesso em: 25 fev. 2020.

SCHWABE, L; DICKINSON, A; WOLF, O. T. Stress, habits, and drug addiction: A psychoneuroendocrinological perspective. *Exp Clin Psychopharmacol***,** v.19, n. 1, p. 53–63, fev. 2011.

SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. *Physis: Rev. Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 29-41, fev./mar., 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.

SILVA, R. A. et al. A percepção de caminhoneiros sobre o uso de substâncias psicoativas no trabalho: um estudo etnográfico. SMA, *Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog*, v. 15, n. 4, p. 1-8, out./dez., 2019. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/337231422_A_percepcao_de_caminhoneiros_sobre_o_uso_de_substancias_psicoativas_no_trabalho. Acesso em: 20 fev. 2020.

SIRVENT, C.; FERNANDEZ, L. Depersonalization Disorder in Former Addicts (Prevalence of Depersonalization-Derealization Disorder in Former Addicts. *J Addict Res Ther* , v. 6, n. 25, p. 1-5, mai. 2015.

SJOERDS, Z. et al. The role of habits and motivation in human drug addiction: a reflection. *Front psychiatry*, v. 5, p. 8, 2014.

SKINNER, M. D.; AUBIN, H. J. Craving's place in addiction theory: Contributions of the major models. *Neurosci Biobehav Ver*, v.34, p. 606–623, 2010.

SOUZA, S. Políticas públicas: uma revisão da literatura. *Sociologias*, Porto Alegre, v. 8, n. 16, p. 20-45, jul./dez. 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16. Acesso em: 17 fev. 2020.

STANDAERT, D. G.; GALANTER, J. M. Farmacologia da neurotransmissão dopaminérgica. *In*: GOLAN, D. E. et al. *Princípios de Farmacologia: A base fisiopatológica da farmacoterapia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 166-185, 2009.

STEPHANE, M.; ARNAOUT, B.; YOON, G. Alcohol withdrawal hallucinations in the general population, an epidemiological study. *Psychiatry Research*, v. 262, p. 129–134, 2018.

TEIXEIRA, Carmen Fontes. Promoção de Saúde e SUS: um diálogo pertinente. *In*: TEIXEIRA, Carmen Fontes; SOLLA, Jorge Pereira. *Modelo de atenção à Saúde da Família.* Salvador: EDUFBA, p. 85-108, 2006. Disponível em: http://books.scielo.org/id/f7/pdf/teixeira-9788523209209-05.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

TEIXEIRA, M. B. et al. Tensões paradigmáticas nas políticas públicas sobre drogas: análise da legislação brasileira no período de 2000 a 2016. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 5, p. 1455-1466, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n5/1413-8123-csc-22-05-1455.pdf. Acesso em: 20 fev.2020.

TAMMI, T.; HURME, T. How the harm reduction movement contrasts itself against punitive prohibition. *Int J Drug Policy*, v. 18, n. 2, p. 84–87, abr. 2007.

VANDREY, R; UMBRICHT, A; STRAIN, E. C. Increased Blood Pressure Following Abrupt Cessation of Daily Cannabis Use. *J Addict Med*, v. 5, n. 1, p. 16-20, mar. 2011.

VERDEJO-GARCÍA, A.; LAWRENCE, A. J.; CLARK, L. Impulsivity as a lnerability marker for substance-use disorders: review of findings from high-risk research, problem gamblers and genetic association studies. *Neurosci Biobehav Rev*, v. 32, p. 777–810, 2008.

VOLKOW, N. D.; KOOB, G. F.; MCLELLAN, A. T. Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. *N Engl J Med*, v. 374, p. 363–371, jan. 2016.

VOLKOW, N. D. et al. Addiction: Decreased reward sensitivity and increased expectation sensitivity conspire to overwhelm the brain's control circuit. *Bioessays*, v. 32, n. 9, p. 748–755, set. 2010.

_____. Addiction Circuitry in the Human Brain. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, v. 52, p. 321–336, 2012.

_____. Unbalanced Neuronal Circuits in Addiction. *Curr Opin Neurobiol*, v. 23, p. 639–648, 2013.

WEATHERBURN, D. Dilemmas in harm minimization. *Addiction,* v. 104, n. 3, p. 335–339, mar. 2009.

WILKERSON, A. K. et al. Insomnia severity during early abstinence is related to substance use treatment completion in adults enrolled in an intensive outpatient program. *Journal of Substance Abuse Treatment*, v. 104, p. 97–103, 2019.

WODAK, A. Harm reduction is now the mainstream global drug policy. *Addiction,* v. 104, n. 3, p. 343–345, mar. 2009.

WOOD, W; RÜNGER, D. Psychology of Habit. *Annu Rev Psychol*, v. 67, p. 289–314, jan. 2016.

UNODC. UNITED NATIONS. *World Drug Report 2019* [Site na Internet]. Disponível em: https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

YANG, H. et al. Interaction Between Early Life Stress and Alcohol Dependence on Neural Stress Reactivity. *Addict Biol*, v. 20, n. 3, p. 523–533, mai. 2015.