Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

MARIA PAULA SIMÕES LIMA FIGUEIREDO

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER SOB A ÓTICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

FRANCA
2018

MARIA PAULA SIMÕES LIMA FIGUEIREDO

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER SOB A ÓTICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional - Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para obtenção de título de Mestre.

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesario

Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.

FRANCA
2018

Figueiredo, Maria Paula Simões Lima
F491u Urgência e emergência em saúde da mulher sob a ótica do desenvolvimento regional e das políticas públicas. / Maria Paula Simões Lima Figueiredo. – Franca: Uni-Facef, 2017.
116p. ; il.

Orientador: Prof. Dra. Raquel Rangel Cesario
Dissertação de Mestrado – Uni-Facef
Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento regional. 2.Politicas públicas. 4.Ginecologia – obstetrícia. 5.Saúde - Mulher. 6.Pronto Socorro. I.T.

CDD 613.04244

MARIA PAULA SIMÕES LIMA FIGUEIREDO

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER SOB A ÓTICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional - Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para obtenção de título de mestre.

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesario

Linha de pesquisa: Desenvolvimento social e Políticas Públicas.

Franca, _____ de março de 2018.

Orientadora: _____
Nome: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesario
Instituição: Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca

Examinadora:_____
Nome: Profa. Daniela de Figueiredo Ribeiro
Instituição: Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca

Examinadora: _____
Nome: Profa. Andreia Aparecida de Carvalho Reis Liporoni
Instituição: Unesp – Universidade Estadual Paulista - Franca

Àquela por quem eu não desisti, àquela que sempre me fez mais capaz, minha “Vó Cida”.

AGRADECIMENTOS

Inicio o agradecimento à minha avó Cida, pela insistência e por acreditar tanto e sempre. Ela não foi a única, mas a mais emblemática. Não deixo de lado meu avô Paulo, que, de forma suave, sempre esteve por traz incentivando e dando o suporte. A vocês dois, meus grandes exemplos de determinação e força, meu muitíssimo obrigado.

Não poderia deixar de agradecer também à minha mãe, pela preocupação com meu desgaste e pelo estímulo a concluir essa tarefa, sempre me relembrando os meus limites. Obrigada pelas ajudas indiretas e diretas, obrigada pelas comidas congeladas que me salvaram inúmeras vezes, pelas revisões gramaticais de prontidão e por ser minha mãe e base da minha persistência e fortaleza.

Agradeço ao meu marido por não me cercear das minhas inúmeras tarefas simultâneas, por entender os meus momentos de estresse em meio aos vários livros e papéis e por compreender meus desejos profissionais. Obrigada por ser quem você é.

Agradeço à Ângela Freitas, secretária de pós-graduação da instituição. Acredito que sua função e auxílio muitas vezes tornam-se a alma e o sucesso do mestrado. Parabéns por fazer com amor e afinco o seu trabalho.

Agradeço da mesma forma ao “Aguinaldo do NTI” da Famema – Aguinaldo Alves da Silva, por todo apoio e prontidão sem ao menos me conhecer. Sem você, com certeza, não teria sido viável o levantamento de todos os dados.

Às minhas amigas de residência, meu carinho e gratidão, não só pelas trocas de plantão e coberturas, mas pela escuta e por serem simplesmente fantásticas. Assim, sou grata à Patrícia Biltge, Jussara Coelho, Juliana Jaime, e em especial à Jaqueline Tedesco e à Juliana Jorge.

Agradeço aos meus antigos chefes, Dr Sinésio Duarte e Dr. Frederico Alonso, e alunos da época pelas trocas de horário e compreensão em relação a todos os ajustes necessários.

À Dra. Raquel, minha admiração e meu afeto. Amiga e orientadora que confiou seu nome a essa orientação mesmo sabendo de todas as minhas limitações. Obrigada por me mostrar na prática que sem pressão as coisas também fluem.

Agradeço a todos os professores e colegas do mestrado, por ampliarem meu olhar para o mundo. Fazer as aulas com vocês foi conhecer assuntos completamente díspares na minha formação e com isso, crescer e me desenvolver pra vida. Meu agradecimento especial ao professor Dr. José Alfredo de Pádua Guerra, que foi além das teorias da gestão de organização do terceiro setor. Em você vi uma docência leve, respeitosa, incentivadora e de coração. Obrigada por ter sido espelho.

Ao Hospital Materno Infantil, agradeço a possibilidade de crescimento profissional e pessoal e de perceber ainda mais na prática a relação de desenvolvimento regional, políticas públicas e saúde. Obrigada aos meus professores da residência e em especial ao Dr. Luiz Takano, que me auxiliou em singelas, mas essenciais informações e discussões.

Por fim e, não menos importante, agradeço à banca, composta pela Dra. Daniela Figueiredo e Dra. Andreia Liporoni pelas contribuições, discussões e escuta.

RESUMO

Entende-se saúde como direito humano fundamental e como maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, sendo influenciado por fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, sendo a saúde da mulher fundamental para o desenvolvimento sustentável e para as gerações futuras. Objetiva-se, nesta dissertação, explorar as relações de um serviço de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia com o desenvolvimento regional e políticas públicas, realizando um estudo observacional, transversal, qualiquantitativo e com análise documental, por meio de um levantamento retrospectivo dos atendimentos do pronto socorro registrados no sistema informatizado do Hospital Materno Infantil (HMI) do Município de Marília, no período de 01/novembro/2016 a 31/outubro/2017, bem como por meio de entrevista com a Diretoria técnica do HMI, e, análise dos documentos referentes ao fluxo de atenção à saúde na rede de urgência e emergência em saúde da mulher. Os dados apontam que o fluxo de atendimento entre os municípios do DRS IX e entre os pontos de atenção dentro do município de Marília não é bem especificado, com fragilidade no processo de regionalização e hierarquização. A maioria das usuárias do pronto socorro (PS) está na faixa etária dos 20 a 24 anos, é casada, possui ensino médio, é do lar e procedente de Marília. A classificação de risco ainda é insipiente e os maiores encaminhadores ao HMI são as Unidades de Pronto Atendimento. O registro médico muitas vezes é inespecífico, existindo grande solicitação de exames, mesmo sendo a maioria dos casos de baixa complexidade e a porcentagem relativamente pequena de taxa de internação. As internações possuem média de permanência maior que o recomendado e pouca gravidade extrema, representada pelo pequeno número de encaminhamentos à UTI. Existe um número considerável de atendimentos por condições sensíveis à atenção primária, mesmo de pessoas provenientes de áreas com presença de UBS ou PSF. Os grandes medicamentos usados são passíveis de utilização domiciliar, sendo o seu maior representante a dipirona. Conclui-se que o pronto socorro deve organizar a atenção às urgências e emergências nos hospitais, atendendo à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionando como retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade. Entretanto, nota-se um desvio em sua função original, com realização de consultas pertinentes a outros pontos de atenção. Além disso, o estudo evidencia um distanciamento da prática ao que é estabelecido nas políticas de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção à saúde da mulher, de atenção hospitalar, dentre outras. O conhecimento produzido pode servir de base para estudos mais detalhados, bem como para organização do próprio serviço do PS do HMI e criação de protocolos para organizar a forma de condução dos casos e os fluxos assistenciais.

Palavras-chave: Ginecologia e obstetrícia, Pronto-Socorro, Política pública.

ABSTRACT

Health is understood as a fundamental human right and as a major resource for social, economic and personal development. It is influenced by political, economic, social, cultural, environmental, behavioral and biological factors, and women's health is fundamental to sustainable development and for future generations. The objective of this dissertation is to explore the relationships of an urgency and emergency care in gynecology and obstetrics with regional development and public policies, conducting an observational, cross-sectional, qualitative and quantitative study, with documental analysis, through the retrospective survey of care in the Maternity Hospital (MH), in the Municipality of Marília, from 01 / November / 2016 to 31 / October / 2017, as well as through an interview with the MH Technical Director, and analysis of the documents related to the flow of health care in the network of urgency and emergency in women's health. The study indicates that the flow of care between the municipalities of Regional Health Department IX and between the points of attention within the municipality of Marília is not well specified, with fragility in the process of regionalization and hierarchization. The majority of users is between 20 and 24 years old, are married, are high school graduates, are housewife and come from Marília. The risk classification is still insipient and the major forwarders to the MH are the Urgency Care Units with lower level of complexity. The medical record is often non-specific and there is a great demand for exams, even though most cases are of low complexity and the relatively small percentage of hospitalization rate. The hospitalizations have a mean of permanence longer than recommended and little extreme severity, represented by the small number of referrals to the ICU. There is a considerable number of visits for ambulatory care sensitive conditions, even from people from areas with basic health unit or family health program. The major drugs used are possible to be used at home, and its largest representative is dipyrone. It is concluded that urgency and emergency care should organize the attention in the urgencies and emergencies' network, taking into account spontaneous and / or referenced demand and functioning as a back-up for other points of attention to less urgent emergencies. However, there is a deviation from its original function, with medical appointments pertinent to other points of attention. In addition, the study shows a distancing from practice to what is established in primary care, urgency and emergency policies, women's health care, hospital care, among others. The knowledge produced can serve as a basis for more detailed studies, as well as for the organization of the MH service itself and the creation of protocols to organize the way to conduct the cases and the care flows.

Key words: Gynecology and obstetrics, Urgency and Emergency Care, Public policy.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 11

1.1 OBJETIVO GERAL 15

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 15

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS..... 15

2 DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E JUSTIÇA SOCIAL..... 21

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: ENTENDENDO ALGUMAS INTERCONEXÕES..... 29

3.1 POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE..... 29

3.2 ASPECTOS GERAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA..... 35

4 E A MULHER?..... 40

4.1 SAÚDE DA MULHER, BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA 40

4.2 ASPECTOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA MULHER..... 48

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 54

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP..... 54

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARÍLIA/SP..... 61

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 104

REFERÊNCIAS..... 107

1 INTRODUÇÃO

Todos sabem o árduo caminho de se fazer um mestrado e esta dissertação não teve uma trajetória diferente.

Durante meu primeiro ano de percurso, tive grande apoio dos meus colegas de trabalho, alunos e superiores, para exercer minhas funções em horários alternativos. Entretanto, minha família foi assolada pela triste notícia de que minha avó materna estava com câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Minha avó que sempre foi minha maior incentivadora, aquela que me ensinou a escrever e que sempre me impulsionou nos estudos, estava cada dia mais debilitada. Mesmo com a saúde açoitada, ela não desistiu de viver e buscou os tratamentos que estavam ao seu alcance, tendo se mantido firme, mesmo quando todos esmoreceram. Espelhando-me nessa força e nesta garra, segui o mestrado e cursei todas as disciplinas necessárias, sempre com a supervisão atenta da minha “vozinha”, pois para ela minha desistência não deveria ser uma alternativa aos dias de transtorno.

No segundo ano de percurso, há menos de 5 meses, houve mudança de toda a estrutura da dissertação, incluindo o tema e objeto de estudo, já que me mudei de cidade para realizar residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Marília e, assim sendo, voltei meu interesse de estudo para a área de saúde da mulher.

A mudança foi drástica e a escolha muito difícil, pois tive que deixar meus empregos, um concurso público, meu marido e minha família, estabilidade financeira e emocional, para realizar um sonho adormecido, mas não menos importante.

Os meses iniciais de residência foram passando e os cansaços das 60 horas semanais, entremeadas com os plantões noturnos foram me assolando e fazendo com que aos poucos o mestrado se tornasse algo distante e talvez impossível. Mas minhas companheiras de residência foram solidárias e não deixaram de me apoiar um dia sequer, me incentivando e ajustando o que era possível para que o caminho fosse menos dramático. Neste período, minha mãe foi acometida por um infarto agudo do miocárdio, com apenas 50 anos, tendo passado por cateterismo e angioplastia e dias intermináveis de internação na UTI. Desistir

passou a ser um caminho, mas nunca essa foi uma opção bem aceita, pois minha mãe, igualmente, sempre foi exemplo de determinação e foco.

Talvez não menos importante, tenha sido a mudança de orientadora, já que a professora que anteriormente exercia essa função se mudou de estado, tendo sido substituída por outra, não menos capaz.

Assim, em meio a dificuldades, estudos e novas experiências em um hospital terciário especializado em saúde da mulher, surgiu o desejo de estudar o serviço de urgência e emergência (Pronto Socorro - PS) do Hospital Materno Infantil (HMI) e sua interface com o desenvolvimento regional, a partir da identificação empírica de um uso inadequado do serviço por parte das usuárias e dos próprios profissionais da saúde.

O Conselho Federal de Medicina desde 1995 define como urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata e como emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). Dessa maneira, sabe-se que o PS deve organizar a atenção às urgências e emergências nos hospitais atendendo à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionando como retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade (BRASIL, 2013a). Todavia, muitas vezes além desse atendimento original, o PS do HMI presta-se a atender mulheres com quadros percebidos como urgências, mas incompatíveis com tal situação; pacientes não aderentes à atenção primária e/ou especializada e as urgências sociais. Não obstante, ocorrem casos de acompanhamentos com retornos constantes orientados pelos próprios médicos, ao invés de contrarreferência ao serviço de atenção primária de origem. A isso soma-se a superlotação, inclusive com internações realizadas em leitos virtuais no próprio PS e agrava-se por problemas organizacionais como, por exemplo, a falta de triagem de risco, o que determina o atendimento de todos os casos que buscam por atenção, sem qualquer avaliação prévia da pertinência da queixa para o tipo de serviço procurado, podendo acarretar prejuízo aos pacientes e não atender ao princípio do SUS de equidade. Merece lembrança também a falta de materiais e insumos, fazendo, muitas vezes, com que a investigação e tratamento preconizados e baseados em evidência científica não sejam instituídos (BRASIL, 2002).

Logo, é recorrente o pensamento que, mesmo existindo políticas públicas especificamente voltadas à saúde da mulher e à organização dos fluxos assistenciais, existem lacunas entre a aplicação das mesmas e o desenvolvimento local e regional.

Soma-se ao contexto apresentado, o conhecimento grosseiro de que 80% das demandas de atendimento do PS são queixas obstétricas, totalizando uma média de 800 casos/mês.

Sabe-se que a saúde materna é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para as gerações futuras. A má saúde materna é medida por mortalidade e morbidade (GRAHAM et al, 2016) e relaciona-se com a qualidade da atenção prestada à mulher, incluindo desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal até o puerpério (SILVA, 2016). A mortalidade materna é definida como:

> a morte de uma mulher durante ou até 42 dias após o término da gravidez, independente da duração e local da gravidez, por qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou sua gestão, mas não devido a causas acidentais ou incidentais (WHO, 2012).

Neste cenário, muitas vezes o pronto socorro apresenta-se como porta de entrada para o atendimento resolutivo e determinante no desfecho positivo da saúde materna e, portanto, de fundamental necessidade de estudo.

A partir de tal contexto, surge a indagação de qual o perfil sociodemográfico e de adoecimento das mulheres que buscam atendimento de urgência e emergência no hospital materno infantil e sua relação com o desenvolvimento regional?

Nesta perspectiva, o estudo ora empreendido, versa no Capítulo 2 sobre as múltiplas relações entre a saúde, o desenvolvimento e a justiça social. Trata da saúde tanto no aspecto relacionado ao indivíduo e qualidade de vida, quanto como setor que interage em diversas dimensões com outros setores, sendo alvo de políticas públicas e interesses particulares. O Capítulo 3 aborda de forma abrangente a descentralização, hierarquização e regionalização em saúde determinada pela constituição federal e pelo SUS, os pontos de atenção em Urgência e Emergência, esclarecendo as relações entre os municípios nos fluxos assistenciais. Já o Capítulo 4 aborda a necessidade de desenvolvimento de mulher

como agente de transformação social, os aspectos mais relevantes da mortalidade feminina e os principais enfoques das políticas públicas femininas.

As conexões mentais que incitaram tais capítulos foram as seguintes: primeiro é necessário entender as relações de saúde com desenvolvimento de forma abrangente, sem restrições à saúde da mulher, pois, neste caso, o abordado de forma mais macro também se aplica ao caso singular das mulheres. Posteriormente, para se entender muitas das situações que envolvem a utilização do serviço de urgência e emergência pelas mulheres é preciso, de antemão, conhecer como os fluxos organizacionais se estruturam a partir de uma rede regionalizada e hierarquizada. Por fim, parte dos atendimentos de urgência e emergência são secundários ao papel histórico das mulheres e da forma de condução das políticas públicas.

O Capítulo 5, por sua vez, aborda os resultados integrados com a discussão, com uma análise sistêmica dos achados, sendo inviável esgotar as reflexões em relação às políticas públicas e o desenvolvimento social e humano como um todo.

O Capítulo 6 caracteriza-se como considerações finais, sendo um apanhado geral e amplo do encontrado.

Ao responder à pergunta mencionada ao final deste estudo, pretende-se contribuir, antes de qualquer coisa, para estabelecer um panorama geral do serviço prestado pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, bem como para maximizar a alocação de recursos financeiros, identificar pontos de possíveis melhorias no fluxo assistencial de urgência/emergência em saúde da mulher no município e na rede de atenção à saúde, ampliar o conhecimento de todos os atores envolvidos na prestação e na gestão do serviço e por fim, e não menos importante, contribuir como incentivo para criação de uma agenda comum de objetivos e metas a serem alcançados, agregando o maior número de agentes envolvidos e interessados, para um atendimento digno da população e benefício dos trabalhadores, já que tendo claro o serviço prestado, existe uma maior possibilidade de articulação e implementação de ações de melhoria cabíveis.

Ao levar-se em conta que para o desenvolvimento local é necessária a efetivação da cidadania e que esta inclui a capacidade de exercer os direitos políticos, civis e ambientais, com espaço efetivo de integração entre os cidadãos, entre governantes e governados, destaca-se a importância desse estudo, pois como

é possível exercer participação efetiva nesse cenário da saúde e, mais especificamente, no de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia, sem conhecimento da realidade da assistência local nesse setor? Como pode o governo estar ao alcance de todos, se as informações não estão? (AKERMAN, 2005).

Longe de almejar conclusões definitivas, o estudo foca em inspirar inquietações, com novas discussões e reflexões sobre a saúde da mulher no contexto da urgência e emergência, com consequências para o desenvolvimento regional.

1.1 OBJETIVO GERAL

Explorar as relações de um serviço de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia com o desenvolvimento regional e políticas públicas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar o serviço de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia do Hospital Materno Infantil, bem como suas usuárias;

Caracterizar o fluxo de atenção à saúde da Rede de Urgência e Emergência em saúde da mulher do Município de Marília/SP;

Problematizar a aplicação das políticas públicas relacionadas ao setor e às características encontradas;

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, transversal, qualiquantitativo e de análise documental, por meio de um levantamento retrospectivo dos atendimentos do pronto socorro (PS) registrados no sistema informatizado do

Hospital Materno Infantil do Hospital das Clínicas (HMI) do Município de Marília no período de 01/novembro/2016 a 31/outubro/2017, relacionados ao público feminino.

O HMI atende nas especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia e terapia intensiva neonatal e pediátrica, sendo caracterizado como um Hospital Especializado tipo II (BRASIL, 2015), com referência para uma cobertura populacional de 1.077.491 habitantes. Possui título de “Hospital Amigo da Criança” desde 2002, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e sendo referência no cuidado em saúde da criança e da mulher.

Na área de saúde da mulher, possui capacidade planejada de internação de 16 leitos e capacidade operacional real de 10, relacionados à ginecologia e 20 leitos de capacidade planejada e operacional relacionados à obstetrícia (alojamento conjunto), com a realização de uma média de 110 partos/mês, com aproximadamente 70% das vias de parto sendo cesáreas.

O setor de obstetrícia recebe majoritariamente casos de internação de gestação de alto risco provenientes tanto do ambulatório de gestação de alto risco como do pronto socorro, alocados fisicamente no mesmo complexo estrutural. O ambulatório de gestação de alto risco possui em torno de 200 atendimentos mensais de patologias variadas, incluindo síndromes hipertensivas, diabetes gestacional ou prévia, doenças reumatológicas, cardiopatias, má formação fetal, dentre outras.

O serviço de urgência e emergência do HMI provê atendimento pediátrico, ginecológico e obstétrico 24h por dia, 7 dias por semana à população proveniente do IX Departamento Regional de Saúde de Marília, com 62 municípios situados nas regiões de saúde de Adamantina, Assis, Marília, Ourinhos e Tupã, sendo o centro de referência da região.

O setor de ginecologia e obstetrícia do PS conta com 11 profissionais médicos que se rodiziam no plantão, bem como 6 residentes em ginecologia e obstetrícia, com média de atendimento mensal de aproximadamente 1000 casos, compondo-se mais de 80% por queixas obstétricas, segundo o núcleo de tecnologia de informação do hospital.

Neste estudo, abordaram-se apenas aspectos relacionados à saúde da mulher, excluindo-se, portanto, os pediátricos. A procura do serviço de urgência e emergência pelas usuárias pode ocorrer por demanda espontânea, por encaminhamentos dos pronto-atendimentos da cidade ou por encaminhamento dos

serviços de saúde dos municípios integrantes da Rede Regionalizada de Atenção à Saúde 10 (RRAS 10).

Todas as mulheres que chegam ao PS do HMI passam por uma classificação de risco realizada por um profissional da enfermagem, o qual categoriza o motivo da procura por gravidade da situação, não urgente (azul), urgência mínima (verde), urgência relativa (amarelo) e urgência absoluta (vermelho).

O atendimento é registrado em prontuário eletrônico, realizado por um profissional médico especialista em ginecologia e obstetrícia, por um médico residente em ginecologia e obstetrícia ou por um estudante do 5º ano de medicina, sendo que nas duas últimas situações, ocorre supervisão do atendimento pelo médico especialista de plantão. Os casos são priorizados de acordo com classificação de risco, sendo atendidos primeiro os classificados em vermelho, depois os amarelos e, por fim, os verdes e azuis. De acordo com a queixa e diagnóstico, as mulheres podem ser liberadas com orientações e/ou medicações a serem usadas em casa, podem ser submetidas a exames complementares no local, podem receber medicações no local, sendo por fim liberadas com alta hospitalar ou internadas no serviço. Para isso, como já mencionado, o HMI possui 20 leitos de internação obstétrica com alojamento conjunto e 10 leitos de internação ginecológica, além de 2 leitos de pré-parto, totalizando 38 leitos.

Foram coletados dados de todas as fichas de atendimento obstétrico e ginecológico registradas no sistema eletrônico no período delimitado, não sendo excluído nenhum atendimento do período.

As variáveis para caracterização das usuárias e do serviço foram idade, estado civil, escolaridade, ocupação, município de origem, número de atendimentos realizados por dia, classificação de risco (CR), tempo de espera para consulta, tempo de permanência no PS, código internacional de doenças (CID) registrado no atendimento, exames complementares solicitados, medicações prescritas para uso no PS, encaminhamento ao final da consulta do PS, número de consultas que geraram internação, local de internação das pacientes internadas pelo PS, tempo de internação das pacientes internadas pelo PS, CID de internação das pacientes provenientes do PS, uso de leitos de UTI pelas pacientes internadas pelo PS, com definição de CID, idade e dias de internação, encaminhamentos ao final da internação, óbito de pacientes internadas pelo PS.

Em relação aos CIDs, a investigação ocorreu pela frequência de registro no sistema, tendo se estabelecido a prevalência de cada um deles.

Alguns de interesse arbitrário foram agrupados por semelhança clínica ou de significado da seguinte forma:

- Supervisão de gestação: Z349 - Supervisão de gravidez normal, não especificada, Z359 - Supervisão não especificada de gravidez de alto risco, Z000 - Exame médico geral, Z014 - Exame ginecológico (geral) (de rotina), Z358 - Supervisão de outras gravidezes de alto risco, Z340 - Supervisão de primeira gravidez normal, Z348 - Supervisão de outra gravidez normal, Z353 - Supervisão de gravidez com história de assistência pré-natal insuficiente, Z369 -Rastreamento pré-natal não especificado.

- Dor abdomino-pélvica: R102 - Dor pélvica e perineal, M545 - Dor lombar baixa, R104 - Outras dores abdominais e as não especificadas, R103 - Dor localizada em outras partes do abdome inferior

- Ameaça de aborto: O2000 – Ameaça de aborto

- Aborto de algum tipo: O069 - Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações, O021 - Aborto retido, O039 - Aborto espontâneo - completo ou não espec., sem complicações, O034 - Aborto espontâneo - incompleto, sem complicações, O060 - Aborto não especificado - incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos, N96Abortamento habitual, O031 - Aborto espontâneo - incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia.

- Infecção do trato urinário: N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada, O234 - Infecção não especificada do trato urinário na gravidez, O231 - Infecções da bexiga na gravidez, N300 - Cistite aguda, O233 - Infecções de outras partes do trato urinário na gravidez, N309 - Cistite, não especificada, O230 - Infecções do rim na gravidez, O239 - Outras infecções e as não especificadas do trato urinário na gravidez.

- Síndromes Hipertensivas: I10 - Hipertensão essencial (primária), O149 - Pré-eclâmpsia não especificada, O16 – Hipertensão Materna não Especificada, O100 - Hipertensão essencial pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério, O141 - Pré-eclâmpsia grave, O109 - Hipertensão pré-existente não especificada, complicando a gravidez, o parto e o puerpério, O150 - Eclampsia na gravidez, O151 - Eclampsia no trabalho de parto.

-Sífilis na gestação: O981 - Sífilis complicando a gravidez, o parto e o puerpério, A539 - Sífilis não especificada, A502- Sífilis congênita precoce não especificada, A510 - Sífilis genital primária, A519 - Sífilis precoce não especificada.

- Morte Fetal: P95 – Morte fetal por causa não especificada, O364 - Assistência prestada à mãe por morte intra-uterina

- Abuso Sexual: T724 – Abuso sexual, Y059 Agressão sexual por meio de força física - local não especificado Z044 - Exame e observação após alegação de estupro e sedução

- Agressão: R456 - Violência física, Y049 - Agressão por meio de força corporal - local não especificado, Y044 - Agressão por meio de força corporal - rua e estrada, Y090 - Agressão por meios não especificados – residência, Y088 Agressão por outros meios especificados - outros locais especificados.

No tocante à classificação de risco, adotou-se 5 indicadores (BRASIL, 2014a):

Percentual de classificações segundo prioridade clínica (cor), calculado pela somatória de todas as usuárias classificadas segundo prioridade clínica (cor) dividida pelo número de usuárias classificadas, no mesmo período X 100;

Tempo médio de espera do cadastro ao início da classificação de risco, calculado pela somatória de todos os tempos de espera dos usuárias, do cadastro da CR, dividido pelo número de usuárias no mesmo período;

Tempo Médio da usuária na classificação de risco, calculado pela somatória de todos os tempos de abertura da ficha de CR ao final da CR, dividido pelo número de usuárias classificados no mesmo período;

Tempo médio de espera do final da classificação de risco ao atendimento médico, pela somatória de todos os tempos de espera dos usuários com determinada prioridade clínica para atendimento médico dividido pelo número de usuárias com a mesma prioridade clínica, no mesmo período.

Tempo médio de permanência no PS, calculado pela somatória de todos os tempos de espera das usuárias com determinada prioridade clínica, do cadastro da CR até a finalização do atendimento na urgência, dividido pelo número de usuárias com a mesma prioridade clínica, no mesmo período.

Já, para o tempo de internação, utilizou-se a média de permanência, calculada pela relação entre o número de pacientes-dia e o número de saídas,

expressando o tempo médio que o paciente permanece internado em dias (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR, 2010).

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do programa Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de gráficos e tabelas, com uso de estatística descritiva.

As informações relativas ao município de origem, pelo endereço cadastrado na ficha de atendimento do PS, das pessoas que buscaram atendimento por condições sensíveis à atenção básica foram georreferenciadas com uso do Google Maps. Foram georreferenciados pela cidade de origem aqueles endereços não identificados pelo programa. Os seguintes CIDs de condições sensíveis à atenção básica cadastrados nos atendimentos foram considerados no georreferenciamento: N70- Salpingite e oforite, N71- Doença inflamatória do útero, exceto o colo, N72- Doença inflamatória do colo do útero, N73- Outras doenças inflamatórias pélvicas femininas, N75 - Doenças da glândula de Bartholin, N76- Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva, O23- Infecção do trato urinário na gravidez, O98.1- Sífilis complicando a gravidez, parto e o puerpério como forma de associação com o CID de sífilis congênita.

Para caracterizar o fluxo de atenção à saúde da Rede de Urgência e Emergência do Município de Marília, foi agendada uma entrevista semiestruturada com a Diretora Técnica do HMI, afim de se esclarecer a regionalização e hierarquização da assistência nessa área. A entrevista foi guiada pelas seguintes perguntas disparadoras, relacionadas a queixas obstétricas e ginecológicas: Qual o fluxo assistencial das urgências e emergências em saúde da mulher estabelecida entre os Municípios da RRAS? Como se desenvolve o fluxo assistencial em saúde da mulher em urgência e emergência dentro do próprio Município de Marília? Existem protocolos de referência e contrarreferência entre os diferentes tipos de ponto de atenção da rede de urgência e emergência em saúde da mulher? A entrevista foi gravada e o fluxo assistencial reconstruído a partir das informações dadas em conjunto com análise documental dos protocolos e pactos no que se relaciona à atenção em saúde da mulher na rede de urgência e emergência.

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os preceitos da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF, sob o CAAE 80683317.2.0000.

2 DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E JUSTIÇA SOCIAL

A palavra saúde é polissêmica e ora será mencionada como setor, ora como condição do indivíduo, ora como característica coletiva, ora como direito objetivo.

Nesta dissertação, entende-se saúde como direito humano fundamental e como maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, sendo influenciado por fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 1986). Assim, o conceito de saúde contempla minimamente quatro dimensões, sendo elas a física, a mental, a espiritual e a social, configurando-se como um requisito central, e portanto, básico para uma vida digna (RIBEIRO, 2015).

Direitos e garantias fundamentais podem ser entendidos como fatores sem os quais o indivíduo não se realiza, não convive e não sobrevive e por isso devem ser assegurados e garantidos a todos, para uma vivência digna e igualitária. (SILVA, 2010). Sendo a saúde um direito fundamental, ela apresenta características próprias como universalidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade (LENZA, 2008). Dessa forma, a abordagem do desenvolvimento e saúde, merece associação do desenvolvimento humano com os direitos e garantias fundamentais.

A Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, pactuou os novos objetivos de desenvolvimento sustentável global, com intenção de implantação plena da agenda em 2030, sendo o início em 01 de janeiro de 2016. Os objetivos foram traçados por meio de consulta pública por 2 anos, envolvimento da sociedade civil e demais partes interessadas e tem como prioridades de desenvolvimento a erradicação da pobreza, a saúde, a educação, a segurança alimentar e nutricional, mas traz consigo outros aspectos importantes, como igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, os quais, por meio de uma abordagem sistêmica, não deixam de ter relação com a saúde. A Agenda explicita a necessidade do respeito aos direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento (ONU, 2015).

O desenvolvimento, por sua vez, tem relação com a melhora da qualidade de vida e das liberdades que são valorizadas, permitindo que as pessoas sejam completas, podendo praticar os seus desejos (SEN, 2010).

Muitas pessoas são expostas à morte prematura, à escassez de acesso ao serviço de saúde, de educação funcional, de emprego remunerado, de segurança econômica ou social ou à desigualdade de gênero e dessa forma têm suas liberdades substantivas ou seus direitos e garantias fundamentais restringidos (SEN, 2010). Igualmente, outras têm recusadas suas liberdades instrumentais, com privação de suas liberdades políticas, de seus direitos civis básicos, de oportunidades sociais e de proteção social, negando a possibilidade de participarem amplamente na sociedade (PINHEIRO, 2012). Assim, a pura e simples privação de uma liberdade substantiva pode acarretar um série de outras privações de liberdades substantivas e instrumentais e, nesse paradigma, a saúde apresenta-se novamente como essencial (SEN, 2010; PINHEIRO, 2012).

Para exercerem uma liberdade substantiva é necessário que as pessoas tenham capacidade de levar o tipo de vida que elas valorizam. Tais capacidades podem sofrer impacto de políticas públicas e o inverso é igualmente verdadeiro (SEN, 2010). Exemplificando, as políticas públicas de saúde sofrem influência daquilo que atualmente é valorizado, bem como interferem na valorização de determinados aspectos relacionados à saúde.

Ter mais liberdade melhora o auto cuidado e o poder de influenciar o mundo, favorece a realização de bons resultados, essenciais para o processo de desenvolvimento (SEN, 2010).

Ao falar-se em desenvolvimento, sabe-se que existe uma relação bidirecional ou mesmo multidirecional com a saúde, ou seja, a saúde, tanto como setor quanto como condição, pode influenciar positiva ou negativamente no desenvolvimento social e econômico, assim como ambos podem exercer o mesma influência sobre ela (AKERMAN, 2005).

Posicionando-se sobre a questão econômica, é certo que a privação de renda pode ser a causa de más condições de vida, de saúde, de nutrição, de educação e etc, entretanto, ainda que muito importante, integra um arsenal mais amplo, composto pela privação de capacidades. Por exemplo, o desemprego não envolve apenas a questão de diminuição de renda, mas também a debilitação de habilidades, de iniciativa, exclusão social, perda de autonomia, supressão da saúde

física e mental. Assim, mesmo que haja um sistema de previdência, por exemplo, tais efeitos não são cobertos (SEN, 2010).

A questão da renda ou econômica não pode, portanto, ser analisada isoladamente. Determinado conjunto de pessoas pode ter uma renda semelhante ou maior do que outro grupo, entretanto pode sofrer privações relativas ou absolutas, ou seja, pode haver uma dissonância entre os padrões de vidas julgados segundo a renda per capita e os segundo o potencial de vida para sobreviver até idades mais avançadas. Por exemplo, nos EUA os afro-americanos possuem uma renda maior que os pobres da China ou do Kerala, entretanto apresentam uma taxa de sobrevivência menor (SEN, 2010). Aspectos do desenvolvimento humano, portanto, não covariam nem se submetem à métrica da renda, ainda que esta seja um importante meio para o desenvolvimento e tenha relação com os determinantes sociais de saúde (PINHEIRO, 2012).

A qualidade de vida, que envolve a saúde, concentra-se, por conseguinte, na forma como as pessoas vivem e não necessariamente na renda que possuem, assim a renda é instrumental e depende das circunstâncias e interações com outros aspectos da vida (SEN, 2010).

Frente a isso, a saúde é coordenadora do bem-estar e da capacidade de exercermos liberdades individuais e coletivas e a equidade na saúde é inexoravelmente multidimensional e central para compreensão da justiça social. Portanto, a saúde em si é uma das mais importantes condições para vida e para o desenvolvimento das capacidades humanas. Uma ampliada noção de justiça, que envolva distribuição equitativa e desenvolvimento de capacidades, não pode ignorar o papel da saúde (SEN E KLIKSBERG, 2010), sendo esta um direito objetivo, com reconhecimento social e alcance suficiente para gerar políticas públicas (PINHEIRO, 2012).Por ser multidimensional e possuir diversas interfaces, vários fatores exercem influência na saúde individual e coletiva, como acesso ao atendimento, predisposições genéticas, renda, hábitos alimentares, condições de moradia, características epidemiológicas, condições de trabalho, hábitos de vida, variações climáticas etc. Desta forma, a equidade em saúde sobrepõe exclusivamente a questão do acesso ao atendimento ou igualdade em saúde; deve levar em consideração também a forma de alocação de recursos e os arranjos sociais de determinada comunidade (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Assim, de nada adianta medidas que diminuam as desigualdades se não se ajustarem à equidade em saúde. Para elucidar, hipoteticamente, pouco resolve fornecer mamografia a todas as mulheres, enquanto as da zona periférica estão morrendo por doenças infectocontagiosas; pouco resolve todas as mulheres terem acesso ao serviço, mas nem todas terem suas necessidades de saúde ouvidas; pouco resolve o investimento de recursos ocorrerem em áreas não prioritárias ou de alta densidade tecnológica. Obviamente, com essa afirmação, não se exclui a importância de combate à desigualdade, somente deseja-se apontar que a equidade em saúde é multidimensional e deve ser um alvo valorado (SEN E KLIKSBERG, 2010), contemplando tanto as necessidades de saúde, quanto as necessidades de serviços de saúde, com olhar para as desigualdades em saúde em termos dos determinantes de saúde (RIBEIRO, 2015).

Cada pessoa merece singularidade, o que combate a indiferença na distribuição da atenção à saúde. O bem-estar, no geral, não significa o bem-estar de todos, ou seja, de nada adianta alguns estarem infinitamente saudáveis, enquanto outros estão dolorosamente doentes. A soma do todo, neste caso, não é igual às partes; um fato não compensa o outro (SEN E KLIKSBERG, 2010). Em concordância, é necessária atenção refinada às diversas circunstâncias particulares vivenciadas por cada indivíduo, para reconhecimento daquilo como fundamental e, portanto, básico e pertinente à saúde daquela pessoa (RIBEIRO, 2015).

Qualquer redução de doença em qualquer pessoa deveria ter a mesma prioridade, independente do nível geral de saúde ou econômico dessa pessoa. Todavia, uma pessoa incapacitada ou doente crônica, acaba recebendo menos atenção médica, o que gera mais desvantagem para aquele já em prejuízo (SEN E KLIKSBERG, 2010). Dessa forma, um indivíduo nessa situação tem sua capacidade normativa reduzida, operando com os seus funcionamentos básicos restritos (RIBEIRO, 2015), não recebendo atenção equitativa, contrapondo mais uma vez à justiça social.

Em síntese, podem-se encontrar inúmeras associações entre saúde e o desenvolvimento, as quais se relacionam com a polissemia da palavra, tais como (GADELHA et al, 2011):

a. Vertente associada ao bem-estar e qualidade de vida, com interação íntima com condições de vida e determinantes sociais.

Portanto, apresenta-se como área transversal para o desenvolvimento econômico e social, fazendo pontes com os demais condicionantes de desenvolvimento;

b. Fator de interferência na expectativa de vida e no capital humano, captado pelos indicadores matemáticos de desenvolvimento. Dessa maneira, a saúde tem o potencial de impactar nos investimentos tanto locais, quanto regionais ou nacionais;

c. Sistema que gera renda, emprego e inovação, com impacto na globalização associada à revolução tecnológica, já que, potencialmente, forma um complexo econômico de atividades relacionadas à microeletrônica, biotecnologia, química fina, nanotecnologia, mecânica de precisão, etc. Sendo a inovação aspecto crítico no desenvolvimento regional, este sistema mostra-se relevante;

d. Política relacionada ao sistema de proteção social, com responsabilização do Estado sobre o cuidado dos indivíduos. Política esta que apresenta divergência e conflitos, pois ao mesmo tempo que ordena um acesso universal, convive com o setor privado forte e atuante, bem como torna-se secundária frente à liberalização da economia;

e. Setor que gera disputas políticas para definição de suas diretrizes, já que movimenta quantidade expressiva de recursos e relaciona-se à polarização de interesses de reguladores, provedores e usuários;

f. Setor que engloba relação entre as esferas municipais, estaduais, nacionais e sociedade e apresenta-se como meio para construção de um espírito de nação;

g. Área fulcral para integração com países fronteiriços. A faixa de fronteira representa 30% do território nacional e figura-se como meio de cooperação entre estados dos diferentes países, já que tais regiões sofrem carências importantes, pois estão geograficamente à margem do centro político do país e de cada estado pertencente, bem como apresentam questões diplomáticas específica;

h. Setor com relações multiaxiais, pelo qual ações específicas interferem no desenvolvimento econômico. Por exemplo, ao se vivenciar a epidemia da obesidade e necessidade de combate desse transtorno, a redução do consumo de produtos industrializados, ricos em sódio, açúcar ou gorduras pode gerar mudanças econômicas. O mesmo ocorre com o combate ao tabagismo, por meio de

legislação antifumo e campanhas, que além da diminuição do consumo do produto, pode gerar economia de recursos a quem cessa o uso (AKERMAN, 2005);

i. Condição que sofre influência de múltiplas ações e políticas públicas.

Além do elencado acima, o setor saúde permite determinar novos fluxos de investimentos e, delimitar a rede urbana no aspecto territorial, permite o envolvimento de uma cadeia produtiva de produtos e serviços com impacto econômico, social e organizacional e por fim, organiza a política, dando um enfoque territorial para a mitigação das desigualdades entre regiões, quando bem implementada. Em relação à delimitação da rede urbana, o setor saúde determina a capacidade de polarização das cidades, com hierarquização desses espaços em escalas diversas, pois se apresenta como um bem de consumo coletivo.

Dessa forma, e sob essas diversas perspectivas, a saúde deveria ocupar um espaço estratégico nas políticas públicas, pois pode ser considerada pedra angular do desenvolvimento sustentável. Sua relevância em todas as políticas é reforçada pelas consequências das políticas públicas nos sistemas de saúde, determinantes da saúde e bem-estar (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 2013). Entretanto, a existência de vários conflitos de interesse gera distúrbios em sua priorização, muitas vezes a restringindo apenas a uma relação diminuta com o desenvolvimento humano e não ao econômico. Isso gera uma dissonância do que é preconizado com o que é instituído no Sistema Único de Saúde (SUS), abrindo um abismo entre teoria, prática e desenvolvimento. Fluxos e interesses nacionais e internacionais, portanto, culminam em desigualdades sociais, gerando desunião entre o social e o econômico, com impactos assimétricos na implementação dos princípios e diretrizes do SUS e distanciamento da justiça social.

Esses conflitos de interesse podem ser ilustrados por um breve histórico mais atual do financiamento da saúde.

A política de seguridade social integra a saúde, a previdência e a assistência social, compondo um modelo de política redistributiva e inspirada em princípios como justiça social, que garantem a todos os cidadãos o direto de benefícios mínimos, de forma universalizada, independente da existência de algum tipo de contribuição. Vem associada com a criação de um orçamento único, o Orçamento da Seguridade Social (OSS), composto por contribuições e impostos, pelo qual 30% deveria ser destinado ao SUS. Todavia, inconsistências ocorreram,

tais como a não entrada da totalidade de recursos que lhe pertenciam, a falta de regularidade dessa entrada de recursos e gastos que não correspondiam a atividades específicas da seguridade social, gerando gradual esvaziamento do Conselho Nacional de Seguridade Social, com desarticulação do projeto da seguridade social instituído pela constituição (LUCCHESE, 2002; GIOVANELLA et al, 2013).

Com consequência, emergiu a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, em 2000, a qual definiu a participação das esferas federal, estadual e municipal de governo no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, garantindo formalmente o financiamento do SUS. Por ela, a União deveria participar com valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB), os Estados com 12% da arrecadação vinculável das receitas e os Municípios 15%, sendo este o mínimo para aplicação em ações de serviços públicos de saúde (LUCCHESE, 2002; VIEIRA 2016).

Devido às múltiplas distorções existentes no setor político do Brasil, em 2012 foi necessário a Lei Complementar nº141, estabelecendo quais despesas poderiam ser consideradas realmente ações de serviços públicos de saúde (VIEIRA 2016).

Em 2015 foi aprovada a Emenda Constitucional nº86 que fixava, entre outras coisas, um piso para os gastos da União com ações e serviços públicos de saúde. Esse piso, após um período de transição, seria de, no mínimo, 15% da Receita Corrente Líquida, representando uma diminuição de 9milhões para 2016, em relação à regra da EC nº29 (VIEIRA 2016).

Acrescenta-se que, em 2016,a emenda constitucional nº93 ampliou de 20% para 30% o percentual de Desvinculação de Receitas da União e criou mecanismo semelhante para estados, Distrito Federal e municípios, nomeado como Desvinculação de Receitas dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios (DREM). Essa medida visava evitar o engessamento do orçamento, entretanto, pode se apresentar como uma forma de priorizar alguns setores ou políticas em detrimentos de outras, já que permite ao governo realocar, como queira, 30% das receitas obtidas com taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio econômico, as quais, até então, eram destinadas a órgãos, fundos e despesas específicos. Como historicamente o setor saúde não é o priorizado, a medida torna-se preocupante (BRASIL, 2016a).

Por fim, e não menos desanimador, a emenda constitucional nº95 de 2016, termina por representar os conflitos de interesse e a priorização inadequada de medidas por parte dos governantes. Por ela, fica instituído um novo regime fiscal para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com fixação de um limite anual de despesa primária baseado no ano anterior, com correção apenas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, em relação à saúde, significa que o orçamento de cada ano será o mesmo do ano anterior, corrigido pela inflação, representando um investimento menor em termos de porcentagem de Produto Interno Bruto (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016).

Apesar de toda a importância individual e coletiva da saúde, apesar das múltiplas relações inter setoriais, apesar de essencial a existência humana, constata-se que o país está seguindo diametralmente oposto ao que é disposto na Constituição Federal, que coloca a saúde como direito social básico e dever do Estado, tendo como objetivo o bem-estar e a justiça social. São princípios fundamentais relacionados ao direito à saúde a universalidade, a integralidade, a igualdade, a regionalização e a hierarquização, a descentralização, a participação social e a informação, os quais cada vez mais estão ameaçados pelo retrocesso governamental ao qual estamos sendo submetidos.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: ENTENDENDO ALGUMAS INTERCONEXÕES.

3.1 POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE.

O artigo 198 da Constituição Federal traz:

> As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
> I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
> II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
> III. Participação da comunidade
> Parágrafo único - o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes" (BRASIL,1988).

A existência ou não de um nível mínimo de aglomeração populacional e de demanda gera a necessidade de determinados serviços na área da saúde. Todavia, a existência de uma rede de serviços com uma distância plausível para o acesso, determina o que é essencial ter ou não em uma determinada região. A estruturação da rede deve articular diferentes localidades, com graus diferentes de serviços urbanos e complexidade, formando uma região de saúde. Esse arranjo territorial permite, também, suprimir as múltiplas carências e desigualdades de determinados locais, bem como uma maior otimização da aplicação de recursos, com a existência dos acordos intermunicipais e inter-regionais de prestação de serviço. Assim, a regionalização busca garantia de acesso aos serviços de saúde e uso racional dos recursos, com gasto otimizado de acordo com a hierarquização. Todavia, a minimização das desigualdades ainda permanece restrita, com pouca articulação entre as políticas sociais, econômicas e de saúde para consolidação das regiões de saúde com sustentabilidade (GADELHA et al, 2011).

Em congruência com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Saúde de 1990 apresenta, dentre outros princípios, a descentralização político-

administrativa, com direção única em cada esfera de governo, enfatizando a descentralização para os serviços municipais e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde (BRASIL, 1990). Entende-se, portanto, como descentralização a transferência de responsabilidade de gestão do sistema de saúde para os municípios, com repasse de recursos financeiros pela União, além de cooperação técnica; e como regionalização a articulação entre gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados, descentralizados, garantindo acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população, de tal forma que os serviços básicos sejam disseminados e os especializados mais concentrados (PAIM, 2009). Com o incremento da municipalização, o SUS foi instituído, bem como o acesso à saúde, todavia, esse aspecto gerou uma fragmentação com diversos mini sistemas isolados em municípios com pouca capacidade institucional. Os serviços prestados distinguem diferentes tipos de cidades, as quais podem oferecer a atenção primária à saúde, sendo esta de dimensões locais, bem como serviços de níveis macrorregionais ou nacionais, como centros especializados de alta complexidade tecnológica. Contudo essas relações hierárquicas têm ocorrido fundamentalmente em níveis intraestaduais, sem uma lógica territorial mais abrangente, a qual se prestaria para minimizar a concentração espacial e a exclusão social existente no Brasil (GADELHA et al, 2011).

Para que a articulação regional ocorra e seja efetiva, os estados devem assumir o papel de coordenadores, para que a articulação regional seja efetiva na formulação e implementação de políticas. Entretanto, com a municipalização, os estados assumiram inadvertidamente um papel coadjuvante na organização e planejamento de todo sistema, pautando-se apenas na visão de território como área geográfica delimitada onde uma população está inserida, reduzindo o olhar territorial ampliado, o impede que sejam considerados adequadamente aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, fluxos de populações e condicionantes macroestruturais na criação de políticas regionais integradas (GADELHA et al, 2011).

Assim, em 2005, como forma de ajustar as arestas e implementar um modelo de atenção congruente ao preconizado pelo SUS, foi instaurado o Pacto pela Gestão, com metas de gestão consensuadas, partindo-se de uma mudança no modelo de atenção prestada, com organização do SUS em redes de atenção à saúde, com articulação de diferentes espaços territoriais (BRASIL, 2005). O Pacto

apresenta-se com metas de gestão reafirmando aquilo que já deveria estar ocorrendo.

As redes de atenção à saúde devem integrar as ações da promoção da saúde, da atenção básica à saúde, da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, da vigilância em saúde e da gestão do trabalho e educação na saúde, reconhecendo a Atenção Básica como centro estruturante do sistema, com serviço direcionado à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, envolvendo o indivíduo e a coletividade, o singular e o familiar em sua abordagem (BRASIL, 2005). Apresentam como portas de entrada, ou seja, serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS, a atenção primária, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, todavia, novas portas de entrada podem ser criadas, considerando as características da Região de Saúde (BRASIL, 2011a).

A formalização do Pacto é instituída por um Termo de Compromisso que contempla os compromissos sanitários e as responsabilidades e compromissos de gestão, os quais devem ser monitorados por cada esfera de governo, de acordo com a lei de responsabilidade sanitária. Quatro são os eixos que orientam o compromisso sanitário e de gestão (BRASIL, 2005):

I. A redução das desigualdades em saúde;

II. Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção;

III. Redução dos riscos e agravos;

IV. Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle social.

Dentre os compromissos sanitários, alguns apresentam-se com interesse específico para este trabalho, sendo eles:

1. Redução da mortalidade materna e infantil, com a efetivação do pacto já firmado entre os gestores, garantindo o acesso ao atendimento humanizado e de boa qualidade, ao pré-natal, parto e puerpério e as ações de vigilância;

2. Controle de hipertensão arterial sistêmica e diabetes;

3. Garantia de acesso à atenção básica universal e de boa qualidade, com a oferta do conjunto de ações integrais, resolutivas e humanizadas e com incorporação e realização das ações de saúde bucal, mental e saúde dos trabalhadores, estas na atenção básica e especializada;

4. Redução da morbimortalidade por causas externas e garantia do acesso imediato às urgências e emergências.

Para que as redes de atenção à saúde se efetivem, propõe-se a constituição de regiões de saúde, as quais podem se organizar em regiões infraestaduais, intramunicipais, interestaduais e em regiões fronteiriças, de forma regionalizada e hierarquizada, envolvendo o acesso universal, a equidade, a integralidade e a resolutividade, com racionalização de gastos e otimização de recursos, como já idealizado na década de 90 (BRASIL, 2005). Para que seja instituída uma região de saúde, ela deve conter no mínimo ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde (BRASIL, 2011a).

A regionalização, portanto, envolve alguns pressupostos: Subsidiariedade, Cooperação, Coesão Regional, Responsabilização, Territorialização e Flexibilidade (BRASIL, 2005).

Entende-se por subsidiaridade a não transferência para uma esfera subsequente daquilo que a esfera anterior é capaz de exercer; por cooperação a existência de articulação e pactuação para o desenvolvimento de ações e serviços, incluindo co-financiamento; como coesão regional o envolvimento de todos os atores e instituições para o estabelecimento de objetivos de ação regional e meios para alcançá-los; por responsabilização o compromisso entre gestores para o enfrentamento dos problemas de saúde da população em um determinado território; por territorialização o estabelecimento de critérios claros para espacialidade regional; e por fim, por flexibilidade a capacidade de comportar a heterogeneidade territorial, a distribuição desigual dos serviços e as dimensões continentais do país (BRASIL, 2005).

Para o reconhecimento das regiões de saúde e construção das redes de atenção à saúde há participação das Comissões Intergestoras Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT), sendo a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais; a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais e CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB (BRASIL, 2011a). A representação estrutural encontra-se na Figura 1

.

Figura 1 – Processo de formulação de políticas e de participação social do SUS



Fonte: PAIM et al, 2011.

CONNAS=Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. CONASEMS=Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. COSEMS=Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. MS= Ministério da Saúde.

Dessa forma, as comissões intergestoras pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em Rede de Atenção à Saúde, incluindo:

> I - aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus Planos de saúde, aprovados pelos respectivos Conselhos de saúde;
> II - diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos;
> III - diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos;
> IV - responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias; e
> V - referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. (BRASIL, 2011a)

Transpondo tais informações para a realidade a qual o presente trabalho se relaciona, tem-se que:

O município de Marília faz parte da Rede Regional de Atenção à Saúde 10 (RRAS 10), que é composta pelo IX Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília, com 62 municípios situados nas regiões de saúde de Adamantina, Assis, Marília, Ourinhos e Tupã, totalizando uma população de 1.077.491 habitantes, sendo 544.334 mulheres e 533.157 homens (DATASUS, 2012). A região de saúde de Adamantina é composta pelos municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacembu, Pracinha, Sagres e Salmourão; a de Assis por Assis, Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florínia, Ibirarema, Lutécia, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina e Tarumã; a de Marília por Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Campos Novos Paulista, Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Guaimbê, Guarantã, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia, Quintana, Ubirajara e Vera Cruz; a de Ourinhos por Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Timburi; e a de Tupã por Arco-Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, Parapuã, Queiroz, Rinópolis e Tupã, todos representados na Figura 2.

Figura 2 - Rede Regional de Atenção à Saúde - RRAS 10 e respectivos DRS, Regiões de Saúde e Municípios.



Fonte: SES/SP

Neste contexto regionalizado, descentralizado e hierarquizado, existe a rede de atenção às urgências e emergências e, mais singularmente, os atendimentos relacionados às afecções ginecológicas e obstétricas, com pactos estabelecidos e fluxos assistenciais acordados.

3.2 ASPECTOS GERAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Como mencionado, a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é uma das portas de entrada do SUS e organiza-se de forma descentralizada,

regionalizada e hierarquizada, e desta maneira, possui diversos pontos de atenção e uma grande complexidade, funcionando de forma articulada e em rede (BRASIL, 2013b).

Figura 3 – Componentes da RUE e suas interfaces



Fonte: SAS/MS, 2011

A Figura 3 apresenta os componente da Rede de Urgência e Emergência e suas interfaces com os demais pontos da rede. O primeiro componente, a Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde, objetiva o desenvolvimento de ações de saúde e educativas orientadas para prevenção de violência e acidentes, lesões e mortes no trânsito, doenças crônicas não transmissíveis, bem como produção do cuidado (BRASIL, 2013b).

Já a sala de estabilização pode ser instalada em serviço de saúde público ou filantrópico, em hospitais de pequeno porte (HPP) com no máximo 30 (trinta) leitos, fora da área de abrangência de UPA 24 horas ou em unidades básicas de saúde, desde que funcione em período integral, sendo usada para estabilização do paciente crítico em municípios de grandes distâncias, em locais de isolamento ou locais de vazios assistenciais (BRASIL, 2013b).

A Força Nacional do SUS (FN-SUS) é o componente humanitário do SUS, aprovada em 2011, objetivando a união de esforços em casos de situações de risco ou emergenciais, dando respostas rápidas às situações de risco em todo

território nacional, tais como alagamentos, seca, desabamentos, enchentes, incêndios, epidemias/pandemias, acidentes nucleares, eventos com grande concentração de pessoas, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas (BRASIL, 2013b).

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por sua vez, responsabiliza-se por ordenar o fluxo assistencial e prover o atendimento precoce e o transporte rápido, adequado e resolutivo, por meio de unidades móveis com equipe médica e/ou de enfermagem, de transtornos clínicos, cirúrgicos, gineco-obstétricos, traumáticos e/ou psiquiátricos através do atendimento pelo telefone 192. A regulação dos atendimentos é feita pela Central de Regulação Médica de Urgências composta por médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio operadores capacitados que classificam e priorizam os chamados, ordenando as referências e contrarreferências dentro da Rede de Atenção à Saúde, a partir dos princípios da regionalização e hierarquização (BRASIL, 2013b).

As Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h), neste cenário, são pontos de atenção intermediários entre a Atenção Básica (UBS/ESF) e a rede hospitalar com funcionamento integral, sendo um ponto de atenção capaz de intervir de imediato ou contrarreferenciar para atenção básica, especializada ou unidade hospitalar. As UPAs 24h podem ser novas, ou seja, construídas para esse fim ou ampliadas, construídas a partir de estabelecimentos de saúde já existentes (BRASIL, 2013b).

No tocante à Atenção Hospitalar, esta apresenta diversos componentes, os quais seguem:

1. Portas hospitalares de urgência e emergência;
2. Enfermaria de retaguarda clínica;
3. Unidades de cuidados prolongados e hospitais especializados em cuidados prolongados;
4. Leitos de terapia intensiva; e
5. Organização das linhas de cuidado prioritárias:

- LC do infarto agudo do miocárdio (IAM);
- LC do acidente vascular cerebral (AVC);
- LC da traumatologia

A Atenção Hospitalar objetiva o atendimento da demanda espontânea ou referenciada e provimento de retaguarda para os demais pontos de atenção às

urgências e emergências de qualquer nível de complexidade, bem como a garantia do atendimento nas linhas de cuidados prioritárias.

Já a Atenção Domiciliar constitui-se por :

> um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde, tendo como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar, para a humanização da atenção à saúde, a redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou a redução do período de permanência de usuários internados, viabilizando a disponibilização de leitos hospitalares para a retaguarda das urgências e a preservação dos vínculos familiares, além da ampliação da autonomia dos usuários e familiares para o cuidado em saúde (BRASIL, 2013b).

Possui três modalidades, sendo a primeira de responsabilidade da equipe da atenção básica, com visitas domiciliares pelo menos 1x por mês; a segunda é realizada por equipes multiprofissionais de atenção domiciliar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta e/ou assistente social, auxiliar/técnico de enfermagem); e a terceira por equipes multiprofissionais de apoio (3 profissionais escolhidos entre os seguintes: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional), para aqueles que precisam de atenção intensiva e contínua (BRASIL, 2013b).

Neste contexto, a atenção básica deve realizar acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidades, objetivando a resolutividade da demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências e emergências, podendo se valer da sala de observação nesses casos (BRASIL, 2013b).

A atenção básica caracteriza-se, na definição da Portaria do Ministério da Saúde 2436, de 21 de setembro de 2017, como um

> [...] conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017a, p 1).

Sendo a porta de entrada preferencial, a base, a coordenadora do cuidado, a Atenção Básica deveria esgotar grande parte da demanda de

atendimento ou mesmo prevenir a ocorrência de agravos que culminassem em necessidade de atendimento de urgência e emergência, exercendo seus fundamentos de adscrição de território e usuários, acesso universal e contínuo, coordenação da integralidade, estimulando a participação dos usuários, ampliando sua autonomia e construção do auto cuidado (BRASIL, 2011b).

Figura 4. Fluxograma de referenciamento dos fluxos assistenciais nas condições de urgências e emergências



Fonte: PACHECO, 2015

O fluxograma da Figura 4 demonstra que não necessariamente o usuário deve fazer uma escalada na hierarquia do sistema de saúde. Por meio da referência e contrarreferência e pela central de regulação, o usuário terá o atendimento a partir de suas necessidades e classificação de risco, atingindo uma alta resolutividade em tempo apropriado (PACHECO, 2015).

A RUE não apresenta, necessariamente, pontos de atenção específicos para a Saúde da Mulher, podendo haver apenas no tocante à atenção hospitalar essa diferenciação.

4 E A MULHER?

4.1 SAÚDE DA MULHER, BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA

É pertinente pensar no bem-estar da mulher, entretanto sem perder de vista a necessidade de alcance de sua condição de agente, buscando a transição de uma histórica e patriarcal postura passiva, receptiva, para uma postura ativa, de agente de mudanças (SEN, 2010, BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016; FARIA E FOGARI, 2010). Agente é aquele que causa modificação no ambiente com ação livre e racional, assim, condição de agente é a capacidade de agir livremente segundo os seus próprios fins e normas (SEN, 2010; PINHEIRO, 2012).

A busca do bem-estar feminino e a condição de agente são complementares e indissociáveis, portanto, não passíveis de fragmentação ou prioridade (SEN, 2010).

A busca do bem-estar envolve sim a mitigação das desigualdades. Sabe-se que em inúmeros países ocorre uma mortalidade exagerada das mulheres por falta de acesso ou por privação dos cuidados em saúde e outras necessidades, além da negligência mundial das necessidades femininas específicas (SEN, 2010).

De 1940 a 2015, a mortalidade feminina em período fértil diminuiu, sendo que de cada 100 mil nascidas vivas, 77.777 iniciavam o período reprodutivo, contra 98.302 em 2015. A melhora também ocorreu na expectativa de vida, que ao atingir 80 anos era de 4,5 anos em 1940 comparado com 10,4 anos em 2015 (IBGE, 2016a).

Mesmo que as estatísticas brasileiras mostrem melhora, é pertinente atenção e investigação das causas, pois a melhoria dos padrões ocorreu para todos, devido ao desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país e não, necessariamente de melhoria de alguma condição especificamente relativa às mulheres. O modelo patriarcal hegemônico no país, em relação à classe social, raça, geração, etc, oportuniza as desigualdade frente às mulheres, com consequências diretas para a saúde destas (SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 2016).

A maioria dos estudos relacionados à morte feminina direciona-se para a mortalidade materna, sendo que o perfil de causas prioritárias praticamente não mudou na última década, caracterizando se por hipertensão, infecção puerperal, aborto e hemorragia, tendo as mulheres negras como as principais vítimas. Em números, hipertensão e a hemorragia, corresponderam, em 2012, a 20,2% e 11,9% do total de óbitos maternos, respectivamente; infecção puerperal e o aborto a 7,3% e a 4,5%, respectivamente (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2014b).

A saúde da mulher deve ser vista de forma ampliada, além da mortalidade em si, exigindo um papel de agente e assim, uma busca de si, para si e por si mesma, alcançando uma repercussão coletiva, para homens, mulheres, crianças e idosos. A busca de vez e voz ativa, independência e ganho de poder são influenciadas pela capacidade de obtenção de renda, possibilidade de ter emprego fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizada e exercer papéis decisivos dentro e fora de casa, trazendo mais qualificação, informação e condição de escolha à mulher (SEN, 2010).

A independência econômica e emancipação social, com consequente efetivação da condição de agente das mulheres, pode reduzir significativamente a mortalidade infantil, influenciar políticas públicas e interesses diversos, como já mencionado. Inclusive, modifica a posição relativa feminina no ambiente familiar, pois depende menos ou nada de outros, sua contribuição para prosperidade familiar é objetiva e visível e, portanto tem menos privações relativas, doenças e fome. Assim, a geração de renda por parte das mulheres produz benefícios sociais, além de recompensa pessoal (SEN, 2010).

Por adição, a alfabetização e o emprego ampliam o poder de escolha das mulheres sobre a reprodução e geração de filhos, o que é de suma relevância, já que as mulheres jovens são as que sofrem maior desgaste com inúmeras gestações e criação dos filhos e, por fim, negação das liberdades substanciais (SEN, 2010). Um marco em relação à sexualidade e reprodução é a IV Conferência Internacional sobre a saúde da mulher, pela qual os direitos sexuais e reprodutivos são definidos como:

> Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens, no que diz respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos

> comportamentos sexuais e suas conseqüências (CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995).

Reforçando, os direitos sexuais e reprodutivos não se restringem ao campo da saúde, mas se conectam e expressam diferentes dimensões da vida social (BRASIL, 2010a). Logo, em análises, as únicas variáveis que tiveram repercussão estatística sobre a fecundidade foram a alfabetização feminina e a participação das mulheres na força de trabalho (SEN, 2010).

Na medida em que ampliam seu poder de decisão, seu empoderamento, sua educação e alfabetização, exercem influência direta no bem-estar dos filhos, pois são capazes de priorizar os seus cuidados , inclusive, na diminuição do viés de sobrevivência contra o sexo feminino (SEN, 2010; HAIDAR, OLIVEIRA E NASCIMENTO, 2001).

Em específico, a alfabetização feminina tem influência poderosa na redução da mortalidade infantil e extremamente potente, em contraposição a alfabetização masculina e redução geral da pobreza (SEN, 2010; BRASIL, 2014b).

Por fim, a condição de agente das mulheres possui alcance além do bem-estar feminino e é uma das condições mais negligenciadas nos estudos sobre desenvolvimento, sendo de aspecto crucial para o desenvolvimento como liberdade (SEN, 2010). Necessário reforçar a necessidade do incremento do protagonismo da mulher, com interferência na construção de um país mais solidário, igual e equânime, por meio da ampliação do processo de democratização e participação social, seja ele institucionalizado ou organizados de forma livre e legítima (BRASIL, 2017b).

Como já mencionado, a saúde materna é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para as gerações futuras. A má saúde materna é medida por mortalidade e morbidade (GRAHAM et al, 2016) e relaciona-se com a qualidade da atenção prestada à mulher, incluindo desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal até o puerpério (SILVA, 2016).

Existem dois tipos de formas de redução da mortalidade: a mediada pelo crescimento e a induzida pela assistência (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Pela primeira, observa-se que o crescimento econômico tem influência significativa na melhoria da expectativa de vida sobretudo pelo impacto do Produto Nacional Bruto sobre a renda, especificamente do pobre, e sobre o gasto público, especificamente em saúde pública. Ou seja, caso não haja impacto na renda do

pobre e no investimento em saúde pública, a relação estatística entre PNB e expectativa de vida não é confirmada (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Já pelo segundo, existe possibilidade de melhoria na expectativa de vida, com redução da mortalidade sem grande dependência de crescimento econômico através do fornecimento de serviços sociais, ou seja, basicamente saúde e educação. Seria possível isso em uma economia pobre, pois nesse cenário existe menos dinheiro, mas em contrapartida, também necessita-se de menos dinheiro para o fornecimento de tais serviços, ou seja, os custos são menores, tanto tecnológicos quanto de recursos humanos (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Ao se comparar as formas de redução de mortalidade, evidencia-se a relevância do processo induzido por assistência, que acaba por chegar a uma longevidade muito mais alta (SEN E KLIKSBERG, 2010). Apesar da importância referida, o Brasil é surpreendido atualmente pelo apontamento de que políticas universais, como o SUS, são inviáveis, que os problemas no sistema de saúde não são relativos ao seu sub financiamento histórico e crônico e que o congelamento dos gastos com saúde por 20 anos é medida prudente e necessária, refletindo, dentre outros aspectos, na inferiorização da qualidade da assistência por desconsiderar as necessidades de saúde da população, o impacto do crescimento populacional, da transição demográfica e do envelhecimento populacional (REIS, 2016).

E porque usar mortalidade em vez de morbidade?

A partir de seus hábitos e conhecimentos médicos, as pessoas têm percepções variadas sobre seus estados mórbidos. Dessa forma, locais de amplo acesso ao serviço médico e de qualidade e a diagnósticos, possuem pessoas com percepção de maior morbidade, embora tenham boas condições de saúde, por terem um conhecimento mais amplo sobre as doenças. Ao inverso, uma população com acesso restrito aos serviços de saúde, possui uma percepção comprometida de sua morbidade, mesmo tendo problemas de saúde relevantes. Assim, o que as pessoas discernem e valorizam sofre influência de suas experiências e saberes. Números reduzidos de serviços de saúde, de educação geral e em saúde, geram percepção de doença limitada. Portanto, ao analisar-se a mortalidade, a informação mostra-se mais objetiva e traduz melhor a capacidade das pessoas de prevenir doenças graves e morte (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Por fim, utilizar as informações de mortalidade tem grande relevância por ter importância intrínseca, pois uma vida longa é valorizada em si mesma;

porque estar vivo é uma condição necessária para exercer as liberdades e capacidades; pela relevância associativa, tendo em vista que realizações valiosas são inversamente proporcionais à taxa de mortalidade; por permitir a identificação de desigualdades sociais e de gênero; por evidenciar pontos que direcionem a necessidade de mudança em políticas públicas (SEN E KLIKSBERG, 2010). Desta maneira, a mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de vida de uma população e o estudo de suas causas pode revelar o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade (BRASIL, 2014b).

Entretanto, a análise dos dados sobre a mortalidade materna torna-se difícil, pois quase dois terços dos nascimentos e uma maior proporção de óbitos maternos não são registrados ou são mal classificados, e dados populacionais sobre a morbidade materna, natimortos e resultados do recém nascido são particularmente escassos, especialmente em áreas rurais e pequenas cidades (VICTORA, 2011; GRAHAM et al, 2016). Em relação à RRAS 10, tem-se os seguintes dados:

Tabela 1 – Número de óbitos maternos por região de saúde segundo o ano.

	Adamantina	Assis	Tupã	Ourinhos	Marília	Total
2008	0	1	0	0	4	5
2009	1	0	1	4	1	7
2010	0	1	0	1	1	3
2011	0	1	1	2	3	7
2012	0	0	0	1	5	6
2013	1	0	1	1	3	6
2014	0	1	1	0	5	7

Fonte: DATASUS, 2015.

As transições demográficas e epidemiológicas, relacionadas às econômicas e políticas, afetam desproporcionalmente a saúde, os direitos e os papéis das mulheres devido especificidades biológicas e de gênero. O aumento da expectativa de vida associado à transição demográfica e à mudança de papéis das mulheres são dois fatores importantes ligados à idade mais avançada no primeiro nascimento e, portanto, ao aumento da prevalência e ao impacto de complicações obstétricas e doenças não-transmissíveis (GRAHAM et al, 2016). Fala-se em transição obstétrica, que reflete uma tendência secular de:

- passagem de um padrão de alta mortalidade materna para baixa mortalidade materna;

- predominância das causas obstétricas diretas de mortalidade materna para uma proporção crescente de causas indiretas associadas às doenças crônico-degenerativas;
- envelhecimento da população materna e modificação da história natural da gravidez e do parto para um padrão de institucionalização da assistência;
- aumento das taxas de intervenção obstétrica e eventual excesso de medicalização (SOUZA, 2014).

Em relação ao segundo tópico, o gráfico abaixo representa a referida transição.

Gráfico 1 – Razão de mortalidade materna (RMM) por causas obstétricas diretas e indiretas (por 100 mil nascidos vivos). Brasil, 1990, 2000 e 2012.



Fonte: BRASIL, 2014b.

Dentre as principais causas indiretas, doenças do aparelho circulatório complicadas pela gestação, pelo parto ou pelo puerpério (O99.4 da CID-10), representou 7,3% do total de óbitos maternos, correspondendo a mais frequente causa.(BRASIL, 2014b)

A RMM, por sua vez, é definida como número de óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes em determinado espaço geográfico, no ano considerado (VERMELHO, LEAL, KALE, 2005). Entre 1990 e 2012, a RMM no Brasil reduziu-se de 141 para 62 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, o que

representa diminuição de 56% (BRASIL, 2014b). Em números absolutos, em 2015, isso representou 1.738 óbitos maternos, sendo 214 na região Norte, 580 na Nordeste, 631 na Sudeste, 166 na Sul e 147 na Centro-oeste, o que reforça a hipótese de subnotificação, pois o Sudeste apresentou maiores taxas, sendo a região mais bem provida de serviços médico-hospitalares. Foram registrados no mesmo ano 179 óbitos maternos tardios, sendo a maioria (61) também na região Sudeste (DATASUS, 2015).

De qualquer maneira, sabe-se que 98% das mortes maternas são preveníveis com medidas de saúde precoces e de qualidade, portanto, sua ocorrência caracteriza uma violação do direito reprodutivo das mulheres e caracteriza-se como a ponta do iceberg dos problemas relacionados à gravidez (VICTORA, 2011; GRAHAM, 2016). O Gráfico 2, representa a proporção entre os óbitos maternos em relação às causas.

Gráfico 2 – Proporção dos óbitos maternos, segundo tipo de causa. Brasil, 2012.



Fonte: BRASIL, 2014b.

Além disso, a disponibilidade de atendimento em saúde e o tipo de atendimento (público ou privado) são influências importantes sobre a vida e a morte, assim como educação, acesso à ciência moderna e à vida urbana. Da mesma forma, a renda pessoal é inquestionável na sobrevivência ou morte de uma pessoa e de forma geral associa-se à qualidade de vida, entretanto, caracteriza-se apenas como uma variável em meio a diversas outras. Busca-se a renda para existência de uma vida com motivos para valorizá-la, com qualidade de vida e consequente capacidade de ser e fazer. Ao se analisar vantagem ou desvantagem, deve-se olhar

para possibilidade da pessoa fazer e ser o que tem motivos para valorizar (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Sob o enfoque do atendimento público e privado e da renda, o Brasil teve um percentual de gasto total com saúde de 48,2%, inferior ao de países latino americanos (Argentina, 67,1%; Colômbia, 76%; Costa Rica, 75%; Cuba, 93%; e México, 51,7%), sendo que países com sistema de saúde universal requerem mais de 70% do gasto total em saúde para um funcionamento digno, refletindo, inclusive sobre à saúde da mulher, a qual já possui diversas outras interferências sociais, já mencionadas (REIS et al, 2016).

Quando comparado o gasto público em saúde per capta dos sistemas universais, a discrepância é ainda maior. O Brasil gasta US$525,00, enquanto o Reino Unido gasta US$ 3.004,00; a França US$ 3.740,00; o Canadá, US$3.985,00 e a Suiça, 6.131,00 (REIS et al, 2016).

A desproporção de gastos entre público e privado é mais evidente comparando-se os números. Em 2015, aproximadamente ¼ da população possuía planos de saúde e o setor movimentou R$ 132 bilhões, frente a R$ 236 bilhões movimentados pelo público, ou seja, menos que o dobro, para aproximadamente 3x mais pessoas (REIS et al, 2016).

Ao se transpor para a assistência à mulher, nota-se que as gestantes atendidas no setor público tiveram desvantagens em relação às atendidas no setor privado, que foram (CESAR et al, 2012):

- menor número de consultas pré-natal e início mais tardio;
- menor número de exames laboratoriais pertinentes realizados (glicemia de jejum, urina 1, ultrassonografia e citopatológico de colo uterino)
- menos orientações sobre uso de medicamentos e exercício físico;
- menores taxas de investigação sobre uso atual de medicamentos;
- menores taxas de seguimento pré natal com o mesmo médico.

Portanto, apesar da melhora da assistência pré-natal geral, nota-se uma disparidade social importante, com potencial de refletir nos desfechos favoráveis em relação à saúde materna e fetal.

4.2 ASPECTOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA MULHER.

As mulheres são as principais usuárias do sistema de saúde brasileiro, seja por motivos próprios, seja como acompanhantes, além disso, apresentam-se como principais cuidadoras, tanto de crianças como de idosos, familiares, vizinhos, etc (BRASIL, 2011b). Dessa forma, caracterizam-se como um segmento icônico para a atenção em saúde e desenvolvimento de políticas públicas.

É prudente apropriar-se, mesmo que brevemente, sobre a evolução das políticas de saúde em relação às mulheres, pois muitos desfechos desfavoráveis que culminam na necessidade do uso dos serviços de urgência e emergência, são por má aplicação ou insuficiência de tais políticas ou mesmo pelo aspecto cultural no qual elas foram desenvolvidas.

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas de saúde no início do século XX, sendo que os programas eram fragmentados e se restringiam ao aspecto biológico, caracterizado pela gravidez e parto, reduzindo o papel feminino apenas à função reprodutiva e à maternidade e não cobrindo, portanto, a maior parte da vida da mulher (BRASIL, 2011b).

Em 1940 foi criado o primeiro órgão exclusivo para o cuidado materno infantil, o Departamento Nacional da Criança (Atuação de 1940-1965), o qual enfatizava o cuidado de puericultura, bem como com a gravidez e amamentação. Neste Departamento havia duas visões, uma de que a reprodução era uma função essencialmente social e outra mais focada ao combate à mortalidade infantil, sem disciplinar a reprodução (NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005).

Já em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, o qual coordenava a nível nacional a assistência materno infantil.

Na década de 60, com o desenvolvimento dos anticoncepcionais e DIU, houve uma mudança no padrão de liberdade sexual e trabalho das mulheres, entretanto, a oferta de tais métodos era restrita, com assistência precária e inadequada, com comprometimento da saúde feminina (LEITE E PAES, 2009).

A partir da década 70, o Ministério da saúde reformulou suas diretrizes e oficializou o Programa Materno Infantil (PMI), com ações para gravidez, parto, puerpério, amamentação, incentivo ao espaçamento entre as gestações, com o

objetivo de prevenir e tratar os agravos controláveis (LEITE E PAES, 2009). As ações planejadas tinham como objetivo contribuir para a maior produtividade com o ingresso de novas e mais hígidas gerações na força de trabalho (NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005).

Houve, então, uma multiplicação de maternidades e clínicas relacionadas ao cuidado relativo ao ciclo gravídico puerperal compostas por profissionais especializados em substituição das parteiras. Tais profissionais também estimulavam a amamentação, pois com o processo de industrialização, esta havia sido secundarizada em prol do uso de fórmulas ou leite em pó, o que culminou em altas taxas de mortalidade infantil por diarréia, desnutrição e desmame precoce. (LEITE E PAES, 2009).

Em 1978, o Ministério da Saúde criou o Programa de Prevenção de Gravidez de Alto Risco, para assistência a mulheres com risco reprodutivo e obstétrico, prevenção de gestações futuras, diagnóstico e tratamento de esterilidade e infertilidade (LEITE E PAES, 2009).

O reconhecimento da insuficiência das políticas, até então, marcou um novo posicionamento da sociedade, com uma postura participativa dos membros, frente aos indícios reais de conflitos entre a tradição e a modernidade, e não uma rejeição unilateral da modernidade de forma impositiva por dirigentes, religiosos ou políticos. Portanto, a identificação do controle ideológico sobre a saúde das mulheres traduzido em forma de controle da sua sexualidade como veículo de reprodução (NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005) associado a ações de atenção e assistência fragmentadas, culminaram em movimentos feministas em prol de ampliação dos direitos, já que as desigualdades entre gêneros também se apresentavam como problemas de saúde, sofrimento, adoecimento e morte. Assim, as mulheres reivindicaram sua condição de sujeito de direitos (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2017b).

Em meio às reivindicações, em 1983 emerge a proposição, por um grupo de sanitaristas, psicólogos, sociólogos, representantes das mulheres, demógrafos e pesquisadores das universidades, do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), com criação efetiva em 1984, a partir da evidente necessidade de atenção integral à mulher e não apenas órgãos e situações isoladas. Tal programa teve bases na experiência do modelo de atenção desenvolvido na Unicamp. Dessa forma, foi criado um programa de assistência da mulher, da adolescência à terceira idade, com garantia de direito a mulher exercer ou não a

maternidade, com contemplação da mulher em todo ciclo vital, ou seja, atendimento global das necessidades prioritárias desse grupo (BRASIL, 2011b; LEITE E PAES, 2009; NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005).

O PAISM mostrou-se revolucionário, até então, pois incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 1984).

Simultaneamente, foram criados os Comitês de Mortalidade Materna (CMM) caracterizados por instâncias interinstitucionais, multiprofissionais e confidenciais que visam identificar todos os óbitos maternos e apontar medidas de intervenção para a redução dessa mortalidade na região de sua abrangência. Constituem também importante instrumento de avaliação permanente da atenção materna, derivando daí suas funções de investigação, avaliação, informação e educação, além das normativa e mobilizadora (BRASIL, 2009).

Em 1988, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização do Pré Natal e Nascimento, com valorização do ser humano e assistência ao parto com o mínimo de intervenção e com procedimentos centrados nas necessidades da mãe. O objetivo era reorganizar a assistência do pré natal, incorporando-o ao parto e ao puerpério, ampliando o acesso e garantindo a execução apenas de procedimentos necessários (LEITE E PAES, 2009; NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005).

O processo de implementação do PAISM apresenta confluência com a criação do SUS, relação com a municipalização e reorganização da Atenção Primária à Saúde, com enfoque na implementação do Programa de Saúde da Família. Todavia, devido às dificuldades de implantação do SUS, através na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS (2001), foram estabelecidas as ações mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino para o âmbito municipal, porém não abrangeu toda a proposta do PAISM. O nível federal também teve dificuldades e descontinuidade no processo de assessoria e apoio para implementação do PAISM, com mudanças a partir de 1998, quando a saúde da mulher passou a ser considerada uma prioridade de governo (BRASIL, 2011b).

Em 2003 foi criada a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República e incorporada em 2015 ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Esta objetiva um Brasil mais justo, igualitário e democrático, por meio da valorização da mulher e de sua inclusão no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País (CASTRO, SIMONETTI, ARAÚJO, 2015).

Já em 2004 ocorreu a I Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que repercutiu no I Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (PNPM).

Em 2004, o PAISM evoluiu para o status de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, com característica mais permanente, incluindo à igualdade e o respeito à diversidade, a equidade, a autonomia das mulheres, a laicidade do Estado, a universalidade das políticas, a justiça social, a transparência dos atos públicos e a participação e controle social, com posterior incremento em 2007 e 2011. Assim, tem como objetivos:

> – Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro.
> – Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.
> – Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011b).

Em 2007 houve a II Conferência Nacional, com elaboração do II Plano Nacional e em 2011, a terceira que resultou o PNPM 2013-2015, o qual possui os seguintes enfoques:

> - Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica;
> - Educação para igualdade e cidadania;
> - Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos;
> - Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres;
> - Fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão;
> - Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social;
> - Direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta;
> - Cultura, esporte, comunicação e mídia;
> - Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia;
> - Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência. (BRASIL, 2013c).

Em 2011, houve mais uma iniciativa do Ministério da Saúde que culminou na criação da Rede Cegonha, pela qual ocorre o incentivo de excelência e inovação na atenção pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto, bem como nas ações em torno do desenvolvimento da criança durante os primeiros dois anos de vida. Apresenta-se como um meio de garantir que a mulher vivencie a experiência da maternidade de forma única e mais fisiológica (BRASIL, 2011c).

Possui como diretrizes:

> • Garantia do acolhimento e classificação de risco, qualificação do acesso e assistência;
> • Garantia de vinculação da gestante desde o pré-natal até os serviços de referência que compõem a rede integral, incluindo a maternidade programada para a realização do parto;
> • Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento;
> • Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo;
> • Gestão democrática e participativa. Gestão participativa e compartilhada na maternidade, buscando aumentar o grau de corresponsabilização entre usuários/acompanhantes, trabalhadores e gestores (BRASIL, 2011c).

Por fim, em 2016 teve a quarta e última Conferência Nacional de Políticas Públicas para as mulheres, que teve como tema central “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”, com quatro eixos temáticos:

> * Eixo I: Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades — contempla os espaços políticos para os movimentos de mulheres exercerem controle social. Fundamenta-se no princípio da participação social nas políticas públicas.
> * Eixo II: Estruturas Institucionais e Políticas Públicas Desenvolvidas para mulheres no âmbito Municipal, Estadual e Federal — aponta para a importância dos organismos de políticas para as mulheres, entende que a questão das estruturas não é só uma questão de estatuto, pois não podem ficar subordinados às estruturas governamentais.
> * Eixo III: Sistema Político com Participação das Mulheres e Igualdade — passa pela questão do poder, da sub-representação das mulheres no parlamento brasileiro, um tema a ser superado, a ser discutido.
> * Eixo IV: Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres — buscam-se subsídios e recomendações para que as políticas públicas para as mulheres venham se transformar em política de Estado. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, 2016).

A evolução das políticas públicas em saúde da mulher demonstra um esforço no sentido da ampliação do olhar em saúde para essa parcela da população, entretanto, nota-se a que maioria das ações ainda se concentra na atenção a gravidez, ao parto e ao puerpério e mesmo assim, a busca por serviços de urgência

e emergência em saúde da mulher é majoritariamente composta por queixas obstétrica.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são apresentados e discutidos sob a perspectiva sistêmica, ou seja, partindo-se do princípio da complexidade, contextualizando os achados em um cenário ou conjuntura mais amplos, reconhecendo a causalidade recursiva. Assim, é pertinente a leitura com ampliação do foco, permitindo a visualização de um sistema amplo, com múltiplas conexões e relações entre os elementos, políticas e agentes. Ao final, ver-se-á conexões ecossistêmicas, redes de redes, demonstrando a complexidade do desenvolvimento em saúde, contrário à lógica da disjunção e redução (VASCONCELLOS, 2013).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP.

A cidade de Marília está situada no oeste do Estado de São Paulo, na região denominada Alta Paulista. Nascido da incorporação de três povoados que se desenvolveram com o café, o município de Marília tem hoje uma área de 1.170km^2 e uma população de 216.457 moradores, em grande parte urbana e alfabetizada, e em crescimento (GIGLIO-JACQUEMOT, 2005; IBGE, 2010).

Em relação à rede de urgência e emergência, a população conta com 13 UBS e 35 USF, constituindo a base da RUE.

Além disso, o município presta atendimento de complexidade intermediária em urgência/emergência em 2 unidades de pronto atendimento, PA Norte e PA Sul. Estes acolhem as pacientes de acordo com o processo de classificação de risco, realizando os atendimentos com apoio diagnóstico e terapêutico. Caso necessário, referenciam as pacientes por meio de Centrais de Regulação Médica de Urgências do SAMU-192 para o PS do HMI ou Maternidade Gota de Leite.

O atendimento de urgência/emergência hospitalar, por sua vez, é realizado através do pronto socorro do Hospital Materno Infantil/HCII e, em casos de

gestantes de baixo risco, também pela Maternidade Gota de Leite. A distribuição dos pontos de atenção da RUE está apresentada nas figuras 5 e 6, as quais se complementam.

Figura 5 – Mapa representativo da parte norte da RUE em saúde da mulher do Município de Marília, 2018.



Fonte: A autora, 2018.

Legenda: PA Norte USF UBS

Figura 6 – Mapa representativo da região central e sul da RUE em saúde da mulher do Município de Marília, 2018.



Fonte: A autora, 2018.

Legenda: PA Sul HMI Maternidade Gota de Leite SAMU

USF UBS

Pelo protocolo municipal, os casos que são considerados de alto risco em obstetrícia e que, portanto, são de competência do pronto socorro do HMI em casos de urgência e emergência ou parto, são os seguintes:

1. Antecedentes obstétricos:

- Cirurgia uterina anterior (acima de 4 cesáreas, miomectomia, conização e outros);
- Morte perinatal explicada ou inexplicada;
- Pré-eclâmpsia, eclâmpsia;
- Restrição de crescimento, prematuridade ou má formação;
- Síndromes hemorrágicas;

2. Morbidade Materna

- Aneurisma;
-Aterosclerose;
- Câncer;
- Cardiopatia;
- Doenças auto-imunes (LES, outras colagenoses);
- Doenças inflamatórias intestinais crônicas;
- Endocrinopatias (Especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo);
- Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras);
- Hemopatias(Anemia falciforme, talassemia, anemia severa (Hb<8g%);
- Hipertensão arterial ou uso de anti-hipertensivo;
- Nefropatias;
- Portadoras de doenças infecciosas (Hepatite, toxoplasmose, HIV, sífilis e outras DSTs);
- Trauma e queimaduras;
- Trombofilia;
- Asma grave;
- Tromboembolismo.

3. Doença obstétrica na gravidez atual:

- Aloimunização;
- Aminiorrexe abaixo de 37 semanas de idade gestacional;
- Desvio quanto ao crescimento uterino (abaixo do percentil 10);
- Macrossomia fetal confirmada;
- Volume do líquido amniótico <5 ou >18cm;

- Hidropsia fetal;
- Malformações fetais;
- Síndromes hemorrágicas;
- Trabalho de parto prematuro (<37 semanas);
- Diabetes gestacional;
- Gestação Múltipla.

4. Características pessoais e sócio demográficas:

- Dependência de drogas lícitas ou ilícitas;
- Transtorno mental;
- Não aceitação da gravidez, principalmente adolescente;
- Violência doméstica;
- Obesidade grau III (IMC>40g/m2);
- Gestantes reclusas;
- Idade materna <13 anos ou >40 anos.

São considerados de baixo risco e, portanto, de competência da Maternidade Gota de Leite:

- Gestante de risco habitual em trabalho de parto e/ou com bolsa rota com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas;
- Gestante com risco habitual com idade gestacional maior ou igual a 40 semanas para avaliação de vitalidade fetal.

Em todos os casos, a carteira de pré-natal deve conter pelo menos uma rotina pré-natal completa e uma ultrassonografia.

Assim, todas as gestantes que durante o pré-natal na atenção primária evoluírem sem risco, devem ser encaminhadas à Maternidade Gota de Leite para o parto.

Aqueles casos que não se enquadrarem nos requisitos acima devem ser atendidos pelo pronto atendimento e, quando necessário, referenciados ao serviço hospitalar do HMI.

O SAMU deve respeitar esse protocolo no momento do transporte das pacientes até o serviço de referência.

Para os casos de ginecologia, não existe protocolo específico de organização do fluxo assistencial, cabendo ao julgamento clínico a referência ao PS do HMI.

Importante ressaltar que o PS do HMI atende, além dos casos referenciados, demanda espontânea tanto em ginecologia quanto em obstetrícia, a qual passa por acolhimento com avaliação e classificação de risco, orientado por um protocolo institucional. Desta maneira, toda paciente que chegar ao PS do HMI (referenciada ou não) deverá passar pelo acolhimento e classificação de risco, inclusive para situações em que o hospital é referência para o atendimento, como H1N1, violência contra a mulher, intoxicações ou pelo exposto acima.

O processo de acolhimento e classificação de risco do HMI foi implantado em 2009 e desde então teve algumas modificações. A última versão orienta a classificação dos pacientes em (MANZZONI, 2015):

- azul (baixa complexidade);
- verde(urgência mínima) - tempo de espera < 60 minutos;
- amarelo (urgência relativa) – tempo de espera <30 minutos;
- vermelho (urgência absoluta) – necessidade de atendimento imediato.

Figura 7. Fluxograma de avaliação com classificação de risco - HMI



Fonte: MANZZONI, 2015.

A Figura 7 representa o fluxo teoricamente recomendado após a classificação de risco.

É estabelecido que nenhuma usuária poderá ser direcionada para outro serviço sem guia de contrarreferência preenchida e assinada pelo médico de plantão, em duas vias, ficando uma com a mulher e a outra no prontuário.

Apesar do protocolo de classificação de risco ser referente ao hospital materno infantil, este faz menção específica à gestante ou a causas ginecológicas apenas nos seguintes pontos:

- Vermelho: Gestante > 20 semanas com trabalho de parto prematuro (contrações a cada 2 minutos), ausência de movimentos fetais, hipertensão com ou sem cefaleia, edema e dor abdominal.
- Amarelo: Vítima de abuso sexual.

Aponta-se dessa maneira, necessidade de revisão do protocolo, estabelecendo-se parâmetros de classificação compatíveis com ginecologia e obstetrícia, além, claro, dos parâmetros habituais para as demais queixas.

Em relação à regionalização e hierarquização no DRS IX, de forma geral, o HMI é referência de alta complexidade em saúde da mulher para as Regiões de Saúde de Adamantina, Tupã e Marília e o Hospital Regional de Assis, para as Regiões de Saúde de Assis e Ourinhos. Tanto o HMI, quanto o Hospital Regional de Assis atendem o mesmo nível de complexidade em relação à saúde da mulher.

Tabela 2. Procedência dos casos atendidos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Região de Saúde	Ginecologia	Obstetrícia
Assis	13	26
Ourinhos	4	4
Adamantina	11	65
Tupã	21	119
Marília	1986	9060

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Pela Tabela 2, nota-se que 47 pacientes que foram atendidas no PS do HMI tinham como referência o serviço de Assis, não obedecendo ao fluxo regionalizado da RUE. Sabe-se que muitas vezes o atendimento dessas pacientes é permitido pelo plantonista do PS, que aceita o caso solicitado pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), desconhecendo, portanto, o processo de regionalização.

O DRS IX conta com 21 maternidades que fazem partos de risco habitual, sendo elas expressas na Tabela 3.

Tabela 3. Maternidades que fazem parto, municípios e regiões de saúde a que pertencem e referência de alta complexidade, DRS IX, 2018.

Ref. de alta complexidade	Região de Saúde	Município	Maternidade que realiza partos
MARÍLIA	ADAMANTINA	Adamantina	Santa Casa de Adamantina
		Pacaembu	Santa Casa de Pacaembu
		Flórida Paulista	Santa Casa de Flórida Paulista
		Oswaldo Cruz	Santa Casa de Oswaldo Cruz
	TUPÃ	Tupã	Santa Casa de Tupã
		Bastos	Hospital de Bastos
	MARÍLIA	Marília	Hospital das Clínicas Unidade I
			Hospital das Clínicas Unidade II
			Maternidade Gota de Leite
		Garça	Hospital São Lucas de Garça
		Pompéia	Santa Casa de Pompéia
ASSIS	ASSIS	Assis	Hospital Regional de Assis
			Santa Casa de Assis
		Cândido Mota	Santa Casa de Cândido Mota
		Maracaí	Hospital Beneficente de Maracaí
		Palmital	Santa Casa de Palmital
		Paraguaçu Paulista	Santa Casa de Paraguaçu Paulista
	OURINHOS	Ourinhos	Santa Casa de Ourinhos
		Chavantes	Santa Casa de Chavantes
		Salto Grande	Santa Casa de Salto Grande
		Santa Cruz do Rio Pardo	Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo

Fonte: DRS IX, 2018

Para melhor representação da distribuição das casas de parto, segue na Figura 8 a marcação no mapa referente o DRS IX.

Figura 8. Distribuição das casas de parto, DRS IX, 2018.

Fonte: SES/SP adaptado pela autora, 2018.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARÍLIA/SP.

Optou-se por realizar o início da apresentação e discussão dos resultados pela origem das pacientes que fazem uso do serviço de urgência e emergência, como forma de responder à seguinte pergunta: “De onde vêm as usuárias do PS?” Esta origem configura o requisitante do encaminhamento.

Identificar os principais pontos de atenção que encaminham pacientes (Tabelas 4 e 5) pode se configurar como uma oportunidade de seleção dos locais prioritários de treinamento em urgência e emergência em saúde da mulher, tanto

para que a referência ao PS seja oportuna e apropriada, quanto para que o primeiro atendimento seja adequado e qualificado.

Tabela 4 – Requisitantes dos atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

REQUISITANTE	OBSTETRÍCIA		GINECOLOGIA		TOTAL	
	‘N	%	N	%	N	%
DEMANDA ESPONTÂNEA	3.763	40,3%	919	44,9%	4.682	41,1%
PA SUL NOVA MARILIA	818	8,8%	259	12,7%	1.077	9,5%
REGULAÇÃO INTERNA	695	7,4%	253	12,4%	948	8,3%
SAMU	553	5,9%	41	2,0%	594	5,2%
UPA REGIÃO NORTE	278	3,0%	72	3,5%	350	3,1%
HOSPITAL MATERNIDADE GOTA DE LEITE MARILIA	324	3,5%	7	0,3%	331	2,9%
CENTRO DE SAÚDE DE GUARANTA	172	1,8%	35	1,7%	207	1,8%
PA NORTE SANTA ANTONIETA MARILIA	164	1,8%	32	1,6%	196	1,7%
UBS SANTA ANTONIETA MARILIA	125	1,3%	16	0,8%	141	1,2%
OUTRAS	2443	26,1%	413	20,2%	2856	25,1%

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A Tabela 4 aponta que a maior parcela das usuárias vem por demanda espontânea e os 3 serviços de pronto atendimento da cidade estão entre as 8 instituições que mais encaminham pacientes ao PS. As 8 primeiras instituições são responsáveis por 34,5% do volume de pacientes, dentre as 167 especificadas que realizaram encaminhamento no ano estudado.

O alto percentual de demanda espontânea incita a discussão sobre o papel que a APS vem desempenhando com ponto central na rede de cuidados. Como estão sendo as orientações para essas mulheres durante o pré-natal, por exemplo? Quais esclarecimentos estão sendo dados sobre as modificações e queixas comuns durante o período gestacional? Quais estratégias de promoção de saúde estão sendo utilizadas? Quais métodos preventivos de agravos a mulheres estão sendo implementados? Assim, a APS tem função de resolução, que consiste em solucionar a maioria dos problemas de saúde, a função de coordenação, pela qual deve organizar os fluxos e contrafluxos de pessoas na rede e a função de responsabilização, que se caracteriza pela coresponsabilização pela saúde das usuárias em qualquer nível de atenção (BRASIL, 2017a).Tendo em vista isso, não cabe ao serviço de urgência e emergência funcionar como porta de entrada ao sistema de saúde como vem ocorrendo, não cabe ao pronto socorro dirimir as falhas dos processos na APS, sendo identificado pelo usuário como meio de conseguir

uma consulta com o especialista o qual espera há meses ou como forma de ter acesso rápido a um exame laboratorial ou de imagem. Não quer dizer, com isso, que entre a demanda espontânea não existam casos pertinentes ao PS, mas quer-se frisar e refrisar a necessidade de cada nível de atenção assumir o seu papel e suas responsabilidades.

As unidades de pronto atendimento estar entre os primeiros requisitantes de atendimento no PS faz refletir sobre o a resolutividade desse tipo de ponto de atenção, o qual deve atender quadros agudos e ou crônicos agudizados, prestar o primeiro atendimento nas urgências visando à estabilização dos casos e, só assim, avaliar a necessidade do encaminhamento para hospitalização ou reavaliação e seguimento em serviço especializado. Desta maneira, os pronto atendimentos devem ser responsáveis pela resolução de 95% dos casos de baixa e média complexidade (PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), funcionando como rede de apoio intermediária entre a APS e a rede hospitalar. Em estudo realizado em Florianópolis, apenas 8,38% dos atendimentos realizados nos pronto atendimentos eram caracterizados como urgência e emergência, sendo que 47,52% tinham caráter ambulatorial, refletindo uma distorção do primeiro contato com o serviço de saúde ser genuinamente na APS (CASSETARI E DE MELLO, 2017).

Pronto atendimentos inflados de casos pertinentes à APS geram superlotação, repercussão no processo de trabalho e muitas vezes encaminhamento também desnecessários ao serviço hospitalar. Importante ressaltar que qualquer unidade de saúde da APS deve receber e cuidar da usuária em situação de urgência e emergência e encaminhá-la, somente se necessário for, para não gerar custos de atendimento em duplicidade e uma “via sacra” para usuária em busca de atendimento (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2013b).

Expõe-se uma ação muito ampla da APS, entretanto, é, pelo menos em teoria, a política atual adotada.

Tabela 5 – Requisitantes dos atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, agrupados por semelhança, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

REQUISITANTE	**OBSTETRÍCIA**		**GINECOLOGIA**		**TOTAL**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
DEMANDA ESPONTÂNEA	3.763	40,3%	919	44,9%	4.682	41,1%

PRONTO ATENDIMENTO DE MARÍLIA	1.260	13,5%	363	17,7%	1623	14,3%
CENTROS DE SAÚDE	1116	12,0%	167	8,2%	1283	11,3%
UNIDADES MÓVEIS DE EMERGÊNCIA	650	7,0%	45	2,2%	695	6,1%
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	482	5,2%	80	3,9%	562	4,9%
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	363	3,9%	61	3,0%	424	3,7%
HOSPITAL E MATERNIDADE	332	3,6%	9	0,4%	341	3,0%
UNIDADES HOSPITALARES	141	1,5%	21	1,0%	162	1,4%
SANTAS CASAS	51	0,5%	7	0,3%	58	0,5%
CENTRAL REGULACAO MARÍLIA	45	0,5%	4	0,2%	49	0,4%
PARTICULAR	21	0,2%	4	0,2%	25	0,2%
PRONTO ATENDIMENTO FORA DE MARÍLIA	5	0,1%	2	0,1%	7	0,1%
OUTROS	1.106	11,8%	365	17,8%	1471	12,9%
TOTAL	9.335	100,0%	2.047	100,0%	11382	100,0%

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A Tabela 5 expressa os diversos requisitantes por agrupamento, sendo os Centros de Saúde o terceiro maior grupo de encaminhadores, os quais se caracterizam por prestarem uma atenção primária de saúde a indivíduos e famílias, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nestas áreas (DATASUS, [20-]).

Assim, ao se agrupar os serviços de APS, estes correspondem a quase 20% dos encaminhamentos. O Ministério da Saúde conta com uma publicação intitulada Protocolos da Atenção Básica – Saúde das Mulheres, do ano de 2016, que serve como guia orientador, por exemplo, para os encaminhamentos obstétricos, os quais compõem a maioria dos casos do pronto socorro do HMI (BRASIL, 2016b).

Por este protocolo, os sinais indicativos de necessidade de encaminhamento à urgência e emergência estão expressão no Quadro 1.

Quadro 1 – Sinais indicativos de encaminhamento à urgência e emergência obstétrica.

- Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta prévia), independentemente da dilatação cervical e da idade gestacional.
- Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial > 140/90 (medida após um mínimo de cinco minutos de repouso, na posição sentada) e associada à proteinúria (usar o teste rápido de proteinúria.)
- Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito.
- Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia).

• Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular/corioamnionite ou outra infecção que necessite de internação hospitalar. • Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes • Situações que necessitem de avaliação hospitalar: cefaleia intensa e súbita, sinais neurológicos, crise aguda de asma etc. • Crise hipertensiva (PA > 160/110). • Amniorrexe prematura, podendo ser observada mediante exame especular com manobra de Valsalva e elevação da apresentação fetal. • Trabalho de parto prematuro. • IG a partir de 41 semanas confirmadas. • Hipertermia (tax ≥ 37,8 ºC), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de IVAS. • Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes. • Investigação de prurido gestacional/icterícia. • Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento sistêmico com menos de 20 semanas. • Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre. • Restrição de crescimento intrauterino. • Oligodrâmnio. • Óbito fetal.

Fonte: Protocolo de Atenção Básica: Saúde das Mulheres, Ministério de Saúde, 2016.

Desta maneira é prudente que os profissionais de saúde que compõem as equipes da APS sejam treinados e capacitados em congruência com os protocolos já existentes. Todavia, é conhecida a dificuldade de fixação, principalmente do profissional médico, nos postos de trabalho, gerando um elevado índice de rotatividade e, por conseguinte, dificuldade de uma APS qualificada adequadamente, bem como de estabelecimento de vínculo e de continuidade na atenção prestada à usuária.

Verifica-se, principalmente nas regiões sudeste e sul, uma acentuação dessa rotatividade médica, aproximando-se de 50%, médias superiores a nacional (36,7%). Esse elevado turn over, pode ocorrer pela busca de melhores condições de trabalho e remuneração, bem como insatisfação no trabalho, sendo necessário um plano de ação para essa ocorrência que tanto impacta na atenção à saúde da população (PIERANTONI et al, 2015).

Já em relação ao percentual que chega por meio das unidades móveis de emergência (6,1%), uma revisão sistemática de 2015 dispôs-se a esclarecer o porquê do acesso indevido ao serviço de ambulância. Assim, verificou-se uma ampla variação no que os pacientes e cuidadores identificam como emergência, com uma dissonância com a classificação médica, já que os pacientes muitas vezes se baseiam em fatores psicossociais ou existência de múltiplas comorbidades e não, necessariamente, em sinais e sintomas de urgência e emergência. Identifica-se,

também ansiedade do paciente e do cuidador em torno de risco relativamente pequeno, com medo genuíno de risco de vida em 60% dos casos, tendo os cuidadores papel influente na chamada pelo serviço, principalmente quando são cuidadores formais. Fatores tradicionalmente associados a privações também fazem como que as pessoas se utilizem mais desses serviços, bem como características sócio demográficas que incluem viver sozinho, ser idoso, pertencer a etnias minoritárias. A existência de cuidados de APS limitados ou ausência de busca por atendimento primário também soma-se às justificativas de uso, assim como doenças psiquiátricas, uso de álcool e drogas (BOOKER, SHAW E PURDY, 2015).

Aqui fica clara a necessidade de educação da população, além de esclarecimento e treinamento sobre urgências e emergências, com atuação principalmente, mas não somente, da APS.

Já em relação às características sócio demográficas, os dados estão representados nas Tabelas 6,7,8 e 9 e nos Gráficos 3 e 4.

Tabela 6 – Distribuição da faixa etária das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Faixa etária	**Ginecologia**		**Obstetrícia**		**Total**	
	N	%	N	%	N	%
< 10 anos	1	0,0%	13	0,1%	14	0,1%
10 a 14 anos	37	1,8%	90	1,0%	127	1,1%
15 a 19 anos	196	9,6%	1.530	16,4%	1.726	15,2%
20 a 24 anos	319	15,6%	2.503	26,8%	2.822	24,8%
25 a 29 anos	285	13,9%	2.175	23,3%	2.460	21,6%
30 a 34 anos	274	13,4%	1.635	17,5%	1.909	16,8%
35 a 39 anos	275	13,4%	1.014	10,9%	1.289	11,3%
40 a 44 anos	191	9,3%	318	3,4%	509	4,5%
45 a 49 anos	191	9,3%	46	0,5%	237	2,1%
50 a 54 anos	84	4,1%	4	0,0%	88	0,8%
55 a 59 anos	61	3,0%	1	0,0%	62	0,5%
60 a 64 anos	45	2,2%	2	0,0%	47	0,4%
65 a 69 anos	30	1,5%	-	0,0%	30	0,3%
70 a 74 anos	20	1,0%	1	0,0%	21	0,2%
75 a 79 anos	8	0,4%	-	0,0%	8	0,1%
80 e + anos	30	1,5%	2	0,0%	32	0,3%
Não informada	-	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Total	**2.047**	**100,0%**	**9.335**	**100,0%**	**11.382**	**100,0%**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018

Nota-se que a faixa etária predominante das usuárias é entre os 20 a 29, mais especificamente entre os 20 a 24 anos.

Salta aos olhos o elevado número de atendimentos na obstetrícia de pacientes até 14 anos e entre 14 e 19 anos, correspondendo a 141 e a 1726 usuárias, respectivamente. A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, podendo ser observado por diversos ângulos: a chance de morte infantil duplica para filhos de adolescentes menores que 15 anos comparada a mulheres entre 25 e 29 anos; a incidência de baixo peso é duas vezes maior e a mortalidade neonatal é três vezes maior entre filhos de mães adolescentes, além do aumento do risco de morte da gestante dessa faixa etária (14% dos óbitos em gestantes são em adolescentes). Outro ponto a ser analisado e não menos importante, é que muitas das gestações nessa faixa etária são secundárias à violência sexual, sendo entendida como violência de natureza ou conotação sexual imposta pela força física, pela ameaça e pela sedução, sendo que os filhos dessas mães possuem mais chance de serem abusados, gerando um ciclo vicioso. Merece ser pontuado também que as relações sexuais antes dos 14 anos são, presumivelmente, um ato criminoso, quando o parceiro é de maior idade e o médico deve estar atento a essas possibilidades (ALMEIDA, 2013; BRASIL, 2017b; BRASIL, 2014b).

Em uma *coorte* realizada em São Paulo, 20,1% das mães eram adolescentes (<20 anos) e 11,1% tinham 35 anos ou mais, sendo que no presente estudo as taxas foram de 17,5% e 14,8%, respectivamente (MOURA et al, 2018). As mães com trinta anos ou mais representam na amostra 32,3%, compatível com dados nacionais, representando um envelhecimento da estrutura etária das mães do Brasil (BRASIL, 2014b).

Sabe-se que a idade representa um fator de interferência no número de consultas de pré-natal, indicador utilizado para avaliação da saúde materna e do recém-nascido. Assim, quanto mais nova a mãe, menor é a proporção de consultas de pré-natal (BRASIL, 2014b), o que pode gerar, consequentemente, maior número de atendimentos no setor de urgência e emergência ou complicações materno-fetais. Em contrapartida, as gestações em pacientes maiores de 35 anos aumentam a incidência de abortos, anormalidades fetais, diabetes, hipertensão, hemorragias, partos prematuros, trabalho de parto disfuncional, partos por cesariana, baixo peso do bebê ao nascimento, maiores índices de sofrimento fetal, e menores índices de Apgar do recém-nascido no quinto minuto.

Outra perspectiva de análise desses números é sob a ótica do gênero, revelando relações de poder que reforçam as desigualdades entre homens e mulheres. A “escolha” dessas jovens gera uma privação relativa que muitas vezes a mulher não é capaz de identificar (SEN, 2010), e produz impacto na sua saúde e na forma de adoecer, já que o empoderamento emocional e psíquico não sobrevêm em conjunto. Grande parte das vezes o modelo androcêntrico prevalece, findando em estigma e preconceito pela sociedade, além de tratamento precoce e inoportuno desta adolescente como mulher (BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016). Estar grávida não muda sua condição física, psíquica e emocional, fato que deve ser compreendido pela equipe de saúde, sem julgamentos e imposições.

Frente a isso a APS, principalmente, deve agir identificando os fatores de risco para ocorrência da gestação nessa faixa etária, tais como baixa autoestima, problemas psicossociais, gravidez de adolescente na família, violência intrafamiliar, família monoparental, abuso de substâncias, moradia fora da família, evasão escolar, proporcionando um cuidado integral a essas jovens de maneira preventiva (MAIA, 2011). E a partir do momento do diagnóstico de gestação, essas adolescentes devem ser acolhidas e entendidas nos diversos serviços de saúde de maneira compatível com o seu momento de desenvolvimento.

Em relação ao registro dos atendimentos obstétricos na faixa etária acima dos 55 anos, muito provavelmente, apresenta-se como erro de cadastro no sistema.

A representação do estado civil das usuárias está demonstrada nos Gráficos 3 e 4, pelos quais percebe-se uma maior prevalência de amasiadas entre o grupo atendido na obstetrícia.

Gráfico 3 -Distribuição do estado civil das usuárias do serviço de ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Gráfico 4 -Distribuição do estado civil das usuárias do serviço de obstetrícia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018

O Gráfico 4 evidencia alto índice de gestantes solteiras, correspondendo a 22%, porcentagem superior à porcentagem nacional de mulher sem cônjuge com filho, que correspondeu, em 2015, a 16,3%, valor praticamente estável desde 2005. O aumento de menção à mulher como pessoa de referência da família, passando da proporção de 30,6% para 40,5 em 10 anos, corrobora com a dupla ou tripla jornada de trabalho, acentuando fatores de morbimortalidade (IBGE, 2016b).

Tabela 7 – Distribuição da escolaridade das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

ESCOLARIDADE	GINECOLOGIA		OBSTETRÍCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1° GRAU INCOMPLETO*	93	4,5%	547	5,9%	640	5,6%
FUNDAMENTAL I INCOMPLETO	71	3,5%	64	0,7%	135	1,2%
FUNDAMENTAL I **	6	0,3%	7	0,1%	13	0,1%
FUNDAMENTAL II INCOMPLETO	85	4,2%	363	3,9%	448	3,9%
FUNDAMENTAL II***	484	23,6%	2.046	21,9%	2.530	22,2%
MÉDIO INCOMPLETO	160	7,8%	1.171	12,5%	1.331	11,7%
MÉDIO	827	40,4%	4.066	43,6%	4.893	43,0%
SUPERIOR INCOMPLETO	50	2,4%	232	2,5%	282	2,5%
SUPERIOR	191	9,3%	577	6,2%	768	6,7%
NENHUM	61	3,0%	169	1,8%	230	2,0%
Não informado	19	0,9%	93	1,0%	112	1,0%
TOTAL	2.047	100,0%	9.335	100,0%	11.382	100,0%

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018

Nota-se a prevalência de 33,1% das usuárias com 8/9 anos ou menos de estudo no grupo relativo à obstetrícia e 44,8% com menos de 12 anos, perfil compatível com o inquérito nacional e com a coorte realizada no município de São Paulo (MOURA, 2018).

A baixa escolaridade aumenta o risco de internações prévias ao parto, mortalidade perinatal, neonatal e infantil, baixo peso ao nascer, início mais tardio do pré-natal (HAIDAR, OLIVEIRA E NASCIMENTO, 2001).

Entre as mães com 12 anos ou mais de estudos, 90,3% realizaram pelo menos seis consultas no pré-natal, contudo, essa proporção cai para 55,8% entre aquelas com mais baixa escolaridade (0 a 3 anos de estudo) (BRASIL, 2014b), também repercutindo em complicações obstétricas e perinatais, com potencial maior de utilização do PS.

Assim, aumentar a escolaridade da parcela feminina é uma forma de emancipação, aumentando em consequência o seu poder decisório e sua capacidade de tomar as rédeas da própria vida, além disso, produz impacto inquestionável e acentuado na diminuição da mortalidade infantil nos menores de 5 anos, bem como redução dos número de gestações (SEN, 2010; BRASIL, 2017b; IBGE, 2016b).

Mulheres mais instruídas tornam-se agentes decisórios em sua própria vida e, por consequência, sofrem uma queda da taxa de fecundidade e menos interferências do pensamento androgênico (SEN, 2010; BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016, FARIA E FOGARI, 2010).

Vale ressaltar, de forma geral, que a maioria dos óbitos infantis no Brasil ocorre entre filhos e filhas de mães com idade entre 20 e 29 e com escolaridade entre 8 e 11 anos, o que representa a maior parte da amostra do estudo (BRASIL, 2017c).

Tabela 8 – Distribuição da ocupação das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

OCUPAÇÃO	GINECOLOGIA		OBSTETRÍCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
DO LAR	389	25,9%	2.397	35,3%	2.786	33,6%
ESTUDANTE	100	6,7%	474	7,0%	574	6,9%
VENDEDORA	59	3,9%	406	6,0%	465	5,6%
ATENDENTE	37	2,5%	307	4,5%	344	4,1%
CAIXA	34	2,3%	296	4,4%	330	4,0%

AUTONOMA	27	1,8%	202	3,0%	229	2,8%
EMPREGADA DOMÉSTICA	45	3,0%	140	2,1%	185	2,2%
BALCONISTA	21	1,4%	125	1,8%	146	1,8%
AUX. PRODUÇÃO	11	0,7%	121	1,8%	132	1,6%
PROFESSORA	20	1,3%	120	1,8%	140	1,7%
SERVIÇOS GERAIS	49	3,3%	120	1,8%	169	2,0%
AUX. LIMPEZA	36	2,4%	110	1,6%	146	1,8%
RECEPCIONISTA	24	1,6%	109	1,6%	133	1,6%
MANICURE	16	1,1%	103	1,5%	119	1,4%
TELEFONISTA	16	1,1%	91	1,3%	107	1,3%
OUTROS	617	41,1%	1.849	27,2%	2.466	29,7%
TOTAL COM OCUPAÇÃO MENCIONADA	1.501	100,0%	6.790	100,0%	8.291	100,0%
TOTAL SEM OCUPAÇÃO MENCIONADA	546	*	2.545	*	3.091	*

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018

Além de terem um baixo grau de instrução, nota-se, pela Tabela 8 que poucas estão em direção à mudança dessa realidade, pois menos de 7% das que referem ocupação intitulam-se estudantes, e, porcentagem ainda menor se comparado ao total de mulheres atendidas.

Dos dados sócio demográficos analisados, apenas ocupação tem alta prevalência de não preenchimento, identificado na Tabela 8 como “total sem ocupação mencionada”. Não identificar a ocupação pode de alguma forma evidenciar o baixo nível socioeconômico dessas pacientes, as quais podem não ter ocupação alguma.

A baixa escolaridade e a não menção à ocupação também pode ser interpretada pela ótica de gênero, já que o lugar socialmente atribuído a cada um é uma manifestação de uma desigual distribuição de responsabilidade na produção social da existência (CARLOTO, 2001). A prevalência de 25,9% de “do lares” em atendimentos ginecológicos e 33,6% nos obstétricos, compondo a maioria da ocupação mencionada, só reforça a afirmação anterior e o peso masculino na significação das relações de poder (FARIA E FOGARI, 2010).

Apesar dos avanços inquestionáveis da presença da mulher no mercado de trabalho, nota-se que das 15 ocupações mais frequentes nos atendimentos de obstetrícia, por exemplo, apenas uma é de nível superior e compõe apenas 1,8%. Assim, praticamente todas as ocupações são de baixa qualificação profissional, o que reforça a realidade de que a cada 10 cargos executivos de

grandes empresas, apenas 1 é ocupado por mulheres, assim como cargos de gerência, nos quais a proporção é de duas para 8 homens (BRASIL, 2017b; FARIA E FOGARI, 2010).

Sabe-se que as mulheres são as principais vítimas da precarização do trabalho e as atuais propostas de flexibilização do trabalho só contribuirão para jornadas parciais, trabalho informal, ampliação de horas trabalhadas e desemprego, acentuando essa realidade já não equitativa. Compondo a desigualdade de gênero, a atual proposta de Reforma Previdência (PEC 287/16) prevê a igualdade de idade para aposentadoria entre homens e mulheres, esquecendo-se da dupla ou tripla jornada de trabalho e o início mais precoce da mulher no trabalho, não vislumbrando, portanto, os impactos na saúde feminina (BRASIL, 2017b).

Em uma análise global, a condição de agente dessas mulheres pode ser limitada por fatores externos, tais como pobreza, falta de oportunidades econômicas, exclusão social, baixa escolaridade, sendo pertinente um olhar ampliado dos profissionais do serviço na atenção à saúde dessa parcela da população (PINHEIRO, 2012).

Tabela 9 – Distribuição da procedência das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Procedência	**GINECOLOGIA**		**OBSTETRÍCIA**		**TOTAL**	
	N	%	N	%	N	%
Marília	1.427	67,6%	6.315	67,6%	7.742	68,0%
Vera Cruz	92	3,6%	336	3,6%	428	3,8%
Ocauçu	63	2,9%	269	2,9%	332	2,9%
Guarantã	53	2,3%	214	2,3%	267	2,3%
Lupércio	37	2,3%	218	2,3%	255	2,2%
Campos Novos Paulista	31	2,2%	201	2,2%	232	2,0%
Oriente	50	1,8%	172	1,8%	222	2,0%
Júlio Mesquita	33	1,7%	157	1,7%	190	1,7%
Echaporã	28	1,7%	160	1,7%	188	1,7%
Gália	32	1,6%	152	1,6%	184	1,6%
Ubirajara	27	1,6%	154	1,6%	181	1,6%
Alvinlândia	28	1,5%	138	1,5%	166	1,5%
Guaimbê	21	1,6%	145	1,6%	166	1,5%
Garça	24	1,3%	122	1,3%	146	1,3%
Quintana	4	1,1%	105	1,1%	109	1,0%
Outros da DRS IX	85	4,2%	416	4,5%	501	8,7%
Subtotal DRS IX	2.035	99,3%	9274	99,3%	11.309	99,4%
Outros fora da DRS IX	10	0,4%	35	0,4%	45	0,4%
Não codificados	2	0,3%	26	0,3%	28	0,2%
Total	**2.047**	**100,0%**	**9.335**	**100,0%**	**11.382**	**100,0%**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A existência de uma rede regionalizada e hierarquizada permite acesso ao serviço de forma oportuna. Limitações nessa rede fazem com que mulheres que residem em municípios de pequeno porte populacional, por exemplo, quando perambulando em busca de assistência para síndromes hipertensivas, sejam mais expostas ao óbito (BRASIL, 2014b).

A média de atendimentos mensais em ginecologia é de 171 e em obstetrícia 778, com média diária de 5,7 e 25,9, respectivamente, totalizando em média 949 atendimentos/mês e 31,6 atendimentos/dia.

A busca pelo serviço de urgência e emergência pode ser motivada por uma situação real de urgência e emergência, localização próxima da residência, horário de atendimento acessível, falta de médico na atenção primária, exames realizados com agilidade e/ou atendimento rápido em conjunto com uma relativa facilidade de acesso (FEIJÓ, 2010). Essa realidade exprime a dificuldade da população utilizar a rede de atenção à saúde de forma adequada, bem como as limitações que os demais pontos de atenção impõem à população, tanto por uma assistência insuficiente, como por políticas públicas mal implementadas, apesar de existentes e bem escritas.

Desta maneira, caracterizar o padrão de uso do Pronto Socorro é pertinente tanto ao planejamento, quanto à análise das políticas públicas.

Tabela 10– Distribuição da classificação de risco dos atendimentos das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Setor	**Vermelho N**	**Amarelo N**	**Vermelho e amarelo %**	**Verde N**	**Azul N**	**Verde e azul %**	**Sem classificação**	**Total de Atendimentos**
GINECOLOGIA	2	484	29,0%	1.161	30	58,1%	426	2.047
OBSTETRÍCIA	16	4.573	56,9%	3.393	81	3,2%	1.441	9.335
Total	**18**	**5.057**	**52,1%**	**4.554**	**111**	**40,9%**	**1.867**	**11.382**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridades clínicas para o atendimento, sendo vista como um protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de

necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada (BRASIL, 2013a).

Nota-se, pela Tabela 10, que 16,4% dos atendimentos não passam por classificação de risco, correspondendo a 20,8% dos ginecológicos e 15,4% dos obstétricos. Como a classificação de risco tem por objetivo o atendimento mais resolutivo e o estabelecimento de prioridades, deixar de realizá-la é interferir diretamente no princípio da equidade e no tratamento digno e humanitário das usuárias, podendo inclusive interferir no desfecho do atendimento e acarretar graves problemas às usuárias (FEIJÓ, 2010; BRASIL, 2002), ainda mais se observando o elevado número de fichas classificadas como azul e verde. Ou seja, dentre as fichas não classificadas, o percentual de casos de baixa complexidade deve ser semelhante, todavia, não são identificados, sendo atendidos por ordem de chegada e não por critérios estabelecidos, contrariando a política nacional de atenção hospitalar e os princípios do SUS.

Tabela 11– Tempo médio de espera no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Setor	% de CR	Tempo médio de espera do cadastro à abertura da CR	Tempo médio entre a abertura da CR e o fim desta	Tempo médio entre o final da CR(Abertura da ficha na urgência) e início do atendimento médico	Tempo de permanência no PS
GINECOLOGIA	100%	20,85	32,89	74,36	232,98
VERMELHO	0%	14,50	20,50	19,00	93,50
AMARELO	22%	19,98	27,08	61,19	241,85
VERDE	56%	21,20	33,90	79,27	230,56
AZUL	1%	23,78	28,92	63,54	151,45
Sem Classificação	21%	14,86	93,38	76,05	311,73
OBSTETRÍCIA	100%	17,67	24,07	69,01	208,28
VERMELHO	0%	19,61	21,00	32,11	118,81
AMARELO	48%	21,54	23,18	61,93	206,43
VERDE	36%	20,94	25,18	78,11	219,80
AZUL	1%	18,19	24,57	58,88	166,93
Sem Classificação	15%	20,51	24,20	72,19	211,76

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.
Tempo em minutos.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), o tempo médio de espera do cadastro ao início da classificação de risco deve ser menor que 10 minutos, o tempo médio da classificação de risco menor que 5 minutos e o tempo médio de espera da classificação de risco ao atendimento médico por prioridade clínica deverá ser:

- Prioridade Clínica Vermelha: tempo zero;

- Prioridade Clínica Amarela: até 30 minutos;
- Prioridade Clínica Verde: até 120 minutos;
- Prioridade Clínica Azul: até 240 minutos.

Segundo o protocolo da própria instituição (MANZZONI et al, 2015), o tempo médio de espera da classificação de risco ao atendimento médico por prioridade clínica deverá ser:

- Prioridade Clínica Vermelha: tempo zero;
- Prioridade Clínica Amarela: até 30 minutos;
- Prioridade Clínica Verde: até 60 minutos;
- Prioridade Clínica Azul: Encaminhado à atenção primária/aguardar.

Desta forma, evidencia-se, pela Tabela 11, uma discrepância entre o recomendado e o que ocorre efetivamente na rotina de atendimento.

A implantação do acolhimento e classificação de risco no HMI tem 9 anos de evolução e observa-se que, muitas vezes, é realizado de acordo com a experiência profissional do enfermeiro e não em protocolos bem estabelecidos para mulheres e/ou gestante, conforme apresentado no início dos resultados. Além disso, é possível verificar que o tempo de atendimento médico entre as fichas classificadas como verde e amarela são relativamente próximos, podendo representar uma desvalorização da CR ou uma falta de entendimento dos profissionais médicos de seu intuito. O tempo médio de atendimento registrado para as CR vermelhas pode refletir a ausência real de urgência absoluta ou o mau uso do SAMU / resgate, os quais dão entrada, muitas vezes, com a usuária pela sala de emergência.

Observa-se um tempo de permanência no PS que varia de, aproximadamente, 1h à 4h, com média de 3,3h. Sendo a maioria das CR verdes e azuis, questiona-se essa longa permanência das pacientes no PS, mesmo após o atendimento médico. Aventa-se a possibilidade de ser para aguardar pedidos de exames, os quais, grande parte das vezes poderiam ser realizados na APS; ou mesmo para realização de medicações, as quais muitas vezes poderiam ser administradas via oral, em casa, tendo como base o perfil de medicações usadas no PS apresentadas a seguir, nesta dissertação.

Tabela 12 – Distribuição, por CID, dos atendimentos obstétricos do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

CID 10	Total	
	N	%*
Z349 Supervisão de gravidez normal, não especificada	3.750	40,5%
R102 Dor pélvica e perineal	712	7,7%
O200 Ameaça de aborto	522	5,6%
O600 Trabalho de parto pré-termo sem parto	290	3,1%
N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	259	2,8%
O069 Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações	168	1,8%
O13 Hipertensão gestacional induzida pela gravidez sem proteinúria significativa.	168	1,8%
Z719 Aconselhamento não especificado	146	1,6%
O021 Aborto retido	138	1,5%
D689 Defeito de coagulação não especificado	114	1,2%
O623 Trabalho de parto precipitado	103	1,1%
Total	6370	68,7%

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

*% em relação ao número de CIDs informados.

Em relação aos diagnósticos realizados nos atendimentos obstétricos, de 9335 atendimentos registrados, 9266 constavam o CID. Foram identificados 445 CID de registro diferentes. A tabela 12 apresenta os 10 primeiros CIDs mais frequentes no registro do atendimento no PS em obstetrícia.

Tabela 13 – Distribuição, por agrupamento de CIDs, dos atendimentos obstétricos do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

GRUPAMENTO	**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**					
	VERMELHO	AMARELO	VERDE	AZUL	SEM CLASSIFICAÇÃO	TOTAL
Supervisão de gestação	4	1997	1381	31	637	3977
Dor abdomino-pélvica	0	367	376	3	106	852
Ameaça de aborto	1	312	147	3	62	522
Aborto de algum tipo	1	214	139	3	66	423
Infecção do trato urinário	0	123	163	5	45	336
Síndromes hipertensivas	1	134	44	1	25	205
Sífilis na gestação	0	11	11	0	11	33
Morte fetal	1	16	9	0	3	29
Total	8	3174	2270	46	955	6377

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

O maior número de atendimentos foi registrado como supervisão de gestação, o que não é coerente com um serviço de urgência e emergência, ainda mais especializado em gestação de alto risco. Nota-se pela tabela 13, portanto, um

preenchimento inespecífico dos diagnósticos dos atendimentos do PS. Isso pode ocorrer devido à existência de casos não pertinentes ao tipo de serviço prestado, que geram apenas esclarecimentos de dúvidas e orientações gerais, bem como por falta de entendimento por parte do médico da importância individual, epidemiológica e de gestão dos registros ou mesmo por sobrecarga de trabalho de necessidade de rapidez, para atendimento do próximo. Desde 2002, o CFM pontua a necessidade de anotação em prontuário de anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, sendo assim, a falta de clareza diagnóstica torna o registro parcialmente adequado. Soma-se a isso o fato de que o prontuário é o principal constituinte de provas judiciais, então, com registros omitidos ou irregulares, o médico pode perder a possibilidade de comprovação dos seus atos. A medicina defensiva reforçada com a contínua incorporação de tecnologias modernas não substitui o preciso preenchimento do prontuário (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).

Sob outra perspectiva, segundo o Código Penal, a anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente no prontuário quanto aos fatos relacionados com o paciente pode caracterizar falsidade ideológica, não tendo, o médico, muitas vezes dimensão da possibilidade de repercussão de suas atitudes, não somente no âmbito clínico ou individual para o paciente, mas também no âmbito coletivo e para si próprio (CARVALHO, [20-]).

As infecções do trato urinário, também apresentadas nas tabelas 12 e 13, são condições sensíveis à atenção primária, sendo um dos principais motivos específicos de busca de atendimento. É uma situação de fácil diagnóstico e manejo, inclusive com rastreamento incluso na rotina de pré-natal. Atendimentos dessa natureza, a princípio, não exigem elevado nível de densidade tecnológica, sendo passível de atendimento e tratamento tanto na APS, como no Pronto Atendimento.

Gráfico 5 – Distribuição, por agrupamento de CIDs, dos atendimentos relativos à violência contra a mulher, do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A invisibilidade social da violência contra mulher é um fato, ilustrado pelo atendimento com esse tipo de registro em apenas 28 casos, somando-se abuso sexual e agressão, no período de um ano, contrapondo a triste realidade de que no Brasil, a cada cinco minutos uma mulher é agredida, a cada 11 minutos uma mulher sofre estupro e a cada duas horas uma mulher é assassinada (BRASIL, 2017a). Sabe-se pelos registros do SINAN, que a maioria das ocorrências são causadas por parentes imediatos, parceiros ou ex-parceiros afetivos, sendo a violência não letal um importante indicador de prevenção da violência letal (BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016; WAISELFISZ, 2015) A proporção de mulheres assassinadas por parceiro é 6,6 vezes maior do que a proporção de homens assassinados por parceira, reforçando o problema de gênero (GARCIA et al, 2013).

No Brasil, desde 2006, existe a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Já em 2015, foi sancionada a Lei 13.104, classificando o feminicídio como crime hediondo e com agravantes quando acontece em situações específicas de vulnerabilidade (gravidez, menor de idade, na presença de filhos, etc.) (WAISELFISZ, 2015). Mesmo assim, muitas vezes a procura por ajuda, inclusive médica é adiada por medo, vergonha ou dependência do agressor. Todavia, apesar da existência da Lei Maria da Penha, estudo realizado pelo Ipea, não constatou impacto nas taxas de mortalidade feminina por agressões.

Em Marília, a taxa média de feminicídio por ano, ou seja, de homicídios de mulheres decorrentes de conflito de gênero (GARCIA et al, 2013), é de 2,5, ocupando 1181º lugar em relação aos municípios com mais de 10.000 habitantes, sendo a cidade de Barcelos/AM a primeiro no ranking, com 45,2 (WAISELFISZ, 2015).

Frente a isso, o profissional de saúde do PS deve estar preparado para o acolhimento e atendimento das mulheres nessas circunstâncias, com registro apropriado em prontuário e notificação compulsória, podendo inclusive responder por omissão.

Em casos de agressão sexual, o médico deve proceder à anticoncepção de emergência, realizar a profilaxia para IST´s e, se o atendimento for imediato, nas primeiras horas ou dias, coleta de material do conteúdo vaginal, oral ou anal, por meio do swab estéril, bem como preservação de evidências materiais da existência de crime sexual. Também é necessário que se proceda o apoio psicossocial e a integração e articulação dos serviços e organizações que, direta ou indiretamente, atendem situações de violência sexual, reforçando a intervenção multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional (BRASIL, 2012). Desta forma, deve ser assegurado um atendimento adequado, humanizado, integrado, multissetorial e em rede às mulheres em situação de violência nos serviços públicos especializados e não especializados (BRASIL, 2016c).

Interessante e pertinente que o profissional da urgência e emergência também oriente sobre a existência da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Ligue 180, que se presta a orientar sobre os direitos das mulheres, bem como sobre como agir em situação de violência, além do atendimento de denúncias e ligações de urgência e emergência, com redirecionamento, nesse último caso, ao SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Direitos Humanos (BRASIL, 2016c).

Tabela 14 – Distribuição, por CIDs mais frequentes, dos atendimentos em ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

CID 10	GINECOLOGIA	
	N	%
N939 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado	177	8,7%
R102 Dor pélvica e perineal	137	6,7%
N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	88	4,3%
N926 Menstruação irregular, não especificada	80	3,9%

Z349 Supervisão de gravidez normal, não especificada	67	3,3%
O069 Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações	62	3,0%
Z988 Outros estados pós-cirúrgicos especificados	60	2,9%
O021 Aborto retido	47	2,3%
D259 Leiomioma do útero, não especificado	46	2,3%
Z000 Exame médico geral	46	2,3%
Total	810	37,5%

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Diferente dos atendimentos de obstetrícia, 99,4% dos de ginecologia possuem identificação, correspondendo a 2047 consultas, sendo os principais CIDs expressos na tabela 14.

Ao agrupar-se de por semelhança os CIDs, nota-se que 113 atendimentos, 5,5%, apresentam diagnósticos inespecíficos como exame médico geral, aconselhamento não especificado, aconselhamento geral sobre contracepção, exame ginecológico geral de rotina, causas desconhecidas e não especificadas de morbidade.

Verifica-se que a maioria, em termos de grupo de diagnósticos, relaciona-se de alguma forma com sangramentos genitais e sua repercussão, que é a anemia, correspondendo a 21,1% dos atendimentos, como segue na tabela 15.

Tabela 15 – Número de atendimentos por CIDs potencialmente relacionados a sangramento e anemias no serviço de ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

CID 10	**N**
DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS COM SANGRAMENTO	
N939 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado	177
N926 Menstruação irregular, não especificada	80
D259 Leiomioma do útero, não especificado	46
N938 Outros sangramentos anormais especificados do útero e da vagina	42
N950 Sangramento pós-menopausa	18
N921 Menstruação excessiva e freqüente com ciclo irregular	11
N840 Pólipo do corpo do útero	9
D251 Leiomioma intramural do útero	8
O209 Hemorragia do início da gravidez, não especificada	6
O720 Hemorragia do terceiro estágio	4
D250 Leiomioma submucoso do útero	3
N841 Pólipo do colo do útero	2
Total parcial	406
ANEMIAS	

D649 Anemia não especificada	10
D464 Anemia refratária, não especificada	4
D500 Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue (crônica)	4
D509 Anemia por deficiência de ferro não especificada	3
D648 Outras anemias especificadas	3
D62Anemia aguda pós-hemorrágica	2
D571 Anemia falciforme sem crise	1
Total parcial	27
Total	433

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Assim como na obstetrícia, na ginecologia o atendimento por causas relacionadas a aborto não é incomum, representando um total de 153 casos/ano, somando 576 atendimento/ano, o que corresponde a 5% do total.

Transtornos mamários somam apenas 57 casos/ano, divididos conforme o gráfico 6 abaixo:

Gráfico 6 – Distribuição dos transtornos mamários, por CID, atendidos no serviço de ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

As neoplasias, igualmente, representam uma parcela pequena dos atendimentos, com apenas 36 casos, conforme o gráfico 7, abaixo:

Gráfico 7 – Distribuição dos transtornos neoplásicos, por CID, atendidos no serviço de ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.
Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Todavia, cabe ressaltar que neoplasia maligna de colo de útero corresponde a 11 pacientes e de mama a 5, as quais são doenças rastreáveis, com métodos disponíveis na atenção primária à saúde.

Nota-se que 5% dos atendimentos em ginecologia são por infecções do trato urinário sem complicação, demonstrando um uso inadequado da RUE.

Um fator limitante à análise dos diagnósticos de atendimento do pronto socorro é a impossibilidade de cadastro de mais de um CID por atendimento, pois com frequência as paciente apresentam associação de comorbidades que levam à queixa principal. Além disso, para aqueles atendimentos que geraram internação, não há possibilidade de registro facilmente recuperável dos CIDs secundários. Por exemplo, se a paciente está internando devido a pré-eclâmpsia grave, mas porém está em tratamento de sífilis, apenas o CID referente à primeira patologia entrará no sistema, limitando o levantamento do perfil epidemiológico das usuárias.

Assim, a implantação do prontuário eletrônico traz benefícios inigualáveis, incluindo a possibilidade de continuidade da assistência, integrando diversas fontes, economia de espaço, mais agilidade, possibilidade de acesso simultâneo das informações por diferentes locais e profissionais, além de

contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico, com melhora da qualidade da informação. Todavia, possui limitações práticas como as apresentadas acima, possíveis de correção, caso houvesse integração entre as equipes assistenciais e o núcleo de tecnologia de informação. Outras limitações são adesão inadequada ao preenchimento completo pelos profissionais de saúde, receio de que o uso da tecnologia possa quebrar o sigilo médico, questionamento do uso de tecnologia em substituição do raciocínio médico, falta de planejamento estratégico na implantação do sistema, bem como falta de monitorização contínua por parte dos gestores das informações e uso adequado do prontuário (MOURÃO E NEVES, 2007).

Em relação às condições sensíveis a atenção básica, a Figura 9 traz a representação global da distribuição dos casos no DRS IX.

Figura 9. Georreferencimento dos casos de CSAP atendidos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Foram identificados 130 casos de atendimentos no PS pelos CIDs estabelecidos, sendo que 24 não puderam ser georreferencidos pelo endereço, devido a erros de preenchimento e, portanto, foram introduzidos apenas com o referencial da cidade. A maior concentração, em termos absoluto, ocorre na cidade de Marília, o que pode ser justificado pelo maior número de habitantes da cidade.

Figura 10. Georreferenciamento dos casos de CSAP atendidos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Legenda: Sífilis complicando a gravidez Infecções relacionadas ao trato urinário Inflamação da vulva e vagina

Como mostra a Figura 10, a distribuição dos casos atendidos no PS por condições sensíveis à atenção primária se dá mais em periferia, com predominância na zona sul, sendo que esta não coincide com os locais de maior

densidade populacional, conforme a Figura 11. Interroga-se sobre a predominância em locais de menor renda, entretanto, essa informação sobre não é precisa em todo município de Marília, conforme a Figura 12.

Figura 11. Distribuição da população residente em Marília, por faixas de concentração, IBGE, 2010.



Fonte: IBGE, 2010.

Figura 12. Domicílios ocupados com rendimento médio mensal per capta em salários mínimo, inferior ou igual a 1/2, IBGE, 2010.



Fonte: IBGE, 2010.

Apesar disso, não se pode ignorar a influência dos determinantes sociais de saúde, os quais são entendidos como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população, proporcionando a distribuição referida dos casos (BUSS E PELLEGRINI FILHO, 2007).

O georreferenciamento por endereço de origem dos casos permite o estudo da distribuição espacial das ocorrências, bem como abre portas para o aprofundamento sobre o padrão observado, permitindo identificar possíveis fatores associados, bem como o risco de adoecimento. Além disso, auxilia os processos de gestão da APS, evidenciando onde devem ser concentrados maiores esforços para qualificação da assistência básica. Assim, georreferenciar as informações em saúde auxilia no entendimento da ocorrência de eventos, predição, tendência, simulação de situações, planejamento e definição de estratégias de vigilância em saúde (BARCELLOS et al, 2008). No presente estudo, houve um georreferenciamento básico dos casos, o qual merece aprofundamento das correlações e associações em estudos posteriores.

Ao se confrontar com as Figuras 5 e 6, nota-se que os casos possuem proximidade com a área de localização das unidades de APS. As CSAP são problemas de saúde atendidos por ações típicas do primeiro nível de atenção e cuja evolução, na falta de atenção oportuna e efetiva, pode exigir a hospitalização. Desta maneira, a investigação dessas condições no PS pode servir de sentinela para uma futura internação, bem como evidenciar a efetividade ou não do nível primário de atenção (NEDEL, 2010). Como já mencionado, só foram georreferenciados CIDs de relação direta e mais específica com a saúde da mulher, conforme a portaria nº 221 de 2008. Entretanto, afecções com mesmo significado clínico de tais CIDs podem ter sido registradas no sistema eletrônico sob forma de outros CIDs, havendo um sub levantamento desses casos.

Em relação à solicitação de exames complementares, a proporção de consultas que geram pelo menos um pedido segue a representação do Gráfico 8.

Gráfico 8 – Proporção de consultas x solicitação de exames complementares no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.



Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Desta forma, 53,6% das consultas ginecológicas e 62,2% das obstétricas geram pedidos de exames complementares laboratoriais. Em média, são solicitados 3,44 exames por usuária e 5,6 exames por consulta que requerem pedidos, estando os números absolutos e valores gastos expressos na Tabela 16.

Tabela 16 –Distribuição dos exames laboratoriais solicitados no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

EXAMES LABORATORIAIS	**Total N**	**% ***	**Valor unitário** R$**	**Valor final R$**
HEMOGRAMA COMPLETO	4.183	10,70%	4,11	17.192
TEMPO E ATIVIDADE DE PROTOMBINICA	3.283	8,40%	2,73	8.963
URINA 1	3.274	8,40%	3,7	12.114
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCILA ATIVADO	3.260	8,40%	5,77	18.810
FIBRINOGENIO – DOSAGEM	3.245	8,30%	4,6	14.927
CULTURA URINA C/ CONTAGEM DE COLONIAS	2.623	6,70%	5,62	14.741
VDRL	2079	5,3%	2,83	5.884
CREATININA	1.003	2,60%	1,85	1.856
TRANSAMINASE OXALACETICA	998	2,60%	2,01	2.006
TRANSAMINASE PIRUVICA	988	2,50%	2,01	1.986
DESIDROGENASE LATICA	847	2,20%	3,68	3.117
ACIDO URICO	840	2,20%	1,85	1.554
GONADOTROFINA CORIONICA - BETA HCG	814	2,10%	7,85	6.390
POTASSIO	798	2,00%	1,85	1.476

UREIA	796	2,00%	1,85	1.473
SODIO	789	2,00%	1,85	1.460
GRUPO ABO FATOR RH (INCLUI DU)	594	1,50%	1,37	814
PROTEÍNA C REATIVA	593	1,50%	2,83	1.678
COOMBS INDIRETO (INCLUI QUANTITATIVO)	517	1,30%	2,73	1.411
BILIBURRINA TOTAL E FRACOES	470	1,20%	2,01	945
GLICOSE	393	1,00%	1,85	727
MAGNESIO	278	0,70%	2,01	559
Outros	9185	16,40%	-	-
Total	**39178**	**100%**	**-**	**R$120.081**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

***em relação ao total de exames complementares**

****SIGTAP, 2018.**

Rotineiramente, no serviço, são solicitados fibrinogênios, tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA) e tempo e atividade de protrombínica (TAP) para aquelas pacientes que tenham possibilidade de internação ou que efetivamente internarão como forma de rastreamento de coagulopatias ou risco de sangramento, caso seja necessário uma intervenção cirúrgica como cesariana. Todavia, a literatura aponta há tempos que o coagulograma está indicado como exame pré-opertório apenas em pacientes com história de sangramento, não acrescentando nenhum benefício a pessoas assintomáticas. Soma-se a isso, o fato de que tais exames não modificam a conduta intraoperatória em casos assintomáticos, pois não predizem o risco de sangramento. Assim, só faz sentido a solicitação de coagulograma com base nos dados de prontuário, história clínica e exame físico, de forma individualizada.

No período estudado o custo dessa rotina (TTPA, TAP e Fibrinogênio) somou R$42.700,00, conforme Tabela 16, fato que deve ser repensado frente ao exposto anteriormente.

Também se deve colocar em discussão o pedido de hemograma, que muitas vezes é solicitado como pré-operatório e em tantas outras é solicitado ora para verificação da série vermelha ora para verificação de plaquetas, exclusivamente, além do seu uso rotineiro de forma completa. Assim, deve ser lembrada a possibilidade de pedidos de hemoglobina, hematócrito e plaquetas de forma isolada, podendo diminuir os custos de investigação diagnóstica. Em relação ao pré-operatório, não há evidências que seu uso indiscriminado possa melhorar a

evolução clínica da paciente (FERNANDES et al, 2010; MATHIAS et al, 2006; CHEE E GREAVES, 2003; CHEE E GREAES, 2003; SUCHMAN E MUSHLIN, 1986).

Apesar de não muito frequente, o pedido de dosagem de magnesemia ocorre no pronto socorro, majoritariamente em pacientes com distúrbios hipertensivos, com risco potencial de necessidade de uso de sulfato de magnésio. Todavia, deve ser lembrado que a prevalência de hipermagnesemia prévia é incomum, exceto em pacientes com insuficiência renal crônica. Além disso, as doses excessivas de magnésio endovenosas são mais bem toleradas do que as excessivas via oral. Importante pontuar, assim, que a monitorização da magnesemia para sulfatação é desnecessária e que, deve-se realizar, sim, controle clínico, com monitorização da diurese, reflexo patelar, frequência respiratória e cardíaca, com boa correspondência clínica, como segue na Tabela 17 (BARBOSA, 2010; SILVA, 2013; TOWNSEND, 2015).

Tabela 17 – Sintomas segundo a dosagem sérica de Magnésio no sangue.

Dose sérica em mg.dL	Sintoma
1,6-2,3	Valores normais
5-9	Terapêutica
10-15	Arreflexia
15-20	Parasia respiratória
> ou =25	Parada cardíaca

Fonte: BARBOSA, 2010.

Grande parcela dos diagnósticos realizados no pronto socorro possui relação com as síndromes hipertensivas na gestação, as quais são reconhecidas como hipertensão crônica, hipertensão crônica superajuntada com pré-eclampsia, pré-eclampsia eclampsia, hipertensão gestacional e síndrome HELLP. Assim, dependendo da desordem apresentada existe indicação de coleta de creatinina para verificação de insuficiência renal progressiva (TASK FORCE ON HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013), de bilirrubinas totais, DHL, TGO, esfregaço sanguíneo e plaquetas para diagnóstico de síndrome HELLP (SIBAI, 1990); e Urina I para diagnóstico de pré eclampsia, lembrando que a inexistência de proteinúria não exclui necessariamente esta última entidade.

Na pré-eclampsia ocorre também aumento do ácido úrico, com associação à crise hipertensiva, eclâmpsia, síndrome HELLP parcial e síndrome HELLP, óbito fetal, prematuridade, RN pequenos para idade gestacional, com menor

peso ao nascer, todavia, isoladamente não tem força decisória na prática obstétrica (DAMACENA, 2016).

Ao analisarmos os números absolutos de exames solicitados, nota-se certa proximidade absoluta entre a dosagem de ácido úrico, DHL, TGO, TGP, muito provavelmente devido ao acima apresentado. Todavia, uma dosagem aproximadamente 50% menor de bilirrubinas totais e frações. Como para o diagnóstico de HELLP apenas TGO é suficiente, é possível a suspensão da solicitação de TGP quando para esta finalidade e emprego mais criterioso da solicitação de bilirrubinas, já que apenas um dos exames alterados no contexto em pauta pode configurar-se síndrome HELLP (TASK FORCE ON HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013).

Como não existe protocolo clínico específico da instituição, as condutas podem apresentar-se díspares, como evidenciado com a análise da solicitação dos exames. Assim, é necessária a adoção de protocolos e diretrizes terapêuticas para garantir intervenções seguras, resolutivas e baseadas em evidências científicas, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS (BRASIL, 2013a).

Tabela 18 – Distribuição dos exames ultrassonográficos solicitados no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS	**Total**	**%**	**Valor Unitário* R$**	**Valor Final R$**
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1.586	43,57	24,2	38.381
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER	1.372	37,69	42,9	58.859
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	464	12,75	24,2	11.229
ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO	108	2,97	24,2	2.614
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA GINECOLÓGICA	24	0,66	24,2	580,8
Outros	86	2,36	-	-
Total	3640	100,00		R$111.663,8

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

*SIGTAP, 2018.

A cada 3 usuárias atendidas, uma recebe um pedido de ultrassom. E a cada 2 consultas que geram pedidos de exames complementares, uma recebe solicitação de ultrassom, podendo os números absolutos serem vistos na Tabela 18.

Pontua-se, em relação aos exames complementares, que a produção irreal da saúde perfeita, a judicialização da saúde e o afastamento da medicina da clínica tradicional, envolvendo anamnese e exame físico completos, ampliam as demandas por tecnologias médicas. Acrescenta-se ao mencionado a transformação de problemas socioeconômicos em doenças, a criação de novas doenças pela sociedade contemporânea ou a ampliação da definição de doenças já conhecidas para abarcar novos pacientes, e a ampliação do uso de determinados exames para condições não originalmente incluídas em seu escopo, acarretando sobrecarga de trabalho e de custos ao setor (RIBEIRO, 2015).

Tabela 19 – Distribuição dos exames laboratoriais questionáveis solicitados no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

EXAMES QUESTIONÁVEIS	**Total N**	**Valor Unitário* R$**	**Gasto Final R$**
ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2	208	10,00	2.080
ANTÍGENO HBSAG	126	18,55	2.337
FTA-ABS, PARA SIFILIS IGG	120	5,00	600
TOXOPLASMOSE (IGG E IGM)	119	35,19	4.188
ANTI-HCV	105	18,55	1.948
HORMÔNIO TIREOSTIMULANTE	43	8,96	385
ANTI-HBE	38	18,55	705
PROTEINURIA DE 24 HORAS	37	2,04	75
CITOMEGALOVIRUS (IGG E IGM)	30	22,61	678
ANTICORPOS IGIG E IGM RUBEOLA	29	34,32	995
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	28	7,86	220
ANTÍGENO HBEAG "E" HEPATITE B	28	18,55	519
ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE	26	11,6	302
ANTI-HBSAG	22	18,55	408
ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO	21	13,35	280
ANTI-HBC IGG	9	18,55	167
COLESTEROL TOTAL	6	1,85	11
TRIGLICERÍDEOS	6	3,51	21
COOMBS DIRETO	6	2,73	16
COLESTEROL (HDL)	4	3,51	14
ANTI-HBC IGM	3	18,55	56
HORMÔNIO LUTEIZANTE	2	8,97	18
FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO – FSH	2	7,89	16
Total	1018		R$16.040

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

*SIGTAP, 2018

A Tabela 19 apresenta exames que podem ter sua solicitação questionada em um serviço de urgência e emergência em saúde da mulher, esclarecendo que queixas clínicas agudas de mulheres não gestantes e não ginecológicas são habitualmente atendidas no Hospital das Clínicas I.

Algumas hipóteses podem ser levantadas em relação a esse perfil.

A primeira é de que os profissionais solicitam alguns dos exames, como as sorologias para HIV e hepatite B para completarem minimamente as carteirinhas de pré-natal, já que, não raramente, estas se apresentam com preenchimento incompleto ou ilegível, tanto pelo serviço de APS não ter solicitado o exame quanto pelo profissional de saúde não ter realizado a anotação. Além da implicação de geração de custos ao pronto socorro, essa deficiência dos registros do pré-natal da APS pode gerar internação de gestantes de baixo risco no HMI, já que segundo o protocolo, pré-natal com registro incompleto é de responsabilidade do referido serviço.

Ademais, a solicitação de tais exames pelos profissionais do PS, quando não diretamente relacionado ao esclarecimento de um diagnóstico relacionado à queixa, reforça o uso incorreto da RUE pelas usuárias em si, pois identificam um meio, muitas vezes mais rápido, de terem acesso aos exames que almejam ou necessitam, mesmo que não sejam de urgência ou emergência.

A segunda é de que os próprios profissionais fazem uso de forma inadequada da RUE, realizando consultas semelhantes às de pré-natal com solicitação de exames e retorno, haja vista o número de retornos, os quais somam 680 na obstetrícia, no período estudado.

Praticamente todos os exames da Tabela 19 não têm os seus resultados liberados em 24h, o que reforça o questionamento sobre sua solicitação em um serviço de urgência e emergência, a menos que a paciente seja internada e tais exames sirvam de complementação diagnóstica ou terapêutica específica.

Foram consumidos no período de um ano no PS 24.060 medicações, excetuando litros de oxigênio e medicações anestésicas. Dessas, 1813 foram dipirona cápsulas e 1779 dipironas ampolas.

As 5 medicações mais utilizadas em obstetrícia foram dipirona, isoxisuprina, cefalotina, nimesulida e escopolamina, excetuando soro fisiológico e glicose hipertônica, congruente ao apresentando na Tabela 12, já que dor pélvica e

perineal e trabalho de parto prematuro (TPP) estão entre os CIDs mais prevalentes nas consultas do PS.

Cabe a observação de que, mais recentemente, a isoxisuprina (inibina) não é mencionada nos artigos científicos como escolha para inibição de TPP (BITTAR E ZUGAIB, 2009; FLENADY et al, 2014), apesar de ser a droga mais utilizada para esta finalidade no PS. Foram utilizadas 1201 ampolas e 262 comprimidos desta medicação em comparação com apenas 188 ampolas de terbutalina ou 275 comprimidos de nifedipina, por exemplo, sendo este último mais usado na prática clínica da instituição para picos hipertensivos. Isso evidencia , mais uma vez, a necessidade de estabelecimento de protocolos atualizados, baseados em evidência.

Em relação às síndromes hipertensivas, a medicação mais utilizada foi metildopa (1038 comprimidos), todavia para as hipertensões severas na gestação as escolhas iniciais de tratamento são nifedipina (275 comprimdios) e hidralazina (6 ampolas), as quais tiveram consumo sensivelmente menor (TASK FORCE ON HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013).

As 5 medicações mais utilizadas em ginecologia foram dipirona, captopril, tenoxican, cefalotina e ceftriaxone, excetuando-se também soro fisiológico e glicose hipertônica, perfil também compatível com as principais afecções apresentadas no PS de ginecologia, apresentado na Tabela 14.

Observa-se que a cefalotina e a cefalexina são cefalosporinas de 1ª geração, com espectro de ação semelhante, sendo o perfil de resistência cruzado para as drogas do mesmo grupo (FELICIANO, 2016). Desta maneira, é possível a prescrição de cefalexina para uso domiciliar, ao invés de parenteral, diminuindo a sobrecarga de trabalho no PS e provendo o mesmo resultado terapêutico desejado.

A medicação mais prescrita tanto em ginecologia quanto em obstetrícia é a dipirona.

Tabela 20 - Distribuição dos encaminhamentos ao final do atendimento no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Encaminhamento ao final do atendimento	Ginecologia		Obstetrícia	
	N	**%**	**N**	**%**
REVELIA APÓS CONSULTA/ANTES DA CONDUTA	50	2,4%	188	2,0%
REVELIA APÓS CONSULTA / APÓS CONDUTA	12	0,6%	65	0,7%

RETORNO E ENCAMINHAMENTO	2	0,1%	23	0,2%
RETORNO	155	7,6%	680	7,3%
ALTA	1.355	66,2%	5.517	59,1%
INTERNAÇÃO HC-II	183	8,9%	2.060	22,1%
CONTRA-REFERÊNCIA	58	2,8%	166	1,8%
OUTROS	232	11,3%	2.683	28,7%
Total	**2.047**	**100,0%**	**9.335**	**100,0%**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Apesar de 58,1% dos atendimentos em ginecologia serem classificados como verde e azul e 37,2% dos de obstetrícia, menos de 3% dos atendimentos se finalizam com contrarreferência para APS e mais de 7% recebem orientação de retorno no serviço terciário, conforme apresentado na Tabela 20.

Devido o caráter de atendimento de um serviço de pronto socorro, não cabe a consulta de retorno. Assim, o médico que solicitar os exames ou o plantonista que assumir deverá reavaliar o paciente e interpretar os resultados em período compatível com a caracterização de urgência e emergência (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS, 2010). Se existe a possibilidade de alta com retorno, existe a possibilidade de contrarreferência para a atenção primária, pois esta sim é o centro de coordenação do cuidado da rede de atenção à saúde. Cabe ressaltar que retorno é entendido como um novo encontro com o médico para a finalização da consulta que não pode ser concluída com as informações disponíveis naquele momento, relacionadas à anamnese, exame físico e exames complementares (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010). Sendo a urgência um agravo que necessita de assistência médica imediata e a emergência um risco iminente de vida ou sofrimento intenso, reitera-se a incompatibilidade da existência de retorno no pronto socorro. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). Portanto, mostra-se necessário a instituição da alta responsável com transferência do cuidado por meio de relatório adequado, articulando seguimento, em especial com a APS (BRASIL, 2013a).

Não houve no período estudado revelia antes da consulta, mas houve 315 casos de revelia após consulta. Assim, as pacientes foram atendidas, mas não obtiveram a conclusão do seu tratamento por opção. Hipóteses podem ser feitas em relação a esse fato, tais como dificuldade de relação médico/paciente, casos de baixa complexidade com satisfação da usuária apenas com atendimento e

orientação, dificuldades socioeconômicas de permanecer no local aguardando a implementação da conduta. Independente da causa, tais atendimentos geram custos, contribuem para superlotação dos pronto-socorros e, grande parte das vezes, não se caracterizam como urgência e emergência.

Dos atendimentos em ginecologia, 8% geraram internação, assim como 19,9% dos em obstetrícia.

A Tabela 21 representa o local de internação (enfermaria de entrada) inicial dessas pacientes.

Tabela 21 – Distribuição do local de internação por enfermaria de pacientes internadas com solicitação de internação realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Equipe requisitante / Enfermaria entrada	%
URG/EMERGÊNCIA GINECOLOGIA	
GINECOLOGIA	72,8%
URG/EMERG MATERNO INFANTIL	15,2%
OBSTETRÍCIA	5,2%
CENTRO OBSTÉTRICO	2,6%
CENTRO CIRÚRGICO HC II	1,6%
CLÍNICO / CIRÚRGICO	1,6%
MI	0,5%
UTI	0,5%
URG/EMERGÊNCIA OBSTETRÍCIA	
OBSTETRÍCIA	50,9%
CENTRO OBSTÉTRICO	22,2%
GINECOLOGIA	12,8%
URG/EMERG MATERNO INFANTIL	12,1%
CENTRO CIRÚRGICO HC II	1,7%
PEDIATRIA	0,2%
CLÍNICO / CIRÚRGICO	0,1%
URG/EMERG HCI FRENTE	0,0%

Nota-se que parcela expressiva das internações (Tabela 21) não ocorre nas enfermarias de ginecologia e obstetrícia em si, sendo que em média 12,3% das pacientes ficam internadas no próprio Pronto Socorro, em condições distantes de uma internação humanizada e digna. 12,1% das internações de obstetrícia ocorrem nos leitos da enfermaria de ginecologia, devido à disponibilidade de leitos para gestantes ser aquém do contingente de pacientes, reduzindo, portanto, a capacidade operacional da ginecologia. 1,6% do total de pacientes internadas pelo PS internam diretamente no centro cirúrgico, realizando o pós operatório neste local,

sem a possibilidade de deambular, realizar a higiene autonomamente, ou mesmo, urinar e evacuar espontaneamente, quando já em condições. A internação no centro obstétrico seria para aquelas pacientes que estão em trabalho de parto ou em vias de resolução da gestação, todavia, não raramente os leitos são utilizados para pacientes que não se enquadram nisso, devido à escassez de leitos.

Frente ao apresentado, é necessário aprofundamento sobre a adequação das internações, com criação de protocolos para uniformização das condutas, estudo detalhado sobre a taxa de ocupação hospitalar, índice de rotatividade e média de permanência, a fim de se entender esse processo de internação em outras enfermarias de forma mais sistematizada.

No tocante à média de permanência, a Tabela 22 apresenta algumas informações.

Tabela 22 – Indicadores de Permanência de pacientes internadas com solicitação de internação realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Setor	**Média de permanência Dias**	**Permanência máxima Dias**	**Desvio padrão Dias**
GINECOLOGIA	3,26	27,70	3,75
OBSTETRÍCIA	3,55	118,10	4,00
Totais	**3,53**	**118,10**	**3,98**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A média de permanência é um indicador de qualidade e eficiência do serviço e importante parâmetro para gestão hospitalar, inclusive em relação aos custos.

Para uma análise mais aprofundada é adequado avaliar a média de permanência por procedimentos clínicos e cirúrgicos especificamente, já que o SUS estabelece média de permanência para cada procedimento em específico, sendo que para alguns deles admite permanência a maior (BRASIL, 2010b).

A permanência a maior indica que pelas características próprias do procedimento ou pela condição clínica do paciente, permitem-se dias de permanência além do dobro da média (BRASIL, 2010b). Quando o tempo de internação ultrapassa esse período, não ocorre pagamento pelo SUS do valor referente a esses dias excedentes, o que gera um déficit orçamentário.

Em relação à obstetrícia, a média de permanência das 10 primeiras causas mais frequentes de internação via PS, por CID, segue a distribuição da Tabela 23.

Tabela 23 – Principais CIDs de internação obstétrica de pacientes internadas com solicitação realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

CID Descrição	N	Idade Média	Média de permanência
O800 Parto espontâneo cefálico	258	26,1	3,1
O13 Hipertensão gestacional (Induzida pela gravidez) sem proteinúria significativa	233	26,4	3,8
O623 Trabalho de parto precipitado	162	25,2	3,7
O429 Ruptura prematura de membranas, não especificada	140	25,9	4,3
Z302 Esterilização	133	33,0	3,6
O820 Parto por cesariana eletiva	103	25,8	2,8
O420 Ruptura prematura de membranas, com início do trabalho de parto dentro de 24 horas	86	26,8	3,2
O809 Parto único espontâneo, não especificado	75	24,3	3,0
O360 Assistência prestada à mãe por isoimunização Rh	65	28,5	0,2
O410 Oligohidrâmnio	56	27,2	4,1

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018

A forma de cobrança da permanência a maior ocorre da seguinte forma:

PM = DI – (Pmx2) – DIUTI

PM: Permanência a maior

Pm: Permanência média previamente estabelecida.

DIUTI: Diárias de UTI.

O SUS paga pela permanência a maior R$16,19 pelo serviço hospitalar e R$3,87 pelo serviço profissional. Assim, caso o PM seja de 10 dias, o hospital receberá no total R$200,06, enquanto o custo do paciente pode variar de R$164,72 a R$ 324,68/dia, a depender da instituição e da especialidade (SOUZA E SCATENA, 2014).

Aplicando-se à realidade do estudo, 298 internações vindas do PS tiveram CIDs relacionados diretamente às síndromes hipertensivas, com média de permanência de 6,4 dias, sendo que a média de permanência estabelecida para tratamento de edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez parto e puerpério é 3 dias (SIGTAP, 2018), com valor total hospitalar de R$123,99/dia. Desta maneira, uma média de dias de internação discretamente maior que a permanência máxima, gera aproximadamente 120 dias não custeados integralmente

pelo SUS. O hospital receberia R$14.878,80 por tais dias, entretanto, receberá R$2472,00 (SIGTAP, 2018).

Clareando:

PM = DI – (Pmx2) – DIUTI

PM=6,4 – (3x2) – 0

PM=0,4 dias (de cada internação)

298 internações x 0,4 dias = 119,2 dias.

119,2 dias x R$123,99 = R$14.878,00 (Valor que se receberia)

119,2 dias x 20,06 = R$2.472,00 (Valor pago por permanência a maior)

Déficit = R$14.878,00 - R$2.472,00 = R$12.406,00

Para os tratamentos de complicações relacionados predominantemente ao puerpério, a média de permanência previamente estabelecida é 5 dias, sendo que a do HMI, relacionadas às pacientes vindas do PS, é de 8,7 dias.

Os CIDs de internação relacionados à infecção do trato urinário somam 59 pacientes, com média de permanência de 5,2 dias, ou seja, mais de 306 dias de internação preveníveis por ações da atenção primária à saúde, assim como mais de 100 dias de internação relativos à sífilis na gestação. Somente essas duas condições geram mais de 400 dias de internação, com prejuízos sociais e econômicos. Isso é uma amostra de que deixar de prevenir ou tratar uma condição por razões sociais e políticas, e não pessoais, configura-se como afronta ao bem estar geral e à justiça social (SEN E KLIKSBERG, 2010).

Para ilustrar e ampliar a discussão, exemplifica-se, na Tabela 24, alguns procedimentos relacionados à ginecologia e obstetrícia e sua média de permanência previamente estabelecida pelo SUS.

Tabela 24 – Média de permanência e valores, segundo procedimento ginecológico e obstétrico, DATASUS, 2018.

PROCEDIMENTO	MÉDIA DE PERMANÊNCIA (DIAS)	SERVIÇO HOSPITALAR (R$)	SERVIÇO PROFISSIONAL (R$)
Cesárea em gestação de alto risco	3	660,79	230,15
Cesárea + Laqueadura	2	395,68	150,05
Curetagem pós aborto	1	109,21	70,41
Cirurgia de gravidez ectópica	3	330,48	128,70
Histerectomia total	3	412,33	221,71
Laqueadura	1	200,05	138,97
Miomectomia	2	343,97	184,97
Histerectomia vaginal	3	276,67	183,41
Curetagem de Mola Hidatiforme	2	66,50	70,88

Cerclagem de colo do útero	2	97,31	80,70
Colpoperineoplastia anterior e posterior	2	298,12	174,31
Ooforectomia/Ooforoplastia	2	358,00	151,86
Mastectomia simples	2	299,98	162,82
Drenagem de abcesso de mama	2	122,58	48,93
Mastectomia + Linfadenectomia	3	504,54	278,97
Quadrantectomia	1	185,31	128,13
Descolamento manual de placenta	2	84,48	73,33
Sutura de laceração do trajeto pélvico	2	88,76	56,28

Fonte: SIGTAP, 2018.

As pacientes internadas com diagnóstico de incompetência ístmico cervical têm uma média de permanência de 9,8 dias. Portanto, caso o motivo da internação seja para cerclagem de colo de útero, este reflete uma média bem maior que o recomendado, que são de 2 dias (Tabela 24) e caso seja devido a complicações da não realização oportuna do procedimento, reflete má assistência pré-natal.

Foram atendidas no pronto socorro, tanto no setor de ginecologia quanto no de obstetrícia, 576 (5%) casos de aborto de algum tipo, sendo apenas 9 classificados como complicados por infecção do trato genital ou órgãos pélvicos. De todas as internações provenientes do PS, 183 (8%) foram por aborto de algum tipo, com média de permanência de 1,4 dias. Todavia, semelhantemente, apenas 2 com classificação de infecção. A maioria dos casos de aborto são internados para realização de curetagem uterina, sendo assim, a média de permanência está 0,4 dias acima do esperado.

Existe uma subnotificação dos casos de aborto no país, pois muitas mulheres não requerem assistência e, uma subnotificação, ainda mais acentuada, dos abortos realizados em condições não seguras. É uma ocorrência ligada a hemorragias, dor, infecção, anemia, dificuldade posterior de engravidar, dentre outras coisas e, assim, merece atenção. A mulher que busca auxílio, muitas vezes sofre represália e é considera como criminosa por parte da sociedade, impedindo que a assistência seja adequada. É incongruente objetivar-se redução da mortalidade materna, sem atenção aos cuidados médicos ao aborto no geral e, mais especificamente, com o clandestino (FUSCO, ANDREONI E SILVA, 2008; DIAS et al, 2010). Além disso, o perfil das mulheres que abortam voluntariamente é de jovens (20-29 anos), pobres, em união estável, usuárias de métodos contraceptivos, que já possuem filhos, trabalhadoras, com até oito anos de estudo, as quais abortam com misoprostol. Isso reforça a necessidade de olhar para os determinantes sociais

de saúde, pois é uma ocorrência maior dentre a população desfavorecida socialmente (DIAS et al, 2010) . Pelos objetivos do milênio, deve-se assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, sendo necessário, inclusive para prevenção deste desfecho tão danoso física e emocionalmente (ONU, 2015). E cabe ao PS, prestar atendimento digno, humanizado e de qualidade a essas pacientes, sem emissão de juízo de valor pelos profissionais, com internação quando necessário ou contrarreferência apropriada para seguimento pela APS.

A média de permanência pré-estabelecida para cesárea conforme a Tabela 24 é de 3 dias, sendo que para as internações provenientes do PS por cesárea eletiva foi de 2,8 (Tabela 23), portanto, compatível com os procedimentos do SUS.

Houve 103 casos com CID especificamente registrado de cesárea eletiva, entretanto, sabe-se que a ocorrência é maior que o registrado, já que muitas vezes registra-se o CID de alguma patologia que a mulher venha a ter e não do procedimento em si. O percentual de parto cesárea no Brasil está em ascensão e em 2014 teve porcentagem de 57% pelo Sinasc, sendo que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam taxas maiores que 60%, excedendo em muito o recomendado pela OMS, que é de 10 a 15% de todos os partos (BRASIL, 2017c). As taxas são ainda mais discrepantes ao se comparar o serviço público e privado, onde se vê 40% x 85% de partos por cesárea, respectivamente. Importante mencionar que a cesariana desnecessária contribui para a prematuridade tardia iatrogênica, com consequências para os recém-nascidos e que, taxas populacionais de cesariana maiores que 10% não contribuem para redução da mortalidade materna, perinatal ou neonatal. A opção por essa via de parto é complexa e multifatorial, incluindo características sócio demográficas da paciente e sua família, atenção pré-natal e modelo de atenção obstétrica, bem como recursos disponíveis para adequada assistência ao parto no momento da concepção (BRASIL, 2016d). O parto normal requer mais horas do profissional que está prestando assistência e mais leitos disponíveis para sua execução, sendo assim, não é suficiente a instauração de uma política de parto humanizado, com priorização do parto normal, quando pertinente, se as condições de infraestrutura e recursos humanos não são compatíveis.

Em relação à ginecologia, os CIDs que se relacionam de alguma forma com sangramento genital, excetuando-se aborto, apresentam apenas 41 pacientes, com uma média de permanência de 3,4 dias, mesmo sendo a maior causa de busca de atendimento no pronto socorro de ginecologia (20%), conforme a Tabela 14. Apesar das neoplasias representarem apenas 36 atendimentos, 8 geraram internação (22%), com média de permanência de 7,4 dias.

Tabela 25 - Distribuição dos encaminhamentos ao final da internação dos casos provenientes do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Setor	Encaminhamento ao final da internação	Total de internações
URG/EMERGÊNCIA GINECOLOGIA	REVELIA	3
	ÓBITO SEM NECROPSIA	1
	ÓBITO COM NECROPSIA	1
	ALTA A PEDIDO	1
	ALTA	174
	Subtotal do setor	**180**
URG/EMERGÊNCIA OBSTETRÍCIA	REVELIA	21
	ÓBITO SEM NECROPSIA	1
	ÓBITO COM NECROPSIA	2
	INTERNAÇÃO UNIMAR	1
	ALTA A PEDIDO	2
	ALTA	1.839
	Subtotal do setor	**1.866**
	Total internados via PS	**2.046**

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

Segundo a Tabela 26, das 2046 pacientes internadas via PS, apenas 19, ou seja, 0,9% necessitaram de internação em leito de UTI, com média de 7,49 dias de internação em UTI e 23,17 dias de internação total. Apresentaram idade média de 32 anos. Dos 5 óbitos que ocorrem no período estudado, apenas 1 não teve passagem na UTI.

Tabela 26 – Caracterização dos casos provenientes do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil internados em UTI, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.

Dias internados	Dias UTI	CID Principal	Idade	Encaminhamento
12,38	4,78	Infecção não especificada do trato urinário na gravidez	20	ALTA

9,66	6,22	Outras formas de obstrução intestinal, e as não especificadas	53	ALTA
5,88	1,94	Transtornos mentais e doenças do sistema nervoso complicando a gravidez, o parto e o puerpério	21	ALTA
10,29	7,59	Septicemia não especificada	27	ÓBITO
19,74	1,38	Perfuração do intestino (não-traumática)	23	ALTA
7,73	2,80	Doenças do aparelho respiratório complicando a gravidez, o parto e o puerpério	24	ALTA
18,90	6,67	Hipertensão Gestacional induzida pela gravidez sem proteinúria significativa	29	ALTA
118,10	53,8	Septicemia não especificada	31	ÓBITO
27,70	8,98	Aderências intestinais (bridas) com obstrução	40	ALTA
22,18	5,51	Parto espontâneo cefálico	41	ALTA
3,41	2,60	Doenças do aparelho respiratório complicando a gravidez, o parto e o puerpério	19	ÓBITO
41,77	9,66	Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em outra parte	30	ALTA
41,77	4,91	Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em outra parte	30	ALTA
21,12	4,73	Neoplasia maligna do ovário	65	ALTA
38,64	2,92	Ruptura prematura de membranas, não especificada	32	ALTA
4,38	3,15	Neoplasia maligna do ovário	60	ÓBITO
13,90	5,43	Infecção não especificada do trato urinário na gravidez	17	ALTA
10,91	2,96	Infecção não especificada do trato urinário na gravidez	20	ALTA
11,78	6,25	Outras hidronefroses e as não especificadas	30	ALTA

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018.

A faixa de variação recomendada para o tempo médio de permanência em UTI para obstetrícia é de 2,87 a 4,59 dias, conforme representado pela Tabela 27.

Identifica-se que os casos provenientes do PS, em sua maioria, não possuem gravidade extrema, necessitando poucas vezes de suporte intensivo. Entretanto, quando esta necessidade ocorre, existe um problema de logística de transporte e vaga, pois a UTI localiza-se no Hospital das Clínicas I (HCI), oferecendo certo transtorno para se conseguir leito vago, momento em que a paciente, muitas vezes é transferida para a sala de emergência, até possibilidade de cuidado oportuno pela UTI.

Tabela 27. Faixa de variação recomendada para o tempo média de permanência em UTI, por tipo de leito geral e tipo de UTI.

Tipo de leito geral	Tipo de UTI	Faixa de variação do TMP em UTI (dias)	
		Limite inferior	Limite superior
Neonatologia	UTI Neonatal	8,8	11,9
Pediatria clínica	UTI Pediátrica	7,78	14,1
Pediatria cirúrgica	UTI Pediátrica	5,97	8,36
Obstetrícia	UTI Adulto	2,87	4,59
Clínica 15 a 59 anos	UTI Adulto	6,79	9,08
Clínica 60 anos e mais	UTI Adulto	7,39	9,52
Cirúrgica 15 a 59 anos	UTI Adulto	4,48	5,92
Cirúrgica 60 anos ou mais	UTI Adulto	4,64	6,24

Fonte: BRASIL, 2015.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fluxo de atendimento de urgência e emergência em saúde da mulher entre os municípios do DRS IX é pouco especificado, com ausência de critérios claros do que é de responsabilidade de cada ponto de referência, sendo que em alguns momentos o PS do HMI assume responsabilidade de pacientes que teriam como referência o Hospital de Assis ou mesmo o serviço de atenção primária do município de origem da usuária.

O fluxo de atendimento na RUE do município é estabelecido parcialmente no tocante à saúde da mulher, com discriminação genérica, por meio de protocolos, do que deve ser atendido em cada ponto de atenção.

Pontua-se a dificuldade de acesso aos documentos oficiais, os quais não estão disponíveis de forma a permitir análise pela população e exercício do controle social, nem mesmo o Plano Municipal de Saúde.

O município tem uma ampla cobertura de atenção primária, com 13 UBSs e 35 USFs, porém mesmo assim, o PS recebe demanda considerável de baixa complexidade e, incompatíveis com urgência e emergência, sendo assim, com potencial de resolução no nível primário, porém não exerce a contrarreferência, sendo também responsável pelo mau uso do sistema de atenção à saúde por parte dos usuárias.

Os principais encaminhadores de usuárias para o PS são os Pronto Atendimentos, o que pode representar uma ineficiência da atenção, com duplicidade de emprego de gastos e esforços, sendo necessário estudos mais aprofundados dos encaminhamentos para conclusão mais fidedigna.

A maioria das usuárias procura o serviço por demanda espontânea, estão na faixa etária dos 20 a 24 anos, são casadas, possuem ensino médio, são do lar e procedentes de Marília.

Existe uma alta proporção de atendimentos de gestantes adolescentes com baixa escolaridade, com profissões de baixo nível de qualificação, evidenciando necessidade de amadurecimento do papel de agente da mulher, rumo ao desenvolvimento como liberdade.

Nota-se fragilidade na classificação de risco, com ausência de acolhimento e classificação de um número elevado de pacientes, bem como

ausência de critérios específicos para o acolhimento e classificação de mulheres e gestantes, com tempos médios de atendimentos divergentes ao preconizado pelo Ministério de Saúde. Nota-se uma supervalorização na classificação de risco em relação às gestantes, com proporção mais acentuada de fichas vermelhas e amarelas em comparação com a ginecologia.

Observa-se um número expressivo de preenchimento de CIDs inespecíficos, com prejuízo da análise mais aprofundada dos diagnósticos das pacientes atendidas, podendo refletir a incompreensão médica da importância do registro correto para análise epidemiológica e de gestão. Nota-se registro de poucos casos de violência contra mulher, o que pode revelar a subnotificação histórica ou mesmo a baixa procura por atendimento médico nesses casos, bem como o padrão ainda patriarcal e androgênico da nossa sociedade.

As causas de atendimento refletem causas importantes de mortalidade feminina, tais como hemorragia, síndromes hipertensivas e abortos e devem, portanto, ser abordadas de forma integral nos diversos níveis de atenção.

É prudente estudo mais aprofundado sobre as condições sensíveis à atenção primária, pois vários casos foram registrados no PS, os quais podem servir de sentinela para evitar futura internação.

O pedido de exames complementares é frequente, com média de 3,5 exames laboratoriais por paciente e um pedido de ultrassom a cada três usuárias atendidas, entretanto a ausência de protocolos de atendimento não uniformiza os critérios e indicações para tal atitude, ocorrendo emprego exacerbado de recursos financeiros que poderiam ser melhores alocados. Isso também pode representar uma medicina defensiva, cada dia mais necessária frente à judicialização dos atendimentos.

Identificou-se o uso predominante de medicações sintomáticas simples como dipirona, podendo apontar mais uma vez para o atendimento de baixa complexidade realizado, falha na APS, bem como para a dificuldade do médico em contrarreferenciar o caso, sem ao menos dar uma medicação.

Importante seria a implantação de protocolos assistenciais para utilização no pronto socorro, em conformidade com a política de atenção hospitalar, com intuito de oferecer a conduta com melhor evidência científica, internações apropriadas, solicitações de exames necessárias e medicação oportuna.

Pequena parcela dos casos atendidos no PS possui gravidade ou critérios apropriados para internação, porém mesmo assim, parcela considerável é distribuída em locais que não as enfermarias de ginecologia e obstetrícia, traduzindo a lotação rotineira do serviço, muitas vezes acentuada pelos atendimentos não cabíveis a esse tipo de nível de atenção. Poucos casos possuem indicação de leito de UTI, porém é necessário estudo para verificação se são evitáveis.

Em relação às internações de casos provenientes do PS, verifica-se uma média de permanência maior que o normalmente necessário, sendo prudente estudo posterior sobre as causas dessa ocorrência e apontamento para melhor forma de gestão de recursos financeiros e humanos.

Assim, por meio deste estudo, foi possível evidenciar as inúmeras correlações e intersecções do serviço de urgência e emergência com as políticas públicas e impossibilidade de se fazer tais políticas sem considerar a dimensão macro em que elas serão aplicadas.

Nota-se, por exemplo, que uma política pública fragilizada em relação à prevenção de gravidez na adolescência, reflete diretamente nas características das usuárias atendidas no setor de urgência e emergência. Uma política educacional falha, da mesma forma, interfere neste perfil, bem como no padrão de adoecimento das mulheres e assim por diante.

Vê-se na dissertação como um todo que o que falta não são políticas públicas apropriadas, mas sim condições de aplicabilidade das mesmas, com monitoramento oportuno e implementação de planos de ação corretivos.

REFERÊNCIAS

AKERMAN, Marco. Saúde e desenvolvimento local: princípios, conceitos, práticas e cooperação técnica. São Paulo: Hucitec, 2005. 151 p.

ALMEIDA, Ana Mattos de Brito . Primeira infância e gravidez na adolescência. Fortaleza: [s.n.], 2013. 33 p. Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf>. Acesso em: 21 maio 2018.

BARBOSA, Fabiano Timbó et al . Usos do sulfato de magnésio em obstetrícia e em anestesia. Rev. Bras. Anestesiol., Campinas , v. 60, n. 1, p. 104-110, Fev. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942010000100013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 Fevereiro 2018.

BARCELLOS, Christovam et al . Georreferenciamento de dados de saúde na escala submunicipal: algumas experiências no Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 17, n. 1, p. 59-70, mar. 2008 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742008000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 22 maio 2018.

BITTAR, Cléria Maria Lobo, CESARIO, Raquel Rangel, LIMA, Lara Carvalho Vilela de. Grupos vulneráveis: gênero, corpo e sexualidade. In: FIGUEIREDO, Glória Lúcia Alves., MARTINS, Carlos Henrique Gomes (Org.). Políticas, tecnologias e práticas em promoção de saúde. Franca: Unifran; São Paulo: Hucitec, 2016. cap. 6. p 132-51.

BITTAR, Roberto Eduardo; ZUGAIB, Marcelo. Tratamento do trabalho de parto prematuro. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro , v. 31, n. 8, p. 415-422, Ago. 2009 . Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032009000800008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 meio 2018.

BOOKER, Matthew J, SHAW, Ali R., PURDY, Sarah. Why do patients with ‘primary care sensitive’ problems access ambulance services? A systematic mapping review of the literature. BMJ Open. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência integral à saúde da mulher: bases da ação programática. Brasília: Ministério da Saúde, 1984. 26p.

_____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

_____. Lei no. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde; a organização e o funcionamento dos serviços correspondente e da outras providencias. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, p.18055, 20 de set. 1990.

_____. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Brasília: DF, 2002.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Pacto de gestão: garantindo saúde para todos. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2005. 84 p.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual dos comitês de mortalidade materna. 3.ed. Brasília :DF: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 104 p.

_____.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília : Ministério da Saúde, 2010a.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria 436, de 10 de setembro de 2010. Atualiza a composição e descrição dos atributos classificando-os em gerais e complementares da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Proteses e Materiais Especiais do SUS, que caracterizam os procedimentos, na forma de Anexos I e II. Brasília: DF, 10 de setembro de 2010b.

_____. Decreto nº 7508, de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 29 de jun. 2011a.

_____. Ministério da Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2011b.

_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Brasília: DF, 2011c.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes

da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica. 3. ed. atual. Brasília:DF : Ministério da Saúde, 2012. 124p.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS).Brasília: DF: Editora do Ministério da Saúde, 2013a.

_____. Portaria 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Brasília: DF, 2013b.

_____. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2013c.

_____.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Brasília : Ministério da Saúde, 2014a.

_____.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação em Saúde. Saúde Brasil 2013 : uma análise da situação de saúde e das doenças transmissíveis relacionadas à pobreza. Brasília: DF: Editora do Ministério da Saúde, 2014b. 384p.

_____.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Critérios e Parâmetros para o Planejamento e Programação de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília:DF: Ministério da Saúde, 2015.

_____.Constituição (1988). Emenda constitucional nº93, de 8 de setembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Brasília: DF, 8 de set. 2016a.

_____.Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília: Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, 2016b.

_____. Secretaria de Políticas para as mulheres. Programa 2016 – Política para as mulheres: promoção da autonomia e enfrentamento à violência. 2016c.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Portaria 306, de 28 de março de 2016. Aprova as Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana. Brasília: DF, 28 de março de 2016d.

_____. Portaria 2.436, 21 de setembro de 2017. Estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: DF, 2017a.

_____. Conselho Nacional de Saúde. Documento orientador da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, 2017b.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2015/2016 : uma análise da situação de saúde e da epidemia pelo vírus Zika e por outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti [recurso eletrônico]. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2017c. 386p.

BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis, Rio de Janeiro , v. 17, n. 1, p. 77-93, Apr. 2007 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Maio 2018.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Pec 241/2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesweb/fichadetramitacao?idproposicao=2088351>. Acesso em: 27 fev. 2018.

CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para análise das relações sociais. Serviço Social em Revista, Londrina, v.3, n.2, p 1-7, jan./jun.2001.

CARVALHO, Mônica Santiago O.A. A Importância do Preenchimento Adequado do Prontuário Médico – Aspectos Éticos e Legais. Instituto Paulista de Estudo Bioéticos e Jurídicos. [20-].

CASSETTARI, Sônia da Silva Reis; DE MELLO, Ana Lúcia Schaefer Ferreira . Demanda e tipo de atendimento realizado em unidades de pronto atendimento no município de Florianópolis, Brasil. Texto contexto - Enferm., Florianópolis, v. 26, n. 1, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072017000100308&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Mar. 2018. Epub Mar 27, 2017.

CASTRO, Lúcia Maria Xavier de; SIMONETTI, Maria Cecília Moraes; ARAÚJO, Maria José de Oliveira. Monitoramento e acompanhamento da política nacional de atenção integral à saúde da mulher e do plano nacional de políticas para as mulheres. Brasília; s.n; nov. 2015. 46 p.

CESAR, Juraci A. et al . Assistência pré-natal nos serviços públicos e privados de saúde: estudo transversal de base populacional em Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 28, n. 11, p. 2106-2114, Nov. 2012 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2012001100010&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 22 May 2018

CHEE, Yen-Lin; GREAVES, Michael. Role of coagulation testing in predicting bleeding risk. The Hematology Journal. 2003. p 373-78.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 1ª, 1986. Otawa. Carta de Otawa. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acesso em: 21 jun. 2017.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 8ª, 2013. Helsinque. Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 4., 1995, Pequim. Anais... [S.l.]: ONU, [1995].

CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, 4ª, 2016. Brasília. Regulamento Interno.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1451, de 10 de março de 1995.

_____. Resolução nº 1638, de 09 de agosto de 2002.

_____. Resolução nº1958, de 15 de dezembro de 2010.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS. Parecer consulta nº4007/2010. 2010.

DAMACENA, Andressa Trecenti. Associação entre ácido úrico materno com resultados maternos e perinatais na pré eclampsia. 2016, 50 f. (Dissertação em ginecologia, obstetrícia e mastologia). Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2016.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATASUS). Informações de saúde (Tabnet). 2012.

_____. Informações de Saúde (Tabnet). 2015.

_____. Informações de Saúde. Tipo de estabelecimento. [20-]. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.htm. Acesso em 28 maio 2018.

_____. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP). 2018. Disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. Acesso em 28 maio 2018.

DIAS, Ana Paula Azevedo et al. Aborto infectado: epidemiologia, diagnóstico e conduta na urgência: [revisão]. Rev. Med. Minas Gerais, abr-jun, 2010.

FARIA, Denise Jesuína, FOGARI, Maria Luiza Costa. Questão de gênero no mundo do trabalho: elo de atuação do assistente social. In: PIMENTEL, Rosalina Chedian. (Org.). Estado, economia, trabalho e sociedade: o mosaico de uma nação. Franca: Unifran, 2010. art 6. p 157-90.

FEIJÓ, Vivian Biazon El Reda. Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco: análise da demanda atendida no pronto socorro de um hospital escola. 2010. [MESTRADO] Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010. Disponível em: < http://www.uel.br/pos/saudecoletiva/Mestrado/diss/113.pdf>. Acesso em Março de 2017.

FELICIANO, Cinara Silva. Curso Básico de Antimicrobianos - Cefalosporinas. 2016. Disponível em: file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/5.%20Cefalosporinas.pdf. Acesso em: 06 Mar 2018.

FERNANDES, Eduardo de Oliveira et al. Avaliação pré operatória e cuidados em cirurgia eletiva: recomendações baseadas em evidências. Prática Médica. 2010.

FLENADY, Vicki et al. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour and birth. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014.

FUSCO, Carmen L. B.; ANDREONI, Solange; SILVA, Rebeca de Souza e. Epidemiologia do aborto inseguro em uma população em situação de pobreza Favela Inajar de Souza, São Paulo. Rev. bras. epidemiol., São Paulo , v. 11, n. 1, p. 78-88, Mar. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2008000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 Mar. 2018.

GADELHA, Carlos Augusto Graboios et al . Saúde e territorialização na perspectiva do desenvolvimento. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 16, n. 6, p. 3003-3016, Junho 2011 .

GARCIA, Leila Posenato et al. Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil. Ipea; 2013

GIGLIO-JACQUEMOT, Armelle. Urgência e emergência em saúde: perspectiva de profissionais e usuários. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 192 p.

GIOVANELLA, Ligia et al .Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2a Ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2013. 1100 pp.

GRAHAM, Wendy et al. Diversity and divergence: the dynamics burden of poor maternal health. The Lancet, vol388, 15 set. 2016.

HAIDAR, Fátima Hussein; OLIVEIRA, Urânia Fernandes; NASCIMENTO, Luiz Fernando Costa. Escolaridade materna: correlação com os indicadores obstétricos. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 17, n. 4, p. 1025-1029, Aug. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2001000400037&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Mar. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/>. Acesso em: 07 mar. 2018.

_____. Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016a.

_____.Síntese de indicadores sociais : uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2016b.

TOWNSEND, Courtney M. et al. Tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 19 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1010 p.

LEITE, Ana Cristina da Nóbrega Marinho Torres; PAES, Neir Antunes. Direitos femininos no Brasil: um enfoque na saúde materna. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 16, n. 3, p. 705-714, Set. 2009 .

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12 ed., São Paulo: Saraiva, 2008.

LUCCHESE, Patrícia T. R. (coord.). Políticas Públicas em Saúde Pública. São Paulo: IBIREME/OPAS/OMS, 2002.

MAIA, Joviane Marcondelli Dias et al. Mãe, pai e casal na adolescência: e agora? Orientações para profissionais da saúde. São Carlos: Pedro & João Editores, 2011. 88p.

MANZZONI, Cleber José et al. Protocolo da unidade de urgência materno infantil. [S.L.: s.n.], 2015.

MATHIAS, Ligia Andrade da Silva Telles et al . Exames complementares pré-operatórios: análise crítica. Rev. Bras. Anestesiol., Campinas , v. 56, n. 6, p. 658-668, Dec. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942006000600011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Mar. 2018.

MOURA, Bárbara Laisa Alves et al . Internações por complicações obstétricas na gestação e desfechos maternos e perinatais, em uma coorte de gestantes no Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 34, n. 1, e00188016, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2018000105012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Mar. 2018.

MOURÃO, Alice Diniz; NEVES, Jorge Tadeu de Ramos. Impactos da implantação do prontuário eletrônico do paciente sobre o trabalho dos profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Faculdade Cenecista de Varginha – FACECA, 2007; [citado 15 jun. 2010]. Disponível em: http://www.economia.aedb.br/seget/artigos07/56_SEGET.pdf.

NAGAHAMA, Elisabeth Erico Ishida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização médica do parto no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 10, n. 3, p. 651-657, Set. 2005 .

NEDEL, F. B. et al . Características da atenção básica associadas ao risco de internar por condições sensíveis à atenção primária: revisão sistemática da literatura. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 19, n. 1, p. 61-75, mar. 2010. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742010000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 07 mar. 2018.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR. Glossário de Conceitos. São Paulo, fev. 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de desenvolvimento sustentável globais. Nova York. set. 2015.

PACHECO, Marcos Antônio Barbosa (Org.).Redes de atenção à saúde: rede de urgência e emergência – RUE. São Luís: UNA-SUS/UFMA, 2015.

PAIM, J. S. O que é SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 149p.

PAIM, Jairnilson Silva et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. The Lancet. Série Saúde no Brasil. 2011.

PIERANTONI, Celia Regina et al . Rotatividade da força de trabalho médica no Brasil. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 39, n. 106, p. 637-647, Sept. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042015000300637&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24 Fev. 2018.

PINHEIRO, Maurício Mota Saboya . As liberdades humanas como bases do desenvolvimento: uma análise conceitual da abordagem das capacidades humanas de Amartya Sen. Rio de Janeiro: IPEA, 2012. 56 p.

PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE. Competência das UPAs. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa/contato/744-acoes-e-programas/upa-24h-unidade-de-pronto-atendimento/40325-competencia-das-upas>. Acesso em: 27 fev. 2018.

REIS, Ademar Arthur Chioro dos et al. Tudo a temer: financiamento, relação público e privado e o futuro do SUS. Saúde Debate, Rio de janeiro, v. 40, p. 122-135, dez. 2016.

RIBEIRO, Carlos Dimas. Justiça social e equidade em saúde: uma abordagem centrada nos funcionamentos. Saude soc., São Paulo , v. 24, n. 4, p. 1109-1118, Dec. 2015 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902015000401109&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 Fev. 2018.

SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. Programa 2016 – Politica para as mulheres: promoção da autonomia e enfrentamento da violência. Brasília. 2016.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Trad. Bernardo Ajzemberg, Carlos Eduardo Lins da Silva. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SIBAI, Bahaeddine M. The HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets): much ado about nothing? Am J ObstetGynecol. 1990;162(2):311-6.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23 ed., São Paulo: Malheiros, 2010.

SILVA, Vanessa Yuiri Nakaoka Elias da. et al. Sulfatação na eclampsia: Revisão de literatura, Rev. Uningá Review, v.16, n.1, 2178-2571, Out – Dez 2013.

SILVA, Bruna Gonçalves Cordeiro da et al . Mortalidade materna no Brasil no período de 2001 a 2012: tendência temporal e diferenças regionais. Rev. bras. epidemiol, São Paulo , v. 19, n. 3, p. 484-493, Set. 2016.

SOUZA, João Paulo. et al. Obstetric Transition: the pathway toward sending preventable maternal deaths. International Journal Obstetrics and Gynaecology, mar. 2014.

SOUZA, Paulo Cesar, SCATENA, João Henrique. Apuração do custo da diária de internação hospitalar: Um estudo de caso. Revista de administração hospitalar e inovação em saúde. P. 123-135, 2014.

SUCHMAN, Anthony L., MUSHLIN, Al L. How well does the activated partial thromboplastin time predict post operative hemorrhage? JAMA. P.750-753, 1986.

TASK FORCE ON HYPERTENSION IN PREGNANCY. Hypertension in pregnancy. Washington, 2013.

VASCONCELOS, Maria José Esteves de. Pensamento sistêmico: O novo paradigma da ciência. 10 ed. Campinas: Papirus, 2013.

VERMELHO, Letícia Legay; Leal, Antônio José Costa.; Kale, Paulina Lorena. Indicadores de Saúde. In: Medronho RA (Org). Epidemiologia. 1a.ed. São Paulo: Atheneu, 2005, pags. 33 a 55.

VICTORA, Cesar. G. et al. Saúde de mães e crianças no Brasil: Progressos e desafios. The Lancet. Série Saúde no Brasil, maio 2011.

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Implicações de decisões e discussões recentes para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. 109, p. 187-199, June 2016.

WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. Rio de Janeiro. 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, UNICEF, UNFPA and THE WORLD BANK. Trends in maternal mortality: 1990 to 2010. Geneva, 2012.