

Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

WILSON CUNHA JÚNIOR

**IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: um estudo em Franca-SP**

FRANCA
2019

WILSON CUNHA JÚNIOR

**IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: um estudo em Franca-SP**

Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-graduação *Stricto Senso* em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para obtenção de título de Mestre em Desenvolvimento Regional.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional.

**FRANCA
2019**

C98i Cunha Júnior, Wilson
Impactos sociais e econômicos da hipertensão arterial sistêmica: um estudo em Franca-SP. Wilson Cunha Júnior. – Franca: Uni-Facef, 2019.
83p. ; il.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires
Dissertação de Mestrado – Uni-Facef
Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento social. 2.Qualidade de vida. 3.Controle hipertensão arterial sistêmica. 4.Desenvolvimento econômico.
I.T.

CDD 614

WILSON CUNHA JÚNIOR

**IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: um estudo em Franca-SP**

Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-graduação *Stricto Senso* em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para obtenção de título de Mestre em Desenvolvimento Regional.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional.

FRANCA, 17 de Abril 2019.

Orientador: _____
Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires
Instituição: Uni-Facef – Centro Universitário Municipal de Franca

Examinador: _____
Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto
Instituição: Uni-Facef – Centro Universitário Municipal de Franca

Examinador: _____
Prof. Dr. Rodrigo Tavares Silva
Instituição: UNIFRAN – Universidade de Franca

Dando graças a Deus, pela oportunidade de realizar este trabalho, um sonho desde a graduação, dedico:

- a meus pais, que sempre me apoiaram;
- à minha amada esposa, Silvinha e;
- aos meus filhos amados, Gustavo, Guilherme e Gabriela.

AGRADECIMENTOS

Agradeço:

- em primeiro lugar, a Deus, que me proporciona oportunidades imensuráveis para crescimento e melhoria;
- à minha família, que sempre esteve ao meu lado e acreditou que eu conseguiria realizar este trabalho, mesmo nos momentos mais difíceis;
- a meu orientador, Professor Doutor Daniel Facciolo Pires, que, perseverantemente, me ajudou e me socorreu nos momentos de dúvida e insegurança;
- ao Uni-Facef e a seu quadro de professores e funcionários, pela excelência no Programa de Mestrado;
- aos meus colegas de curso e a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a concretização deste ideal;
- aos meus alunos, Isabela Baúti, Ana Cláudia Azarias e Bianca Fadul, que foram fundamentais na coleta de dados.

Não sei... se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas.

Cora Coralina

RESUMO

As doenças crônicas degenerativas estão associadas a uma diminuição da qualidade de vida e do desenvolvimento social e econômico. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome crônica caracterizada por elevações persistentes da pressão arterial (PA) associada a lesões de órgãos alvos, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Na cidade de Franca-SP, e região, são escassos os dados clínicos e epidemiológicos sobre a prevalência e o controle da HAS. Os custos com internação devido a HAS, AVC e IAM também são dados importantes para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Isto pode se tornar um potente alvo de intervenção interdisciplinar, podendo contribuir de modo inegável para reduzir o drástico impacto da HAS na morbimortalidade das doenças cardiovasculares, e no desenvolvimento social e econômico, em nossa região. Tendo em vista essas perspectivas, a absoluta falta de evidências sobre o diagnóstico e controle pressórico da população de Franca e região, foi realizado um levantamento retrospectivo de pacientes atendidos no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e em uma clínica particular da cidade de Franca, para descrever o comportamento da pressão arterial e a taxa de HAS pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2016; evidenciou-se que, entre os 1.823 pacientes, 39,4%, apesar de usarem regularmente medicação anti-hipertensiva, não estavam controlados. O levantamento no SIH-SUS sobre internações e custos devido a HAS, AVC e IAM, em Franca, mostrou um aumento progressivo no período de 2010 a 2018. Em Ribeirão Preto-SP, houve discreto aumento de internações e gastos devido a IAM, e, em relação a AVC, também um discreto aumento no número de pacientes internados e nos custos. Internações e custos devido a AVC tiveram um expressivo aumento neste período em Limeira-SP. Em relação a IAM, em Limeira ocorreu uma diminuição no número de internações e nos custos. Conclui-se que, realmente, existe uma necessidade de intervir no atendimento dos pacientes hipertensos para atuar na prevenção de complicações e diminuir os custos, e, dessa forma, contribuir para um melhor desenvolvimento social e econômico.

Palavras-chave: Desenvolvimento social. Controle da hipertensão arterial sistêmica. Desenvolvimento econômico.

ABSTRACT

Chronic degenerative diseases are associated with a decrease in quality of life and socio-economic development. Systemic arterial hypertension (SAH) is a chronic syndrome characterized by persistent elevations of blood pressure (BP) associated with damages in target organs, with a consequent increase in the risk of fatal and nonfatal cardiovascular events. In the city of Franca-SP and region, clinical and epidemiological data on the prevalence and control of SAH are slender. The hospitalization costs due to SAH, stroke and AMI are also important data for the economic development of a city. This may become a potent target for interdisciplinary intervention and may undoubtedly contribute to reduce the drastic impact of SAH on the morbidity and mortality of cardiovascular diseases and socio-economic development in our region. Taking these perspectives into account, the absolute lack of evidence on the diagnosis and blood pressure control of the population of Franca and region, a retrospective survey of patients attended at the Ambulatory Medical Specialties (AME) and at a private clinic in the city of Franca was conducted, to describe the behavior of blood pressure and the rate of hypertension by ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), from February 2011 to December 2016; it was evidenced that, among 1,823 patients (39.4%), despite the regular use of antihypertensive medication, were not controlled. The SIH-SUS survey on hospitalizations and costs due to SAH, stroke and AMI in Franca showed a progressive increase in the period of 2010 until 2018. In Ribeirão Preto, there was a slight increase in hospitalization and expenses due to AMI, and, in relation to stroke, also a slight increase in the number of hospitalized patients and costs. Hospitalizations and costs due to stroke had a significant increase during this period in Limeira-SP. In relation to AMI, in Limeira there was a decrease in hospitalizations and costs. It is concluded that, in fact, there is a need to intervene in the care of hypertensive patients to prevent complications and to reduce costs, and, thus, contribute to a better socio-economic development.

Keywords: Social development. Systemic arterial hypertension control. Economic development.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIH - Autorização de Internação Hospitalar
AME - Ambulatório Médico de Especialidades
AVC - Acidente Vascular Cerebral
AVCH - Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
AVCI - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico
AVE - Acidente Vascular Encefálico
CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde
DCNT- Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DCV - Doenças Cardiovasculares
DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável
DM - Diabete Mellitus
FA - Fibrilação Atrial
HA - Hipertensão Arterial
HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica
HBDF - Hospital de Base do Distrito Federal
HIPERDI - Sistema de Cadastramento de Hipertensos e Diabéticos
HRC - Hospital Regional de Ceilândia
HTN - Hipertensão
IAM - Infarto Agudo do Miocárdio
IM - Infarto do Miocárdio
IMC - Índice de Massa Corpórea
MAPA - Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial
MRPA - Monitorização Residencial da Pressão Arterial
MS - Ministério da Saúde
OMS - Organização Mundial de Saúde
PA - Pressão Arterial
SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
SUS - Sistema Único de Saúde
UBS - Unidade Básica de Saúde
USF - Unidade de Saúde da Família

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1: Medicamentos custo por mês.....	25
Tabela 2: Valores anormais de PA pela mapa (mmhg).....	46
Tabela 3: Resultados.....	50
Quadro 1: Dados analisados.....	47

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011 no município de Mafra.....	23
Gráfico 2: número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011 no estado de Santa Catarina.....	24
Gráfico 3: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca.....	51
Gráfico 4: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca.....	52
Gráfico 5: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC, no período 2010 a 2018 em Franca.....	53
Gráfico 6: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Franca.....	53
Gráfico 7: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca.....	54
Gráfico 8: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca.....	55
Gráfico 9: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca.....	55
Gráfico 10: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca.....	56
Gráfico 11: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	57
Gráfico 12: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	57
Gráfico 13: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a HAS no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	58
Gráfico 14: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	58
Gráfico 15: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	59
Gráfico 16: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	59

Gráfico 17: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	60
Gráfico 18: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	60
Gráfico 19: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto.....	61
Gráfico 20: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	62
Gráfico 21: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	62
Gráfico 22: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a HAS no período 2010 a 2018 em Limeira.....	63
Gráfico 23: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Limeira.....	63
Gráfico 24: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	64
Gráfico 25: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	64
Gráfico 26: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	65
Gráfico 27: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	65
Gráfico 28: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira.....	66
Gráfico 29: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	67
Gráfico 30: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	67
Gráfico 31: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	68
Gráfico 32: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	68
Gráfico 33: taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	69

Gráfico 34: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	70
Gráfico 35: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	70
Gráfico 36: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto.....	71
Gráfico 37: internações por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	74
Gráfico 38: custos por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	74
Gráfico 39: internações por AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	75
Gráfico 40: custos devido AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	76
Gráfico 41: internações por IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	77
Gráfico 42: custos devido a IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo.....	77

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 IMPACTOS ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO	22
3 IMPACTOS SOCIAIS DO NÃO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO	31
4 METODOLOGIA	45
4.1 PROBLEMA DA PESQUISA.....	45
4.2 OBJETIVO DA PESQUISA.....	45
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	45
4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	45
4.5 VARIÁVEIS DE ANÁLISE.....	47
4.5.1 Delimitações da pesquisa.....	47
4.5.2 Delineamento do estudo.....	48
5 RESULTADOS	49
5.1 PACIENTES AVALIADOS PELA MAPA.....	49
5.2 INTERNAÇÕES, ÓBITOS E CUSTOS COM HAS, AVC E IAM EM FRANCA....	50
5.3 COMPARAÇÃO COM OUTRAS CIDADES.....	56
5.3.1 Ribeirão Preto.....	56
5.3.2 Limeira.....	61
5.3.3 Comparação Franca, Ribeirão Preto, Limeira.....	66
6 DISCUSSÃO	72
7 CONCLUSÃO	79
REFERÊNCIAS	80

1 INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome multifatorial caracterizada por elevações persistentes da PA associada a lesões de órgãos alvo (cérebro, coração, rins e vasos sanguíneos) e alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. (VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2016).

A HAS é um grave problema de saúde pública, considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis na prevenção de eventos cardiovasculares. Aproximadamente 30% da população brasileira tem o diagnóstico de HAS, com taxas de controles variáveis, mas que de maneira geral não ultrapassam 19%. A elevada prevalência e o baixo controle pressórico têm reflexo direto no impacto provocado pela HAS na saúde pública. Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas a HAS, a maioria em países subdesenvolvidos e em indivíduos ativos economicamente; óbitos esses decorrentes, principalmente, de acidente vascular encefálico e doença isquêmica do coração. A HAS também interfere negativamente na qualidade de vida de seus portadores, e seu melhor controle é muito importante para melhoria na qualidade de vida e no desenvolvimento social (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2016).

Dados recentes do Ministério da Saúde (DATASUS, SIH-SUS, Ministério da Saúde, 2018) demonstram que o diagnóstico de HAS na população do estado de São Paulo tem crescido nas últimas décadas, acometendo 22,7% e 24,6% da população, respectivamente nos anos de 2006 e 2010.

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Não há uma causa única para estas doenças, mas vários fatores de risco que aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A HAS e o diabetes mellitus (DM) representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o agravamento deste cenário em nível nacional. A HAS afeta de 11 a 20% da população adulta com mais de 20 anos. Cerca de 85% dos pacientes com acidente vascular encefálico (AVE) e 40% das vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM) apresentam HAS associada. Esta doença leva, com frequência, à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves

repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. Quando diagnosticadas precocemente, estas doenças são bastante sensíveis, oferecendo múltiplas chances de evitar complicações; e também evitam a progressão das já existentes e as perdas delas resultantes. Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida, como também para evitar a hospitalização e os consequentes gastos, principalmente quando se considera o alto grau de sofisticação tecnológica da medicina moderna. Se é possível prevenir e evitar danos à saúde do cidadão, este é o caminho a ser seguido. Desta forma, o Ministério da Saúde (MS), em articulação com as sociedades científicas (Cardiologia, Diabetes, Hipertensão e Nefrologia), as federações nacionais dos portadores, as secretarias estaduais, através do CONASS, e as secretarias municipais de saúde, através do CONASEMS, apresenta o Plano de Reorganização da Atenção à HAS e à DM. O propósito do Plano é vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações de capacitação dos profissionais e de reorganização dos serviços. O MS elaborou um caderno que é um dos instrumentos da capacitação dos profissionais da atenção básica. Tem como base os protocolos, consensos e manuais elaborados pelas áreas técnicas do MS e pelas sociedades científicas, além de outros documentos e trabalhos, incluindo experiências bem sucedidas nos estados e municípios. O objetivo é montar uma verdadeira força tarefa com todos os atores, de forma a intervir no comportamento destas doenças na população.

Com o avanço da tecnologia, a expectativa de vida tem aumentado consideravelmente e levado à busca por uma melhor qualidade de vida. Devido ao aumento da longevidade, as doenças crônico-degenerativas também tiveram um aumento expressivo. A HAS está dentro desse grupo de doenças e é uma das com maior prevalência. O não controle da pressão arterial pode levar a um aumento de custos com os cuidados à saúde, impactando negativamente no desenvolvimento econômico, e conduzir a uma diminuição da qualidade de vida, e, conseqüentemente, a um impacto negativo no desenvolvimento social e local.

O ser humano vem evoluindo há milhares de anos, através de sua convivência com o meio ambiente. Inicialmente, o meio ambiente estipulava onde a sociedade humana deveria se alojar para poder sobreviver e buscar sua subsistência. Neste período, o meio impunha-se sobre a capacidade de busca de alimento e abrigo necessários para a perpetuação da população humana no planeta.

Com o transcorrer do tempo o homem foi capaz de entender e controlar certos fenômenos, como o domínio do fogo, que o ajudaram a consolidar formas de defesa, preparo do alimento, manutenção da temperatura e iluminação noturna. Outra grande conquista foi o desenvolvimento da agricultura, através da observação da germinação de sementes próximas às áreas de abrigo, onde eram descartados os restos de frutas e vegetais colhidos para consumo. Este foi um grande salto na cultura da humanidade, pois a partir do controle agrícola as populações humanas deixaram de ser nômades e se estabeleceram em determinadas áreas, passando também a dominar a criação de animais em cativeiro para sua subsistência (POUSA, 2014, p. 19).

Segundo Abiko (1995, p. 5), “é a partir dessa transição de modo de vida do homem, que há uma ‘viragem’ significativa e essencial no desenvolvimento social e econômico do homem, e na evolução do mesmo quanto a constituição de locais específicos para troca, surgindo assim, além das divisões sociais, as cidades.”

Com o início do processo de industrialização ocorrido na Europa, no século XVIII, houve uma intensa migração do homem do campo para a cidade. Esse fluxo migratório intenso levou a uma aglomeração de pessoas nas cidades e a um êxodo rural (RIOUX, 1975). Esse crescimento intenso da população urbana levou ao aparecimento de problemas sociais e de saúde pública, resultando em aumento de custos e piora da qualidade de vida.

No Brasil, o processo de industrialização iniciou tardiamente se comparado à Europa, com aproximadamente 150 anos de atraso (BRUM apud POUSA, 2014, p. 19). Devido ao crescimento da população nas cidades, ampliou-se a demanda interna, que proporcionou aumento da oferta de empregos. Isto levou a um maior volume da migração da população rural para as cidades, aumentando a taxa de urbanização (BRAGA FILHO, 2000). No entanto, devido à falta de investimentos em programas sociais, esse crescimento afetou diretamente o aumento dos custos para os setores públicos e privados, a qualidade de vida das pessoas, sobretudo daquelas de baixa renda, que dependiam desses recursos, principalmente em relação a saúde pública, moradia e segurança.

O resultado dessas mudanças foi o surgimento das favelas, aumento do desemprego, criminalidade, entre outros. Ampliaram-se, também, os problemas de saúde física e psicológica, causados nas pessoas que viviam numa rotina de vida acelerada, decorrente da velocidade da informação, advinda do avanço tecnológico

(RATTNER, 1979 apud POUSA, 2014, p. 20). Diante de tantas mudanças, a melhoria da qualidade de vida passou a ocupar importante atenção no debate acadêmico e na agenda dos governos.

Na literatura atual há um consenso de que qualidade de vida é uma área de conhecimento em processo de definição.

Segundo Mynaio et al. (2000, p. 10), qualidade de vida é o entendimento sobre satisfação na vida amorosa, familiar, social, ambiental e existencial. De acordo com Barbosa (1998, p. 20 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 13), não existem indicadores únicos sobre qualidade de vida, mas, sim, um conjunto que una as esferas objetivas (sociais) e subjetivas, a partir da percepção dos sujeitos.

Conforme Vilarta e Gonçalves (2012, p. 33 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 20), a esfera objetiva trata das condições materiais, como a posição do indivíduo na vida e as relações estabelecidas nessa sociedade; e as subjetivas, das condições físicas, emocionais e sociais relacionadas aos aspectos temporais, culturais e sociais como são percebidas pelo indivíduo.

De acordo com Teles (2014, p. 126-139), direito ao desenvolvimento é uma forma de proporcionar o acesso à dignidade do ser humano, a partir do trabalho, e destacar que o Estado deve agir junto com a sociedade, a fim de banir restrições de liberdade de atuação e acesso aos meios de produção. Para fomentar o desenvolvimento é necessária uma ação conjunta entre o Estado e o ser humano. Não há como conseguir desenvolvimento sem essa reciprocidade. Nas últimas décadas, a maior intervenção sobre o meio ambiente, reduzindo as doenças infectocontagiosas e aumentando as doenças crônico-degenerativas, bem como o avanço tecnológico na área da saúde, têm proporcionado uma maior expectativa de vida e um aumento das doenças crônico-degenerativas.

Conforme descrevem Martins et al. (1996, p. 6), doença crônica é toda alteração patológica, irreversível, permanente, que necessita de treinamento especial para reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados.

Acrescentam os autores, que as doenças crônicas degenerativas relacionam-se às condições de vida, trabalho e consumo da população, e que, diante deste cenário, um número cada vez maior de indivíduos com esse perfil de patologias tendem a fazer parte da clientela dos serviços de saúde.

Souza et al. (2016) publicaram uma revisão sistemática com metanálise sobre qualidade de vida e adesão ao tratamento em hipertensão. O objetivo foi verificar os efeitos do tratamento anti-hipertensivo (farmacológico e não farmacológico) na qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas com hipertensão arterial. Chegaram aos resultados que a sumarização do efeito mostrou incremento de 2,45 pontos na média (IC95% 1,02–3,87; $p < 0,0008$) da qualidade de vida em pessoas com adesão ao tratamento não farmacológico para hipertensão arterial. A adesão ao tratamento farmacológico indicou aumento de 9,24 pontos na média (IC95% 8,16–10,33; $p < 0,00001$) da qualidade de vida em pessoas com HAS, concluindo que o tratamento não farmacológico melhora a qualidade de vida global e o domínio físico de pessoas com HAS; e a adesão ao tratamento farmacológico impacta positivamente nos domínios mental, físico e escore total da qualidade de vida.

A análise de desenvolvimento regional de determinado local pode ser realizada por diversos indicadores: nível de alfabetização, taxa de crianças na escola, renda per-capita, taxa de emprego e índice de homicídios, entre outros. Há que se destacar, no entanto, os indicadores e parâmetros relacionados à saúde da população, os quais também são capazes de refletir o desenvolvimento regional de determinado local de maneira fidedigna. Dentre os vários indicadores utilizados no âmbito da saúde, o gerenciamento de doenças crônicas é um grave problema enfrentado pelas equipes gestoras da saúde. Neste contexto, a HAS sistêmica assume relevância, não somente pela elevada prevalência na população, mas, principalmente, pela relação com as doenças cardiovasculares, impacto na morbimortalidade, qualidade de vida, comprometendo o desenvolvimento social e impactando, também, nos custos e na economia.

Em virtude disso, a partir de 1980, a saúde passou a contar com novos sujeitos sociais e a comunidade aderiu à discussão sobre as condições de vida e as propostas governamentais indicada para o setor. A saúde deixou de ser interesse apenas dos técnicos para assumir uma dimensão política. Em 1988 aconteceu a aprovação da nova constituição federal e a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 1994 o Ministério da Saúde capitaneou um processo de reorganização da saúde, a partir do fortalecimento da atenção básica à saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família, que articula elementos das propostas originalmente conhecidas como Sistemas Locais de Saúde/Distrito Sanitário,

Programação em Saúde e Promoção à Saúde. A Saúde da Família surgiu com o papel de prover a atenção básica para toda a população de acordo com os princípios da universalidade. Dentre as principais doenças crônico-degenerativas, destacam-se a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Em 2001, o Ministério da Saúde (MS) propôs o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao Diabetes Mellitus, reconhecendo a importância da atenção básica na abordagem desses agravos, feita por meio do modelo de atenção programática denominado HIPERDIA (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos), possibilitando o desenvolvimento de ações contínuas e de alta capilaridade. Essa proposta sugere que o cuidado ofertado deve ir além do binômio queixa-conduta, de modo que permita identificar portadores assintomáticos, monitorar o tratamento, estabelecer vínculos entre equipe de saúde-pacientes-cuidadores e realizar educação em saúde, incorporando a realidade social do paciente a esse processo (HIPERDIA, 2001).

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no Hiperdia, na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde no período de 2010 a 2011. A média de idade foi 63 +- 10 anos, a adesão ao tratamento era de 54,3%, e 33,7% estavam controlados. Os autores concluem que mesmo com o cadastro no Programa Hiperdia, o controle da pressão arterial (PA) nos hipertensos não é satisfatoriamente alcançado e mantido.

De acordo com Lessa (2006, p. 36), a consequência da hipertensão arterial (HA) descontrolada é determinante para acidente vascular cerebral (AVC), doenças isquêmicas do coração (DAC), insuficiência cardíaca, insuficiência renal e isquemia vascular periférica. A HA é responsável por elevado ônus social e econômico ao setor de saúde, repercutindo sobre a seguridade social e sobre a população.

Efeitos negativos sobre as tendências decorrem, não somente da não adesão ao tratamento, como também do subtratamento, de inadequação da droga, dificuldade do acesso ao sistema de saúde, indisponibilidade de medicação na rede básica de saúde, quantidade de drogas e número de doses diárias da medicação prescrita, efeitos adversos, resistência ao tratamento e presença de co-morbidades.

Conforme assinalam Ribeiro et al. (2015), saúde e doença crônica estão muito relacionadas com qualidade de vida e desenvolvimento social. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica muito prevalente e seu não controle piora a qualidade de vida, aumenta os custos com cuidados em saúde, com impacto no desenvolvimento econômico.

Em Franca são escassos os dados sobre o não controle da hipertensão arterial, de pacientes em uso de anti-hipertensivos, e este trabalho foi realizado para fazer levantamento nesses pacientes e avaliar internações por HAS, acidente vascular cerebral (AVC), IAM e os custos resultantes em decorrência dessas internações.

2 IMPACTOS ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO

De acordo com Stevens et al. (2018, p. 29), as doenças cardíacas impõem limitações à qualidade de vida nos aspectos físicos, sociais, financeiros e de saúde no Brasil. Os autores avaliaram o impacto econômico (sistema de saúde e produtividade) de quatro doenças cardíacas no Brasil, a partir de estimativas do custo anual para 2015: HAS, IAM, fibrilação atrial (FA) e insuficiência cardíaca (IC). O custo com IAM acarretou o mais alto índice financeiro (R\$ 22,4 bilhões/6,9 bilhões de dólares), seguido de IC (R\$ 22,1 bilhões/6,8 bilhões de dólares), hipertensão (R\$ 8 bilhões/2,5 bilhões de dólares) e, finalmente, FA (R\$ 3,9 bilhões/1,2 bilhão de dólares). Stevens et al. concluem que, no Brasil, as doenças cardíacas determinam substanciais custos financeiros e perda de bem-estar, e deveriam ser uma prioridade de saúde pública.

Em Pereira (2006) se depreende que o desenvolvimento econômico é um fenômeno que passa a ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua revolução capitalista, e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico tende a ser automático ou auto-sustentado na medida em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de conhecimentos técnicos. Isto não significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos; pelo contrário, variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o mercado, para promover o desenvolvimento.

Machado et al. (2014, p. 51) relatam que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos não modificáveis, como herança genética, idade, sexo e raça, e os modificáveis, destacando-se a obesidade, as dislipidemias, o consumo excessivo de sal e carboidratos, bem como bebidas alcoólicas, o tabagismo, e fatores de ordem psicossocial geradores de estresse, e a inatividade física.

Conforme apontam, HAS é considerada um dos principais problemas de saúde no Brasil, elevando o custo médico-social, principalmente pelas


complicações que causa, como as doenças cerebrovasculares, IC e insuficiência renal crônica. Citam que, no Brasil, os estudos de prevalência de hipertensão arterial são poucos e não representativos, mas mostram alta prevalência, variando de 22% a 44%.

Descrevem que a incidência destas duas patologias é crescente, e vem se tornando alvo de estudo prioritário pelo MS, por ser um problema de saúde pública; e afirmam que a busca por um maior detalhamento destas doenças torna-se importante e instigante para permitir uma reestruturação das ações de prevenção e educação em saúde que amenize o impacto causado com os altos gastos gerados com tratamentos para as doenças crônicas não transmissíveis.

Narram os autores que os índices de morbimortalidade das DCNTs nortearam a formulação de estratégias preventivas pela OMS, em 2005, para o enfrentamento das DCNTs. Ainda segundo Machado et al. Depreende-se em Alwan et al. (2010 apud MACHADO et al., 2014, p. 56) que, do total de óbitos ocorridos no mundo em 2008, a maior representatividade é das DCNTs (63%), sendo que as doenças cardiovasculares, o câncer, doença respiratória crônica e diabetes responderam pela grande maioria desses óbitos. Os dados sobre a mortalidade (habitantes/100mil) são preocupantes em relação às DCNTs.

Na cidade pesquisada (gráfico 1), observa-se a tendência ao aumento nos casos de óbitos.


Gráfico 1 - número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011 no município de Mafra-SC



Fonte: Planilha Brasil (2013)

O gráfico 2 revela uma crescente evolução nos óbitos por doenças do aparelho circulatório e para as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, no estado de Santa Catarina.

Gráfico 2 - número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011 no estado de Santa Catarina



Fonte: Planilha Brasil (2013)

Machado et al. (2014, p. 51) avaliaram as ações de prevenção e promoção de saúde em relação a DM e HAS, em duas estratégias de saúde à família (ESF), em um município do Planalto Norte Catarinense, Mafra, com uma população de 52.912 habitantes, segundo o IBGE/2010. Para a coleta de dados, houve a preferência pelas Unidades Centrais devido ao maior fluxo de pacientes, divididos como ESF I e ESF II. Por meio de um questionário semiestruturado, avaliaram-se número de famílias cadastradas, número de pacientes HAS e DM, atividades de promoção e prevenção de saúde, visitas domiciliares, reuniões para educação em saúde e profissionais atuantes nesta área. Estas duas unidades possuem: ESF1, 2.566 pacientes e ESF2, 1.076. Destes, 49,7% possuíam HAS na ESF1E, 35,7% na ESF2. A terapia medicamentosa fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento da DM e HAS, está descrita na tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Medicamentos custo por mês

MEDICAMENTO	COMPRIMIDOS/MÊS	R\$/MÊS
Captopril	60.000	19.960
Enalapril	60.000	29.980
Hidroclorotiazida	60.000	4.800
Total	180.000	54.740

Fonte: Machado et al. (2014, p. 51)

Os autores concluem que a quantidade de medicamentos dispensada é alta, bem como os custos gerados para controle da hipertensão arterial. Enfatizam que um dos grandes desafios no tocante às DCNTs é a baixa adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso, comprometendo sua efetividade, com repercussão na qualidade de vida, e aumentando os gastos com saúde. Citam que vários fatores podem influenciar a adesão, como condições socioeconômicas, características da doença, tratamento empregado, o sistema de saúde e seus profissionais, bem como o próprio paciente.

Perante os dados apresentados de mortalidade, verifica-se a importância de se tomar uma ação rápida e eficiente, pois os números mostram um aumento nos últimos 10 anos, que resulta em um grande gasto para a saúde pública, com tratamentos e distribuições de medicamentos da doença de base e das complicações resultantes dela.

Misquita (2016) fez um levantamento sobre os gastos hospitalares das internações por Hipertensão Arterial Sistêmica e suas complicações, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no período de 2012 a 2015.

Quantificou as internações, verificou valor médio da autorização de internação hospitalar (AIH), média de permanência das internações e o número de óbitos. Foram registradas 897 internações por HAS, sendo que 54 ocorreram no HBDF, e 843 internações no HRC, por complicações, foram 2.341 e, dessas internações, 733 no HBDF e 1.608 no HRC. O valor médio da autorização de internação hospitalar (AIH) por HAS é de R\$ 791,97 no período estudado; deste, o HRC gastou em média por internação R\$ 255,55, e o HBDF gastou em média R\$ 536,41 por internação. Já a média da AIH por complicações HAS no período

estudado foi de R\$ 1.985,64; o HBDF representa um valor três vezes maior que no HRC. A média de permanência hospitalar oscilou, mas no HRC a média de permanência por internações por complicações da HAS é maior.

O estudo concluiu que no HRC ocorreram elevada taxa de internação, maior tempo de permanência e mais óbitos, comparado ao HBDF. Porém, constatou-se que os gastos com internações no HBDF foram superiores aos do HRC. Recomendam-se novos estudos para verificar essa discrepância de valores e a elevada taxa de internação no HRC.

A HAS é um problema de saúde pública, e o sanitarista pode auxiliar na criação de estratégias eficazes na atenção básica, a fim de possibilitar uma melhor qualidade de vida e diminuir as hospitalizações evitáveis e os consequentes gastos.

Marinho et al. (2011, p. 406) relatam que, no Brasil, o custo anual estimado para o tratamento da hipertensão arterial no sistema público de saúde, em 2007, foi de US\$ 398,9 milhões e representou 1,43% dos gastos totais do SUS e que estudos sobre custos hospitalares e com medicamentos por algumas doenças crônicas vêm demonstrando o impacto econômico dessas doenças para o SUS, bem como que o diabetes e a hipertensão são potenciais preditores clínicos para o agravamento dos casos, aumento do tempo de internação, e apresentam, consequentemente, associação positiva com maior custo de tratamento.

Descrevem que em países com as características do Brasil, onde os recursos para o setor de saúde são escassos, torna-se fundamental a eficiência na provisão dos serviços, e que, no setor da economia da saúde, estudos como este têm gerado conhecimentos aplicáveis à realidade dos serviços, auxiliando na aplicação de recursos e na determinação das prioridades da gestão em saúde.

Os autores desenvolveram um estudo de análise de custos da provisão para a assistência à saúde, em unidade de referência de média complexidade, localizada em Recife-PE, sob gestão municipal e financiada com recursos do SUS e da Prefeitura da cidade do Recife. Para o levantamento da produção ambulatorial e dos valores reembolsados pelo SUS, utilizaram-se os arquivos do banco de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Como resultados, levantaram que os custos diretos e o valor reembolsado pelo SUS totalizaram R\$ 4.855.291,82 e R\$ 2.118.893,56, respectivamente. Os grupos de despesas que apresentaram maiores custos foram: medicamentos - R\$ 1.762.424,42 (36,3%), serviços de

terceiros - R\$ 996.637,82 (20,5%) e pessoal - R\$ 978.096,10 (20,1%). Todos os procedimentos apresentaram maior custo estimado que os valores pagos pela tabela SUS.

Marinho et al. (2011) concluíram que os medicamentos representaram os maiores custos para assistência, e identificou-se diferença considerável entre os custos estimados e os valores reembolsados pelo SUS.

De acordo com Gadelha (2012), a vulnerabilidade dos sistemas universais de saúde é crescente, pelas condições concretas de dificuldade de incorporação de tecnologias essenciais para a promoção, a prevenção e a atenção à saúde. A dimensão econômica e a dimensão da saúde como direito são interdependentes e sua integração faz parte de uma nova visão e de uma nova política. A relação entre saúde e desenvolvimento acaba reduzida à visão de que a saúde requer apoio por ser elemento inerente às políticas sociais básicas, que também gera efeito indireto sobre o crescimento econômico, decorrente apenas de sua dimensão social, implicando na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do ambiente geral para investimentos. A agenda de saúde tem que sair de uma discussão interna e isolada e entrar na discussão do padrão do desenvolvimento brasileiro. Ou seja, requer pensar sua conexão estrutural com o desenvolvimento econômico, a equidade, a sustentabilidade ambiental e a mobilização política. A saúde se torna, assim, parte endógena da discussão de um modelo de desenvolvimento. O que se aponta é a necessidade de uma mudança profunda na estrutura econômica, que permita, mediante intenso processo de inovação, adensar o tecido produtivo e direcioná-lo para compatibilizar a estrutura de oferta com a demanda social de saúde.

Ainda conforme Gadelha (2012), saúde é a área mundial que concentra os maiores esforços em pesquisa e desenvolvimento, em conjunto com a área de defesa, respondendo isoladamente por cerca de 25% de toda a despesa mundial com inovação. A questão geral que divide as nações entre o mundo desenvolvido e os "outros mundos" se expressa de forma arrebatadora na área da saúde, evidenciando que somos parte não autônoma de um determinado modelo histórico de desenvolvimento.

As DCVs são ainda responsáveis por alta frequência de internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados. Como exemplo, em 2007 foram registradas 1.157.509 internações por DCV no SUS. Em relação aos custos,

em novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV, resultando em um custo de R\$ 165.461.644,33 (DATASUS). A doença renal terminal, outra condição frequente na HAS, ocasionou a inclusão de 94.282 indivíduos em programa de diálise no SUS, registrando-se 9.486 óbitos em 2007 (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. 2010; 95 (1 supl.1): 1-51).

Segundo Siqueira et al. (2017), a mortalidade por DCV representa 28% do total de óbitos ocorridos no Brasil nos últimos cinco anos, e atinge 38% dos óbitos na faixa etária produtiva (18 a 65 anos). Os custos estimados por DCV foram de R\$ 37,1 bilhões de reais no ano de 2015, um aumento percentual de 17% no período de 2010 a 2015. Os custos estimados pela morte prematura por DCV representam 61% do total de custo por DCV; os custos diretos com internações e consultas foram de 22%; e os custos pela perda da produtividade relacionados à doença foram de 15% do total. Os gastos com saúde no Brasil são estimados em 9,5% do PIB, e o custo médio das DCVs foi estimado em 0,7% do PIB. Siqueira et al. (2017) concluem que os custos com DCV vêm aumentando significativamente nos últimos cinco anos. Estima-se que os custos por DCV aumentem à medida que a população brasileira envelhece e que a prevalência de DCV aumenta (Arq. Bras. Cardiol., 2017; 109(1):39-46).

Conforme relata Vieira (2018), em todo o mundo, os custos com saúde são altos e crescentes, tornando imprescindíveis os estudos de economia da saúde. Com os novos tratamentos do acidente vascular cerebral (AVC), os custos desta doença estão se tornando ainda mais altos, tanto para os setores públicos quanto para os privados. Em 2015, estimou-se que ambos os setores gastaram cerca de US \$ 20 bilhões no tratamento de doenças cardiovasculares no Brasil. No entanto, não há estudo prospectivo dos custos intra-hospitalares do AVC no Brasil. Em seu trabalho, Vieira (2018) fez um levantamento do custo hospitalar do tratamento do AVC em dois hospitais privados de Joinville, Brasil. Foi um estudo prospectivo, envolvendo a verificação consecutiva dos custos hospitalares (médicos e não médicos) de todos os tipos de AVC e acidente isquêmico transitório. Vieira conclui em seu trabalho: o acidente vascular cerebral é uma doença muito dispendiosa e seus resultados são úteis para estudos de economia em saúde.

De acordo com Brito (2017), o AVC está entre as três principais causas de anos de vida perdidos no Brasil. Constitui um problema de saúde pública com impacto socioeconômico, tanto para o sistema de saúde quanto para a sociedade.

Apesar da importância do AVC para a saúde pública brasileira, dados sobre custos da doença no Brasil são escassos. A autora realizou uma revisão da literatura no Pubmed (via Medline), CRD Database, Embase, Tripdatabase, LILACS, Scielo e BVS, a fim de identificar dados previamente disponíveis sobre custos diretos do AVC no Brasil. Encontrou, como resultado, que o custo médio nacional do atendimento hospitalar para o acidente vascular hemorrágico (AVCH) foi da ordem de R\$ 415 milhões e R\$ 1,1 bilhões para o AVCI. Quando considerada a indexação pelo VCMH, tais alcançariam, respectivamente, R\$ 608 milhões e R\$ 1,6 bilhões – com aumento de 32%. O custo diário com perda de produtividade para a população brasileira nesse período foi estimado em R\$ 861 mil para o AVCH e R\$ 6,6 milhões para o AVCI. Brito conclui que a ocorrência do AVC arrasta consigo perdas econômicas elevadas para o país. Os resultados indicam a necessidade de implementação de políticas públicas que visem reduzir os casos de AVC no Brasil, de forma não só a gerar melhor alocação e distribuição dos recursos no sistema de saúde, como também poupar com perdas de produtividade.

Devido aos dados apresentados acima, o governo implantou um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA). O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do Sistema Único de Saúde – SUS. O sistema tem como benefícios:

- Orienta os gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção;
- Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na população.

Apresenta como funcionalidades:

- Cadastra e acompanha a situação dos portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus em todo o país;
- Gera informações fundamentais para os gerentes locais, gestores das secretarias e Ministério da Saúde;

- Disponibiliza informações de acesso público com exceção da identificação do portador;
- Envia dados ao CadSUS.

Nogueira et al. (2010, p. 103), em um estudo prospectivo com funcionários de uma universidade do Rio de Janeiro, Brasil (Estudo Pró-Saúde), realizaram aferições padronizadas de pressão arterial e da história de diagnóstico e tratamento da hipertensão. Estimaram a prevalência de hipertensão em 2.384 participantes no período de 1999 a 2001. A partir daí, avaliaram a população, segundo sexo e idade, que reconhecem o diagnóstico de hipertensão arterial, tratam essa condição e cuja doença estava controlada com medicação anti-hipertensiva. Os autores chegaram aos seguintes resultados e conclusão:

Resultados: Da população do estudo, 704 indivíduos (29,6%) foram classificados como hipertensos; desses, 573 (81,5%) reconheciam previamente sua condição (88,6% das mulheres e 71,6% dos homens). Dos hipertensos que reconheciam previamente a sua condição, 445 (77,8%; 88,8% das mulheres e 59,1% dos homens) estavam em tratamento com anti-hipertensivos. Por sua vez, dos hipertensos que estavam em tratamento, 287 (60,1%; 61,5% das mulheres e 57,4% dos homens) estavam controlados. Entre aqueles na menor faixa etária, os percentuais de reconhecimento e tratamento foram menores e o controle foi maior.

Conclusão: Nessa população, reconhecimento, tratamento e controle da hipertensão foram superiores ao observado em grande parte dos estudos nacionais e internacionais. Considerando-se que a maioria da população reconhecia sua condição e se tratava, era esperada uma proporção maior de controle da doença. O controle adequado da hipertensão deve ser uma prioridade dos programas e serviços de saúde, especialmente entre os homens.

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no Hiperdia, na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde, no período de 2010 a 2011. A média de idade foi 63 +- 10 anos; a adesão ao tratamento era de 54,3%, e 33,7% estavam controlados. Os autores concluíram que, mesmo com o cadastro no Programa Hiperdia, o controle da PA nos hipertensos não é satisfatoriamente alcançado e mantido.

3 IMPACTOS SOCIAIS DO NÃO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO

O processo de evolução do ser humano tem passado por diversos períodos, de acordo com sua necessidade, e a evolução ocorre devido à capacidade criativa e ao acúmulo de experiências, numa busca por melhores condições de sobrevivência. Antigamente, o homem tirava seu sustento da sua própria produção. Com o passar dos anos, começou a estocar os alimentos e trocá-los. Essa troca era realizada em vilarejos que, posteriormente, deram origem às cidades. Nessa época, o homem do campo começa a migrar para as cidades (SINGER, 1998).

No prefácio do livro *Qualidade de Vida* (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES; 2012), o professor Luiz Gonzaga Godoi Trigo relata que, crescentemente, tem-se falado sobre qualidade de vida. É um princípio que envolve critérios das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo o que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio. Cita os diferentes conceitos:

Os conceitos e concepções referentes à qualidade de vida são bastante diversos. Por exemplo, no *Dicionário Oxford de Filosofia* (Rio de Janeiro: Zahar, 1997) a consulta ao vocábulo remete diretamente a outro vocábulo, Felicidade. É uma visão bastante específica do tema, apesar de fugir dos aspectos mais práticos do problema. Por outro lado, na década de 1990, o filósofo alemão Hans-Magnus Enzensberger, considerava que o luxo do futuro, um dos patamares mais elevados da qualidade de vida do ponto de vista do consumo capitalista, será menos supérfluo do que estritamente necessário. Os novos luxos, segundo ele, seriam: tempo, atenção, espaço, sossego, meio ambiente e segurança. Pode ser um paradoxo, mas em um mundo fragmentado e contraditório, envolvido em crises econômicas, políticas e sociais cíclicas, os paradoxos são comuns (TRIGO, L. G. G. In: ALMEIDA et al., 2012 - prefácio).

Para os autores, mesmo as atividades ligadas ao prazer e às delícias da vida são comprometidas pelos limites e carências dos seres humanos:

Gilles Lipovetsky indaga como se explica que a ininterrupta melhoria das condições de vida material não leve de modo algum à redução do mal-estar na civilização? O paradoxo maior, ei-lo: as satisfações vividas são mais numerosas do que nunca, a alegria de viver fica estagnada ou até recua; a felicidade parece continuar inacessível enquanto temos, ao menos aparentemente, mais oportunidades de lhe colher os frutos. Esse estado não nos aproxima nem do inferno nem do paraíso; define simplesmente o momento da felicidade paradoxal (ALMEIDA et al., 2012, p. 6).

Refletem, ainda, sobre o que muitas vezes é sugerido como qualidade de vida:

(...) depende de ações individuais para que seja transformada, pois passa a ideia de que o sujeito pode mudar seus hábitos e, com isso, melhorar seu padrão de Qualidade de Vida, bem-estar e viver melhor. Além disso, coloca que bem-estar e qualidade de vida são sinônimos ou que, pelo menos, um exerce interferência sobre o outro (ALMEIDA et al., 2012, p. 15).

(...) essas orientações remetem a hábitos individuais e formas de lidar com alguns dos acontecimentos cotidianos, mas que nem sempre estão ao alcance do sujeito que procura melhoria de qualidade de vida (ALMEIDA et al., 2012, p. 16).

Qualidade de vida tornou-se, em muitas situações, um jargão útil a expectativas fáceis e publicidades enganosas. Isso ocorre devido a uma falta de compreensão específica sobre o termo, e sua consequente colonização por parte dos meios comerciais e de comunicação, que o utilizam como justificativa para tornar seus produtos vantajosos, ou para manipular a opinião pública.

Devido a essa falta de especificidade terminológica e de uma visão segmentada sobre o tema, frequentemente qualidade de vida passa a ser, de forma errada, um termo abordado como algo a ser alcançado e que depende unicamente da boa vontade e da atitude individual do sujeito em mudar seus hábitos.

[...] qualidade de vida não é algo a ser alcançado, um objeto de desejo da sociedade contemporânea que deve ser incorporado à vida a partir de esforço e dedicação individual. [...] o interessante para a vida de cada um é buscar uma boa qualidade frente às suas possibilidades individuais de ação (ALMEIDA et al., 2012, p. 18).

A definição de qualidade de vida apresenta divergências sob a ótica de diversos autores, no livro *Qualidade de Vida* (ALMEIDA; GUTIERREZ E MARQUES, 2012).

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural (MINAYO et al., 2000, p. 10 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 19).

Essa abordagem considera questões subjetivas como bem-estar, satisfação nas relações sociais e ambientais e cultural. Depende da carga de conhecimento do sujeito, do ambiente em que ele vive, do seu grupo de convívio, da sua sociedade e das expectativas próprias em relação a conforto e bem-estar.

Para outros autores, qualidade de vida está relacionada:

[...] à maneira como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, envolvendo, portanto, saúde, educação, transporte, moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito (GONÇALVES e VILARTA, 2004 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 19).

Um parecer que indica para as expectativas de um sujeito ou determinada sociedade em relação ao conforto e bem-estar. O entendimento e a percepção sobre qualidade de vida, nessa perspectiva, são relativos e variáveis.

São muitos e diversos pareceres sobre a questão:

[...] é a condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano (NAHAS, 2001, p. 5 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 19).

Qualidade de vida, para OMS (1995), é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

Segundo Vilarta e Gonçalves (2004), essas esferas se caracterizam como:

Objetividade das condições materiais: interessa a posição do indivíduo na vida e as relações estabelecidas nessa sociedade;
 Subjetividade: interessa o conhecimento sobre as condições físicas, emocionais e sociais relacionadas aos aspectos temporais, culturais e sociais como são percebidas pelo indivíduo (VILARTA e GONÇALVES, 2001, p. 33 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 20).

Para Almeida; Gutierrez e Marques (2012, p. 20), os pontos de vista objetivos buscam uma análise ou um entendimento da realidade baseada em componentes quantificáveis e concretos, que podem ser modificados pela ação humana. Estes componentes são fatores como acesso a saúde, emprego, moradia, educação, transporte, alimentação, saneamento básico, ou seja, necessidades

básicas de sobrevivência da sociedade contemporânea. Este tipo de ação torna possível identificar quadros de perfis socioeconômicos para estabelecer ações direcionadas à melhoria da qualidade vida dos sujeitos envolvidos.

No entanto, em relação ao aspecto subjetivo leva em conta questões históricas, sociais, culturais e de interpretação individual sobre as condições de bens materiais e de serviços do sujeito. Correlaciona-se com condições subjetivas e emocionais, expectativa e possibilidades dos indivíduos ou grupos em relação às suas realizações e à percepção que os atores têm de suas próprias vidas. Levam em consideração questões imensuráveis como prazer, felicidade, angústia e tristeza.

Essa divisão de esferas de percepção busca esclarecer a problemática da multidisciplinaridade presente em estudos sobre qualidade de vida, visto que esse é um tema de grande abrangência semântica. É importante considerar que, por existirem diversas formas de definição sobre o termo, a adoção de somente uma delas parece imprudente, pois esse ainda é um campo em formação e em processo de definição de conceitos e verdades. Logo, tais definições são aceitas e utilizadas, porém, devem ser analisadas com olhar crítico e de forma situada em relação aos aspectos objetivos e subjetivos de análise, além do fato de serem complementares entre si. Tanto aspectos objetivos quanto subjetivos devem ser considerados numa análise sobre o tema (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 2014, p. 22).

O interesse pelo conceito qualidade de vida, na área da saúde, é recente e decorre dos novos modelos que têm influenciado as políticas e as práticas do setor nas últimas décadas. Nesse período, as possibilidades de maior intervenção sobre o meio ambiente, bem como o avanço tecnológico na área de saúde, facilitaram a redução das doenças infectocontagiosas, e, assim, têm proporcionado uma maior expectativa de vida, apesar do aumento das doenças crônico-degenerativas.

Martins et al. relatam a definição de doença crônica, proposta em 1957 pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge:

[...] todos os desvios do normal que tinham uma ou mais das seguintes características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para a reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados (MARTINS et al., 1996, p. 6).

As autoras dizem que as doenças crônicas degenerativas relacionam-se às condições de vida, trabalho e consumo da população e, que diante deste

cenário, um número cada vez maior de indivíduos com este perfil de patologias tendem a fazer parte da clientela dos serviços de saúde.

A atenção primária à questão é uma estratégia do sistema de saúde para realizar ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento dos problemas mais prevalentes e reabilitação individual e coletiva. As doenças crônicas têm sido muito estudadas devido à necessidade de estratégias para a redução dos fatores de risco envolvidos, que estão relacionados às mudanças de estilo de vida e à qualidade de vida.

Martins et al. (1996) fizeram um estudo, no ambulatório de clínica médica em dois hospitais governamentais de ensino da cidade de São Paulo. Foram avaliados 71 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 13 e 79 anos. Foram incluídas no estudo, as pessoas que atenderam os seguintes requisitos:

- Apresentar doença crônica de qualquer natureza;
- Contactar verbalmente;
- Manifestar interesse em participar do estudo;
- Estar presente nos ambulatórios nos dias úteis da semana, das 14 às 18hs.

O estudo obteve os seguintes resultados:

Para as pessoas com doença crônica incluída no presente estudo, o significado de qualidade de vida abrangeu, prioritariamente, os seguintes aspectos: bem-estar material (40,9%), bem-estar físico (23,9%), bem-estar emocional (11,2%), recreação e lazer (6,4%), o relacionamento familiar e social (5,8%), o desenvolvimento pessoal (4,8%), higiene pessoal e ambiental (2,7%), segurança, sorte, independência (2,7%), bem-estar espiritual (1,6%).

A maioria das pessoas entrevistadas (67,6%) referiu que a doença crônica alterou sua capacidade física, sobretudo com relação à limitação para andar, no trabalho/estudo/atividades de lar; para 64,8% a interferência foi no sentido de uma limitação destas atividades e da necessidade de parar de trabalhar devido à presença de diferentes sinais e sintomas; 53,5%, interferências na autoestima, relacionando-a com alteração do estado emocional. As áreas menos comprometidas pela doença crônica foram independência e autocuidado (35,2%), relacionando-se à necessidade de auxílio no cuidado corporal, à necessidade de companhia para sair e à restrição e modificação de hábitos alimentares; relacionamento familiar e social (32,4%), devido a desentendimentos com familiares e amigos por alterações do

humor, impaciência e desequilíbrio emocional; recreação e lazer (29,6%), no sentido de tê-los abandonado, alegando problemas físicos, emocionais e ambientais.

Também observaram que a percepção de qualidade de vida está fortemente determinada por fatores de ordem socioeconômica devido à doença crônica interromper ou dificultar a inserção no processo produtivo e, conseqüentemente, diminuir o acesso aos bens de consumo. Essas pessoas também passam a experimentar diferentes comportamentos e sentimentos decorrentes de alterações na capacidade física, na autoestima, na imagem corporal e na realização de uma série de atividades da vida diária.

Azevedo et al. (2013, p. 1775) citam que a definição de doença crônica mais amplamente aceita é a proposta pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge:

[...] na qual se incluíam todos os desvios do normal que tinham uma ou mais das seguintes características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para a reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados.

E os autores seguem demonstrando que a avaliação de qualidade de vida é bastante ampla, o que pode gerar dificuldades na análise:

Qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura, no sistema de valores em que vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações. O conceito incorpora a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com aspectos significativos do meio ambiente.

[...] Assim, ainda existe necessidade de continuar pesquisando esse tema, sobretudo associado a doenças crônicas a fim de que se obtenham melhores resultados na prática clínica diária. Informações sobre a qualidade de vida de um indivíduo podem ser usadas para monitorar o seu processo de tratamento, comparar diferentes estágios da doença e facilitar a tomada de decisão clínica, e cuidados em saúde (AZEVEDO et al., 2013, p. 1775).

De acordo com o relatado acima fica bem evidente a inter-relação entre doença crônica e diminuição da qualidade de vida.

A HAS é um dos principais fatores de risco cardiovascular e de alta prevalência na maioria dos países. Estudos mostram o efeito negativo da HAS na qualidade de vida relacionada à saúde.

Carvalho et al. (2012) avaliaram 333 pacientes de ambos os sexos, maiores que 18 anos, divididos em Grupo Estudo, composto por 246 pacientes hipertensos sob tratamento em serviço multiprofissional, e Grupo Controle, formado por 87 indivíduos da comunidade, comparando a qualidade de vida desses dois grupos.

Resultados: Os grupos foram homogêneos em relação à idade, ao sexo, à etnia, à escolaridade e ao estado civil. Observou-se que os indivíduos normotensos apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à saúde quando foram comparados aos hipertensos.

Conclusão: A hipertensão arterial, embora considerada entidade clínica, na maioria das vezes, silenciosa, interfere negativamente na qualidade de vida de seus portadores (ARQ. BRAS. CARDIOL. 2013; 100(2):164-174).

Atualmente, com o maior acesso aos serviços de saúde, a melhoria do saneamento básico e de hábitos de vida, a longevidade tem aumentado, e apresenta, como consequência, um maior índice de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica no Brasil, já que o avanço da idade é um dos fatores para a ocorrência de pressão arterial alta.

Na presença de tal problema, muitas pesquisas sobre incidência, prevalência, prevenção e fatores de risco para hipertensão arterial têm sido desenvolvidas.

Conforme Oliveira et al. (2008, p. 10), essa visão é diversa de outras dimensões como: ecológicas, sociais, culturais, religiosas, psicológicas, da mesma maneira importantes no processo, que implicam adoecimento e melhoria da saúde dos indivíduos. Segundo a autora, a alta prevalência de hipertensão arterial e sua relação com morbimortalidade fazem dela um problema de Saúde Pública e que, quando não tratada corretamente, diminui a expectativa de vida e a qualidade de vida das pessoas.

De acordo com Lessa (2006, p. 36), a consequência da HA descontrolada é determinante de AVC, doenças isquêmicas do coração (DAC), IC, insuficiência renal e isquemia vascular periférica. A HAS é responsável por elevado ônus social e econômico ao setor de saúde, repercutindo sobre a seguridade social e sobre a população.

Neste mesmo artigo, a autora termina com as seguintes considerações finais:

O Brasil tem um elevado custo social com a hipertensão não-controlada. Porém, pior do que a não-adesão é a descontinuidade do fornecimento ou reposição da medicação nos serviços de atenção básica, onde se insere a maioria daqueles que conseguem acesso à assistência, ainda sem lesão de órgão-alvo. O prejuízo social torna-se maior, na medida em que os gastos ocorrem, são elevados, mas não permitem o alcance das metas dos programas. Isso significa que os milhões de reais gastos anualmente pelo governo federal não resultam em qualquer impacto em curto, médio ou longo prazos. Em outras palavras, o governo está desperdiçando verbas. No entanto, existem municípios que assumiram o programa e oferecem a contrapartida para o sucesso do controle (LESSA, 2006, p. 45).

Suzano et al. (2016) avaliaram a qualidade de vida dos pacientes hipertensos que realizam tratamento na Clínica da Família Olímpia Esteve, e chegaram à seguinte conclusão:

Este estudo aponta que pacientes hipertensos sofrem a influência de diversas limitações nas atividades de vida diária, podendo acarretar prejuízos significativos nos domínios de aspectos mentais. Portanto, a ampliação do cuidado na rede de atenção básica, pode ser uma estratégia para melhoria da qualidade de vida do paciente hipertenso (SUZANO et al., 2016, p. 53).

Faria (2010, p. 30), em suas considerações finais, conclui que:

O controle da pressão arterial não está relacionado apenas aos hábitos de vida saudável do indivíduo e seu tratamento medicamentoso, mas também à conscientização sobre a doença e as comorbidades relacionadas. Neste contexto a equipe de saúde assume papel na educação para saúde, elaborando estratégias de intervenção pautadas no conhecimento da população atendida e no referencial teórico referente à não adesão ao tratamento.

Santos et al. (2013, p. 465-471) fizeram um levantamento sobre hospitalizações por hipertensão arterial essencial em caráter de urgência no Brasil, 2008-2012. Nesse período foram registradas 436.316 internações. O sexo feminino apresentou maior frequência - 257.932 internações; e a faixa etária de 60 a 69 anos, maior percentual. A região Centro Oeste apresentou maior frequência de internação. As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram os maiores gastos. A conclusão do estudo demonstra que HAS é importante problema de saúde pública; e estratégias efetivas na atenção básica para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle devem ser aprimorados para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, reduzir internações evitáveis e consequentes gastos.

Trevisol (2010) comenta que nos países desenvolvidos há um aumento crescente nas mortes por doenças cardiovasculares. Estas contribuem com 30% no número de mortes em todo o mundo, e em 10% dos anos de vida saudáveis perdidos. Entre os fatores de risco para DCV, a HAS ocupa posição destacada pela alta prevalência em todos os países. Apesar de ser uma das principais causas de DCV, a taxa de controle da HAS é insatisfatória. Os resultados sugerem que a associação entre hipertensão arterial tratada com menor qualidade de vida pode ser atribuída ao fato de a pessoa estar ciente da doença, a mudança no estilo de vida ou os efeitos adversos dos anti-hipertensivos. O autor conclui que os indivíduos com HAS têm menor qualidade de vida do que os indivíduos normotensos, principalmente quando a pressão arterial é controlada por medicamentos.

Oliveira et al. (2008, p. 9) fizeram estudo descritivo, com abordagem quantitativa, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida de indivíduos portadores de hipertensão arterial. A amostra foi constituída de 339 indivíduos portadores de hipertensão, sendo 120 homens e 219 mulheres cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no bairro Maruípe, município de Vitória-ES. Para a coleta de dados, foi utilizada a versão em português do instrumento WHOQOL-brief da OMS, composta por 26 questões que obtiveram os melhores desempenhos psicométricos.

As questões são formuladas para uma escala de respostas tipo Likert, com quatro variáveis, sendo cada uma com cinco níveis. As escalas são de intensidade que variam do nada-extremamente; de capacidade, variando do nada-completamente; de frequência, que vai do nunca-sempre; de avaliação, que varia de muito insatisfeito-muito satisfeito-muito ruim-muito bom. Essa versão é composta por quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, além do domínio global, o qual é constituído pelas perguntas 1 e 2 do questionário. Constituído por 26 questões distribuídas por domínios. Resultados: O domínio social apresentou uma média de 70,0; o psicológico 63,0; o ambiental 67,0; domínio global 70,5; e o físico 70,0. Apresenta, como conclusão, que os principais fatores de influência de qualidade de vida são as questões de âmbito psicológico e social e que o aspecto físico não possui relevância primordial, ou seja, as limitações proporcionadas pela HAS não fazem com que os aspectos físicos sejam os prioritários para uma boa qualidade de vida.

Segundo Ribeiro et al. (2015, p. 432), em um estudo de corte transversal, sobre a qualidade de vida de hipertensos atendidos na Atenção Primária à Saúde, realizado em Jequié-BA, constatou-se que a qualidade de vida dos usuários acometidos por hipertensão arterial foi satisfatória. Quanto aos fatores depressores da qualidade de vida, identificou-se que a escolaridade e a raça/cor dos entrevistados influenciam de forma acentuada nesta quantificação.

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no Hiperdia na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde, no período de 2010 a 2011. A média de idade foi 63 +- 10 anos, a adesão ao tratamento era de 54,3% e 33,7% estavam controlados. O autor conclui que mesmo com o cadastro no Programa Hiperdia, o controle da PA nos hipertensos não é satisfatoriamente alcançado e mantido.

O direito ao desenvolvimento é uma forma de proporcionar o acesso à dignidade do ser humano a partir do trabalho, e destacar que o Estado deve agir junto com a sociedade, a fim de banir restrições de liberdade de atuação e acesso aos meios de produção.

Quando se fala em desenvolvimento social, deve-se sempre pensar em risco social. O risco social vai acontecer devido a aspectos do desenvolvimento da sociedade e que conduzem à sua formação. Quando se conversa sobre risco, pensa-se em algo que pode trazer um problema no futuro, ou seja, o risco, impreterivelmente, causa prejuízo para aquele que foi atingido por ele, causando um dano individual ou coletivo, dependendo do tipo de risco.

Os riscos podem acontecer ou não. Acontecendo, deverá existir o meio necessário para proporcionar a cobertura. Se ele não acontecer é um ponto favorável ao desenvolvimento social. Devido a isso, é importante a implementação de políticas de prevenção de determinados riscos, com o objetivo de evitar o acontecimento deles.

Conforme discorre Teles (2014, p. 133), a preocupação posterior contra os riscos sociais não tem tanto efeito quanto a atuação anterior, pois a consequência já aconteceu. Ainda segundo a autora, não se pode deixar a cobertura dos riscos somente para as pessoas mais abastadas, mas também para o Estado.

Não se pode deixar somente para as classes mais abastadas a possibilidade de cobertura dos riscos, visto que o fazem de forma particular, sem necessitarem que o Estado promova a respectiva proteção. Os menos favorecidos – pobres, excluídos ou marginalizados – merecem a garantia da efetiva atuação do Estado uma vez que não conseguem, por sua conta, sustentar as situações que os fazem vulneráveis na sociedade.

O risco social, portanto, será responsável pelo desenvolvimento social a partir do momento que é detectado e, por consequência, banido (TELES, 2014, p. 134).

Os riscos são detectados através da análise dos indicadores sociais. No Brasil é algo recente o uso de indicadores sociais como ferramenta de planejamento, pois o propósito de criar os indicadores sociais só aconteceu em 1975. O crescimento econômico brasileiro foi bastante significativo no início dos anos 70, porém não levou a uma distribuição de renda e diminuição da pobreza.

Segundo Santagada (1993, p. 127):

O objetivo dos indicadores sociais era o de fornecer elementos para a elaboração e o acompanhamento do planejamento social, sendo que a prioridade seria dada aos indicadores destinados a medir as variações nos níveis de bem-estar material, em especial dos grupos que estavam em situação de "pobreza absoluta" (Conselho Desenv. Social, 1975). Com esse documento, pela primeira vez o termo indicadores sociais aparece de forma oficial no Brasil.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ficou responsável pela coordenação e criação desses indicadores. Posteriormente, foram sendo criados os indicadores regionais para melhor atender às necessidades locais.

Conforme Espírito-Santo (2008, p. 1), desenvolvimento social é um tema de difícil definição por ser muito complexa sua análise. Segundo a autora, desenvolvimento social é um conceito em construção.

Relata que desenvolvimento social seria, assim, um conceito redefinido a cada situação, onde os índices sociais e econômicos seriam mais um meio de compreensão da realidade, mas não o único instrumento levado em conta ao se analisar uma situação social. Propõe, ainda, que soluções criativas sejam coletivamente buscadas, com a certeza de que serão sempre provisórias, mesmo que eficazes em um determinado tempo e espaço. Reafirma-se, dessa forma, uma visão de mundo em movimento, onde a incerteza e a imprevisibilidade jamais poderiam ser desconsideradas (ESPIRITO-SANTO, 2008, p. 13).

Carrijo et al. (2014) fazem um análise sobre os condicionantes sociais da hipertensão arterial. Nesse artigo comentam que a Hipertensão Arterial Sistêmica

é uma doença crônica que leva grande número de pessoas à morte e, quando isto não ocorre, muitas se tornam portadoras de sequelas, devido às suas consequências. Atinge todas as classes sociais, e as diversas consequências atribuem à HAS, caracterizando-a como uma das causas de maior redução da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos. As autoras afirmam que:

Diante da problemática da hipertensão arterial, julgamos ser pertinente uma investigação na qual fosse possível conhecer o universo dos seus portadores, seu ponto de vista e os aspectos que para os mesmos estivessem dificultando o controle da doença. Entendemos que as representações pessoais sobre uma determinada doença demonstram a realidade vivenciada pelos portadores de uma forma mais concreta, caracterizando a leitura que fazem de sua morbidade, sendo esta uma possível influenciadora do controle a ser realizado, caso seja equivocada. A identificação dos aspectos mencionados anteriormente poderá auxiliar na busca de alternativas preventivas, ao oferecer subsídios para a formulação de novas propostas na área da HAS (CARRIJO et al., 2014, p. 3).

Realizaram um trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Franca e analisaram, através de uma pesquisa qualitativa, quatro grupos, com média de dez participantes, os seguintes aspectos: idade, sexo, grau de instrução, emprego, condições emocionais, questões familiares, limites impostos por outras doenças situação socioeconômica, situação laborativa ou de inserção no mercado de trabalho, dificuldade de agendamento de consultas médicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tabagismo, falta de aderência ao tratamento.

Em relação à faixa etária predominante, foi a denominada terceira idade. Quanto ao gênero não houve diferença. Sobre o grau de instrução, a maior incidência foi a de 1ª a 4ª séries, atualmente ensino fundamental incompleto. Comentam que o baixo nível de educação pode estar relacionado com a dificuldade no controle da doença, pois pode haver um distanciamento entre os meios de comunicação científica e o acesso a informações, levando assim a uma compreensão da HAS de maneira insuficiente. Com relação a emprego, verificou-se uma considerável situação de desemprego, e consideram significativo ressaltar que, no universo pesquisado, foi observado que, após a instalação da doença, deixaram o trabalho por falta de condições físicas e, por não serem vinculados à Previdência Social, não foi possível pleitear um benefício, ou este lhes foi negado.

Relativamente às condições emocionais nos quatro grupos, o nervosismo e a ansiedade foram os responsáveis pela elevação da pressão arterial.

Já, quanto às questões familiares, foram relatados problemas de relacionamento com cônjuges ou companheiros, e filhos. As dificuldades no enfrentamento dos limites impostos por outras doenças evidenciaram um sentimento de impotência e uma persistente autoavaliação de menos valia, gerando uma percepção de si mesmos como imprestáveis, como algo a ser descartado.

A situação socioeconômica de muitas pessoas também pode comprometer a saúde, pois, após adoecerem, com dívidas, e sem condições de continuidade de pagamento das prestações de produtos já adquiridos, ainda têm seus nomes inclusos em serviços de proteção ao crédito, o que lhes impede de adquirir novos produtos necessários a sua manutenção, como por exemplo, medicamentos.

No que se refere à situação laborativa ou de inserção no mercado de trabalho, um fato observado se refere à condição daqueles usuários afastados do trabalho por motivos de saúde, que são os beneficiários do auxílio-doença ou aposentados por invalidez, o que poderá levar a uma percepção de “inutilidade” por parte dos doentes. Os pacientes encontram, também, uma grande dificuldade de agendamento de consulta pelo SUS, e estas ocorrem com um longo intervalo, e parece não haver a possibilidade de atendimento antes da data pré-estabelecida.

Finalmente, quanto à aderência ao tratamento, verificou-se que não há queixas por parte dos sujeitos na aquisição dos medicamentos para o controle da HAS. Na realidade estudada, foram raros os relatos daqueles que não conseguiam gratuitamente pela rede pública. Dentre as dificuldades identificadas para o controle da doença, o fato de a HAS muitas vezes ser assintomática também deverá ser considerado um agravante. Há grande número de portadores que abandonam o tratamento por se considerarem curados. Diante de tais dados, parece não haver falta de medicamentos na realidade pesquisada para o controle da hipertensão arterial, mas falta consciência da necessidade de utilizá-los. A pouca informação sobre as causas da HAS, direcionada aos seus portadores, deve-se também ao fato desta ser de natureza multifatorial; assim, os próprios médicos têm dificuldade em estabelecer uma causa única para cada paciente e, neste aspecto, identifica-se a relevância da existência de um trabalho interdisciplinar.

Carrijo et al. (2014) concluem que as condições reais de existência de uma determinada população constroem a compreensão das definições ou dos conceitos referentes à saúde e à doença. A percepção da doença muda de acordo

com o tempo histórico e é influenciada por vários fatores. Não se pode entender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural.

Carrijo et al. (2014) concluem que, apesar do discurso dos sujeitos identificando a compreensão da origem da HAS associada a um contexto emocional, não se pode restringir somente a ele na explicação da doença, é necessária uma análise mais completa e crítica de tal elemento; relatam ter observado que no discurso dos sujeitos, ainda que de maneira sutil, as condições emocionais são ocasionadas por problemas sociais diversos, dentre eles: familiares, econômicos e referentes ao trabalho.

Finalizam que, de acordo com as reflexões acima, o foco foi a hipertensão arterial, mas que muitas das reflexões apresentadas também são válidas para grande parte das morbidades existentes.

4 METODOLOGIA

4.1 PROBLEMA DA PESQUISA

- Quais os impactos socioeconômicos do não controle da hipertensão arterial sistêmica?

4.2 OBJETIVO DA PESQUISA

- Identificar a taxa de hipertensos, não controlados, mesmo em uso de medicamentos anti-hipertensivos.
- Comparar as taxas de internações e custos devido a HAS, AVC e IAM com outras cidades, para identificar futuramente possíveis fatores de melhora para Franca.

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar e discutir os impactos sociais e econômicos do não controle da hipertensão arterial.
- Comparar a taxa de controle de HAS de Franca com outras cidades.
- Comparar e discutir os custos com HAS, AVC E IAM de Franca com outras cidades.

Para comparação, foram escolhidas Ribeirão Preto-SP, devido a sua proximidade e por ser tradicionalmente reconhecida com ótima reputação na área de saúde; e Limeira, devido às características semelhantes a Franca, como tamanho da população.

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para identificar o não controle da HAS foi realizado um estudo clínico, observacional, descritivo e retrospectivo, realizado com pacientes submetidos a MAPA atendidos no AME e em uma clínica privada da cidade de Franca. Foram

analisados todos os exames realizados no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2016.

Para análise comparativa entre as cidades de Franca, Ribeirão Preto e Limeira, os dados foram coletados através do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), disponibilizados na página do Datasus/MS, no link abaixo: (<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203>.), na seguinte ordem, na página do Datasus/MS: -> Informações de Saúde TABNET -> morbidade hospitalar -> geral por local de internação a partir 2010 -> linha-estabelecimento -> coluna - ano de atendimento -> conteúdo (AIH aprovada, valor total, valor, médio da AIH, internações, óbitos) -> período de 2010 a 2018 -> seleções disponíveis: município Franca; Capítulo CID 10: cap. IX - doença aparelho circulatório; Lista morbidade do CID 10: Hipertensão essencial (primária), Acidente Vascular Cerebral não especificado hemorrágico ou isquêmico, Infarto Agudo do Miocárdio.

No período de coleta foram estabelecidos os anos de 2010 a 2018. Os percentuais apresentados nas discussões das tabelas foram calculados com o auxílio da ferramenta Excel.

A definição de MAPA, segundo a 6ª Diretriz de MAPA da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é o método que permite o registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas, ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais na vigília e durante o sono. A MAPA deve fazer parte do fluxograma para identificação das quatro categorias possíveis de comportamento da PA: normotensão, hipertensão arterial, hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada.

São considerados valores anormais de PA pelo MAPA os constantes na tabela 2, baseados na 6ª diretriz de monitorização ambulatorial da pressão arterial e 4ª diretriz de monitorização residencial da pressão arterial.

Tabela 2 - Valores anormais de PA pela MAPA (mmHg)

Período	Valores anormais
24 horas	≥ 130/80
Vigília	≥ 135/85
Sono	≥ 120/70

PA: pressão arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial.

Fonte: elaborada pelo autor

4.5 VARIÁVEIS DE ANÁLISE

As variáveis de interesse são idade, sexo, peso, altura, IMC, tabagismo, medicação anti-hipertensiva, HAS no consultório, HAS pela MAPA. O exame de mapa permite a análise de diversos parâmetros clínicos e pressóricos. Nesta pesquisa foram analisadas as seguintes variáveis, que constam do quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Dados analisados

FORMULÁRIO PARA COLETA DAS VÁRIAVEIS DE ANÁLISE							
IDENTIFICAÇÃO	NOME						
	IDADE		DATA DO EXAME		GÊNERO		
	PESO		ALTURA		IMC	TABAGISMO	
	MEDICAÇÃO ANTI-HIPERTENSIVA		QUAIS		CONVÊNIO		
	DESFECHO ÓBITO		DATA				
MEDIDAS MANUAIS	PAS		PAD				
DADOS GERAIS	TOTAL DE MEDIDAS		MEDIÇÕES VÁLIDAS				
TOTAL	PAS MÉDIA		PAD MÉDIA				
VIGÍLIA	PAS MÉDIA		PAD MÉDIA				
PERÍODO SONO	PAS MÉDIA		PAD MÉDIA				
MATINAL	PAS		PAD		ASCENSO		
DESCENSO DA PA NO SONO	PAS		PAD				
CARGA PRESSÓRICA	VIGÍLIA		PAS		PAD		
	SONO		PAS		PAD		
	TOTAL		PAS		PAD		
VALORES MÁXIMOS							
VIGÍLIA							
PAS	Horário	PAD	Horário	PAM	Horário	PP	Horário
SONO							
PAS	Horário	PAD	Horário	PAM	Horário	PP	Horário
VALORES MÍNIMOS							
VIGÍLIA							
PAS	Horário	PAD	Horário	PAM	Horário	PP	Horário
SONO							
PAS	Horário	PAD	Horário	PAM	Horário	PP	Horário

Fonte: elaborado pelo autor

4.5.1 Delimitações da pesquisa

Definições e critérios diagnósticos

Normotensão: Caracterizada por valores normais de PA medida no consultório (< 140/90 mmHg) e na MAPA de 24 horas (\leq 125/75 mmHg).

Hipertensão Arterial Sistêmica: Caracterizada por valores anormais da PA no consultório (\geq 140/90 mmHg) e na MAPA (\geq 130/85 mmHg).

4.5.2 Delineamento do estudo

Todos os exames de MAPA realizados nas instituições envolvidas são impressos em relatórios e entregues aos pacientes para seguimento do tratamento, sendo que uma cópia é mantida no prontuário médico e arquivada digitalmente. A pesquisa foi efetuada nos arquivos digitais dos exames realizados e em seguida os dados foram transcritos para a base de dados deste trabalho.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Santa Casa de Franca, sob número 56889516.0.0000.5438, com manifestação favorável à dispensa de utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, já que os dados seriam oriundos de prontuário eletrônico.

5 RESULTADOS

5.1 PACIENTES AVALIADOS PELA MAPA

A característica observacional retrospectiva do delineamento desta pesquisa impossibilita o cálculo estatístico de tamanho amostral mínimo. Assim sendo, foram analisados todos os exames da MAPA durante os anos de 2011 a 2016.

As variáveis nominais (categóricas) apresentam-se descritivamente em tabelas ou gráficos, na forma de percentagens (%) ou proporções, e as ordinais deste mesmo modo, podendo-se também apresentar na forma de mediana e intervalos. As variáveis numéricas são apresentadas em tabelas ou gráficos, na forma de médias, mediana, desvios padrão ou intervalos de confiança. A prevalência da HAS é demonstrada de forma descritiva, através de proporção ou percentagem. Os resultados obtidos constam na tabela 3:

Tabela 3: Resultados

TABELA 3 - Características clínicas da população do estudo	
	n (%)
<i>Faixa Etária</i>	
até 59 anos	1073 (41,8)
60 anos ou mais	769 (58,2)
<i>Gênero</i>	
Feminino	1167 (63,3)
Masculino	676 (36,7)
<i>IMC classificação</i>	
Baixo peso	79 (4,3)
Adequado	431 (23,6)
Sobrepeso	345 (18,9)
Obesidade	970 (53,2)
<i>Tabagismo</i>	
Sim	155 (8,4)
Não	1688 (91,6)
<i>Medicação anti-hipertensiva</i>	
Sim	1406 (76,3)
Não	436 (23,7)
<i>Origem do paciente</i>	
Privado	333 (18,1)
SUS	1510 (81,9)
<i>HAS não controlada</i>	
Sim	727 (39,4)
Não	1116 (60,6)


5.2 INTERNAÇÕES, ÓBITOS E CUSTOS COM HAS, AVC E IAM EM FRANCA

Em relação ao gênero houve um predomínio do sexo feminino, com 63,3% dos pacientes. Quanto ao IMC pôde-se observar um alto índice de obesidade, 53,2%. Em relação ao tabagismo foram encontrados apenas 8,4% dos pacientes fumantes. No item faixa etária foram observados 58,2% dos pacientes com idade até 59 anos e 41,2% acima de 60 anos. Neste grupo de pacientes estudados, 1.022

(55,4%) pacientes possuíam diagnóstico de HAS no consultório, sendo detectado que 727 (39,4%) pacientes hipertensos, em uso de medicamentos, estavam com a pressão arterial não controlada.

Quanto ao número de pacientes internados devido a HAS constatou-se um aumento de pacientes internados a partir de 2015, com aumento de 143%, conforme demonstra o gráfico 3:


Gráfico 3: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Houve também um aumento dos custos com internação hospitalar com esses pacientes, a partir de 2014, como indica o gráfico 4:

Gráfico 4: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca




Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Entre os pacientes internados devido a HAS, no período de 2010 a 2018, não houve óbitos.

Entre os pacientes que se internaram devido a AVC, houve um aumento importante no número de internações, no período de 2010 a 2018, evoluindo de 25,47/100.000 habitantes para 95,14/100.000 habitantes, conforme demonstra o gráfico 5:


Gráfico 5: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC, no período 2010 a 2018 em França



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Com relação aos custos totais devidos, também foi observado um crescimento importante, de 60.788,96 para 199.756,74, conforme gráfico 6:


Gráfico 6: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em França



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No período de 2010 a 2014 observou-se um aumento de óbitos nos pacientes internados devido a AVC, com redução a partir de 2016 até 2018, conforme gráfico 7:


Gráfico 7: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Constatou-se um crescente aumento no número de pacientes internados com IAM, no período de 2010 a 2017, com queda em 2018, verificado no gráfico 8:


Gráfico 8: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

O mesmo comportamento foi observado, em relação aos custos totais, no período de 2010 a 2018 em relação aos pacientes internados devido a IAM, conforme gráfico 9:


Gráfico 9: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação à taxa de mortalidade, foi evidenciada uma diminuição de 13,45% para 7,92%, a partir de 2016, conforme gráfico 10:

Gráfico 10: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca



Fonte: Ministério da Saúde, 2018


5.3 COMPARAÇÃO COM OUTRAS CIDADES

5.3.1 Ribeirão Preto

Uma das cidades escolhidas para comparação de dados foi Ribeirão Preto, devido a sua proximidade e ser tradicionalmente reconhecida por ótima reputação na área de saúde.

Informações do SIH-SUS sobre Ribeirão Preto, de internações devido a HAS por 100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, demonstram uma queda de 32,28/100.000 para 21,18, conforme o gráfico 11:


Gráfico 11: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação aos custos, devido a HAS, notou-se, em Ribeirão Preto, uma oscilação, de 2010 a 2015, com pico em 2016 (R\$ 16.167,00/100.000 habitantes), com declínio até 2018 (R\$ 9.251,00), como observado no gráfico 12:


Gráfico 12: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Pode-se notar um baixo índice de óbitos/taxa de mortalidade, no período de 2010 a 2018, sendo que nos anos de 2010, 2012 e 2013 não foram constatados óbitos devido a HAS, conforme o gráfico 13:


Gráfico 13: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a HAS no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

As informações a respeito de AVC, em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, por 100.000 habitantes, evidenciam um aumento progressivo de 2012 (75,76) a 2017 (101,02), com ligeira queda em 2018 (98,55), conforme o gráfico 14:


Gráfico 14: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Os custos com AVC, em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, apresentaram um aumento de 2010 (R\$ 102.338,00) até 2016 (R\$ 160.402,00), com declínio até 2018, demonstrado no gráfico 15:


Gráfico 15: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

A taxa de mortalidade, devido a AVC, vem apresentando um decréscimo de 2010 a 2018 na cidade de Ribeirão Preto, conforme o gráfico 16:


Gráfico 16: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

As internações em decorrência de IAM, em Ribeirão Preto, têm apresentado discreta oscilação no período de 2010 (208,11/100.000) a 2018 (219,88/100.000 habitantes), constante no gráfico 17:


Gráfico 17: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação aos custos, nota-se um aumento, atingindo o máximo em 2014 (R\$ 748.742, 00/100.000 habitantes), e atualmente, em 2018 (R\$ 705.039,00/100.000 habitantes), como demonstra o gráfico 18:


Gráfico 18: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

A taxa de mortalidade, devido a IAM, vem decaindo continuamente, em Ribeirão Preto, conforme o gráfico 19:

Gráfico 19: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto




Fonte: Ministério da Saúde, 2018

5.3.2 Limeira

A outra cidade escolhida foi Limeira devido a características semelhantes a Franca.

Informações do SIH-SUS, sobre internações devido a HAS, na cidade de Limeira por 100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, demonstram um aumento de 2010 a 2012, e, após, uma queda importante, evidenciada no gráfico 20:


Gráfico 20: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação aos custos devido a HAS, na cidade de Limeira, por 100.000 habitantes, foi constatada uma variação no decorrer dos anos, com diminuição de 2012 a 2017, com aumento importante em 2018, apesar de não haver ocorrido um aumento no número de internações, como demonstrado no gráfico 21:


Gráfico 21: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em Limeira ocorreram óbitos devido a HAS, apenas nos anos de 2011 e 2012, conforme gráfico 22:


Gráfico 22: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a HAS no período 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No período de 2010 a 2018, na cidade de Limeira houve um aumento progressivo no número de internações devido a AVC por 100.000 habitantes, indo de 13,4 (2010) para 94,05/100.000 habitantes (2018), demonstrado no gráfico 23:


Gráfico 23: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação aos custos com AVC, no período de 2010 a 2018 houve um aumento importantíssimo, partindo de R\$ 23.997,00/100.000 habitantes em 2010 para R\$ 271.670,00/100.000 habitantes, conforme gráfico 24:


Gráfico 24: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No período de 2010 a 2018, em Limeira notou-se uma grande oscilação em relação à taxa de mortalidade devido a AVC, conforme o gráfico 25:


Gráfico 25: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

As internações devido a IAM, em Limeira, no período de 2010 a 2018 demonstram aumento de 2010 a 2014, com queda até 2017, e novamente elevação em 2018, conforme gráfico 26:


Gráfico 26: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Os custos referentes a internações, devido a IAM demonstram um aumento até 2012 a 2014, com queda até 2017 a 2018, conforme gráfico 27:


Gráfico 27: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação a óbitos e taxa de mortalidade, observou-se um aumento de 2010 a 2018, conforme gráfico 28:

Gráfico 28: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira




Fonte: Ministério da Saúde, 2018

5.3.3 Comparação Franca, Ribeirão Preto, Limeira

Quando se comparam as internações ocorridas devido a HAS, nas cidades de Franca, Ribeirão Preto e Limeira, observa-se um número de pacientes internados/100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, muito superior em Ribeirão Preto, como demonstra o gráfico 29:


Gráfico 29: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação aos custos devido a HAS, notou-se o mesmo comportamento nas três cidades, como observado no gráfico 30:

Gráfico 30: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto




Fonte: Ministério da Saúde, 2018

As internações devido a AVC revelam um absoluto predomínio em Ribeirão no ano de 2010, com progressão mais lenta, ao longo dos anos, enquanto

Franca e Limeira apresentaram um crescimento muito maior nos anos seguintes, com uma diferença mínima em 2018, conforme gráfico 31:


Gráfico 31: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Os custos com AVC, de 2010 a 2018, nas cidades de Franca, Ribeirão Preto e Limeira, apresentaram um aumento constante, e o de Limeira foi mais expressivo, exibido no gráfico 32:


Gráfico 32: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação à taxa de mortalidade por AVC, em Franca houve aumento de 2010 (20,99) até 2013 (33,87), com posterior queda significativa até 2018 (11,71). Em Ribeirão houve queda progressiva de 2010 (17,71) para 2018 (9,94). Em Limeira ocorreu uma oscilação mas sem queda expressiva, conforme gráfico 33:


Gráfico 33: taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

As internações por IAM em Franca mostram aumento de 2010 a 2018. Ribeirão Preto apresenta um número bem mais expressivo de internações em 2010, com pequeno aumento de 2010 a 2018. Em Limeira verifica-se oscilação neste período, uma diminuição de 2014 para 2018, como demonstrado no gráfico 34:


Gráfico 34: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No tocante aos custos com IAM, Franca apresenta um aumento progressivo de 2010 a 2017, com recuo em 2018, condizente à queda do número de pacientes internados. Em Ribeirão Preto houve um aumento progressivo dos custos, não proporcional aos números de pacientes internados. Limeira apresenta uma queda de custos, concordante com a diminuição do número de pacientes internados, segundo o gráfico 35:


Gráfico 35: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No gráfico 36, onde se demonstram os óbitos ocorridos de 2010 a 2018 devido a IAM em Franca, Ribeirão Preto e Limeira, pode-se constatar que em Franca houve um aumento de 2010 a 2013, com diminuição até 2015, e um novo pico em 2016, com queda importante em 2017 e 2018. Ribeirão Preto apresenta queda progressiva de 2010 a 2018, e Limeira demonstra uma oscilação, com pico em 2011 e, após, queda até 2017, com novo aumento em 2018.

Gráfico 36: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

6 DISCUSSÃO

Esta pesquisa demonstrou um elevado número de pacientes hipertensos (39,4%), que, apesar de estarem em uso de medicamentos anti-hipertensivos, não apresentaram controle adequado à MAPA na cidade de Franca. Estes dados estão em concordância com os de Nogueira et al. (2010, p. 103), onde se constata que 39,9% dos pacientes hipertensos em tratamento com anti-hipertensivos não estavam controlados; e diferem dos de Souza et al. (2014), que apresentam índice de 66,3% que não estavam controlados. Nobre et al. (2009), em um levantamento de 2.810 pacientes, constataram que 37,7% eram masculinos e 62,3% femininos, muito diferente do atual levantamento. Verificou 242 (8,4%) pacientes tabagistas, número idêntico a nossa pesquisa. Em relação à obesidade, através do IMC, identificou 38,7% como obesos, taxa inferior à observada em nosso levantamento. No tocante a pacientes hipertensos em uso de hipotensores, constatou que 46,7% não estavam com PA controlada, sendo este número superior ao observado em Franca.

Freitas et al. (2002, p. 117), em um estudo transversal, de 1.210 pacientes em acompanhamento médico, no mínimo por seis meses, com dados coletados de prontuários médicos e de enfermagem, constataram que a taxa de controle pressórico encontrada foi de 20,9% entre os 1.210 pacientes, e de 23,4% entre os hipertensos diabéticos (n=290). Apesar das baixas taxas de controle, 70% dos pacientes usavam um a dois anti-hipertensivos. Houve uma alta prevalência de obesos (38%) e as mulheres apresentaram maior índice de obesidade abdominal do que os homens (90% vs 82%, $p < 0,05$). Entre eles, os de maior índice de massa corpórea tiveram controle menor da pressão arterial. Esses dados, de não controle de pressão arterial, de 79,1% em hipertensos em uso de medicamento, são bem maiores do que os encontrados em nossa pesquisa, que foi de 39,4%.

Rosário et al. (2009, p. 617), em 1.003 indivíduos maiores de 18 anos analisados, observou prevalência de HAS de 30,1%. Entre os hipertensos (n=302), 73,5% sabiam dessa condição, 61,9% faziam tratamento, e apenas 24,2% tinham a PA controlada. Observou-se a associação positiva entre HAS e idade; analfabetismo; escolaridade inferior a oito anos; $IMC \geq 25\text{kg/m}^2$; circunferência da cintura aumentada e muito aumentada; razão cintura-quadril (RCQ) em faixa de

risco; sedentarismo e etilismo. Este trabalho também demonstra um alto índice de não controle da PA (75,8%) em relação ao encontrado em nossos pacientes.

Dados do SIH-SUS demonstram um aumento de internação hospitalar devido a HAS, AVC e IAM no período de 2010 a 2018, na cidade de Franca, com declínio na taxa de óbitos.


Nota-se, também, um aumento crescente de gastos totais relativos a internação por HAS, AVC e IAM.

Ribeirão Preto tem um número muito maior de internações e custos devido a HAS. Em relação a AVC, inicialmente Ribeirão Preto apresenta um número bem superior de internações e custos, sendo que, Limeira e Franca apresentam um aumento no período de 2010 a 2018 e se equiparam a Ribeirão Preto; e Limeira, em 2018, mostra um maior custo com AVC. Este aumento de custos em Limeira merece pesquisas para ser explicado. Apesar de Limeira apresentar os maiores custos com AVC, a taxa de mortalidade é a maior entre as três cidades, e está em ascensão. Este fato também merece investigação para ser explicado.

Devido a IAM há um número muito superior de internações e custos em Ribeirão Preto. Quanto à taxa de mortalidade, observou-se uma queda ao longo dos anos de 2010 a 2018, em Franca e Ribeirão Preto, devido a IAM. Em Limeira houve ligeira queda, com aumento em 2018.

Comparando o número de internações devido HAS de Franca com a média dos municípios do Estado de São Paulo, verificamos uma queda de 2013 a 2015 com elevação de 2015 a 2018, enquanto no estado de São Paulo há uma queda substancial, progressiva, nestes nove anos. Apesar desta queda observada, Franca ainda tem um número de internações menor, conforme demonstra o gráfico 37:


Gráfico 37: internações por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Observamos um comportamento muito parecido em relação aos custos, conforme o gráfico 38:


Gráfico 38: custos por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

No gráfico 39 pode-se observar um aumento progressivo de internações por AVC em Franca, e na média dos municípios, não. Talvez esse aumento seja devido a Franca ser região administrativa do estado, e vários municípios encaminharem seus pacientes para tratamento especializado.


Gráfico 39: internações por AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Os custos devido a AVC aumentaram significativamente, acompanhando o aumento do número de internações, conforme gráfico 40:


Gráfico 40: custos devido AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Em relação a internações devido a IAM há um aumento progressivo do número de pacientes internados, tanto em Franca como na média dos municípios, sendo em Franca mais acentuado, e de 2017 para 2018 houve uma queda em Franca, como demonstrado no gráfico 41:


Gráfico 41: internações por IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Os custos devido a IAM também apresentam um aumento progressivo, tanto na média dos municípios, como em Franca, sendo mais acentuado em Franca, com uma queda de 2017 para 2018, demonstrado no quadro 42:

Gráfico 42: custos devido a IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios do estado de São Paulo



Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Estes dados trazem uma preocupação, pois, tanto o aumento do número de internações, como sequelas que podem resultar devido a essas patologias, pioram a qualidade de vida e o desenvolvimento social. Também fazem refletir quanto ao aumento dos custos sobre o impacto no desenvolvimento econômico. Todos esses fatores conduzem a ponderar sobre o porquê de pacientes hipertensos, em uso de medicamentos, não estarem com a pressão controlada. Algumas questões têm que ser levantadas: os pacientes estão em uso correto dos medicamentos? Estão tendo acesso a consultas de monitoramento? Os medicamentos são de boa qualidade? Estão sendo orientados quanto à gravidade do problema?

7 CONCLUSÃO

Concluindo, a Hipertensão Arterial é uma patologia muito prevalente, com repercussões sérias, que, se não controlada adequadamente, leva a uma piora de qualidade de vida e desenvolvimento social, com aumento de custos e repercussão no desenvolvimento econômico.

Em Franca há um grande número de pacientes portadores de HAS (39,4%), em uso de medicamentos, cuja pressão arterial não está controlada. Apesar deste grande número de pacientes não controlados, observamos números muito superiores em outras localidades.

Houve um aumento do número de internações e custos devido a AVC e IAM, no período de 2010 a 2018, em Franca.

Em relação a internações e custos devido a HAS, IAM e AVC em Franca, Ribeirão Preto e Limeira, no período de 2010 a 2018, os dados são divergentes, e pesquisas posteriores devem ser feitas para tentar responder a essas divergências.

Conclui-se que, realmente, existe uma necessidade de intervir no atendimento dos pacientes hipertensos, para favorecer a prevenção de complicações e diminuir os custos, e, dessa forma, contribuir para um melhor desenvolvimento social e econômico.

Os gestores dos programas de serviços de saúde devem dar prioridade à questão, e ter como objetivo o controle adequado da pressão arterial, através de consultas disponíveis para os pacientes de acordo com suas necessidades, fornecer medicamentos e orientar sobre a gravidade, as consequências e sequelas de sua patologia, se não tratada adequadamente; além de orientações sobre mudança de estilo de vida no auxílio do controle da HAS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABIKO, A. K. **Introdução à gestão habitacional**. São Paulo, EPUSP, 1995. Texto técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/12.
- ALMEIDA, M. A. B.; GUTIERREZ, G. L.; MARQUES, R. **Qualidade de Vida**. São Paulo. Escola de Artes, Ciências e Humanidades-USP. 2012, p. 1-40.
- ASSIS, L. C.; SIMÕES, M. O. S.; CAVALCANTI, A. L. **Políticas públicas para monitoramento de hipertensos e diabéticos na atenção básica, Brasil**. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde. 2012; 14(2): p. 65-70.
- AZEVEDO, A. L. S.; SILVA, R. A.; TOMASI, E.; QUEVEDO, L. A. **Doenças crônicas e qualidade de vida na atenção primária à saúde**. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(9):1774-1782, set, 2013.
- BAZZANELA, S. L. **Saúde, desenvolvimento humano e regional**. Saúde Meio Ambiente v.3, n. 2, p. 3-18, jul./dez. 2014.
- BEZERRA, A. L. A.; BEZERRA, D. S.; PINTO, D. S.; BONZI, A. R. B.; PONTES, R. N. M.; VELOSO, J. A. P.. **Perfil epidemiológico de idosos hipertensos no Brasil: uma revisão integrativa**. Rev. Med. (São Paulo). 2018 jan.-fev.;97(1): p.103- 107.
- BORGES, J. W. P.; MOREIRA, T. M. M.; SCHMITT, J.; ANDRADE, D. F.; BARBETTA, P. A.; SOUZA, A. C. C.; LIMA, D. B. S.; CARVALHO, I. S. **Medição da qualidade de vida em hipertensão arterial segundo a teoria da resposta ao item**. Revista de Saúde Pública-USP. 2017, p. 1-11.
- BRAGA FILHO, H. **Globalização em Franca: a reorganização industrial e economia informal**. 2010 - Dissertação de Mestrado - FACEF.
- BRITO, G. V. **Acidente vascular cerebral no Brasil: estimativa contemporânea do custo da doença no período hospitalar**. Curso de Especialização em Economia da Saúde do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 2017, p. 1-45.
- CARRIJO, D.; OLIVEIRA, C. A. H. S. **Saúde Pública: condicionantes sociais da hipertensão arterial sistêmica**. I Seminário Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. 2014, Franca-SP.
- CARVALHO, M. B.; SIQUEIRA, L. B.; SOUZA, A. L. L.; JARDIM, P. C. B. V. **A influência da hipertensão arterial na qualidade de vida**. Arquivos Brasileiros Cardiologia. 2013, p. 164-174.
- DANTAS, R. C.; SILVA, J. P.; DANTAS, D. C.; RONCALLI, A. G. **Fatores associados às internações por hipertensão arterial**. Official Publication of the Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 2018, p. 1-7.

ESPÍRITO-SANTO, P. S. M. F.; OLIVEIRA, P. T.; RIBEIRO, D. F. **O conceito de desenvolvimento social sob a ótica do pensamento complexo.** Anais do 4º Congresso Brasileiro de Sistemas - Centro Universitário de Franca Uni-FACEF - 29 e 30 de outubro de 2008.

FARIA, T. E. **Qualidade de vida de pacientes hipertensos da equipe de saúde da família águas claras.** Mariana-MG. REGIONAL. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de atenção básica em saúde da família - Universidade Federal de Minas Gerais -, para obtenção de certificado de especialista. 200.

FREITAS, J.B.; TAVARES, A.; KOHLMANN, O. J.; ZANELLA, M. T.; RIBEIRO, A. B. **Estudo Transversal sobre o Controle da Pressão Arterial no Serviço de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP.** Arq Bras Cardiol, volume 79 (nº 2), 117-22, 2002

GADELHA, C. A. G. **Saúde e desenvolvimento:** uma nova abordagem para uma nova política. Rev. Saúde Pública. 2012; 46 (supl.): p. 5-8.

_____. **Desenvolvimento e saúde.** Valor econômico; 2012. p. 1-5.

GADELHA, C. A. G.; COSTA, L. S. **A saúde na política nacional de desenvolvimento. Um novo olhar sobre os desafios da saúde.** Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. vol.1. pp. 103-132.

HIPERDIA. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM): protocolo /Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Diabetes e Hipertensão Arterial. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

LAMPREIA, L. P. **Relatório Brasileiro de Desenvolvimento Social.** Estudos Avançados 9 (24), 1995, p. 1-66.

LESSA, I. **Impacto social da não-adesão ao tratamento da hipertensão arterial.** Rev. Bras. Hipertens. vol.13 (1): 39-46, 2006.

LOTUFO, P. A. **Epidemiologia da hipertensão arterial no Brasil.** In: SERRANO JR., C. V.; TIMERMAN, A.; STEFANINI, E., editores. Tratado de Cardiologia SOCESP. Barueri: Manole; 2009. p. 625-35.

MACHADO, L. E.; CAMPOS, R. **O impacto da diabetes melito e da hipertensão arterial para a saúde pública.** Saúde Meio Ambiente. 2014. p. 53-61.

MALACHIAS, M. V. B.; SOUZA, W. K. S. B.; PLAVNIK F. L.; RODRIGUES, C. I. S.; BRANDÃO, A. A.; NEVES, M. F. T., et al. **7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial.** Arq. Bras. Cardiol. 2016; 107 (3supl.3):1-83.

MARINHO, M. G. S.; CESSÉ, E. A.; BEZERRA, A. F. L.; SOUSA, I. M. C.; FONTBONNE, A.; CARVALHO, E. F. de. **Análise de custos da assistência à saúde aos portadores de diabetes melito e hipertensão arterial em uma**

unidade de saúde pública de referência em Recife – Brasil. Arq. Bras. Endocrinol. Metab. 2011, p. 406-411.

MARTINS, L. M.; FRANÇA, A. P. D.; KIMURA. **Qualidade de vida de pessoas com doença crônica.** Rev. latino-am. enfermagem. 1996, p. 5-18.

MARTINS, R. D.; VAZ, J. C.; CALDAS, E. L. **A gestão do desenvolvimento local do Brasil:** (des)articulação de atores, instrumentos e território. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro. 2010, p. 559-590.

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. **Qualidade de vida e saúde:** um debate necessário. Ciência & Saúde Coletiva, 2000, p. 7-18.

MISQUITA, M. **Gastos hospitalares com hipertensão arterial e suas complicações no sistema único de saúde:** um estudo em dois hospitais públicos do Distrito Federal no período de 2012 a 2015, p. 1-43.

NOBRE, F. **Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA),** 29: 250-257. Medicina, Ribeirão Preto. 1996 abr/set; 29.

NOBRE, F.; RIBEIRO A. B.; MION JR. D. **Controle da Pressão Arterial em Pacientes sob Tratamento Anti-Hipertensivo no Brasil - Controlar Brasil.** Arq. Bras. Cardiol. 2009.

NOBRE, F.; COELHO, E. B. **Três décadas de MAPA - Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas.** Mudanças de paradigmas no diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial. Arq. Bras. Cardiol. 2003.

NOBRE, F.; MION JR., D.; GOMES, M. A. M.; BARBOSA, E. C. D.; RODRIGUES, C. I. S.; NEVES, M. F. T. et al. **6ª Diretrizes de monitorização ambulatorial da pressão arterial e 4ª Diretrizes de monitorização residencial da pressão arterial.** Arq. Bras. Cardiol. 2018; 110 (5supl.1):1-29.

NOGUEIRA, D.; FAERSTEIN, E.; COELI, C. M.; CHOR, D.; LOPES, C. S.; e WERNECK, G. L. **Reconhecimento, tratamento e controle da hipertensão arterial:** estudo pró-saúde, Brasil. Rev. Panam. Salud Publica, 2010, p. 1-7.

NUSKE, M. A.; GESSI, N. L.; ALLEBRANDT, S. L.; KELM, M. **A saúde e sua relação com o desenvolvimento:** um olhar crítico acerca da contribuição da saúde nas múltiplas escalas do desenvolvimento regional. **Territórios, redes e desenvolvimento regional:** perspectivas e desafios Santa Cruz do Sul-RS, Brasil, 13 a 15 de setembro de 2017.

OLIVEIRA, E. R. A.; CALIMAN, L. P. F.; BUBACH, S.; GOMES, M. J. **Avaliação da qualidade de vida de indivíduos portadores de hipertensão arterial.** UFES Rev. Odontol. 2008 p. 9-16.

PAULA, J. **Desenvolvimento Local:** como fazer? SEBRAE. 2008, p. 1-59.

PEREIRA, L. C. B. Trabalho originalmente preparado para curso de desenvolvimento econômico na Fundação Getúlio Vargas. Versão de 2 de março de 2006, p. 1-24.

PICKERING, T. G.; SHIMBO, D.; HAAS, D. **Ambulatory blood pressure monitoring**. The New England Journal of Medicine. 2006 jun: p. 52-8.

POUSA, J. **Qualidade de vida: uma vertente do desenvolvimento local**. 2014. Dissertação de Mestrado – FACEF.

RIBEIRO, I. J. S.; BOERY, R. N. O.; CASOTTI, C. A.; FREIRE, I. V.; BOERY, E. M. **Qualidade de vida de hipertensos atendidos na atenção primária à saúde**. SAÚDE DEBATE | Rio de Janeiro, v. 39, n. 105, p. 432-440, abr-jun 2015.

ROSÁRIO, T. M.; SCALA, L. C. N.; FRANÇA, L. C. A.; PEREIRA, M. R. G.; JARDIM, P. C. B.V. **Prevalência, Controle e Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica em Nobres – MT**. Arq Bras Cardiol 2009; 93(6): 672-678

RIOUX, Jean Pierre. **A revolução industrial: 1780-1880**. Tradução de Waldirio Bulgarelli, São Paulo: Pioneira, 1975. 216 p.

SANTAGADA, S. **Indicadores sociais: contexto social e breve histórico**. Indicadores econômicos da Fundação de Economia e Estatística Rio Grande do Sul, 1993, v.20, n. 4, p. 1-11.

SANTOS, S. S.; VASCONCELOS, D. F. S. A. **Hospitalizações por hipertensão arterial essencial em caráter de urgência no Brasil**. 2008-2012. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v.12, especial, p. 465-471, dez. 2013.

SEIDL, E. M. F.; ZANNON, C. M. L. C. **Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos**. Cad. Saúde Pública [online]. 2004, vol.20, n. 2, p. 580-588.

SINGER, Paul. **Economia política da urbanização**. 14. ed. rev. - São Paulo: Contexto, 1998. 155 p.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretriz de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Arq. Bras. Cardiol. 110, n. 5, (supl.1), maio 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO / SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. 2010; 95 (1 supl.1): 1-51

SOUZA, A. C. C.; BORGES, J. W. P.; MOREIRA, T. M. M. **Qualidade de vida e adesão ao tratamento em hipertensão arterial: revisão sistemática com metanálise**. Revista de Saúde Pública-USP. 2016, p. 1-14.

SOUZA, C. S.; STEIN, A. T.; BASTOS, G. A. N.; PELLANDA, L. C. **Controle da pressão arterial em hipertensos do programa hiperdia: estudo de base territorial**. Arq. Bras. Cardiol. 2014, p. 571- 578.

SOUZA e SILVA. **A Importância clínica dos custos diretos hospitalares em pacientes com hipertensão arterial em tratamento num hospital universitário.** Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Saúde pública, São Paulo.

STEVENS, B.; PEZULLO, L.; VERDIAN, L.; TONLINSON, J.; GEORGE, A.; BACAL, F. Artigo Original. **Os custos das doenças cardíacas no Brasil.** Arq. Bras. Cardiol. 2018, p. 29-36.

SUZANO, D. S.; ALMEIDA, M. C. S., MASSA, L. D. B.; WENGERT, M. **A importância da qualidade de vida em pacientes hipertensos.** Saúde em Redes, 2016, P. 53-6.

TELES, K. C. O. **Direito ao desenvolvimento, cidadania e trabalho: consequências de um país globalizado.** Revista da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu. 2014, p. 126-139.

TREVISOL, D. J. **Qualidade de vida e hipertensão arterial sistêmica: estudo de base populacional na cidade de Porto Alegre-RS.** Tese de doutorado. 2010, UFRGS.

VIANA, A. N. D.; ELIAS, P. E. M. **Saúde e desenvolvimento.** Ciência & Saúde Coletiva, 12 (Sup.):1765-1777, 2007.

VIEIRA, L. G. D. R. Estudo prospectivo do custo hospitalar do acidente vascular cerebral em dois hospitais privados de Joinville – Brasil. 2018, p. 1-93.