

Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

FABIO JOSÉ GAZAFFI

PESSOAS COM DIABETES E A OCORRÊNCIA DE RETINOPATIA:
contribuições para as políticas públicas

FRANCA
2022

FABIO JOSÉ GAZAFFI

PESSOAS COM DIABETES E A OCORRÊNCIA DE RETINOPATIA:
Contribuições para as políticas públicas

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar do *Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF*, para obtenção de título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário.

**FRANCA
2022**

Gazaffi, Fabio José

G252p

Pessoas com diabetes e a ocorrência de retinopatia:
contribuições para as políticas públicas. / Fabio José Gazaffi.
– Franca (SP): Uni- FACEF, 2023.
70f.;

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento regional. 2.Políticas públicas.
3.Avaliação em saúde. 4.Integralidade em Saúde.
5.Diabetes Mellitus. IT.

FABIO JOSÉ GAZAFFI

**PESSOAS COM DIABETES E A OCORRÊNCIA DE RETINOPATIA:
contribuições para as políticas públicas**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar do *Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF*, para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário.

Franca, 02 de dezembro de 2022

Orientadora: _____

Nome: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário

Instituição: Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca

Examinadora: _____

Nome: Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos

Instituição: Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca

Examinadora: _____

Nome: Profa. Dra. Maria Amélia Zanon Ponce

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)

A todas as pessoas que vivem com retinopatia diabética, que por meio do adoecimento nos fizeram refletir sobre suas reais condições de vida e necessidade de políticas públicas para minimizar suas dificuldades e sofrimento.

AGRADECIMENTOS

- A Deus, pela vida e saúde, obrigada, meu Pai, por sempre iluminar a minha caminhada e me ensinar a ter paciência.
- À minha esposa Lívia, por sempre se fazer presente em cada momento, sabendo ouvir quando necessário e opinar quando preciso. Obrigada pela parceria e amor. Juntos somos mais fortes.
- Aos meus pais José Simão e Maria Helena, pelo alicerce que se constituem na minha caminhada. Obrigada por existirem e sempre me apoiarem nos momentos de maior necessidade.
- Ao Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, por tornarem possível a viabilidade deste estudo. Muito obrigado.
- À minha orientadora Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário, por toda dedicação e empenho durante a minha trajetória neste mestrado. Obrigada pela disponibilidade e toda paciência durante a execução desta pesquisa.
- À Profa. Dra. Maria Amélia Zanon Ponce e Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos, por toda orientação durante o Exame de Qualificação. Muito Obrigado.
- Às equipes do Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Ituverava – SP e do Centro Oftalmológico de Franca – SP pela contribuição durante a coleta de dados e por prestarem uma assistência de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.
- Ao enfermeiro Israel Lucas Maza pela contribuição e apoio durante a coleta de dados.
- A todos os professores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, por serem responsáveis pela minha formação de médico pautado na responsabilidade social que permeia a profissão.

Sedare dolorem opus divinum est.

Hipócrates

RESUMO

O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países. Essa condição crônica resulta em mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde e no aumento de gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica para o tratamento das mesmas. As fragilidades do sistema de saúde podem favorecer o desenvolvimento de desfechos desfavoráveis, como a retinopatia diabética. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar o perfil social e de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética e sua relação com o desenvolvimento social. Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa. Os dados de fonte secundária foram coletados no Centro Oftalmológico do município de Franca. A população do estudo é composta por pacientes diagnosticados com retinopatia diabética e que conseguiram assistência em um serviço especializado de retina no ano de 2020, serviço este que é referência para o município de Franca. Os dados foram analisados por técnicas de análise descritivas. Participaram deste estudo 33 pessoas com retinopatia diabética, sendo que a média de idade foi de 63,5 anos; 69,7% (23) eram do sexo feminino; 87,9% (29) eram da cor branca; 60,6% (20) tiveram o diagnóstico de diabetes entre 10 e 15 anos, 21,2% (7) tiveram o diagnóstico de diabetes mais de 15 anos; 69,7% (23) faziam tratamento com insulina; 63,6% (21) aderiam o tratamento conforme orientação médica; 84,8% (28) não faltaram durante as consultas agendadas; 96,9% (32) necessitaram utilizar os serviços de urgência relacionando com a ocorrência de picos de hiperglicemia, 84,9% não faziam seguimento com médico endocrinologista e 91% não faziam seguimento com nutricionista. Diante destes achados é possível identificar que são necessárias ações para melhor execução das políticas públicas de saúde voltadas ao cuidado da pessoa com retinopatia diabética, uma vez que este agravo corresponde a uma complicação de uma condição crônica prevalente, que causa impacto no desenvolvimento social de uma comunidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Políticas públicas. Avaliação em saúde. Integralidade em Saúde. Diabetes Mellitus.

ABSTRACT

Diabetes mellitus (DM) is an important and growing health problem for all countries. This chronic condition results in changes in the pattern of use of health services and in an increase in expenses, considering the need for technological incorporation for them. Health system solutions can favor the development of unfavorable health conditions, such as diabetic retinopathy. Therefore, the objective of this work was to analyze the social profile and use of health services by people with diabetic retinopathy and its relationship with social development. This is a descriptive type of analysis study. Secondary source data were identified at the Centro Oftalmológico de Franca. A service specialized in retina for patients, with this study that is a reference for the municipality of Franca. Data were analyzed by description techniques. Thirty-three people with diabetic retinopathy participated in this study, with a mean age of 63.5 years; 69.7% (23) were female; 87.9% (29) were white; 60.6% (20) had a diagnosis of diabetes between 10 and 15 years, 21.2% (7) had a diagnosis of diabetes more than 15 years; 69.7% (23) were treated with insulin; 63.6% (21) adhered to the treatment according to medical advice; 84.8% (28) were not absent during scheduled appointments; 96.9% (32) needed to follow the emergency services related to the occurrence of hyperglycemia, 84.9% did not occur with an endocrinologist and 91% did not have a peak with a nutritionist. In view of these findings, it is possible to identify that actions are needed to better implement public health policies aimed at caring for people with diabetic retinopathy, since this condition corresponds to a complication of a prevalent chronic disorder, which causes an impact on the social development of a community.

Keywords: Development. Public policy. Health assessment. Integrality in Health. Diabetes Mellitus.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Redes poliárquicas de atenção à saúde	31
Figura 2 – Sistema fragmentado de atenção à saúde.....	32
Figura 3 – Componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas	34
Figura 4 – Representação esquemática do MACC	35
Figura 5 – Âmbitos de aplicação do MACC.....	37
Figura 6 – Modelo de rede poliárquica	38
Figura 7 – Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011	44
Figura 8 – Divisão geográfica da RAS 13 – Araraquara-Barretos-Franca- Ribeirão Preto.....	44

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Diferenças entre os sistemas fragmentados e as redes de atenção à saúde	32
Quadro 2 – Níveis de atuação nas intervenções em saúde em função dos riscos populacionais/determinantes sociais da saúde.....	36

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 – Distribuição de frequência das características sociodemográficas das pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 202149
- Tabela 2 – Distribuição de frequência do perfil de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 2021 ...50
- Tabela 3 – Distribuição de frequência do acompanhamento com oftalmologista das pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 202151

LISTA DE SIGLAS

AME	Ambulatório Médico de Especialidade
APS	Atenção Primária à Saúde
CAPs	Caixas de Aposentadorias e Pensões
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CEREST	Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
CF	Constituição Federal
CICC	Cuidados inovadores para as condições crônicas
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CROSS	Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde
DCNT	Doenças Crônicas não Transmissíveis
DM	Diabetes Mellitus
DM1	Diabetes tipo 1
DM2	Diabetes tipo 2
DRS	Departamentos Regionais de Saúde
ESF	Estratégia de Saúde da Família
GJ	Glicemia de jejum
HA	Hipertensão Arterial
HIV/AIDS	Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
IDF	Federação Internacional de Diabetes
MACC	Modelo de atenção às condições crônicas
NGA-16	Núcleo de Gestão Assistencial
OMS	Organização Mundial da Saúde
RAS	Redes de Atenção à Saúde
RD	Retinopatia diabética
RRAS	Rede Regional de Atenção à Saúde
SAD	Serviço de Atendimento Domiciliar
SAMU	Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência
SBD	Sociedade Brasileira de Diabetes
SUS	Sistema Único de Saúde

SVO Serviço de Verificação de Óbito
Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca
UPA Unidade de Pronto Atendimento

APRESENTAÇÃO

Desde o nascimento, vivemos e somos desafiados diariamente. Começamos com o aprendizado de amamentação, conforme a evolução aprendemos a interagir com o ambiente, crescemos e chegamos à escola. Tarefas que hoje vemos com simples e lúdicas, no início da fase escolar pareciam como algo inatingível até que tivéssemos domínio e tempo para aprender. E assim seguimos com nossos desafios diários...

No meu caso, decidi fazer um curso médio profissionalizante, escolhendo a área de técnico de enfermagem. Aprendi muito nesta área e vi a importância da profissão, porém, queria seguir na área médica. Um grande desafio foi o vestibular: quatro anos de estudos intensos em cursinho para conseguir atingir o objetivo de cursar medicina em uma faculdade pública... consegui! Cheguei em 2006 na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Nesse período de faculdade uma luta diária para cumprir as metas e poder aproveitar a faculdade também. No internato, o desafio de trabalhar no estágio ao longo do dia, dar plantão a noite como interno e ainda no dia seguinte passar visita nos pacientes internados antes do preceptor chegar; cansativo, porém desafio vencido que passou a ser encarado com naturalidade.

Após a Faculdade, fiquei um ano prestando serviço como médico oficial da aeronáutica, desafios diários novamente, vivendo intensamente a vida militar.

Em 2013 retorno para São José do Rio Preto, onde faço três anos de residência médica em oftalmologia e mais dois anos de *fellowship* em retina... desafios diários, observando a linha tênue entre boas notícias, como um paciente que tem uma melhora visual importante após um tratamento ou cirurgia oftalmológica e más notícias, como em ter que informar ao paciente e família que determinado problema visual seria irreversível. Muito aprendizado, não apenas técnico, mas também pessoal.

No final de 2017, já morando em Franca-SP passei no concurso para médico oftalmologista da Prefeitura Municipal. A partir do atendimento da população francana despertou-me o interesse em entender o fluxo assistencial dos pacientes

diabéticos que desenvolvem a retinopatia diabética, uma vez que tinha a percepção de que muitos pacientes possuíam poucas informações sobre a sua real situação de saúde. Durante os anos de atendimento, vários questionamentos foram feitos: Como estava estruturado os serviços de atenção básica do município de Franca - SP para controlar o diabetes mellitus? Como as pessoas tinham acesso ao médico oftalmologista geral? Quando havia a necessidade de encaminhamento para o retinólogo, qual o fluxo que o profissional devia seguir? Quanto tempo a pessoa esperava para conseguir o atendimento com o médico retinólogo? Quais os serviços e/ou municípios que atendiam a população francana para a subespecialidade de retina? Quais as dificuldades que o paciente enfrenta para se cuidar? Estas indagações fizeram com que despertasse a vontade de estudar o que estava ocorrendo, desta forma, decidi iniciar o mestrado para tentar entender a realidade assistencial do município que trabalhava. Entretanto, não encontrei materiais científicos publicados sobre a temática e decidi iniciar conhecendo a população francana com diabetes e retinopatia.

Em 2018, me interessei pela docência e busquei informações sobre o Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). Percebi que o ensino médico estava diferente da forma como eu tinha sido formado, nos tempos atuais os estudantes estão sendo formados por meio do método *Problem Based Learning* (PBL) e diversas ferramentas com base na metodologia ativa são exploradas. Essa situação me causou a vontade de enfrentar mais um desafio, e foi então que decidi prestar o concurso para professor universitário no departamento de Medicina. No início de 2019, iniciei como professor no internato em oftalmologia com os estudantes do quinto ano do curso de medicina e semanalmente realizávamos atendimento de oftalmologia às pessoas que possuíam condições crônicas como o diabetes. Ali tínhamos a oportunidade de discutir sobre aqueles questionamentos que sempre perduravam em minha mente, além de problematizar sobre a importância do médico clínico geral no atendimento integral à pessoa.

Diante destas vivências, em junho de 2019 decidi por mais um desafio: cursar o mestrado. Iniciei como aluno especial e, em 2020, prestei o processo seletivo e consegui a aprovação como pós-graduando no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF. Essa aprovação me causou um grande desafio em voltar a estudar e a escrever, já que estava trabalhando muito, a prática era o meu dia-a-dia.

Então, em 2020, ingressei na turma 13 e continuei as disciplinas, só que neste momento de forma remota, uma vez que se enfrentava a pandemia do COVID-19. Todas as disciplinas cursadas foram fundamentais para o fortalecimento da presente pesquisa que buscou conhecer o perfil das pessoas com retinopatia diabética do município de Franca-SP.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	A SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21
3	POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	24
4	MANEJO DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS E AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	29
5	ADOCIMENTO POR DIABETES E A RETINOPATIA DIABÉTICA	39
6	OBJETIVOS	42
6.1	OBJETIVO GERAL.....	42
6.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	42
7	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	43
7.1	TIPO DE ESTUDO.....	43
7.2	CENÁRIO DO ESTUDO.....	43
7.3	POPULAÇÃO DO ESTUDO.....	46
7.4	PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS.....	47
7.5	ANÁLISE DOS DADOS.....	47
7.6	ASPECTOS ÉTICOS.....	48
8	RESULTADOS	49
9	DISCUSSÃO	52
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
	REFERÊNCIAS	58
	APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de dados	66
	ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética	67

1 INTRODUÇÃO

Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes (*International Diabetes Federation* - IDF) estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade (424,9 milhões de pessoas) vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 628,6 milhões em 2045. Cerca de 79% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).

O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevida dos indivíduos com diabetes (BRASIL, 2020).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Infelizmente, muitos governos, sistemas de saúde pública e profissionais de saúde ainda não se conscientizaram da atual relevância do diabetes e de suas complicações (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009), bem como o impacto no desenvolvimento social que essa condição crônica acarreta para a sociedade.

A ascensão das condições crônicas e, especialmente o diabetes mellitus, resulta em mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde e no aumento de gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica para o tratamento das mesmas. Estes aspectos ocasionam importantes desafios e a necessidade de uma agenda para as políticas de saúde que possam dar conta dessa transição epidemiológica, que está em curso (SCHRAMM *et al.*, 2004).

A organização da atenção e da gestão dos sistemas de saúde ainda hoje se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, de programas, de ações e de práticas clínicas, existindo incoerência entre a oferta de serviços e as

necessidades de atenção (MENDES, 2012). No caso do diabetes mellitus a fragilidade do sistema de saúde pode favorecer o desenvolvimento de complicações, como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica (BRASIL, 2020)

Retinopatia diabética (RD) é uma das principais causas de perda visual irreversível no mundo, considerada a maior causa de cegueira na população entre 16 e 64 anos. Quanto maior o tempo de evolução do diabetes mellitus (DM), maior o risco de RD, sendo encontrada em mais de 90% dos pacientes com DM tipo 1 e em 60% daqueles com DM tipo 2, após 20 anos de doença sistêmica. A gravidade da RD aumenta com controle glicêmico inadequado e de acordo com o tempo de doença (BRASIL, 2020).

Diante dessa situação, se faz necessário a realização de estudos que busquem conhecer o perfil desta população, bem como avaliar a atenção à saúde dos diabéticos, considerando a ascensão dessa doença como um imperativo que exige mudanças profundas na organização dos Sistemas de Saúde. Dessa forma, esse estudo se propõe a conhecer o perfil sociodemográfico e de utilização dos serviços de saúde. Importante esclarecer que a RD foi utilizada como o evento sentinela, que orientou a busca por conhecer o perfil da população, bem como a forma como utilizam os serviços de saúde que assistem uma condição crônica como o diabetes e o estabelecimento dessa complicação considerada como evitável, tendo em vista que o evento sentinela pode ser definido como algo que não deve ocorrer se o serviço de saúde funcionar adequadamente.

Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar o perfil social e de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética e sua relação com o desenvolvimento social.

Para atingir o objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos específicos: I - Descrever o perfil sociodemográfico das pessoas com retinopatia diabética; II - Analisar a utilização dos serviços de saúde com retinopatia diabética e a influência no desenvolvimento social e III – Discutir sobre as repercussões da retinopatia diabética no desenvolvimento social.

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em um município do interior do Estado de São Paulo. As informações

foram coletas de fonte de dados secundária, sendo composto pelo Sistema de prontuário eletrônico. Os dados foram analisados por técnicas de análise descritiva.

O referencial teórico desta pesquisa está dividido em capítulos que foram estruturados para formar uma sequência no raciocínio que suporta o conteúdo. O capítulo inicial contempla a saúde como política pública e a promoção do desenvolvimento social. O capítulo seguinte discorre sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). O próximo capítulo do referencial é sobre Manejo das condições crônicas e as Redes de Atenção à Saúde (RAS). E o último capítulo aborda o adoecimento por diabetes e a retinopatia diabética. Sequencialmente são apresentados os resultados e realizada a discussão dos mesmos e as considerações finais, seguindo pela apresentação das referências bibliográficas utilizadas.

Esta pesquisa parte do pressuposto de que a assistência à saúde às pessoas com diabetes no município estudado não tem sido realizada com vistas à integralidade do cuidado, o que pode, de forma cíclica, resultar no agravamento do quadro de saúde desses usuários e propiciar a presença da retinopatia. Diante do exposto, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de produzir conhecimentos teóricos e operacionais acerca do acesso oportuno às ações e serviços de saúde voltados à prevenção, diagnóstico e tratamento do diabetes e à ocorrência de retinopatia.

2 A SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As políticas públicas, por definição, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, cor, religião ou classe social (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2022).

Segundo Secchi (2013), o termo Política Pública (*public policy*) está relacionado com orientações para a tomada de decisão e ação. As políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e de todo o processo de construção e atuação dessas decisões. São consideradas como uma diretriz que serve para guiar o enfrentamento de um problema público, problema esse entendido como coletivamente relevante e definido como a diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública (SECCHI, 2013).

Lucchese e Aguiar (2004) acreditam que políticas públicas são conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado, regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público e se materializam por meio de ação concreta de diversos sujeitos sociais e de atividades institucionais que as realizam em cada contexto e condicionam seus resultados (LUCCHESE; AGUIAR, 2004, p. 3, 9).

Assim, pode-se pensar que as políticas públicas servem para garantir o regime democrático, buscando o bem-estar de toda sociedade ao considerar os diferentes interesses coletivos. E, como pertencentes ao campo da ação social do Estado, as políticas públicas de saúde buscam a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes social e do trabalho, organizando as funções públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade (LUCCHESE; AGUIAR, 2004).

A política pública deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de

Saúde (SUS) que deverá ser universal, integral e gratuito (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2022; DUARTE; EBLE; GARCIA, 2018).

Paim e Silva (2010), ao realizarem uma contextualização histórica da universalidade, equidade e integralidade, afirmam que a incorporação desses princípios pelas políticas públicas demanda a identificação de dois vetores, o sanitarismo e os sistemas de proteção social. O primeiro defende a intervenção do Estado e o segundo, quando caracterizado como seguridade social, apresenta um caráter institucional e o acesso aos seus benefícios é inerente à condição de cidadania.

Com a Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), ampliaram-se os direitos sociais da cidadania, integrando, sob o conceito de seguridade social, a proteção dos direitos individuais (previdência) à proteção dos direitos coletivos (saúde e assistência social), ou seja, o sistema de saúde não pode ser considerado uma estrutura isolada que atua na promoção dos direitos básicos de cidadania e sim, se insere no contexto das políticas públicas de seguridade social, juntamente com a Previdência e a Assistencial Social (BRASIL, 2009, 2011a). É de suma importância que os processos de gestão passem por uma transformação qualitativa, não apenas para a efetividade da política pública de saúde, mas também para o alcance de objetivos mais amplos orientados ao desenvolvimento social (LUCCHESI; AGUIAR, 2004).

O conceito de desenvolvimento surgiu na biologia e incorporou-se nas teorias e práticas sociais, por meio da economia, sociologia, antropologia e da ciência política; e não tem uma definição esclarecedora e conclusiva, por ser considerado um fenômeno complexo. Porém, tem uma função social relevante, que é de proporcionar o bem-estar da humanidade (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012).

Desenvolvimento é entendido como um termo multidimensional e interdisciplinar, podendo ser compreendido como: uma estratégia de reprodução do capital e do controle social; uma transformação nas formas de pensar e agir; uma questão de interesse público; algo que não pode ser medido apenas na perspectiva da dimensão econômica; algo que não ocorre apenas do crescimento e do acúmulo de riqueza; e algo que requer uma gestão participativa, tendo a comunidade como protagonista e não espectadora da ação do mercado ou do Estado (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012).

Diante disso, compreendendo o desenvolvimento como um conceito complexo de múltiplas dimensões e distante dos conceitos que definem desenvolvimento às ideias de progresso, acumulação de riqueza, avanço tecnológico e crescimento econômico. Esta pesquisa está fundamentada na interrelação entre desenvolvimento humano e social embasada em Amartya Sen (2000), que amplia o conceito de desenvolvimento na perspectiva da liberdade.

Sen (2000) considera a existência do desenvolvimento à medida que se ampliam as liberdades individuais, não podendo conceber o desenvolvimento se as condições para essa expansão não se realizam. A liberdade não é apenas o fim primordial do desenvolvimento, mas é também o seu principal meio, sendo que o primeiro consiste no papel constitutivo da liberdade e o segundo como seu papel instrumental. Assim, as liberdades instrumentais, que contribuem para a capacidade geral de um indivíduo de viver mais livremente, tendo o efeito de complementar e reforçar umas às outras, são categorizadas em cinco tipos: liberdade política, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora.

Assim, concebendo o desenvolvimento enquanto um processo humano e social, Gea (2015, p. 13, grifo do autor) concluiu em sua pesquisa que o desenvolvimento humano pode ser entendido “[...] por meio das mudanças que ocorrem durante o ciclo vital, mediante as interações de diversos fatores como hereditariedade, ambiente, condição socioeconômica, cultura, [...]” entre outros, e o desenvolvimento social como “[...] um processo de ampliação das potencialidades da pessoa humana e de sua *condição de agente*, tendo como um dos instrumentais básicos deste processo as políticas públicas.”

Gadelha e Costa (2013) consideram que a saúde, como fator básico de cidadania, é parte inerente e estratégica do desenvolvimento social. Para Giovanella *et al.* (2019) a relação entre o desenvolvimento social e econômico e as condições ambientais no processo saúde-doença é reconhecida na CF de 1988, que ao definir a “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, [...]” (BRASIL, 1988), coloca que as ações e serviços públicos de saúde devem seguir as diretrizes de descentralização, participação social e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, o que alinha-se a essência da Declaração de Alma-Ata, que trouxe a promoção e proteção da saúde como essencial para a contínuo desenvolvimento econômico e social.

3 POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Nem sempre o Brasil ofertou um sistema de saúde à toda população, ao longo da história características marcantes que acompanharam as tendências políticas e econômicas colaboraram para a criação do sistema atual. A evolução da política de saúde aconteceu com estreita relação com a política econômica e social, obedecendo a ótica do capitalismo nacional e influenciado pelo capitalismo internacional. A saúde pública não se constitui como uma prioridade política, recebendo atenção apenas nos momentos do surgimento de doenças. Foram vivenciados inúmeros desafios, avanços e retrocesso até que permearam a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), que em 2022 completa 34 anos (PAIM, 2018).

Tendo em vista a compreensão do sistema de saúde brasileiro, será feito alguns apontamentos sobre a constituição da política de saúde no Brasil. Desde o período colonial até o início da República o acesso aos serviços de saúde era restrito a uma parcela pequena da sociedade que tinha condições de pagar pelos serviços, tal situação fez com que ocorresse uma crise sanitária e epidemiológica com o surgimento de várias epidemias, sendo que aqueles que não possuíam acesso aos serviços de saúde foram os mais afetados. Neste momento, a saúde não era entendida como um direito universal e sim ela era garantida apenas aqueles que trabalhadores registrados que contribuía para a Previdência Social. A responsabilidade da medicina curativa era exclusiva do Ministério da Previdência Social e o Ministério da Saúde era responsável pelas ações e programas de saúde visando o controle das doenças epidêmicas, principalmente nas áreas fundamentais para a economia agrária exportadora (BRASIL, 2011).

Neste cenário, as campanhas sanitárias foram elegidas como modelo de intervenção de combate às epidemias rurais e urbanas e as ações de saneamento básico estavam centradas nas áreas de interesse comercial. Houve a imposição legal da vacinação contra a varíola, o que desencadeou uma revolta popular (Revolta da Vacina) liderada por opositores políticos do governo e médicos contrários a vacinação (LUZ, 1995). Logo após estes acontecimentos houve o

surgimento do nascimento da saúde pública com o modelo de intervenção chamado de sanitarismo campanhista, que se caracterizava por desenvolver ações de educação sanitária da população como forma de prevenção de doenças (POLIGNANO, s/d), portanto apresentava uma abordagem coletiva e ambiental da doença e caracterizava-se pela prática autoritária (BERTOLOZZI; GRECCO, 2004). Ademais, o modelo clínico curativo-privatista, também estava presente e era realizado pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP's). As CAP's eram financiadas com recursos das empresas, do governo e dos empregados. Tinham como finalidade, além dos benefícios previdenciários, a assistência médica aos trabalhadores segurados e seus familiares (SOUTO-DE-MOURA; SOUTO-DE-MOURA, 1997).

Esta situação motivou o engajamento dos movimentos populares em busca de um sistema de saúde que fosse democrático e que todas as pessoas tivessem o direito de usufruir, foi assim que o Movimento da Reforma Sanitária ganhou força e foi conduzida pela sociedade civil, e não pelo governo ou partidos políticos ou órgãos internacionais (PAIM *et al.*, 2011).

O clima fervoroso de ampliação da cidadania favoreceu colocar a saúde na agenda política e maximizar as propostas da Reforma Sanitária. Assim a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que oportunizou um espaço importante para o debate dos problemas do sistema de saúde e de propostas de reorganizar a assistência médica e de saúde pública. Tal conferência foi de suma importância para a aprovação e criação do Sistema Único de Saúde (SUS). E todo o movimento sanitário, após várias discussões e propostas, conseguiu atingir a Assembleia Nacional Constituinte, sendo aprovada na Constituição Federal de 1988 o direito à saúde como um bem universal e de obrigatoriedade a ser ofertado pelo Estado (BRASIL, 2011).

Neste momento, o conceito saúde é visto de forma mais ampliada e não reducionista considerando que o estado de saúde não se restringe a ausência de doença. Saúde então, é entendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social., passa a ser apresentada como um valor coletivo, um bem de todos, no qual todos têm direito aos princípios de cidadania, advindo de condições de alimentação, moradia, renda, lazer e educação (BRASIL, 2011).

Partindo desta compreensão de saúde, no dia 19 de setembro de 1990 foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que instituiu o Sistema Único de

Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 1990a). E no dia 28 de dezembro de 1990 é publicada a Lei nº 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências (BRASIL, 1990b).

Muitos anos se passaram e em 2011 foi publicado o Decreto nº 7.508, que regulamentou a Lei nº 8.080 e que trouxe como responsabilidade às Comissões Intergestores (tripartite na direção nacional e bipartite na direção estadual), em todos os âmbitos, pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011b, 2021a).

Pode-se afirmar que a criação do SUS resultou de um processo social que necessitou de muita luta política, sendo que seus princípios condizem com as proposições feitas pelo movimento de redemocratização do país. O SUS rompeu com a trajetória de formação do Estado brasileiro assentada na centralização e fortaleceu a concepção de cidadania que vinculava os direitos sociais à inserção no mercado de trabalho e também tem sido capaz de estruturar e consolidar um sistema público de saúde de enorme relevância, com reconhecimento internacional. O setor saúde deve ser visto como um espaço de produção, desenvolvimento, criação de empregos e de riqueza a nação e como fator imprescindível ao desenvolvimento (BRASIL, 2009, 2011a).

Além das suas raízes primordiais de universalização, igualdade e equidade, há outros princípios importantes que são determinantes para o funcionamento do SUS, que seriam a descentralização dos serviços de saúde, a regionalização e hierarquização da rede e participação da sociedade. O intuito seria o de reforçar aos municípios para o suporte à sua população com o objetivo principal de promoção de saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 2000).

Portanto, um sistema de abrangência nacional que trabalha em conjunto com sistemas de cada estado e do Distrito Federal, que por sua vez trabalham com os sistemas de cada município. Cada esfera do governo tem suas obrigações definidas e funcionam interligando todo o sistema de saúde no país para atender à população. Quando um município não consegue oferecer determinado serviço de saúde, podem ocorrer negociações entre gestores municipais próximos

para articulação da rede. Sendo que os sistemas de saúde municipais são os maiores responsáveis pela execução direta dos serviços de saúde (BRASIL, 2000).

Muitos foram os avanços na oferta de ações e serviços de saúde ao longo de toda a criação do SUS, podendo destacar as melhorias nas ações de vigilância em saúde, o programa de controle de Tabagismo, o controle e tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS), a realização de transplantes de órgãos e tecidos, o sucesso do Programa Nacional de Imunização, manejo das condições crônicas, como é o caso do diabetes mellitus, dentre outras ações em saúde (PAIM, 2018).

Entretanto há alguns obstáculos e ameaças ao SUS que estão relacionados as várias vertentes nos campos social, político e econômico, como por exemplo: o povo brasileiro, que possui uma cultura intrínseca que favorece ao individualismo e distinção, dificultando o exercício de políticas de coletividade; a relutância de profissionais da saúde que não estão engajados nas políticas públicas de saúde; o interesse econômico de grandes grupos como operadoras de saúde, indústria farmacêutica e de equipamentos e produtos médico hospitalares (PAIM, 2018). Esses obstáculos e dificuldade do SUS são motivos de debates e preocupação, por impedirem sua consolidação e o ameaçarem de sucumbir progressivamente. Segundo Nelson Santos (2013) podemos destacar quatro obstáculos ao SUS: o baixo financiamento por parte do governo federal, o auxílio crescente de recursos federais ao mercado de planos privados, a rigidez burocratizada técnico-administrativa por parte do Estado e a privatização da gestão pública.

Na contramão do objetivo de universalidade na saúde originada do Movimento da Reforma Sanitária, o SUS foi, ao longo dos anos, sofrendo gradativa segmentação e colocando em cheque o seu caráter universal e se relacionando com outros subsistemas existentes, como os subsistemas privados - a saúde suplementar e o desembolso direto (MENDES, 2019).

Diante, dos avanços e desafios é necessária uma análise crítica e protetiva do sistema de saúde universal, que é o SUS, uma vez que sua criação resultou de um processo social que necessitou de muita luta política, sendo que seus princípios condizem com as proposições feitas pelo movimento de redemocratização do país, sendo que o setor saúde deve ser visto “[...] como um espaço de produção, desenvolvimento, criação de empregos e de riqueza para a

nação e como fator imprescindível ao desenvolvimento.” (BRASIL, 2009; 2011a, p. 29).

Por fim, a adoção de políticas públicas de saúde que visam o conceito ampliado de saúde e buscam pela valorização da dignidade humana, são respostas sociais às necessidades de saúde da população considerando os determinantes sociais do processo saúde doença.

4 MANEJO DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS E AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

As condições de saúde são circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e dos usuários (MENDES, 2012).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as condições de saúde como condições agudas e condições crônicas e essa categorização se mostra mais adequada para descrever o espectro dos problemas de saúde e referenciar a organização dos sistemas de atenção à saúde do que a classificação em doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, que foi utilizada durante os tempos anteriores (MENDES, 2012).

Apesar da relevância da classificação entre doenças transmissíveis e não transmissíveis, principalmente na etiopatogenia desses agravos, do ponto de vista da resposta social aos problemas de saúde, algumas doenças transmissíveis, pelo longo período de seu curso, estão mais próximas da lógica de enfrentamento das doenças crônicas que das doenças transmissíveis de curso rápido (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003; MENDES, 2012), como é o caso das hepatites virais, aids, tuberculose, hanseníase, dentre outras.

Diante disto, as condições que geralmente se apresentam com curso curto (inferior a três meses de duração), autolimitadas, com formas de enfrentamento do tipo episódicas, reativas e com foco na queixa-conduta, com boa resposta a tratamentos específicos, devem ser consideradas condições agudas. Diferentemente disso, as condições crônicas têm um período de duração mais ou menos longo, superior a três meses, com formas de enfrentamento contínuas, proativas, com foco nas pessoas por meio de cuidados permanentes e, nos casos de algumas doenças crônicas, tendem a apresentar-se de forma definitiva e permanente (VON KORFF *et al.*, 1997; SINGH, 2008; MENDES, 2012).

Conforme Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, considera-se doenças crônicas as que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). As condições crônicas, especialmente as doenças crônicas, se iniciam e evoluem lentamente, como é o caso da diabetes mellitus. Tais condições crônicas são multicausais incluindo hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. Normalmente, faltam padrões regulares ou previsíveis para a determinação das condições crônicas (MENDES, 2012).

Tendo esclarecido a diferença entre condição aguda e condição crônica, é possível olhar para o sistema de saúde do Brasil e interpretar o momento atual. A situação de saúde no Brasil se caracteriza por uma transição demográfica acelerada, para o ano de 2045 no Brasil será possível observar uma pirâmide etária típica de populações envelhecidas.

O envelhecimento populacional acelerado resulta em um aumento relativo das condições crônicas, em especial das doenças crônicas, porque elas afetam mais os segmentos de maior idade. Em acréscimo, a situação de saúde do Brasil pode ainda ser caracterizada por uma situação epidemiológica de tripla carga de doenças, sendo analisada a partir de vertentes como a mortalidade (aumento de mortes causadas por doenças crônicas), a carga de doenças (as condições crônicas representam 75% da carga global das doenças no país) e os seus fatores de riscos (determinantes sociais da saúde ligados aos comportamentos e aos estilos de vida respondem pelo predomínio das situações crônicas) (MENDES, 2012).

Desde 2006, implantada em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a pesquisa Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico monitora, por inquérito telefônico, a frequência e distribuição dos principais determinantes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

Os indicadores “% com excesso de peso” e “% com obesidade” tiveram um incremento significativo ao longo dos anos. O *The World Health Report 2002*, da Organização Mundial da Saúde, aponta que excesso de peso e obesidade são determinantes importantes da saúde e levam ao aumento da pressão arterial, níveis de colesterol desfavoráveis e aumento da resistência à insulina. Eles aumentam os


riscos de doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus e muitas formas de câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).

Este cenário proporcionou a implantação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, objetivando preparar o país para enfrentar e controlar as DCNT, como é o caso do: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial sistêmica, câncer, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas. O Plano aborda ainda os fatores de risco: tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade (BRASIL, 2021).

Além disso, considerando a publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político institucional do SUS, um novo contexto na organização dos serviços surge no sentido de avançar na qualificação da atenção e da gestão em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Primeiramente, considera-se as RAS como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), estando sob a coordenação da Atenção Primária à Saúde, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Redes poliárquicas de atenção à saúde




Fonte: Mendes (2011, p. 84 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 24).

Em contrapartida, os sistemas fragmentados de atenção à saúde se organizam por meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados,

incapazes de prestar uma atenção contínua à população. Geralmente, não há uma população adscrita de responsabilização, inviabilizando a gestão baseada na população. Além disso, na organização fragmentada, a Atenção Primária à Saúde não atua como centro de comunicação, não se comunica fluidamente com atenção secundária à saúde, e esses dois níveis também não se comunicam com a atenção terciária à saúde nem com os sistemas de apoio, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2 – Sistema fragmentado de atenção à saúde



Fonte: Mendes (2011, p. 84 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 25).

No Quadro 1, apresenta-se algumas características que distinguem os sistemas fragmentados e as redes de atenção à saúde.

Quadro 1 - Diferenças entre os sistemas fragmentados e as redes de atenção à saúde

SISTEMA FRAGMENTADO	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
Organizado por componentes isolados	Organizado por um contínuo de atenção
Organizado por níveis hierárquicos	Organizado por uma rede poliárquica
Coordenação inexistente	Coordenação feita pela atenção primária à saúde (APS)
Orientado para a atenção às condições agudas	Orientado para a atenção às condições crônicas e agudas
Voltado para os indivíduos	Voltado para uma população
Paciente recebe as prescrições dos profissionais de saúde	Paciente é o agente corresponsável pela própria saúde
Ação reativa	Ação proativa
Ênfase nas ações curativas	Atenção integral
Cuidado profissional	Cuidado multiprofissional
Gestão da oferta	Gestão de base populacional
Financiamento por procedimento	Financiamento por capitação ou por desfecho de condição de saúde

Fonte: Mendes (2011 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 25-26).

Com base nisso, é possível identificar que a implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS (MENDES, 2011).

No caso do cuidado em saúde de pessoas com doenças crônicas, esse deve se dar de forma integral, e isso só é possível se o cuidado for organizado em rede. Nesse sentido, a Portaria GM/MS nº 483, de 1º de abril de 2014, redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado apontando 13 princípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

O objetivo da rede é: realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde); e fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações (BRASIL, 2014). Nesse sentido, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é estruturada pelos componentes apresentados na Figura 3 (BRASIL, 2014).

É importante destacar que para o bom funcionamento da rede é necessário que o trabalho seja compartilhado entre os profissionais da atenção básica e a atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar, de modo complementar e integrado, superando a atuação fragmentada e isolada (MENDES, 2011).

Outro ponto que merece destaque é que um dos objetivos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por isso foi proposto o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) (MENDES, 2011).

O modelo de atenção à saúde, por si, organiza o funcionamento da RAS ao definir a forma como a atenção é realizada na rede e como os diversos pontos se comunicam e se articulam. Desse modo, considerando o que já se conhece sobre a RAS, pode-se inferir que, de acordo com as diretrizes para a implementação da rede, é necessária uma mudança no modelo hegemônico no

SUS, que é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das doenças crônicas.

Figura 3 – Componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas


<p>Atenção Básica</p> 	<p>É o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, ordenadora e coordenadora do cuidado, com a responsabilidade de realizar o cuidado integral e contínuo da população que está sob sua responsabilidade e de ser a porta de entrada prioritária para organização do cuidado.</p>
<p>Atenção Especializada</p> 	<p>É o conjunto de pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas que realiza serviços de urgência e emergência e ambulatoriais especializados e hospitalares, apoiando e complementando os serviços da Atenção Básica de forma resolutiva e em tempo oportuno, que se divide em: ambulatorial especializado; hospitalar; e urgência e emergência.</p>
<p>Sistemas de Apoio</p> 	<p>Constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica. Tem os seguintes subcomponentes: sistemas logísticos; regulação; e governança.</p>

Fonte: Oliveira *et al.* (2017, p. 29).

Nesse sentido, é fundamental, então, uma organização que proporcione a intersetorialidade para a promoção da saúde, contemple a integralidade dos saberes com o fortalecimento do apoio matricial, considere as vulnerabilidades de grupos ou populações e suas necessidades, qualificando e fortalecendo as ações sobre as doenças crônicas (BRASIL, 2010).

As evidências recolhidas na literatura internacional sobre os modelos de atenção à saúde e a singularidade do SUS resultaram no desenvolvimento de um modelo de atenção às condições crônicas (MACC) adaptado ao sistema público de saúde brasileiro e desenvolvido como resposta às situações de saúde de alta prevalência de condições crônicas e da falência dos sistemas fragmentados para enfrentar essas condições (MENDES, 2012). A Figura 4 representa uma adaptação ao modelo.

Figura 4 – Representação esquemática do MACC



Fonte: Mendes (2011 *apud* OLIVEIRA, *et al.*, 2017, p. 33).

O MACC corresponde a uma adaptação de três outros modelos, pirâmide de riscos, atenção crônica e determinação social da saúde. Desse modo, entende-se que os riscos populacionais e os determinantes sociais determinarão os níveis de atuação nas intervenções em saúde promocionais, preventivas e de gestão da clínica (MENDES, 2012). O Quadro 2 detalha os níveis de atuação nas intervenções em saúde, conforme a representação esquemática do MACC apresentada na Figura 4:

Quadro 2 - Níveis de atuação nas intervenções em saúde em função dos riscos populacionais/determinantes sociais da saúde

Nível 1	<ul style="list-style-type: none"> • Opera-se com a população total de uma rede de atenção à saúde. • Foco nos determinantes sociais intermediários (macrodeterminantes), condições de vida e de trabalho, o acesso aos serviços essenciais e as redes sociais e comunitárias. • Intervenções de promoção da saúde realizadas por meio de ações intersetoriais.
Nível 2	<ul style="list-style-type: none"> • Opera-se com subpopulações estratificadas por fatores de risco. • Foco nos determinantes proximais ligados aos comportamentos e aos estilos de vida. • Intervenções de prevenção de doenças, voltadas para indivíduos e subpopulações. • Modificação de fatores de risco comportamentais, tais como a alimentação inadequada, o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de peso e o uso excessivo de álcool.
Nível 3	<ul style="list-style-type: none"> • Trabalha-se com subpopulações com doença crônica estabelecida. • Condições crônicas de baixo ou médio risco ou fatores de risco biopsicológicos. • Ações de autocuidado apoiado, mas existe também a atenção clínica ao indivíduo realizada, de maneira geral, pela Atenção Básica.
Nível 4	<ul style="list-style-type: none"> • Opera-se com subpopulações com condição crônica de alto ou muito alto risco. • Autocuidado apoiado e necessidade mais significativa de cuidados profissionais, incluindo o especializado.
Nível 5	<ul style="list-style-type: none"> • Opera-se com subpopulações que apresentam condição de saúde muito complexa e que chegam a consumir a maior parte dos recursos globais de um sistema de atenção à saúde. • Intervenções podem ser realizadas pela tecnologia da gestão de caso e, em geral, exigem planos de cuidado mais singulares.

Fonte: Brasil (2013 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 34-35).

Esse modelo de atenção possui três âmbitos de aplicação para os cuidados inovadores para as condições crônicas (CICC): o âmbito MACRO, o âmbito MESO e o âmbito MICRO, conforme apresentado na Figura 5.

O âmbito micro é representado pela tríade: pessoas usuárias e suas famílias, equipe de saúde e grupos de apoio da comunidade. Os objetivos fundamentais nesse âmbito são: preparar, informar e motivar cada elemento dessa tríade (MENDES, 2012).

Figura 5 - Âmbitos de aplicação do MACC



Fonte: UNA-SUS. UFMA (2017 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 35).

O âmbito meso propõe uma mudança de foco das organizações de saúde, incorporando um modelo de atenção que dê conta não só de condições agudas mas também da atenção às condições crônicas. Para isso, atuar junto à comunidade é indispensável a fim de integrar os recursos da organização com os recursos comunitários (MENDES, 2012).

No âmbito macro o trabalho deverá ser direcionado a elaborar políticas que considerem as singularidades das condições crônicas, que desenvolvam essas redes de forma sustentável (MENDES, 2012).

A organização da estrutura de uma rede de atenção ao diabetes mellitus é fundamental para atendimento eficiente e eficaz na reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as propostas de organização de redes de atenção ao DM, há o modelo de organização de Mendes (2009 *apud* OPAS, 2010) que idealiza uma rede poliárquica, sendo a Atenção Primária o centro, e articula e organiza a rede de atenção dentro de uma linha de cuidado pactuada entre todos os níveis envolvidos. A Figura 6 apresenta esquema que ilustra esse modelo de redes de atenção:

Figura 6 – Modelo de rede poliárquica



Fonte: OPAS (2010 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2017, p. 41).

Diante deste contexto e considerando que o DM é uma doença crônica de grande impacto epidemiológico, com elevado custo para o serviço de saúde e com grande repercussão na morbimortalidade, fazendo com que seja alvo de grandes estudos, investimentos científicos e elaboração de fluxograma de atendimento, além de medidas de adesão aos tratamentos. É um problema de saúde considerado condição sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares (ALFRADIQUE *et al.*, 2009), além de complicações oftalmológicas que podem causar a perda irreversível da visão, a cegueira, impactando para sempre a qualidade de vida da pessoa e no desenvolvimento social de toda nação, seja uma região, município, estado, país ou mundo.

5 ADOECIMENTO POR DIABETES E A RETINOPATIA DIABÉTICA

Como já visto anteriormente, o diabetes mellitus (DM) é considerado como um sério problema de saúde pública em nível internacional. Para o melhor manejo da doença é recomendável utilizar a classificação do DM, que permite que seja realizado o tratamento adequado, estratégias de rastreamento de comorbidades e de complicações crônicas (SILLER *et al.*, 2020). A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda sua classificação baseada em sua etiopatogenia, sendo: diabetes tipo 1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2), diabetes gestacional (DMG) e os outros tipos de diabetes (ADA, 2014).

O diabetes tipo 2 é o mais comum em adultos, frequentemente associado a obesidade e ao envelhecimento. Seu início é insidioso e caracterizado por resistência à insulina e diminuição parcial da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. Algumas características presentes são a acantose nigra e a hipertrigliceridemia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2021).

O diabetes tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, caracterizado pela destruição das células beta do pâncreas devido autoimunidade causando deficiência importante de insulina. Tem início abrupto e necessita de insulino-terapia plena desde o diagnóstico ou após curto período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2021).

Há uma grande variedade de manifestações clínicas e condições associadas ao diabetes, porém os estudos epidemiológicos tentam elucidar a história natural e a patogênese do diabetes baseado nas alterações glicêmicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020).

Diabetes mellitus é uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo e uma das principais causas que provocam perda visual adquirida (TING; CHEUNG; WONG, 2016). Estabelecer a prevalência e a quantidade de pessoas afetadas é importante para planejamento de ações e alocação de recursos destinados ao seu cuidado (WILD *et al.*, 2004).

Em 2021, estima-se que 537 milhões de pessoas em idade de 20-79 anos apresentam diagnóstico ou ainda não receberam o diagnóstico de diabetes em

todo o mundo. A expectativa é de que este número aumente para 643 milhões em 2030 e para 783 milhões em 2045. Enquanto que a estimativa de crescimento da população mundial neste período é de 20%, a estimativa do aumento do diabetes é de 46% (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021).

Em nível nacional, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking de diabetes entre adultos de 20-79 anos. Em 2021, estima-se uma população de 15,7 milhões, aumentando para 23,2 milhões em 2045. A China lidera com 140,9 milhões em 2021 e 174,4 milhões em 2045. A mortalidade atribuível ao diabetes nas idades de 20 a 79 anos no Brasil foi de 121.082 pessoas em 2011 e cerca de 214.175 pessoas em 2021 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021).

O Diabetes é responsável por inúmeras despesas do poder público ao custear despesas de saúde. No ano de 2011, a despesa por pessoa foi de 1.038 dólares, no ano de 2021 cerca de 2.728,5 dólares e estima-se que em 2030 seja de 3.070,4 dólares, atingindo cerca de 3.269,5 dólares por pessoa em 2045 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021). Dentre as complicações, o diabetes é a causa mais frequente de cegueira nos países industrializados entre as populações ativas, correspondendo a 30% dos pacientes cegos. As alterações oculares que podem evoluir à cegueira no diabetes mellitus são: retinopatia diabética (70%), catarata, glaucoma e neuro-oftalmopatia (OTTAIANO *et al.*, 2019).

Cerca de 1 a 3% da população mundial é acometida pelo DM. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, a prevalência do DM na população brasileira com idade entre 30 e 69 anos é de 7,6%, sendo São Paulo, Porto Alegre e João Pessoa as capitais com maior prevalência. Aproximadamente 85% dos casos se manifestam após os 40 anos de idade, apenas 5% antes dos 20 anos. A RD ocorre em quase todos os pacientes com DM tipo 1 e em mais de 60% dos pacientes com DM tipo 2 (OTTAIANO *et al.*, 2019).

É sabido alguns fatores de risco para o desenvolvimento da RD:

- O tempo de evolução do Diabetes é o principal fator relacionado e cerca de 98% dos pacientes usuários de insulina há mais de 15 anos serão afetados;
- Controle metabólico, a glicemia elevada é considerada o segundo fator de risco mais importante para o desenvolvimento da RD. O controle metabólico inadequado está associado a um pior prognóstico tanto no surgimento quanto na progressão da RD:

- Tipo do DM, as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 apresentam a RD mais frequentemente e em formas mais graves do que o tipo 2;
- Genética, é o fator de risco mais estudado na atualidade;
- Outros fatores também são conhecidos, como a presença de hipertensão arterial, tabagismo, gravidez, nefropatia e fatores oculares.

Diante desta complexa condição crônica que é a retinopatia diabética é necessário esforços científicos e políticas públicas que promova a saúde, que previna as complicações, que garanta a assistência precoce e oportuna, bem como a reabilitação daqueles que necessite. Pois assistir às pessoas de forma ampla é investir em desenvolvimento da sociedade é buscar pela vivência plena, gozando da liberdade de ter saúde, educação, moradia digna e um subsídio econômico.

As políticas públicas devem ser voltadas para a melhoria de vida das pessoas com conseqüente prosperidade econômica do país, e não o contrário. A saúde deve ser o foco, no seu conceito mais amplo de bem-estar físico, psíquico e social. O cuidado das pessoas com retinopatia diabética é somente um ponto importante nesse caminho, dentre tantos outros na construção de uma sociedade saudável.

6 OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GERAL

Analisar o perfil social e de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética e sua relação com o desenvolvimento social

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I - Descrever o perfil sociodemográfico das pessoas com retinopatia diabética;

II - Analisar a utilização dos serviços de saúde com retinopatia diabética e a influência no desenvolvimento social

III – Discutir sobre as repercussões da retinopatia diabética no desenvolvimento social.

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

7.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa.

Optou-se pela pesquisa descritiva por ela possibilitar a descrição das características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre as diversas variáveis (GIL, 2017).

7.2 CENÁRIO DO ESTUDO

O presente estudo foi realizado na Casa do Diabético e no Centro Oftalmológico do município de Franca-SP, sede da 14^a Região Administrativa. Tal município está localizado no interior do Estado de São Paulo, a 400 km da capital estadual, com uma população estimada em aproximadamente 347 mil habitantes (FRANCA, 2022).

O município de Franca-SP se destaca no estado e no país, pelos seus indicadores de longevidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto per capita com saúde, infraestrutura local instalada, entre outros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022), pertence à Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 13, que se localiza na Macrorregião Nordeste do Estado de São Paulo e é composta pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, abrangendo uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a DRS VIII (Franca) é composta por 22 municípios e possui uma população estimada de 683.157 hab. (FRANCA, 2022).

Figura 7 – Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011.



Fonte: Franca (2022, p. 5).

Figura 8 – Divisão geográfica da RAS 13 – Araraquara-Barretos-Franca- Ribeirão Preto



Fonte: Franca (2022, p. 6).

O Município de Franca é composto por uma rede de estabelecimentos de saúde própria, divididos nas seguintes áreas:

- Serviços de atenção primária: 19 Unidades Básicas de Saúde, algumas com estratégia Saúde da Família;
- Serviços de urgência e emergência: 01 Pronto Socorro Adulto, 01 Pronto Socorro Infantil, 02 UPA's Jardim Anita e Aeroporto 1, 04 Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência (SAMU);
- Serviços especializados: 01 Casa do Diabético, 01 Centro Oftalmológico, 01 Centro de Saúde, 10 Ambulatórios de Especialidades (Tuberculose, Hanseníase, Renais Crônicos, Gestante de Alto Risco, Criança de Alto Risco, Centro de Convivência do Idoso, Assistência Especializadas DST/AIDS, 01 Ambulatório de Saúde Mental Adulto, 01 Ambulatório de Saúde Mental Infantil (NAIA), 01 Consultório na Rua, 01 CAPS III 24h (Centro de Atenção Psicossocial), 01 CAPS AD (Atenção Psicossocial Álcool e Droga), 01 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST), 01 Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), 01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 01 Odontomóvel, 01 Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-16), 01 Serviço de Reabilitação Auditiva; 01 Central de Regulação Médica das Urgências, 01 Central de Regulação Municipal, 01 Serviço de Verificação de Óbito (SVO), 01 Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 01 Serviço de Remoção Interna e Externa de Pacientes, Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Sanitária e Ambiental), Farmácia de Manipulação (FRANCA, 2022).
- Serviços hospitalares: a rede contratada/conveniada conta com o Complexo Hospitalar Fundação Santa Casa de Franca que integra um Hospital geral, Hospital do Coração e Hospital do Câncer (ambulatorial);

- Laboratórios contratados: 03 Clínicas de Diagnóstico por Imagem, 06 Laboratórios de Análises Clínicas; com 01 Laboratório de Citologia (FRANCA, 2022).

O local de estudo selecionado foi o Centro Oftalmológico, que é um estabelecimento de saúde que oferta assistência especializada em oftalmologia. O serviço não está equipado e organizado para oferecer atendimento de retina, porém um dos médicos servidores público é especialista em retina. O serviço de referência para atendimento aos pacientes francanos com necessidades da especialidade retina é o Ambulatório Médico de Especialidade (AME) do município de Ituverava.

O Centro Oftalmológico de Franca é mantido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Lions Club, que realizou a compra de muitos equipamentos da oftalmologia. O serviço dispõe de uma adequada infraestrutura com recepção, três consultórios oftalmológicos, uma sala de pequenas cirurgias, sala específica e de campimetria, expurgo e almoxarifado.

Ao lado do Centro Oftalmológico está situada a Casa do Diabético, que atende as pessoas que vivem com morbidades endocrinológicas, seja adulto ou infantil. Com exceção dos médicos, o gestor da unidade e a equipe multiprofissional (enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista e assistente social) são compartilhados entre os dois serviços.

A assistência à urgência e emergência aos pacientes com lesão ocular é realizada na Santa Casa de Franca, entretanto apresenta limitada infraestrutura para procedimento cirúrgico, sendo necessário referenciar os casos via sistema Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). O Hospital Santa Casa é considerado como hospital de ensino, cenário de práticas para estudantes de medicina e demais cursos da área da saúde do município e região, conta com equipe de plantão presencial de oftalmologistas (FRANCA, 2022).

7.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO

A população do estudo foi composta por pacientes diagnosticados com diabetes e retinopatia diabética que foram atendidos em serviço especializado em retina no ano de 2020.

Critérios de inclusão:

- Ser residente no município de Franca-SP;
- Ter prontuário eletrônico no sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Franca;
- Ter idade igual ou superior a 18 anos;
- Não pertencer ao sistema prisional.

7.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados em dois momentos: em um primeiro momento foram identificados e selecionados os pacientes que conseguiram atendimento em um Ambulatório Médico Especializado em retinopatia diabética que é referência para atendimento das pessoas residentes em Franca – SP, e coletadas suas informações de identificação. Em um segundo momento foi realizada a coleta de dados por meio do instrumento disponível no Apêndice A. Utilizou-se o sistema *Sigs*, que é o prontuário eletrônico do município de Franca, para coleta das informações.

O instrumento estruturado é dividido em quatro seções: I – dados sociodemográficos das pessoas com diabetes e que foram encaminhadas para especialidade de retina; II – dados clínicos das pessoas com diabetes e que foram encaminhadas para especialidade de retina; III – dados das pessoas com diabetes e acompanhamento com oftalmologia.

7.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados foram analisados por meio do programa *Statistics* 12.0. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva: medidas de frequência absoluta e frequência relativa para as variáveis categóricas.

7.6 ASPECTOS ÉTICOS

Atendendo à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), sob Parecer nº 4.972.397

Esta pesquisa não oferecerá benefícios diretos aos participantes, porém dentre seus benefícios indiretos poderá trazer contribuições tanto no campo acadêmico, quanto para a reflexão acerca desta temática, fortalecendo a avaliação de políticas públicas de saúde propiciando oportunidades de melhoria dos processos de trabalho na assistência as pessoas com diabetes, e com retinopatia diabética, em particular.

8 RESULTADOS

Foram avaliadas 33 pessoas que vivem com diabetes mellitus do tipo II e que desenvolveram retinopatia. Em relação ao perfil sociodemográfico a idade média identificada foi de 63,5 anos, desvio padrão 13,4 anos, sendo que a pessoa mais nova tinha 29 anos e a mais velha 81 anos, 69,7% (23) eram do sexo feminino, 87,9% (29) eram da raça branca, tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição de frequência das características sociodemográficas das pessoas com retinopatia diabética* no município de Franca, 2021

Características sociodemográficas		Pessoas com retinopatia diabética	
		n	%
Sexo	Feminino	23	69,70
	Masculino	10	30,30
		33	100,00
Faixa etária	18 – 39 anos	3	9,10
	40 – 60 anos	8	24,24
	> 60 anos	22	66,66
		33	100,00
Cor/Raça	Branca	29	87,90
	Negra	3	9,10
	Parda	1	3,00
		33	100,0

*Pessoas com RD participantes da pesquisa.

Fonte: Fábio José Gazaffi (2022).

Quanto aos dados clínicos das pessoas com retinopatia diabética que foram atendidas no ambulatório de especialidade oftalmologia – retina: 27 (81,9%) apresentaram registro com tempo de diagnóstico do diabetes mellitus superior a 10 anos, sendo que 23 (69,7%) faziam tratamento com insulina e 19 (57,6) via oral, sendo possível registrar mais de uma resposta no item de tratamento; 21 (63,64%) possuíam registro de adesão ao uso da medicação do diabetes, 28 (84,84%) não faltaram em consulta médica; 32 (96,96%) apresentaram registro de seguimento nos últimos cinco anos, tabela 2.

Em relação ao registro em prontuário sobre o seguimento clínico: 31 (93,93%) realizaram acompanhamento com médico clínico geral, 28 (84,85%) não realizaram acompanhamento com médico endocrinologista, 22 (66,67%) não

realizaram acompanhamento com médico de família e comunidade, 30 (90,1) não realizaram acompanhamento com nutricionista, Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição de frequência do perfil de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 2021

Dados clínicos	Pessoas com retinopatia diabética		
	n	%	
Tempo de diagnóstico de diabetes*	Até 5 anos	0	0
	6 a 10 anos	6	18,10
	Maior que 10 anos	27	81,90
		33	100,00
Tipo de tratamento do diabetes**	Reeducação alimentar	2	6,06
	Atividade física	2	6,06
	Oral	19	57,60
	Insulina	23	69,70
	Sem informação	1	3,03
Adesão ao tratamento do diabetes	Sim	21	63,64
	Não	10	30,30
	Sem informação	2	6,06
Falta em consulta médica	Sim	3	9,10
	Não	28	84,84
	Sem informação	2	6,06
Seguimento clínico nos últimos 5 anos	Sim	32	96,96
	Sem informação	1	3,04
Seguimento clínico com médico clínico geral	Sim	31	93,93
	Não	2	6,07
Seguimento clínico com médico endocrinologista	Sim	5	15,15
	Não	28	84,85
Seguimento clínico com médico de família e comunidade	Sim	11	33,33
	Não	22	66,67
Seguimento clínico com nutricionista	Sim	3	9,09
	Não	30	90,91
Seguimento clínico com outro profissional de saúde***	Sim	26	78,79
	Não	7	21,21
Registro de utilização dos serviços de urgência e emergência	Sim	32	96,96
	Não	1	3,04
Nos últimos cinco anos quantas vezes utilizou o serviço de urgência	Nenhuma vez	10	30,30
	1 a 3 vezes	13	39,39
	4 a 7 vezes	8	24,24
	8 ou mais	2	6,06

*Tempo de registro no prontuário

** Foi possível inserir mais de uma resposta nesta variável

*** Outros profissionais de saúde: Angiologista, Ginecologista, Nefrologista, Cardiologista, Dermatologista, Ortopedista, Neurologista, Hematologista, Urologista, Otorrinologista, Oncologista, Psiquiatra, Geriatria e Reumatologista.

Fonte: Fábio José Gazaffi (2022).

Sobre o acompanhamento com médico oftalmologista das pessoas vivendo com retinopatia: 23 (69,69%) não passaram em consulta com médico oftalmologista no ano de 2019, sendo que 23 (69,9%) apresentou registro como desfecho da última consulta passar por uma consulta geral de oftalmologia.

Tabela 3 – Distribuição de frequência do acompanhamento com oftalmologista das pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 2021

	Dados clínicos	Pessoas com retinopatia diabética	
		n	%
Se há registro de consulta com médico oftalmologista	Nenhuma vez	23	69,69
	1 vez	8	24,24
	2 ou mais vezes	2	6,06
Desfecho da última consulta com medico oftalmologista geral*	Consulta geral	23	69,69
	Solicitação de exame oftalmológico	14	42,42
	Encaminhamento	12	36,36
	Outros	4	12,12
	Sem informação	3	9,09

* Foi possível inserir mais de uma resposta nesta variável

Fonte: Fábio José Gazaffi (2022).

9 DISCUSSÃO

No Brasil, o perfil de acometimento da DM é mais expressivo nas mulheres, enquanto os homens apresentam aumento da prevalência nos últimos anos (SBD, 2022). Neste estudo a maioria dos participantes (69,70%) que apresentaram RD eram do sexo feminino, assim, estes dados enfatizam a necessidade de maior atenção deste público na agenda de saúde pública.

A prevenção da morbimortalidade associada a DM2 demanda participação das pessoas que vivem com a doença no papel constitutivo de alcance ao desenvolvimento social por meio do planejamento e implementação das políticas de saúde com atenção à proteção social, alinhadas ao investimento econômico, oportunidades sociais e transparência das ações pactuadas entre usuários da saúde, profissionais e gestores (SEN, 2020).

Os dados deste estudo demonstram o acometimento da RD na pessoa idosa que vive com DM2, sendo importante preditor de outras complicações micro e macrovasculares: doença renal, acidente vascular cerebral e doença cardiovascular, além da doença arterial periférica, com maior risco de ulceração e amputação dos membros inferiores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022).

A saúde é um direito previsto na CF de 1988, está se insere enquanto subsidio elementar para a cidadania e emerge do desenvolvimento social e econômico para o provimento de condições essenciais a qualidade de vida. Diante disso, a prevalência da RD e demais complicações da DM2 entre pessoas idosas também é um indicativo de fragilidades na implementação de políticas de saúde e proteção social na condução da integralidade do cuidado e acesso a bens e serviços no setor saúde.

O desenvolvimento social enquanto processo dinâmico decorre no ciclo vital com vistas as potencialidades humanas. Neste sentido, o cuidado a pessoa idosa, do sexo feminino, que apresenta RD precisa incluir elementos de sua história pessoal e social no cenário que está inserida de forma a considerar fatores biopsicossociais, econômicas e culturais que interferem no processo saúde-doença e permeiam a qualidade de vida (GEA, 2015).

No âmbito comunitário o vínculo com a unidade de saúde viabiliza a promoção da saúde e prevenção de morbidades com ênfase nas que ocorrem com maior frequência e podem resultar em danos incapacitantes ao indivíduo, especialmente a DM2. Neste contexto, apesar do controle da glicemia possibilitar a prevenção e progressão da RD segundo a SBD, os achados deste estudo apontam que a maioria dos participantes (66,67%) não apresentavam seguimento clínico com o médico da família e comunidade.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o principal nível de atenção para prevenção da morbimortalidade decorrente de complicações da DM, sobretudo no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao DM, criado em 2001, constitui importante estratégia para registro dos indicadores produzidos pelo o cadastramento de usuários no DATASUS - HIPERDIA, sendo possível analisar os fatores de risco para complicações, monitorar taxas glicêmicas e demais comorbidades, para gestão do cuidado e disponibilização dos medicamentos necessários (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 2011; CARVALHO, 2012; SANTOS; SILVA; MARCON, 2018).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda o início do rastreamento de RD no momento do diagnóstico do DM2. Esta recomendação se dá devido ao diagnóstico do DM2 frequentemente ocorrer de forma tardia, após longo período de adoecimento, assim, quanto mais precoce o diagnóstico da RD melhor o prognóstico e menor o risco de dano irreversível (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022).

A ausência de vínculo com ESF relacionada a falta de seguimento clínico neste nível de atenção compromete a integralidade do cuidado sobretudo à pessoa idosa que vive com DM2 tanto para o diagnóstico da diabetes quanto para evitar complicações que possam levar a perda da acuidade visual e cegueira. Mediante a importância do envelhecimento ativo é imprescindível o planejamento de ações e estratégias individuais e grupais de educação em saúde com orientações sobre a importância da adesão ao tratamento farmacológico, dieta adequada e atividades físicas regulares (FERREIRA; NUNES, 2019).

No que se refere a adesão ao tratamento 63,64% dos participantes deste estudo utilizam medicações recomendadas, sendo 69,70% em uso de insulina. Apesar de constituir a maioria dos participantes, a não adesão ao tratamento é alarmante entre os participantes deste estudo e o uso da insulina pode estar

relacionado a presença da DM2 descompensada, sobretudo nas pessoas com maior tempo de diagnóstico. Além disso, 96,96% já recorreu aos serviços de urgência e emergência entre uma à três vezes (39,39%) e entre quatro a sete vezes (24,24%).

Outro estudo realizado na região Sudeste do país analisou os fatores associados à descompensação da glicemia capilar (superior a 250 mg/dl) em indivíduos com DM2 que procuram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O perfil destes apontou para predominância em pessoas idosas e do sexo feminino, com menor nível de escolaridade e com média glicêmica de 306,2 mg/dL. No que se refere a necessidade de internação por complicações da DM2, no último ano, 90 (42,9%) referiram esta demanda, sendo 74 (85,1%) destas internações na UPA e 13 (14,9%) em outros hospitais, com tempo médio entre 12 horas a mais de sete dias (CAIXETA *et al.*, 2020).

Os fatores associados a complicações do DM2 são: o conhecimento insatisfatório sobre a doença, possível falta de orientações pela equipe de saúde; limitado quantitativo de profissionais, principalmente de agentes comunitários de saúde e médicos, desatualização de protocolos clínicos, ausência de referência e contra referência, falta de acesso as medicações e unidades com períodos limitados para atendimento, desconhecimento sobre localização das unidades de saúde e possível falta de atuação da equipe para o estabelecimento do diagnóstico precoce (CAIXETA *et al.*, 2020).

Os achados deste estudo revelam que 93,93% dos participantes realizam seguimento clínico com médico generalista, mas nenhum participante informou seguimento com oftalmologista. No que se refere a prevenção do grau de acometimento da acuidade visual, as pessoas que vivem com DM devem ser acompanhadas anualmente por oftalmologista. Além disso, as pessoas que vivem com DM podem ser avaliadas pelo profissional médico generalista por meio da oftalmoscopia direta e do exame de acuidade visual para seguimento clínico e prevenção de complicações no período entre as consultas oftalmológicas anuais (FERREIRA; NUNES, 2019).

Para este aspecto, a SBD recomenda estratégias que considere custo-efetividade de acordo com as características clínicas e oftalmológicas da pessoa com DM e do sistema de saúde, sendo as principais estratégias para rastreamento de RD: mapeamento de retina por meio de oftalmoscopia indireta, a biomicroscopia de fundo e a retinografia. Desta forma, recomenda-se que após rastreamento inicial

da RD, na ausência ou em casos de RD leve, o acompanhamento anual, já nos casos de RD moderada à grave, recomenda-se maior frequência de revisões (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022).

Em relação as especialidades, outros achados importantes neste estudo foram o expressivo quantitativo de participantes (84,85%) que não apresentavam seguimento com o endocrinologista e com o nutricionista (90,91%). A ausência destes seguimentos pode contribuir com o desenvolvimento da Síndrome Metabólica na maioria das pessoas com DM2, sendo a RD a principal complicação (PICON *et al.*, 2006).

A prevalência da Síndrome Metabólica está significativamente associada ao sexo feminino e excesso de peso, no qual a pessoa pode apresentar circunferência abdominal elevada somada a, pelo menos, dois dos seguintes componentes: triglicérides (TG) ≥ 150 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL (homens) ou < 50 mg/dL (mulheres); Pressão arterial (PA) $\geq 130/85$ mmHg ou uso de anti-hipertensivos; e, Glicemia de jejum (GJ) ≥ 100 mg/dL ou diagnóstico prévio de DM2, estes componentes podem ser controlados com auxílio do nutricionista e demais integrantes da equipe multiprofissional a fim de atenuar complicações sistêmicas irreversíveis não só para doenças cardiovasculares, mas para microangiopatia (PICON *et al.*, 2006; LIRA NETO *et al.*, 2018).

Urge a necessidade de ações de promoção da saúde na comunidade para prevenção do DM2, prevenção das complicações, sobretudo na população idosa com vistas a qualidade de vida e detecção precoce da RD para atenuar os níveis de acometimento grave da RD e, quando necessário, promover reabilitações necessárias com medidas farmacológicas ou cirúrgicas, além de estratégias educacionais pactuadas no âmbito da APS, visto que o controle intensivo dos componentes relacionados a Síndrome Metabólica reduz o risco de progressão de doença microvascular, incluindo RD.

O presente estudo poderá contribuir com ações estratégicas no município para a prevenção primária, secundária e terciária, de amplo acesso, no entanto, com maior atenção as pessoas idosas, do sexo feminino, que possuem mais de 10 anos do diagnóstico.

Sugere-se mais estudos que avaliem o grau de acometimento da RD na população idosa e os seguimentos clínicos alinhados as recomendações da SBD, manuais e políticas do Ministério da Saúde, a fim de avaliar a gestão do cuidado e

possíveis adequações na linha de cuidado a pessoa com DM2 no âmbito da Rede de Atenção à Saúde.

Além disso, reconhece-se as limitações do estudo, por ser um estudo retrospectivo, pode ter ocorrido viés de informação devido à circunstância da utilização de fonte secundária, que foram os registros em prontuário eletrônico, que podem conter falhas, ausências e erros de anotações.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo traçou o perfil sociodemográfico e de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética no município de Franca – SP.

Na amostra estudada, identificou-se que há um predomínio do adoecimento em mulheres, idosos e pessoas de cor branca, sendo que o tempo de diagnóstico foi superior a 10 anos, o tratamento acontece por meio da insulinoterapia e terapia oral, há utilização dos serviços de pronto atendimento e não seguimento com médico endocrinologista e nutricionista.

Diante destes achados, este estudo sugere que há necessidade de ações para melhor execução das políticas públicas de saúde voltadas ao cuidado da pessoa com retinopatia diabética, de modo a controlar os eventos agudos de condições crônicas, como é o caso do diabetes, uma vez que a agudização dos pacientes impacta de forma negativa no desenvolvimento social de uma comunidade.

REFERÊNCIAS

ALFRADIQUE, M. E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 6, p. 1337-1349, jun. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/y5n975h7b3yW6ybnk6hJwft/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 jan 2022.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, Alexandria, v. 37, suppl. 1, S81-90, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2797383/pdf/zdcS62.pdf>. Acesso em: 24 jan 2022.

BERTOLOZZI, Maria Rita; GRECCO, Rosangela Maria. As políticas de saúde no Brasil: reconstrução histórica e perspectivas atuais. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 380-398, 1996. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/nvBCWN369CLGJPQzB6k9Hyl/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 jan 2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 fev. 2022.

_____. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 18055-18059, 20 set. 1990a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 fev. 2022.

_____. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 25694-25695, 28 dez. 1990b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 10 fev. 2022.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. *Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquistas*. Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_principios.pdf. Acesso em: 2 jan. 2022.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Diabetes Mellitus*. Brasília, DF, 2006. 64 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF. Acesso em: 12 jun. 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *SUS 20 anos*. Brasília, DF, 2009. 282 p.

_____. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Sistema Único de Saúde*. Brasília, DF, 2011a. 291 p. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS, 1). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.1.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022.

_____. Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 28 jun. 2011b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm. Acesso em: 30 jan 2022.

_____. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Seminário Internacional Atenção Primária à Saúde: acesso universal e proteção social*. Brasília, DF: CONASS, 2013. 146 p. (CONASS Documenta, 27).

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. *Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos*. Brasília, DF, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf. Acesso em: 2 jan. 2022.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias*. Brasília, DF, 2013a. 28 p. Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/diretrizes-cuidado_pessoas- doencas_cronicas.pdf. Acesso em: 7 jun. 2017.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica*. Brasília, DF, 2013d. 290 p. (Cadernos de Atenção Básica n. 28, v. 2). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_queixas_comuns_cab28v2.pdf. Acesso em: 30 jan 2022.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. *Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015*. 2. ed. Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf. Acesso em: 30 jan 2022.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. *Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil: 2021-2030*. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes->

[svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view](#). Acesso em: 30 jan 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Acesso à Informação. *Gestão do SUS: Articulação interfederativa*: Comissão Intergestores Tripartite. Brasília, DF, 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/comissao-intergestores-tripartite>. Acesso em: 29 nov. 2021.

CAIXETA, Ana Carolina Magalhães *et al.* O paciente com Diabetes Mellitus tipo 2 com glicemia descompensada: onde está a falha? *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 2829-2846, mar./abr. 2020. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/8526/7337>. Acesso em: 18 març 2022.

CARVALHO, Andre Luis Menezes *et al.* Adesão ao tratamento medicamentoso em usuários cadastrados no Programa Hiperdia no município de Teresina (PI). *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, p. 1885-1892, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/yDGymybPm8SwQWtJHHVwYmj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 març 2022.

CARVALHO FILHA, Francidalma Soares Sousa; NOGUEIRA, Lídy Tolstenko; VIANA, Lívia Maria Mello. Hiperdia: adesão e percepção de usuários acompanhados pela estratégia saúde da família. *Rev Rene*, Fortaleza, v. 12, n. esp., p. 930-936, 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/4380/3348>. Acesso em: 18 març 2022.

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA. *Retina e vítreo*. 4. ed. Coordenador: Milton Ruiz Alves. Editores: Marcos Ávila, Jacó Lavinsky e Carlos Augusto Moreira Junior. 4. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2016.

DUARTE, Elisete; EBLE, Laeticia Jensen; GARCIA, Leila Posenato. 30 anos do Sistema Único de Saúde. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, DF, v. 27, n. 1, mar. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000100018>. Acesso em: 27 nov. 2021.

FERREIRA, Natália M.; NUNES, Carlos p. A importância do rastreio precoce na retinopatia diabética. *Revista de Medicina de Família e Saúde Mental*, Teresópolis, v. 1, n. 2, p. 116-124, 2019. Disponível em: <https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/medicinafamiliasaudemental/article/view/1606/637>. Acesso em: 27 jul 2022.

FRANCA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. *Plano Municipal de Saúde: 2022 a 2025*. Franca, 2022. 39 p. Disponível em: https://www.franca.sp.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=10864:plano-municipal-de-saude-2022-2025. Acesso em: 27 jul 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde no PMA. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude-no-pma>. Acesso: 30 junho 2022.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois; COSTA, Laís Silveira. A saúde na política nacional de desenvolvimento: um novo olhar sobre os desafios da saúde. *In: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: desenvolvimento, Estado e políticas de saúde.* Rio de Janeiro: Fiocruz/IPEA/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. v. 1. p. 103-132. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/895sg/pdf/noronha-9788581100159-05.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.

GEA, Samanta Antonio. *Desenvolvimento humano e social e políticas públicas: um estudo sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Franca-SP.* 2015. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Uni-Facef, Franca, 2015. 201 p. Disponível em: <https://pos.unifacef.com.br/wp-content/uploads/2015/12/DISSERTA%C3%87%C3%83O-SAMANTA-A.-GEA.pdf>. Acesso em: 30 ago 2022.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa.* 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIOVANELLA, L. De Alma-Ata a Astana. Atenção primária à saúde e sistemas universais de saúde: compromisso indissociável e direito humano fundamental. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00012219>. Acesso em: 16 out. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Cidades e Estados:* Franca. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/franca.html>. Acesso em: 30 ago 2022.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. *IDF Atlas.* 8. ed. Bruxelas: International Diabetes Federation, 2017.

LIRA NETO, José Cláudio Garcia *et al.* Prevalência da Síndrome Metabólica e de Seus Componentes em Pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 2. *Texto & Contexto Enfermagem*, Florianópolis, v. 27, n. 3, p. 1-8, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/bk5RmNhTGzygMS6Fk7NDwPN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 ago 2022.

LUCCHESI, Patrícia T. R.; AGUIAR, Dayse Santos. Descrição introdutória ao tema. *In: LUCCHESI, Patrícia T. R. (coord.). Informação para Tomadores de Decisão em Saúde Pública.* São Paulo: BIREME/OPAS/OMS, 2004. cap. 1. p. 3. (Espaço da gestão). Disponível em: http://files.bvs.br/upload/M/2004/Lucchese_Politicas_publicas.pdf. Acesso em: 07 ago 2022.

LUZ, Madel Therezinha. Notas sobre políticas de saúde no Brasil de “transmissão demográfica”: anos 80. *In: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde.*

Desenvolvimento Gerencial de unidades básicas de saúde do distrito sanitário – Projeto GERUS. Brasília, DF, 1995.

MENDES, Eugênio Vilaça. *As redes de atenção à saúde*. 2. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p. Disponível em: https://www.paho.org/bra/dmdocuments/Redes_Atencao_Saude_Eugenio_2ed.PDF. Acesso em: 7 jun. 2017.

_____. *O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família*. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 512 p. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49107/9788579670787-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 7 jun. 2017.

_____. *A construção social da atenção primária a saúde*. Brasília, DF: CONASS, 2015. 193 p. Disponível em: [https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Rede%20Cuidar/A-CONSTR-SOC-ATEN-PRIM-SAUDE%20\(1\).pdf](https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Rede%20Cuidar/A-CONSTR-SOC-ATEN-PRIM-SAUDE%20(1).pdf). Acesso em: 30 abr 2022.

_____. *Desafios do SUS*. Brasília, DF: CONASS, 2019. 868 p. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/desafios-do-sus/>. Acesso em: 30 abr 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 88, 31 dez. 2010. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=88&data=31/12/2010>. Acesso em: 7 jun. 2017.

_____. Gabinete do Ministro. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 48, 24 out. 2011. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=48&data=24/10/2011>. Acesso em: 30 abr 2022.

_____. Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014. Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 50, 2 abr. 2014. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&data=02/04/2014>. Acesso em: 7 jun. 2017.

OLIVEIRA, Ana Emília *et al.* (org.). *Redes de Atenção à Saúde: Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde*. São Luís: EDUFMA, 2017. 89 p. Disponível em: <https://docplayer.com.br/80224900-Redes-de-atencao-a-saude-rede-de-atencao-a-saude-das-pessoas-com-doencas-cronicas-no-ambito-do-sistema-unico-de-saude.html>. Acesso em: 20 set 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Atenção primária em saúde: agora mais do que nunca*. Relatório Mundial de Saúde, 2008. Brasília, DF: OPAS/Ministério da Saúde, 2010. 129 p. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/31_03_2010_9.22.37.70fbb6ffd32f6598e4de044a8feeacdc.pdf. Acesso em: 10 jan 2022.

_____. *Cuidados inovadores para condições crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial*. Brasília, DF: Organização Mundial da Saúde, 2003. 52 p. Disponível em: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1334798934Cuidados%20inovadores%20parte_001.pdf. Acesso em: 15 set 2021.

OTTAIANO, José Augusto Alves *et al.* *As condições de saúde ocular no Brasil: 2019*. São Paulo: Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2019. 102 p. Disponível em: https://www.cbo.com.br/novo/publicacoes/condicoes_saude_ocular_brasil2019.pdf. Acesso em: 10 mar 2022.

PAIM, Jairnilson Silva; SILVA, Lígia Maria Vieira da. Universalidade, integralidade, equidade e SUS. *B/S – Boletim do Instituto de Saúde*, São Paulo, v. 12, n. 2, [p. 1-8], ago. 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/5975>. Acesso em: 27 nov. 2021.

_____. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Qg7SJFjWPjvdQjvnRzxS6Mg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 jan. 2022.

_____. *et al.* *O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011.

PICON, Paula Xavier *et al.* Análise dos Critérios de Definição da Síndrome Metabólica em Pacientes Com Diabetes Melito Tipo 2. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabolismo*, São Paulo, v. 50, n. 2, p. 264-2070, abr. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abem/a/QjSmwCzT4SGKQyQ7tNBwTPD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 set 2021.

POLIGNANO, Marcus Vinícius. *História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena revisão*. Belo Horizonte: UFMG, s/d. Disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br/ces/arquivo/2165/livros>. Acesso em: 12 jul 2021.

SANTOS, Aliny de Lima; SILVA, Elza Monteiro da; MARCON, Sonia Silva. Assistência às pessoas com diabetes no Hiperdia: potencialidades e limites na perspectiva de enfermeiros. *Texto & Contexto Enfermagem*, Florianópolis, v. 27, n. 1, p. 1-10, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/gT4mFsZGMcPNTSvywD7rNBq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 jul 2022.

SANTOS, Nelson Rodrigues dos. SUS, política pública de Estado: seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca de saídas. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 273-280, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vC78GwbjwNdfQpvLRLHFGZB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 4 jan. 2022.

SANTOS, Renata Cavalcante Kuhn dos; RESENGUE, Rosa; PUCCINI, Rosana Fiorini. Puericultura e a atenção à saúde da criança: aspectos históricos e desafios. *Journal of Human Growth and Development*, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 160-165, 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v22n2/pt_06.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.

SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 897-908, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NcL6K3C5p7dRgQfZ938WtRD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SECCHI, Leonardo. *Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos*. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILLER, Alejandro F. et al. Challenges in the diagnosis of diabetes type in pediatrics. *Pediatric Diabetes*, [Berlin], v. 21, n. 7, p. 1064–1073, Jun. 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pedi.13070>. Acesso em: 10 ago 2022.

SINGH, Debbie. How can chronic disease management programmes operate across care settings and providers? Copenhagen: Regional Office for Europe of the World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies, 2008. Disponível em: https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/75474/E93416.pdf. Acesso em: 14 out 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Diretriz: 2021: Classificação do Diabetes*. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/2021/>. Acesso em: 30 mar 2022.

_____. *Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2019-2020*. São Paulo: Clannad, 2020. (Sessão: Epidemiologia e impacto global do diabetes mellitus). Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-20201.pdf>. Acesso em: 10 set 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes*. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/>. Acesso em: 10 set 2022.

SOUTO-DE-MOURA, Luís César; SOUTO-DE-MOURA, Gisela Maria Schebella. Notas de aula sobre a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 94-103, 1997. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/rngenf/article/view/4136/42823>. Acesso em: 18 fev 2020.

TING, Daniel Shu Wei; CHEUNG, Gemmy Chui Ming; WONG, Tien Yin. Diabetic retinopathy: global prevalence, major risk factors, screening practices and public health challenges: a review. *Clinical & Experimental Ophthalmology*, Surry Hills, v. 44, n. 4, p. 260-277, May 2016. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ceo.12696>. Acesso em: 16 ago 2020.

VON KORFF, Michael *et al.* Collaborative management of chronic illness. *Annals of Internal Medicine*, Philadelphia, v. 127, n. 12, p. 1097-110, 1997.

WILD, Sarah *et al.* Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care*, Alexandria, v. 27, p. 1047-1053, 2004.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (ed.). Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, 2009. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44203/9789241563871_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 fev 2020.

_____. *The European Health Report*. 2002. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2002. (European Series, n. 97). Disponível em: https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0007/98296/E76907.pdf. Acesso em: 10 fev 2020.

**APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de dados – Fonte de Dados secundária:
“Rede de atenção à saúde às pessoas com retinopatia
diabética: uma abordagem de políticas públicas”**

I – DADOS SOCIODEMOGRAFICOS DAS PESSOAS COM DIABETES E QUE FORAM ENCAMINHADAS PARA ESPECIALIZADE DE RETINA	
1.	Iniciais
2.	Sigs:
3.	Data de Nascimento:
4.	Sexo:
5.	Cor da pele:
II – DADOS CLINICOS DAS PESSOAS COM DIABETES E QUE FORAM ENCAMINHADAS PARA ESPECIALIDADE DE RETINA	
6.	Ano de diagnóstico do diabetes
7.	Tipo de tratamento do diabetes (mais atual). () Reeducação alimentar ; atividade física () Oral () Insulina
8.	Adesão ao uso da medicação do diabetes ()S ()N
9.	Falta em consultas medica ()S ()N
10.	Seguimento clinico nos últimos 5 anos ()S ()N
11.	Tipos de Seguimento Clinico 11.1 Clinico Geral ()S ()N 11.2 Endocrinologista ()S ()N 11.3 Medicina da Família ()S ()N 11. 4 Nutricionista ()S ()N 11. 5 Outros ()S ()N Especifique: _____
12.	Utilizou serviços de urgência ()S ()N
13.	Nos 5 anos quantas vezes utilizou o serviços de urgência por complicações do Diabetes _____
III – DADOS DAS PESSOAS COM DIABETES E ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGIA	
14.	Nos últimos cinco anos quantas consultas foram registradas com a oftalmologia 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021:
15.	Desfecho da última consulta de oftalmologia geral () CONSULTA GERAL () ENCAMINHAMENTO () SOLICITAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO () OUTROS. Especifique _____
16.	ACUIDADE VISUAL durante a última consulta oftalmológica

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Rede de atenção à saúde às pessoas com retinopatia diabética: uma abordagem de políticas públicas

Pesquisador: Fabio Jose Gazaffi

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 51457221.8.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 4.972.397

Apresentação do Projeto:

O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países. Essa condição crônica resulta em mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde e no aumento de gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica para o tratamento das mesmas. As fragilidades do sistema de saúde podem favorecer o desenvolvimento de desfechos desfavoráveis como a retinopatia diabética.

Diante disso, o objetivo desse trabalho descrever a rede de atenção à saúde às pessoas com retinopatia diabética no município de Franca - SP.

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa. O presente estudo será realizado na Casa do Diabético e no

Centro Oftalmológico do município de Franca. A população do estudo será composta por pacientes diagnosticados com retinopatia diabética. Os

dados serão coletados por meio da análise de prontuários e entrevistas semiestruturadas realizadas diretamente com o paciente. Os dados serão

analisados por técnicas de análise descritivas.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
 Bairro: São José CEP: 14.403-430
 UF: SP Município: FRANCA
 Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



Continuação do Parecer: 4.972.397

Objetivo Geral:

Descrever a rede de atenção à saúde às pessoas com retinopatia diabética no município de Franca - SP

Objetivo Secundário:

Objetivos Específicos

- Descrever os aspectos sociais, demográficos e econômicos das pessoas com diabetes e que apresentaram retinopatia;
- Analisar a estrutura dos serviços de atenção básica e especializada ofertada às pessoas com diabetes do município de Franca - SP.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

A pesquisa prevê riscos mínimos, como por exemplo de constrangimento durante a entrevista. Ressaltamos ainda a manutenção do sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa, mesmo após o seu término.

Benefícios:

Esta pesquisa não oferecerá benefícios diretos aos participantes, porém dentre seus benefícios indiretos poderá trazer contribuições tanto no campo acadêmico, quanto para a reflexão acerca desta temática, fortalecendo a avaliação de políticas públicas de saúde propiciando oportunidades de melhoria dos processos de trabalho na assistência as pessoas com retinopatia diabética

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa.

O presente estudo será realizado na Casa do Diabético e no Centro Oftalmológico do município de Franca - SP. Tal município está localizado no interior do Estado de São Paulo, a 400 km da capital, com uma população estimada em aproximadamente 347 mil habitantes.

A população do estudo será composta por pacientes diagnosticados com diabetes e retinopatia diabética.

Crterios de inclusão:

- Ser residente no município de Franca – SP;
- Ter idade igual ou superior a 18 anos.
- Não pertencer ao sistema prisional.

Os dados serão coletados em dois momentos:

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
 Bairro: São José CEP: 14.403-430
 UF: SP Município: FRANCA
 Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



Continuação do Parecer: 4.972.397

Em um primeiro momento serão coletadas as informações referente a fonte de dados secundário, através do prontuário eletrônico do município de

Franca – SP, conforme o apêndice I.

E em um segundo momento será realizada coleta de dados de fontes primária por meio de entrevistas (apêndice II) realizadas diretamente com o paciente durante atendimento na Casa do Diabético ou Centro oftalmológico. Após o paciente aceitar e concordar com a participação na presente pesquisa, o paciente assinará duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apêndice III.

Após a assinatura será aplicado um questionário estruturado dividido em quatro seções: I – Dados sociodemográficos e econômicos do paciente; II – Processo saúde doença da diabetes; III – Processo saúde doença da retinopatia diabética; IV – satisfação do paciente em relação ao cuidado recebido durante o desenvolvimento da retinopatia.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O TCLE foi entregue e está adequado.

A autorização da pesquisa junta a secretaria municipal de saúde foi entregue e está adequada.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências.

Sem inadequações.

Considerações Finais a critério do CEP:

O Comitê ratifica o parecer de aprovado do Relator.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1820016.pdf	03/09/2021 08:46:16		Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRostoFabioASSINADA.pdf	03/09/2021 08:45:52	Fabio Jose Gazaffi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	02/09/2021 15:25:15	Fabio Jose Gazaffi	Aceito
Declaração de	FabioJoseGazaffiAutorizacaoSMSAssi	02/09/2021	Fabio Jose Gazaffi	Aceito

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
 Bairro: São José CEP: 14.403-430
 UF: SP Município: FRANCA
 Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



Continuação do Parecer: 4.972.397

concordância	ado.pdf	15:22:46	Fabio Jose Gazaffi	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoMestradoFabioGazaffi.pdf	02/09/2021 15:20:35	Fabio Jose Gazaffi	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

FRANCA, 14 de Setembro de 2021

Assinado por:
Antonio Cezar Peron
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
 Bairro: São José CEP: 14.403-430
 UF: SP Município: FRANCA
 Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br