Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO

COBERTURA VACINAL NA INFÂNCIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19:

implicações no desenvolvimento social

TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO

COBERTURA VACINAL NA INFÂNCIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19:

implicações no desenvolvimento social

Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar do *Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF*, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi.

Machado, Tatiane Ferreira Souza

M135c

Cobertura vacinal na infância durante a pandemia COVID-19: implicações no desenvolvimento social. / Tatiane Ferreira Souza Machado. – Franca (SP): Uni-FACEF, 2022.

113 p.; il.

Orientador: Prof^a. Dr^a. Lívia Maria Lopes Gazaffi Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional.

1. COVID-19. 2. Cobertura vacinal infantil. 3. Imunização. 4. Desenvolvimento social. 5. SUS e programa nacional de vacinação - Brasil I.T.

CDD 616.91

TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO

COBERTURA VACINAL NA INFÂNCIA DURANTE A PANDEMIA **COVID-19:**

implicações no desenvolvimento social

Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Regional - Mestrado Interdisciplinar do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi.

Franca, 10 de agosto de 2022.

Orientadora:	
Nome: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi	
Instituição: Uni-FACEF Centro Úniversitário Municipal de Franca	
Examinador:	
Nome: Prof. Dra. Elaine Alvarenga de Almeida Carvalho	
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	
Examinadora:	
Nome: Prof. Dra. Raguel Rangel Cesário	_

Instituição: Uni-FACEF - Centro Universitário Municipal de Franca

Ao Leo, maior incentivador dessa jornada, meu amor, companheiro e exemplo, que me auxiliou por todo o caminho.

Ao Francisco e ao João, que são a razão para que eu procure evoluir como ser humano melhor diariamente.

Aos meus pais, Nilton e Etelvina, minhas raízes fortes.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Deus por me permitir lutar pelos meus sonhos e alcançar meus objetivos;

Agradeço ao meu marido, Leonildo, que pacientemente leu todo o meu trabalho, ajudou na correção e fez apontamentos importantes para ele. Pegou em minha mão para me dar força em cada dificuldade que encontrei e não me deixou desistir. Sem contar no seu suporte aos nossos filhos, que foi ainda maior nos momentos que me ausentei;

Agradeço aos meus filhos Francisco e João, que conviveram com a minha "ausência" nesses dois anos, mas entenderam a importância do trabalho e souberam fazer dos nossos momentos juntos um afago para o coração e o impulso para eu seguir em frente;

Agradeço aos meus pais, Nilton e Etelvina, que são com certeza a minha base, que se orgulham com cada conquista;

Agradeço aos meus irmãos, Juninho, Simone e Lívia por torcerem por mim e se alegrarem com minha vitória. E aos meus sobrinhos Gabi, Matheus e Rafa, por também vibrarem com o término dessa etapa;

Agradeço à minha orientadora, a professora Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi, que entendeu minhas limitações nesse mundo acadêmico e foi muito além da orientação, transmitiu-me os ensinamentos para a pesquisa, para a docência, para a vida;

Agradeço aos meus colegas da 13ª turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, a famosa "Turma 13", que foram companheiros de aula, ainda que na modalidade *on-line*, responsáveis por fazer com que o cumprimento dos créditos de todas as disciplinas se tornasse momentos de grandes discussões, boas risadas e aprendizados, deixando saudades ao término de cada disciplina cursada;

Agradeço aos professores da pós-graduação do Uni-FACEF por aulas tão grandiosas em conteúdo, foi proveitoso demais as discussões em cada disciplina, mesmo em temáticas distantes da minha realidade profissional, mas que levarei para a vida;

Agradeço à Ana Lúcia, Camila e Núbia, minhas companheiras de orientação, formamos um "quarteto" e nos apoiamos nas dificuldades. Grandes amizades que o Mestrado me proporcionou;

Agradeço às professoras participantes da banca, desde o exame de qualificação, a Dra. Raquel Rangel Cesário e a Dra. Elaine Alvarenga de Almeida Carvalho, que trouxeram riqueza ao trabalho com seus direcionamentos e sugestões;

Agradeço à Maria Luisa Cervi Uzun, que realizou o trabalho estatístico dessa pesquisa, atendeu minhas demandas nos mais variados dias e inusitados horários e contribui com apontamentos importantes para a mesma;

Agradeço à Laura Odette Dorta Jardim pela revisão metodológica deste trabalho.

Agradeço às secretárias da pós-graduação do Uni-FACEF, por realizarem seus trabalhos de forma tão solícita;

Agradeço às minhas colegas de plantão da UTI infantil da Santa Casa de Franca, da UTI infantil e do berçário do Hospital Regional de Franca por me ajudarem nas trocas e coberturas de plantões quando precisei me ausentar pela pesquisa;

Agradeço às minhas colegas pediatras do ambulatório-escola, Brenda e Júnia, que me substituíram quando cursei as disciplinas e ao diretor do curso de Medicina da Universidade de Franca (Unifran), Dr. Sinésio Grace Duarte, por permitir e incentivar que eu fizesse o Mestrado;

Agradeço aos meus alunos do curso de Medicina da Unifran, foi pela troca de experiência com cada turma que surgiu a minha necessidade de capacitação, razão da busca pelo aprendizado em pesquisa;

Agradeço aos pais das crianças participantes da pesquisa, sem essa disponibilidade ela não seria possível; e agradeço às crianças participantes da pesquisa, ou não, que me fazem manter o encanto pela pediatria diariamente.

Ciência não é uma escolha. É uma necessidade. Quem não enxerga isso está fadado a um obscurantismo que condena o futuro do país.

RESUMO

A importância da vacinação na infância para a saúde pública é inquestionável, com redução direta na morbidade e mortalidade infantil. A queda na cobertura vacinal rotineira é um fenômeno preocupante que vem ocorrendo nos últimos anos. A pandemia da Covid-19 modificou o modo de viver e as relações entre as pessoas, desde março de 2020. Dentre os seus efeitos indiretos está a influência na vacinação rotineira pediátrica. O presente estudo traz como objetivo discutir a cobertura vacinal infantil, durante a pandemia Covid-19, em crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca e as possíveis repercussões no desenvolvimento social. Trata-se de um estudo transversal descritivo de inquérito vacinal, com abordagem qualitativa e quantitativa, em que foram entrevistados 104 pais ou responsáveis, denominados de cuidadores, de criancas nascidas em 2016. residentes no município e matriculadas na educação infantil. Realizada a análise estatística descritiva dos dados coletados e a análise do efeito conjunto das variáveis independentes sobre o atraso vacinal por meio da regressão logística. sendo qualificadas as variáveis com valor de p 0,05. Concomitantemente, foi efetuada a análise de conteúdo das respostas obtidas com os cuidadores no que tange o motivo de atraso ou ausência das vacinas avaliadas na pesquisa. Encontrou-se que 48 (46,2%) crianças apresentaram inconformidade na vacinação do ano de 2020; 65 (62,5%) faz acompanhamento regular de puericultura com pediatra ou médico de família, sendo que destes 35 (33,7%) crianças acompanhamno SUS e 30 (28,8%) crianças acompanham no convênio médico. As 104 (100%) criancas possuíam o cartão de vacinação; 96 (92,3%), sempre se vacinaram exclusivamente no SUS. Quanto ao motivo da inconformidade do cartão vacinal da criança os motivos mais citados pelos cuidadores foram razões relacionadas à pandemia (39,6%), seguido pelo motivo de não saber ou esquecer a dose (35,4%). Foi observado que o atraso vacinal está estatisticamente associado com a pandemia e a raça do cuidador. Foram identificadas as seguintes categorias de análise qualitativa: pandemia, esquecimento, ocupação do responsável, desconhecimento (dose ou idade), medo de reação da vacina, dificuldade com a criança e adoecimento. Tais achados possibilitam identificar que a pandemia repercutiu na situação vacinal das crianças e permite ser disparadora para organização à assistência prestada e fortalecer as políticas públicas de saúde com o intuito de promover o desenvolvimento social da comunidade, além de contribuir com a produção científica sobre a temática.

Palavras-chave: Cobertura vacinal infantil. Imunização. Covid-19. Desenvolvimento social.

ABSTRACT

The importance of childhood vaccination for public health is unquestionable, with a direct reduction in infant morbidity and mortality. The drop in routine vaccination coverage is a worrying phenomenon that has occurred in recent years. The Covid-19 pandemic has changed the way of life and relationships between people since March 2020. Among its indirect effects is the influence on routine pediatric vaccination. The present study aims to discuss childhood vaccination coverage, during the Covid-19 pandemic, in children born in 2016 residing in the municipality of Franca and the possible repercussions on social development. This is a descriptive cross-sectional study of a vaccine survey, with a qualitative and quantitative approach, in which 104 parents or guardians, called caregivers, of children born in 2016, residing in the municipality and enrolled in early childhood education, were interviewed. Descriptive statistical analysis of the data collected and the analysis of the joint effect of independent variables on vaccine delay were performed through logistic regression, with variables with p value 0.05 being qualified. Concomitantly, a content analysis was performed on the responses obtained from the caregivers regarding the reason for delay or absence of the vaccines evaluated in the research. It was found that 48 (46.2%) children had non-compliance with the 2020 vaccination; 65 (62.5%) have regular childcare follow-up with a pediatrician or family doctor, and of these, 35 (33.7%) children follow the SUS and 30 (28.8%) children follow the medical plan. The 104 (100%) children had the vaccination card; 96 (92.3%) were always vaccinated exclusively in the SUS. Regarding the reason for non-compliance with the child's vaccination card, the most cited reasons by caregivers were reasons related to the pandemic (39.6%), followed by the reason for not knowing or forgetting the dose (35.4%). It was observed that vaccine delay is statistically associated with the pandemic and the race of the caregiver. The following categories of qualitative analysis were identified: pandemic, forgetfulness, occupation of the person responsible, lack of knowledge (dose or age), fear of vaccine reaction, difficulty with the child and illness. Such findings make it possible to identify that the pandemic had an impact on the vaccination situation of children and allows it to be a trigger for the organization of the assistance provided and to strengthen public health policies in order to promote the social development of the community, in addition to contributing to the scientific production on the subject.

Keywords: Child vaccination coverage. Immunization. Covid-19. Social development.

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 -	Situação vacinal de crianças nascidas em 2016, em relação às doses indicadas para o ano de 2020, Franca/SP, 202162
TABELA 2 -	Características sociodemográficas dos cuidadores de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 202163
TABELA 3 -	Características sociodemográficas de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 202164
TABELA 4 -	Estatística Descritiva do perfil das famílias participantes, Franca/SP, 202165
TABELA 5 -	Dados relacionados à vacinação de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 202165
TABELA 6 -	Características das crianças nascidas 2016 com atraso vacinal, Franca/SP, 202166
TABELA 7 -	Características dos cuidadores das crianças nascidas 2016 com atraso vacinal, Franca/SP, 202167
TABELA 8 -	Motivo da inconformidade vacinal em 2020 das crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 202168
TABELA 9 -	Modelo de regressão logística para influência de características relativas à criança com atraso vacinal, Franca/SP, 202169

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 -	Categorização da inconformidade vacinal em 2020 das crianças
	nascidas em 2016, Franca/SP, 202171

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Fluxograma da amostra da pesquisa	60
1 1001tA 1 - 1 luxograma da amostra da pesquisa	UU

LISTA DE SIGLAS

AAP Academia Americana de Pediatria

ACS Agente Comunitário de Saúde

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

APS Atenção Primária à Saúde

BVS Biblioteca Virtual em Saúde

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEP Comitê de Ética em Pesquisa

CGSCAM Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno

CNI Calendário Nacional de Imunização

CRIE Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais

DCNT Doença Crônica Não Transmissível

DTP Vacina Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Pertussis)

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente

ESF Estratégia de Saúde da Família

Gavi Aliança das Vacinas

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

MMR Vacina Tríplice Viral (Sarampo/Measles; Caxumba/Mumps;

Rubéola/Rubella)

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMS Organização Mundial de Saúde

Opas Organização Pan-Americana da Saúde

PNAISC Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança

PNI Programa Nacional de Imunização

RAS Redes de Atenção à Saúde

Sim Sociedade Brasileira de Imunizações

SBP Sociedade Brasileira de Pediatria

SINASC Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos

SUS Sistema Único de Saúde

UBS Unidade Básica de Saúde

Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca
UNICEF Fundo das Nações Unidas para Infância

Unifran Universidade de Franca

UPA Unidade de Pronto-Atendimento

UTI Unidade de Terapia Intensiva

VOP Vacina Oral de Poliomielite

WHO World Health Organization

SUMÁRIO

AP	RESENTAÇAO	. 16
1	INTRODUÇÃO	. 18
2	O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PROGRAMA NACIONAL D	E
	IMUNIZAÇÃO	. 21
3	A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE D	Α
	CRIANÇA E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	. 30
4	A RELAÇÃO ENTRE A COVID-19 E A UTILIZAÇÃO DOS	
	SERVIÇOS DE SAÚDE	. 39
5	VACINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	. 49
6	OBJETIVOS	. 55
6.1	OBJETIVO GERAL	. 55
6.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	. 55
7	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	
	TIPO DE PESQUISA	
	CAMPO DE ESTUDO	
7.3	AMOSTRA	. 57
	PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS	
	ANÁLISE DADOS	
7.6	ASPECTOS ÉTICOS	. 63
8	RESULTADOS	. 64
9	DISCUSSÃO	. 74
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	. 85
	REFERÊNCIAS	. 86
	APÊNDICE A - CARTA CONVITE AOS PAIS DOS ALUNOS DAS	3
	ESCOLAS	101
	APÊNDICE B - FORMULÁRIO UTILIZADO PARA ENTREVISTA	S
	AOS PAIS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES	102

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E	
ESCLARECIDO	106
ANEXO A - PARECER DO CEP	108
ANEXO B - CALENDÁRIO VACINAL DO ESTADO DE SÃO	
PAULO DE 2020	112

APRESENTAÇÃO

Apresentar esta dissertação é a concretização de uma trajetória em busca de aprendizagem. Cursar o mestrado, não fazia parte dos planos de uma médica que sempre amou seu contato prático com os pacientes, que leu e estudou sobre os assuntos de pediatria, seja a puericultura, a neonatologia ou a terapia intensiva pediátrica, para pôr em exercício no trabalho diário e não com o intuito de publicações ou fazer trabalhos acadêmicos. No período da graduação, não houve incentivo por parte da faculdade, e nem interesse da minha parte, para a pesquisa. Após esse período também não fui "fisgada" por essa área desde a minha formatura em 2005.

Em 2020, com toda a mudança mundial ocorrida com a pandemia Covid-19 o medo e a ansiedade, gerados por ela, levou a muitas indagações na vida de todos e comigo não seria diferente. A procura por novos objetivos, o questionamento sobre o que valia a pena na vida, entre outras interrogações, de repente veio a ideia de fazer o Mestrado. Seria uma inovação total, impulsionada pelo fato de no ano anterior eu ter dado os primeiros passos na docência, quando iniciei como preceptora no curso de Medicina da Universidade de Franca (Unifran).

Em julho de 2020, pesquisei sobre programas de pós-graduação *stricto sensu* disponíveis na cidade e justo naquele mês estava ocorrendo a inscrição para a seleção no Mestrado em Desenvolvimento Regional no Uni-FACEF.

Foi com certeza surpreendente retornar à sala de aula, mesmo que de forma remota! Aprendi muito com as disciplinas que cursei, conheci excelentes professores e tive colegas de turma de áreas completamente diferentes da minha, o que transformava as aulas numa interdisciplinaridade grandiosa. Os ensinamentos que recebi da minha orientadora professora Dra. Lívia Maria Lopes Gazzafi foram cruciais para a construção desse caminho, que ainda está tão incipiente.

A presente pesquisa foi influenciada a partir da minha vivência nas consultas pediátricas no ambulatório-escola, onde os atendimentos são realizados pelos alunos do terceiro ano da graduação em Medicina da Unifran com a minha supervisão. Os pacientes são recém-nascidos encaminhados para seguimento de puericultura no ambulatório após a alta da maternidade da Fundação Santa Casa de

Misericórdia de Franca, e também são as crianças para acompanhamento após alta hospitalar da enfermaria pediátrica do mesmo hospital.

O funcionamento do ambulatório foi alterado por alguns meses no início da pandemia, chegando a ter os atendimentos suspensos por um período, o que contribuiu com a perda de vínculo de alguns pacientes do serviço. Após seu retorno, foi notado que várias crianças apresentavam suas cadernetas com doses de vacinas faltantes ou atrasadas. Os pais referiam não ter levado na Unidade Básica de Saúde (UBS) para a vacinação devido ao medo de contágio pelo Coronavírus ou por não saberem sobre o funcionamento do serviço na pandemia.

Dessa forma, foi realizada a primeira busca na literatura acerca do tema, constatado a importância da redução na cobertura vacinal e o risco de ressurgimento de casos de doenças imunopreveníveis como um efeito secundário da pandemia da Covid-19, o que levaria a um reflexo deletério nos indicadores de saúde e no desenvolvimento social. Na ocasião ainda havia poucos trabalhos sobre o assunto, o que despertou o interesse em aprofundar na temática e fazer minha pesquisa.

1 INTRODUÇÃO

A vacinação é uma ação em saúde pública com eficácia conhecida pelos seus benefícios na prevenção de várias doenças com grande morbimortalidade, principalmente na infância. Para Weckx, Kfouri e Amato Neto (2007, p. 81): "Ao lado do fornecimento de água potável, a vacinação representa a intervenção em saúde pública que apresentou os mais notáveis resultados, especialmente considerando a relação custo-benefício." A vacinação é uma forma de proteção individual e coletiva, e é o único meio eficaz de conter doenças imunopreveníveis. O controle de tais doenças só é alcançado ao se atingir altos índices de cobertura vacinal, de forma homogênea, pelo país (BRASIL, 2003).

A imunização é um serviço de saúde essencial, haja vista seu potencial no controle de doenças que podem causar importantes sequelas ou serem letais, desse modo, ela tem influência direta na qualidade de vida da sociedade. Uma criança vacinada adoece menos, reduz a sobrecarga nos serviços de saúde e melhora o rendimento escolar por reduzir as abstenções na escola. Isso denota o papel da vacinação no desenvolvimento social de uma localidade, seja o município em estudo, o estado ou o desenvolvimento social do país.

A vacinação na infância é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e Adolescente em seu Parágrafo Único do Artigo 14 (BRASIL, 2005). Não ter acesso à vacinação pode ser considerado um tipo de privação de liberdade, quando se entende que os direitos sociais conquistados pela população, como as políticas de saúde pública, são uma forma de evitar mortes precoces e ter a oportunidade de viver com qualidade. O desenvolvimento é alcançado a partir do momento que as pessoas possam desfrutar de todas as formas de liberdade (SEN, 2007).

O Brasil possui um serviço de imunização sólido e com credibilidade mundial pelo seu sucesso alcançado. O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criado em 1973 com o sucesso da vacinação contra Varíola e a declaração de erradicação da doença nas Américas, neste mesmo ano, pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Desde então, o PNI foi ampliando sua atuação, com inclusão periódica de novos imunobiológicos, aumentando o número de salas de vacinas pelo país e melhorando a capacitação dos profissionais envolvidos com a

vacinação, culminando em altas taxas de cobertura vacinal num país com tamanha proporção geográfica (BRASIL, 2013).

A partir de março de 2020, o mundo passou a conviver com outra realidade de vida, devido à disseminação da Covid-19, doença causada pela infecção por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2 e a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar estado de Pandemia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020a). Providências foram tomadas para contenção da disseminação do vírus como o distanciamento social, o que refletiu em toda a rotina diária das pessoas, modificando também o acesso aos serviços de saúde, inclusive atingindo a vacinação infantil de rotina (SATO, 2020).

A queda da cobertura vacinal infantil coloca em risco o retorno de doenças que já estavam controladas e algumas até eliminadas. Essa é uma preocupação mundial por ser uma realidade iminente, secundária aos cuidados para mitigação da pandemia, como a restrição de horários ou fechamento de salas de vacinas em alguns países, redução das consultas de rotina como a puericultura e isolamento das pessoas em casa pelo medo de contaminação. A OMS já fez alertas nesse sentido, ainda nos primeiros meses da pandemia, para que os países se preocupem com essa perda da cobertura vacinal (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020b).

Fundamentado no exposto acima, no que concerne à importância do tema, originou-se o problema dessa pesquisa: qual a situação da cobertura vacinal de crianças de 4 anos durante a pandemia Covid-19?

O objetivo geral deste estudo é descrever a cobertura vacinal, durante a pandemia Covid-19, em crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP e discutir as possíveis repercussões no desenvolvimento social.

Para atingir o objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: a) Descrever o perfil sociodemográfico das famílias entrevistadas de crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP; b) Verificar a situação vacinal, em relação às doses das vacinas indicadas aos 4 anos conforme calendário do PNI; c) Identificar as falhas vacinais como atrasos e ausência; d) Demonstrar variáveis associados às falhas vacinais nessa faixa etária.

Trata-se de um estudo transversal descritivo de inquérito vacinal, com abordagem qualitativa e quantitativa, em que foram entrevistados 104 pais ou responsáveis, denominados de cuidadores, de crianças nascidas em 2016,

residentes no município de Franca - SP e matriculadas na educação infantil em escolas do município. Para o cálculo da amostra aleatória simples foi utilizado um nível de confiança de 95% e erro de 10%. Realizada a abordagem quantitativa com a análise estatística descritiva dos dados coletados e a análise do efeito conjunto das variáveis independentes sobre o atraso vacinal através da regressão logística, sendo qualificadas as variáveis com valor de p < 0,05.

A abordagem qualitativa foi realizada com a análise de conteúdo das respostas obtidas com os cuidadores no que tange ao motivo de atraso ou ausências das vacinas avaliadas na pesquisa.

A metodologia inicial do estudo foi alterada devido a dificuldades vivenciadas no percurso de sua execução, que foram todas detalhadas no capítulo de procedimentos metodológicos.

O referencial teórico desta pesquisa está dividido em capítulos que foram estruturados para formar uma sequência no raciocínio que suporta o conteúdo. O capítulo inicial contempla a saúde pública, a importância do Sistema Único de Saúde com a luta para prevenção do seu desmonte, mostrando seu valor e o sucesso de programas como o PNI. O capítulo seguinte discorre sobre a história da saúde na infância até a constituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) e a sua relação com a Atenção Primária à Saúde (APS).

O quarto capítulo perpassa uma reflexão sobre a influência da pandemia Covid-19 na utilização dos serviços de saúde, demarcando grupos populacionais diretamente atingidos devido as alterações sofridas com as medidas de controle da infecção. Finalizando o estudo teórico que embasou essa pesquisa, o quinto capítulo trata da relação entre a vacinação e o desenvolvimento social, uma discussão baseada no conceito de desenvolvimento e na importância da vacinação para a saúde. Sequencialmente são apresentados os resultados e realizada a discussão dos mesmos.

A pandemia ainda é vigente, mas seus efeitos indiretos já são motivo de preocupação mundial. Diante do conteúdo descrito acima sobre a temática, notase a importância do objeto de estudo dessa pesquisa, justificando-a, uma vez que a mesma visa contribuir com a produção de conhecimento científico sobre a relação da pandemia da Covid-19 com a cobertura vacinal infantil e a sua sequela no desenvolvimento social.

2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

A atenção à saúde do brasileiro desde os tempos coloniais, era elitizada e de acesso restrito a uma parcela pequena da população, mesmo após a saída da família Real do país e o início da República. Os interesses econômicos perpassavam os interesses da saúde. Como consequência uma precariedade sanitária se instalou, levando a várias epidemias no país com a maior parte da população sem acesso a nenhum tratamento. A saúde não era um direito universal, era limitado às pessoas que contribuíam para a Previdência Social, pois a responsabilidade da medicina curativa era exclusiva do Ministério da Previdência Social. Ao Ministério da Saúde cabia apenas algumas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, como controle de endemia e vacinação (BRASIL 2011).

Este foi o cenário para o surgimento de movimentos populares em busca de um modelo de saúde democrático para o país. Foi crescente a participação da sociedade no chamado "Movimento da Reforma Sanitária" (BRASIL, 2000). Uma característica dessa reforma sanitária no país, foi o fato de ser conduzida pela sociedade civil, e não pelo governo ou partidos políticos ou órgãos internacionais. (PAIM *et al.*, 2011).

A partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foram geradas as ideias bases para a reforma do setor de saúde brasileiro com a aprovação para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O movimento da Reforma Sanitária, após várias discussões e propostas, conseguiu atingir a Assembleia Nacional Constituinte, sendo aprovada na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o direito à saúde como um bem universal e de obrigatoriedade a ser ofertado pelo Estado (BRASIL, 2011).

A nova Constituição trouxe consigo um novo conceito de saúde, que seria muito além da ausência de doença, significaria constituir um bem-estar global do ser humano, com direito aos princípios de cidadania, advindo de condições de alimentação, moradia, renda, lazer e educação. Assim foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080, em 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a), que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), com as suas características principais de

universalidade, equidade e integralidade, para atender à população brasileira nesse novo conceito de saúde (BRASIL, 2011).

Uma definição básica de SUS seria o conjunto de ações e serviços em saúde. São as Leis n. 8080/90 e n. 8142/90 (BRASIL, 1990b) que definem as diretrizes do SUS e sua regulamentação, com as devidas competências nas três esferas dos governos federal, estaduais e municipais, evidenciando seu caráter descentralizador, a regulação da participação complementar dos serviços privados de saúde, a participação popular, além do gerenciamento dos recursos humanos e financeiros (BRASIL, 2011).

Para Matta (2007), há uma dificuldade em definir claramente o que seriam os princípios e diretrizes do SUS, quando se baseia nas definições encontradas na Constituição de 1988 e na Lei n. 8080/90. No entanto, considerando os princípios como a base ideológica do SUS, são constituídos da universalidade, equidade e integralidade. Assim como, de forma organizacional, para o funcionamento do SUS, as diretrizes que articulam com os princípios são a descentralização, a regionalização e hierarquização e a participação da sociedade.

Destarte, o ideal seria o sistema de abrangência nacional que trabalha em conjunto com sistemas de cada estado e do Distrito Federal, que por sua vez trabalham com os sistemas de cada município. Cada esfera do governo tem suas obrigações definidas e funcionam interligando todo o sistema de saúde no país para atender à população. Quando um município não consegue oferecer determinado serviço de saúde, podem ocorrer negociações entre gestores municipais próximos para articulação da rede. São os sistemas de saúde municipais os maiores responsáveis pela execução direta dos serviços de saúde, assim sua grande importância (BRASIL, 2000). O que é visto na prática, é uma concentração de recursos financeiros e poder por parte da União.

Na construção do SUS, um ponto relevante para a descentralização foi a participação da sociedade por meio da criação, a partir da Lei n. 8142/90, dos Conselhos de Saúde:

Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde, tendo uma atuação independente do governo, embora façam parte de sua estrutura, e onde se manifestam os interesses dos diferentes segmentos sociais, possibilitando a negociação de propostas e o direcionamento de recursos para diferentes prioridades (BRASIL, 2011, p. 27).

Após mais de 30 anos da criação do SUS, há frutos positivos que foram gerados ao longo desses anos, oriundos dos esforços de pessoas detentoras de conhecimento das diretrizes e valores do SUS e defensoras dos mesmos, que formam uma rede que interliga universidades e escolas de saúde pública, funcionários de agências e fundações, secretarias estaduais e municipais, juntamente ao Ministério da Saúde (PAIM, 2018).

Como resultado obteve-se inovações e melhorias em áreas como a vigilância sanitária, vigilância em saúde, o programa de controle de Tabagismo, o controle e tratamento de HIV/AIDS, a realização de transplantes de órgãos e tecidos, o sucesso do Programa Nacional de Imunização (PNI), dentre outras ações em saúde, como na atenção primária com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) (PAIM, 2018).

Apesar dos avanços e benefícios adquiridos com a implementação do SUS, que por várias vezes são reconhecidos mundialmente, há os grandes desafios na efetivação das políticas de saúde, devido a vários fatores influenciadores direta, ou indiretamente, como a falta de interesse político de sucessivos governos eleitos (LIMA; CARVALHO; COELI; 2018).

Segundo estes mesmos autores:

A luta pelo SUS exige a revisão do pacto político que permeia as relações Estado e sociedade e, por isto, a construção de alianças progressistas e de debates ampliados que resultem em um projeto de desenvolvimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável para o país (LIMA; CARVALHO; COELI, 2018, p. 2).

Os obstáculos e ameaças ao SUS advêm de várias vertentes nos campos social, político e econômico: o próprio povo brasileiro detém uma cultura intrínseca que favorece ao individualismo e distinção, dificultando o exercício de políticas de coletividade; a relutância de profissionais da saúde que não estão engajados nas políticas públicas de saúde; o interesse econômico de grandes grupos como operadoras de saúde, indústria farmacêutica e de equipamentos e produtos médico hospitalares (PAIM, 2018) são alguns exemplos.

Os entraves e obstáculos ao SUS são fonte de debates e preocupação, por impedirem sua real consolidação e o ameaçarem de sucumbir progressivamente. Segundo Nelson Rodrigues dos Santos (2013) podemos destacar 4 obstáculos ao SUS: o baixo financiamento por parte do governo federal, o auxílio

crescente de recursos federais ao mercado de planos privados, a rigidez burocratizada técnico-administrativa por parte do Estado e a privatização da gestão pública.

Como consequências desses obstáculos o autor destaca: a impossibilidade de obter uma atenção básica de qualidade, com baixa efetividade na resolução dos problemas; a gestão descentralizada com poucos recursos das secretarias municipais, obriga que estas dediquem os escassos recursos municipais para resolver os problemas urgente e ficam sem possibilidades de prevenção de doença e promoção de saúde, assim não conseguem sanar nem mesmo os problemas não graves, com filas de esperas de meses ou até anos por consultas ou cirurgias eletivas (SANTOS, N. R., 2013).

Devido à precarização do SUS ocorre a aderência por parte da população à planos privados que os supre parcialmente, com grande percentual dessa população ainda recorrendo ao SUS para serviços de alta complexidade; e ainda, outra consequência desses obstáculos seria a existência de grupos locais que tentam seguir as diretrizes do SUS, que apesar de baixa cobertura da Atenção Básica à Saúde, demonstra com a sua atuação, o seu poder de queda em indicadores de saúde como mortalidade infantil e mortalidade precoce por doenças crônicas. Deste modo, esses grupos denotam o poder social com resistência ao desmonte das diretrizes do SUS (SANTOS, N. R., 2013).

Os baixos recursos disponibilizados, principalmente pela esfera federal, levam a uma cascata de consequências negativas na consolidação do SUS, o que consequentemente leva a seu enfraquecimento, chegando ao risco de um desmantelamento, assim explicados:

A insuficiência da infraestrutura pública, a falta de planejamento ascendente, as dificuldades com a montagem de redes na regionalização e os impasses para a mudança dos modelos de atenção e das práticas de saúde também comprometem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. [...] Com insuficientes recursos, o SUS enfrenta problemas na manutenção da rede de serviços e na remuneração de seus trabalhadores, limitando os investimentos para a ampliação da infraestrutura pública. [...] Prevalece, assim, um boicote *passivo* através do subfinanciamento público e ganha força um boicote *ativo*, quando o Estado premia, reconhece e privilegia o setor privado com subsídios, desoneração e sub-regulação (PAIM, 2018, p. 1725).

Na contramão do objetivo de universalidade na saúde originada do Movimento da Reforma Sanitária, o SUS foi, ao longo dos anos, direcionando-se

para uma gradativa segmentação, sendo ainda universal apenas em algumas áreas como a vigilância em saúde, a vacinação, a política de hemoterapia e transplantes de órgãos e tecidos. É uma relação de subsistemas: o público, convivendo com dois subsistemas privados - a saúde suplementar e o desembolso direto (MENDES, 2019).

A defesa do SUS democrático, conforme os princípios que culminaram na sua criação, passa por uma questão política com a necessidade de uma base composta por partidos com ideias progressistas. Além disso, como estratégia para persistir na luta de consolidação do SUS é necessário a força de atuação da sociedade, como no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que foi composto por várias entidades, buscando a articulação com os conselhos de saúde de todas as esferas de governo (PAIM, 2018).

Para essa luta em defesa do SUS seria importante conquistas como a melhoria real da porcentagem de participação da União no financiamento da saúde; o aumento da oferta de serviços e equipamentos de saúde, assim como sua distribuição para regiões menos favorecidas do país; o freio ao processo de privatização na saúde nas três esferas de governo e a revisão dos contratos de isenções fiscais aos planos de saúde privados. Outro ponto relevante seriam reformas administrativas na gestão do serviço estatal com melhora na eficiência da prestação de serviço (SANTOS, N. R., 2013).

O enfrentamento na defesa do SUS deve ser incessante na sociedade brasileira, pois manter essa conquista democrática adquirida de forma constitucional levará à obtenção de políticas de saúde bem-sucedidas, como é o caso do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O PNI foi criado em 18 de setembro de 1973 devido ao sucesso da certificação de erradicação da Varíola, que ocorreu neste mesmo ano. Estimulou-se vertentes dentro do Ministério da Saúde na busca de ampliar recursos para a prevenção de doenças infecciosas controladas com a imunização. Houve discussões conflitantes no governo na determinação de estratégias a serem utilizadas na imunização no país, como as vacinações de rotina ou as campanhas de vacinação. Em dezembro de 1979 houve uma epidemia de Poliomielite no sul do Brasil e a partir desse acontecido foi feita a proposta de criar um dia nacional de vacinação. O primeiro dia nacional de vacinação ocorreu em junho de 1980, com o fortalecimento das campanhas de vacinação desde então (TEMPORÃO, 2003).

A criação do PNI foi prévia à criação do SUS, mas sua evolução de sucesso se deve muito ao seguimento dos princípios doutrinários deste último. A universalidade é cumprida ao disponibilizar em todos os municípios brasileiros os imunobiológicos disponíveis nas salas de vacinação. A equidade é vista no atendimento à população alvo na vacinação rotineira ou em campanhas, em faixas etárias variadas e conforme a necessidade de risco para infecção a ser prevenida (DOMINGUES et al., 2020).

O caráter de descentralização do SUS também foi fator contribuinte para a otimização do PNI:

A contribuição do PNI fez-se ainda mais relevante a partir da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no final dos anos 1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o executor primário e direto das ações de saúde, entre elas as de vacinação. Nesse cenário, o PNI tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas (SILVA-JUNIOR, 2013, p. 7).

A gestão do PNI conta com a participação das três esferas de governo, seguindo modelo descentralizador do SUS. A União é a responsável pelo fornecimento dos imunobiológicos, a elaboração das normas técnicas e do Calendário Nacional de Imunização (CNI). Aos governos estaduais, e distrital, compete a coordenação do programa nos estados e no Distrito Federal, além do provimento de materiais necessários à vacinação. Os governos municipais são peça-chave na realização da vacinação de rotina e execução das campanhas, assim como no controle de estoque dos imunobiológicos do município e no descarte dos materiais utilizados na vacinação. O preenchimento dos dados de vacinação e eventos adversos, nos sistemas de informação e análise dos mesmos são competência das três esferas governamentais, cada uma em seu âmbito (BRASIL, 2014).

O PNI serve de espelho para vários países e é parâmetro a ser seguido pelos atuantes no campo da imunização, um motivo para orgulho aos brasileiros. Os enormes êxitos alcançados com o PNI, desde sua criação há quase 50 anos, fazem do Brasil um país mencionado por órgãos internacionais como a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) (BRASIL, 2003).

Ao longo dos anos o PNI foi elaborando estratégias e estabelecendo metas, constituindo um programa sistematizado, para obter um alto percentual de cobertura vacinal, mesmo sendo o Brasil um país de tamanho continental, populoso e com grande disparidade social e econômica pelo território nacional. Em nota sobre os 48 anos do programa, explana a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm):

Graças ao programa foi possível eliminar a poliomielite, a síndrome da rubéola congênita, o tétano materno e neonatal; eliminar temporariamente o sarampo; e reduzir significativamente a incidência de importantes causas de adoecimento e mortalidade, como difteria, as meningites bacterianas, a coqueluche, entre outras. Atualmente o calendário de rotina contempla 48 imunobiológicos, entre vacina, imunoglobulinas e soros, oferecidos para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), pessoas imunodeprimidas por doença ou tratamento; que vivem com doenças crônicas – como diabetes, cardiopatias e pneumopatias – que aumentam o risco de infecção ou complicações por enfermidades imunopreveníveis; e seus contatos próximos, têm direito a receber algumas vacinas que não são encontradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou que não são oferecidas para as suas faixas etárias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 2021).

Essa vitoriosa atuação da vacinação brasileira, assim como o êxito de outros países que atingiram boas taxas de coberturas vacinais, é ameaçada por movimentos anti vacinas que ocorrem desde o seu surgimento, mas estão crescentes principalmente nos últimos anos em decorrência de uma maior velocidade de difusão de informações por meios eletrônicos (SUCCI, 2018).

Vários fatores estão envolvidos na recusa vacinal, como a desconfiança nos imunobiológicos, a incompreensão na gravidade das doenças devido ser uma geração que já foi imunizada e protegida para as mesmas, assim não vivenciou os surtos de outrora, isso denota um aspecto dicotômico do sucesso do PNI. Outros fatores importantes na hesitação vacinal são o medo de reações adversas e a disseminação de informações equivocadas acerca da imunização, levando ao aumento de pessoas pertencentes ao grupo hesitante (SUCCI, 2018; VICTORA, 2013)

A SBIm e a plataforma digital para mobilizações sociais Avaaz realizaram, em 2019, um estudo para avaliação do reflexo das *fake news* na vacinação e seus resultados principais foram que: quase 70% dos entrevistados acreditaram em falsas informações sobre vacinas, quase 60% não se vacinou ou deixou de vacinar uma criança de sua responsabilidade por acreditar em uma informação considerada incorreta pela OMS e quase 50% dos entrevistados

utilizaram as redes sociais e aplicativos como fontes de informações sobre as vacinas (AVAAZ; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 2019). Estudos como este corroboram a evidência do poder que as informações disseminadas na internet, principalmente em redes sociais e aplicativos, exercem em nossa vida atual.

Vencer a queda na cobertura vacinal, que vem ocorrendo no país, é o maior desafio atual do PNI. O que traz preocupação para gestores e para a saúde pública, pelo risco de surtos e retorno de doenças já previamente controladas ou até eliminadas (CRUZ, 2017). Este é o caso, por exemplo do Sarampo, ocorreu uma queda na vacinação da Vacina Tríplice Viral, com ocorrência de surtos da doença pelo país, principalmente em 2018, e o Brasil perdeu o título de área livre da circulação do vírus autóctone que foi recebido em 2016. Isso se deve ao fato de que para atingir a meta de eliminação do sarampo preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é necessário obter altas taxas de cobertura vacinal da Tríplice Viral entre crianças, adolescentes e até adultos jovens (DOMINGUES *et al.*, 2020).

Uma consequência da hesitação vacinal no Brasil, seria o aumento na morbidade e na mortalidade infantil, devido ao declínio no percentual de cobertura de imunizados que vem ocorrendo desde 2016 (SATO, 2018). O fenômeno da hesitação vacinal é uma preocupação mundial e a OMS o enumera como uma das dez grandes ameaças à saúde global (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).

Ações e campanhas do Estado são primordiais:

A fim de reverter o declínio das coberturas vacinais no Brasil, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Vacina Brasil, em 9 de abril de 2019 [...]. A iniciativa tem como objetivo mobilizar os três níveis de gestão e diversos setores da sociedade brasileira e alertar sobre a importância da vacinação como principal medida de controle das doenças imunopreveníveis, e a única capaz de evitar a reemergência de doenças eliminadas no país (DOMINGUES et al., 2019, p. 1).

Além de movimentos pró-vacina voltados à população, Domingues et al. (2019, p. 2) sugerem a necessidade de estratégias divididas em dois eixos: o primeiro seria a formação e reciclagem de pessoal de nível médio como técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde; o segundo eixo seria a formação e reciclagem de pessoal de nível superior.

No eixo 1, essa formação inclui realização de cursos, produção de vídeos e cartilhas, instruções e esclarecimentos sobre a vacinação, a segurança e eventos adversos, a rede de frios, o sistema de informação, a busca ativa, boas práticas de vacinação e como reduzir as perdas de oportunidades vacinais. No eixo 2, seria a formação no sentido de produção científica acerca do tema, constituição de cursos, incentivo à especialização em imunização em instituições de ensino superior. Outro ponto importante seria a inclusão dos gestores municipais – prefeitos e secretários municipais de saúde, para que otimizem as ações de vigilância em saúde em seus municípios (DOMINGUES *et al.*, 2019).

Para a população, deve-se demonstrar a importância da vacinação, com seus benefícios que suplantam os riscos, objetivando o retorno do sucesso já previamente atingido pelo PNI. A partir desse ponto discute-se entre uma estratégia coercitiva ou uma aproximação persuasiva. Independente de qual via escolhida, as ações devem ocorrer de forma rápida para evitar uma involução na saúde pública. Todavia, pondera o autor:

[...] no momento atual em que a hesitação pela vacinação tem sido um fenômeno que reflete uma diversidade e complexidade de atitudes e crenças, incluindo desconfiança em questões médicas e científicas, resistência à autoridade governamental e adesão à saúde "natural" ou crenças religiosas, as abordagens persuasivas parecem estar se tornando menos eficazes, sem contar que consomem tempo e trabalho intensivo (DOMINGUES et al., 2020, p. 14).

O SUS e o PNI devem ser motivo de orgulho aos brasileiros, a busca pela efetiva consolidação do SUS e pela manutenção do sucesso do PNI carecem da colaboração da sociedade civil junto à atuação do governo. Políticas progressistas são necessárias para que sejam cumpridos os princípios de universalidade, equidade e integralidade, tal qual foram formulados na construção do SUS pelo Movimento da Reforma Sanitária, assim será respeitado o direito à saúde, obtido constitucionalmente.

3 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A história da saúde da criança foi mudando ao longo dos tempos, partindo desde um "ser" sem expressão até um "ser" que, reconhecidamente, integra a sociedade. A preocupação com a saúde da criança no Brasil inicia no começo do século XX, sob a mesma ótica europeia, da preocupação no investimento à futura força de trabalho. Assim, muda o caráter social de tratamento da infância, com maior força nas práticas voltadas para esta faixa etária.

Segundo Sanine e Castanheira (2018, p. 206): "Observa-se que à medida que os direitos da infância vão sendo legitimados por meio de diferentes políticas de proteção social, a concepção ao 'ser criança' avança em direção a um maior reconhecimento de cidadania."

Considerar a criança como um adulto em miniatura, denota um erro da sociedade em não se importar com as particularidades necessárias dessa faixa etária. Assim descreve:

As crianças por muitos anos foram tratadas da mesma forma que adultos, sem nenhuma consideração pelos aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil. [...] Entretanto, no decorrer dos séculos a criança passou a ser vista socialmente, com particularidades significativas que exigiram transformações sociais, econômicas e políticas (ARAÚJO *et al.*, 2014, p. 1001).

A consulta pediátrica foi modificando suas características à medida que a saúde evoluía em seu conceito e a criança foi sendo reconhecida como sujeito social. Isso constitui o fato da necessidade do exercício de uma prática pediátrica específica para a faixa etária e demonstra a articulação da saúde com a história, cultura e a política de cada sociedade (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012).

Em 13 de julho de 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei n. 8069/1990. Desde então, crianças e adolescentes foram reconhecidos como seres em desenvolvimento e que têm o direito a uma atenção prioritária na concepção de políticas pública (BRASIL, 2005).

O avanço alcançado na saúde brasileira com a criação do SUS, a partir da garantia da mesma como direito universal determinado pela Constituição de 1988, e a elaboração do ECA levaram a uma conquista na saúde da faixa etária

pediátrica. O país, além disso, legitimou pactos, tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos da criança. Com esse conjunto de medidas:

O país conquistou grande diminuição nas taxas de mortalidade infantil (menores de 1 ano) e de mortalidade na infância (menores de 5 anos), tendo com isso cumprido o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) número quatro para 2015, com três anos de antecedência e com redução de 77%, uma das maiores do mundo. Também se observa admirável controle da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis e diarreia, grande diminuição dos índices de desnutrição e melhora crescente nos indicadores de aleitamento materno (BRASIL, 2018, p. 7).

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc), foi instituída por meio da Portaria GM/MS n. 1.130 de 05 de agosto de 2015. Sua concepção foi resultado de muitas discussões e debates, desde 2012, de vários grupos liderados pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM), do Ministério da Saúde. A sua elaboração contou com a participação de especialistas em Saúde da Criança, representantes dos conselhos estaduais e municipais de secretários de saúde e alguns grupos da sociedade civil (BRASIL, 2018).

Essa política é arquitetada com base em princípios, diretrizes e eixos estratégicos. Constituem seus oito princípios: o direito à vida e a saúde; a prioridade absoluta da criança; o acesso universal à saúde; a integralidade do cuidado; a equidade em saúde; o ambiente facilitador à vida; a humanização da atenção e a gestão participativa e controle social (BRASIL, 2018).

Suas nove diretrizes contemplam: a gestão interfederativa das ações de saúde da criança; a organização das ações e dos serviços na rede de atenção; a promoção de saúde; o fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família; a qualificação da força de trabalho do SUS; o planejamento e desenvolvimento de ações; o incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; o monitoramento e avaliação; e a intersetorialidade (BRASIL, 2015, art 5º apud BRASIL 2018).

A Pnaisc é ainda estruturada a partir de sete eixos. O eixo I trata do atendimento humanizado e de qualidade à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Uma rede de cuidados, a Rede Cegonha, que engloba atenção à saúde da mulher em sua vida sexual e reprodutiva desde a adolescência, os

cuidados na gestação com atenção ao pré-natal, a assistência ao parto com incentivo à autonomia da parturiente, segue-se com cuidados ao recém-nascido com a atenção ao cuidado especializado e uma alta hospitalar já vinculada à atenção básica, onde seguirão o binômio mãe-bebê (BRASIL, 2018).

O eixo II se refere à promoção ao aleitamento materno através de várias estratégias facilitadoras do mesmo. Além de promover uma alimentação saudável, principalmente na introdução alimentar de crianças até 2 anos de idade, o que é fundamental para a formação de hábitos saudáveis para toda a vida. O eixo III concerne a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, denotando a importância da puericultura na Atenção Básica à saúde, inclusive com disponibilização e incentivo à utilização da Caderneta de Saúde da Criança (BRASIL, 2018).

O eixo IV diz respeito aos agravos prevalentes na infância e às doenças crônicas, com a preocupação em estratégias para diagnósticos precoces e seguimentos posteriores adequados. Já o eixo V tange sua atenção para a criança vítima de violência de toda natureza: sexual, física e psicológica, assim como as situações de abandono e negligência, faz a promoção da cultura da paz e arquiteta estratégias para prevenção de acidentes (BRASIL, 2018).

O eixo VI contempla a atenção à saúde de crianças com deficiência e as crianças em situações específicas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do campo, ou as crianças de maior vulnerabilidade como as que estão institucionalizadas, as que estão em situação de rua e as que vivem em situação precária com risco de desastres. O sentido principal do eixo visa a inclusão dessas crianças nas políticas públicas de saúde. Por fim, o eixo VII trata da vigilância e prevenção ao óbito infantil, fetal e materno, por meio dos comitês de mortalidade, são investigadas as causas do desfecho e são estabelecidas estratégias para a prevenção na mortalidade materno-infantil (BRASIL, 2018).

O Brasil tem desafios complexos a serem superados advindos de vários fatores: a mudança do perfil epidemiológico com o envelhecimento da população, a maior demanda em patologias crônicas, o surgimento de novos agentes infecciosos, o ressurgimento de doenças infecciosas que outrora estiveram controladas, o aumento na violência urbana. Além disso, o vultuoso número de partos cesarianas, as altas taxas de prematuridade, a obesidade infantil e as condições sanitárias precárias das aglomerações urbanas. Todas essas dificuldades

elencadas demonstram a necessidade de pôr em prática as diretrizes, os princípios e eixos do Pnaisc para o benefício em prol da saúde da criança e consequente melhoria da saúde do país (BRASIL, 2018).

Fica evidente a necessidade em modificar o modelo de saúde que privilegia o paradigma assistencial da atenção secundária e terciária, com os recursos destinados prioritariamente ao tratamento de problemas já instalados, sem se preocupar em investir na raiz do problema e mesmo na prevenção para que ele nem ocorra.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro contato do cidadão com o SUS, o nível de atenção em saúde mais próximo da comunidade e de onde toda a articulação da rede de saúde deve ser germinada. Portanto:

[...] tendo em vista que existem diferentes decodificações de APS. A interpretação mais restrita da APS seletiva a entende como um programa específico destinado a populações e regiões pobres, às quais se oferta um conjunto restrito de tecnologias simples e de baixo custo, sem possibilidades de acesso a tecnologias de maior densidade. A interpretação da APS como o nível primário do sistema de atenção à saúde concebe-a como o modo de organizar e fazer funcionar a porta de entrada do sistema, enfatizando a função resolutiva desses serviços sobre os problemas de saúde mais comuns. E a interpretação mais ampla da APS como estratégia de organização do sistema de atenção à saúde que a compreende como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar todos os recursos desse sistema para satisfazer às necessidades, demandas e representações da população, o que implica a inserção da APS em Redes de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2015, p. 15).

Coexistem, na prática, esses três conceitos de APS explanados acima, essa é a prática vigente no país e um objetivo da luta na consolidação do SUS é justamente o exercício da APS se enquadrando no terceiro conceito, como organizadora do SUS, atuando em redes, nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), suprindo 90% da demanda em saúde, estruturando as referências e contrarreferências aos níveis secundários e terciários de atendimento (MENDES, 2015).

Os atributos da APS são divididos em quatro essenciais – o primeiro contato, a continuidade, a integralidade e a coordenação. Além dos três atributos derivativos que são: centralização na família, orientação para a comunidade e a adequação cultural (STARFIELD, 2002).

Conhecer a definição de APS e seus reais atributos permite diferenciar do que seria uma atenção mínima à saúde. O conceito de saúde integral ao

indivíduo, denota à APS seu papel fundamental para a prosperidade na saúde da infância. É importante frisar que "[...] a maior parte das intervenções preventivas e curativas dirigidas aos problemas mais prevalentes na infância é tecnologicamente simples, dispensando cuidados hospitalares." (HARZHEIM; STEIN; ÁLVAREZ-DARDET, 2004, p. 27). Uma APS que exerce bem sua função leva a melhoria nos indicadores de saúde.

Apesar do progresso conquistado na saúde infanto-juvenil com importante redução na mortalidade infantil, ainda se tem muito a evoluir no cuidado com a criança e ao adolescente. O atendimento voltado para a doença e para o indivíduo, no caso a criança, deve ser modificado para o modelo de atenção voltado à constituição de redes de atendimento, com a inserção da família e do atendimento integral ao paciente e o seu entorno, numa preocupação também com a promoção de saúde (ARAÚJO *et al.*, 2014).

Corroboram com essa ideia:

[...] as práticas exercidas atualmente nos serviços de APS não avançam na integralidade do cuidado, segundo a concepção do "ser criança" como sujeito de direitos, com reconhecimento e respeito ao universo infantil, que deve ser diferenciado do pequeno adulto, futuro trabalhador (SANINE; CASTANHEIRA, 2018, p. 212).

A efetividade do trabalho da APS é diretamente proporcional à qualidade da sua gestão, vários fatores influenciam no sistema organizacional do serviço que são a maior parte devido ao projeto técnico-político dirigente. A gerência municipal, por meio do secretário municipal de saúde e a gerência local da APS, exercida pelo gestor da unidade, que define toda a articulação e organização da rede. Esses cargos são influenciados pela política com as mudanças nos planos de cada governo que se inicia, o que leva à falta de seguimento de trabalhos iniciados ou até perda de trabalho já concluído, isso reflete diretamente nos indicadores de qualidade, quando estes são avaliados (SANINE et al., 2021).

Em um estudo sobre a influência da gestão municipal na organização da atenção primária de atendimento à saúde da criança no interior paulista, foi evidenciado uma qualidade ruim na atenção à criança quando avaliados medidas tipicamente preconizadas como "[...] avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, diagnóstico e acompanhamentos das insuficiências respiratórias agudas, hidratação por via venosa ou a aplicação de penicilina benzatina." (SANINE *et al.*, 2021, p. 9).

A falta de constância nos serviços, sem investimento em melhorar progressivamente a execução das ações da APS é notada, por exemplo, em um outro estudo comparativo de indicadores para avaliar a organização da assistência primária à saúde da criança no interior de São Paulo. Foram comparados os anos de 2007, 2010 e 2014, evidenciado uma melhoria na maior parte dos indicadores de 2010 em relação à 2007, todavia houve manutenção ou piora em 2014, quando comparado à 2010. Segundo os autores da pesquisa, mesmo com as limitações metodológicas do estudo, isso demonstra o hiato entre a teoria e a prática efetivamente realizada:

[...] mesmo diante de vários documentos que orientam a atenção à saúde da criança, o modo como sua oferta vem sendo praticada nos serviços de atenção primária à saúde da região estudada, muitas vezes, ainda não correspondem ao modelo preconizado pelas políticas públicas, particularmente quando se pensa na atenção integral que deveria articular e integrar as ações de promoção, prevenção e assistência, sobressaindo a necessidade de mais esforços em relação à integralidade da saúde da criança (SANINE et al., 2018, p. 12).

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) iniciou no Brasil em 1994 como Programa de Saúde da Família (PSF), no intuito de melhorar o primeiro acesso do usuário ao sistema de saúde na atenção primária, além de atender aos demais atributos da APS. Após anos de sua implantação no país, nota-se uma redução nas internações por condições sensíveis à atenção básica. Em 2006 este programa perdeu seu caráter temporário para se tornar permanente na política de saúde nacional, modificando de nome para ESF (PINTO; GIOVANELLA, 2018).

A ESF é um mecanismo importante que leva atenção básica à população cadastrada naquela região correspondente à sua área de abrangência, com atendimento à saúde da criança. Em Teixeiras - MG, foi avaliada a assistência pediátrica exercida pela ESF do município, por meio de um estudo com três dimensões: estrutura, processo e resultado. Interessante salientar que na amostra participaram usuários do sistema e profissionais de saúde que atuam nele. O desfecho da pesquisa mostra uma atenção à saúde da criança ainda fragmentada, mas com avanços e melhorias na organização do sistema. Há poucas ações preventivas e de promoção de saúde para o público infantil, funcionando muitas vezes a ESF como um suporte ao hospital (COSTA et al., 2011).

Uma pesquisa feita em Montes Claros - MG, para avaliação da percepção dos cuidadores quanto aos atributos da APS na saúde da criança, foi realizada exclusivamente com famílias cadastradas na ESF, moradoras da zona urbana da cidade. Como resultado trouxe a ESF como serviço de referência aos cuidados da criança para a maior parte dos entrevistados, mas na avaliação individual de cada atributo, somente a longitudinalidade e a integralidade obtiveram escore satisfatório. O atributo orientação comunitária teve melhor escore que a orientação familiar. Um fator que os autores destacam que visita domiciliar, característico da ESF, leva a melhor efetividade na orientação comunitária (LEÃO; CALDEIRA; OLIVEIRA, 2011).

Em um estudo realizado numa cidade da região metropolitana de Curitiba - PR, notou-se diferença na qualidade quando foi feita uma comparação da exequibilidade de atributos da APS em relação à saúde da criança em Unidades Básicas de Saúde (UBS) tradicionais e Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). As UBS tradicionais não alcançaram escores de Atenção Primária nos atendimentos infantis, já as ESF dessa região estavam mais de acordo com melhores escores no geral. Mesmo as ESF se deparam com dificuldades com a escassez de profissionais médicos e outros componentes da equipe de saúde, que ainda tem em sua formação o modelo centrado no trabalho hospitalar e especializado, levantando a discussão sobre a necessidade de mudança nas bases curriculares da formação desses profissionais (OLIVEIRA; VERÍSSIMO, 2015).

A formação médica e dos demais profissionais da área da saúde é um tema para discussão à parte, com a necessidade de formação acadêmica que se baseie e valorize a importância da atenção primária com o benefício na relação do atendimento em saúde. É válido refletir:

A medicina contemporânea, incluindo a pediatria, deve privilegiar sentimentos e valores dos pacientes, de seus familiares e dos profissionais de saúde, todos sujeitos envolvidos de forma compartilhada na recuperação da saúde e no estímulo à reflexão em conjunto para as tomadas de decisões necessárias, ou seja, a democratização da relação médicopaciente (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012, p. 5).

Pesquisa realizada de forma similar, buscou estimar qual seria o melhor desempenho entre os moldes assistenciais de oferta de APS, quanto aos atributos essenciais e derivados, direcionada para a criança, comparando: a UBS

tradicional, as unidades de ESF e as unidades que possuem os dois modelos, chamadas UBS mistas. O cenário dessa pesquisa foram três municípios distintos, sendo Cascavel - PR (UBS tradicionais), Londrina - PR (UBS mista) e João Pessoa - PB (unidade com ESF). O desfecho demonstrou superioridade, estatisticamente significativa, nos escores satisfatórios e essenciais à APS do modelo de UBS mista. Embora deva ser levado em consideração as diferenças regionais dos municípios pesquisados, o estudo pode prognosticar que as falhas detectadas em cada modelo de atenção possam ser supridas quando se institui um modelo misto de atenção no desempenho de cuidado à saúde infantil. Sugerem os autores:

Diante disso, faz-se necessário refletir acerca das especificidades de cada modelo em relação às dimensões da APS, que podem estar contribuindo para qualificar a atenção à saúde da criança no modelo de UBS mista, bem como da implementação dos modelos nas diferentes regiões brasileiras, cujas especificidades podem estar comprometendo a atenção à criança (SANTOS, N. C. C. B. *et al.*, 2018, p. 9).

Essa amostra da pesquisa citada anteriormente, foi avaliada quanto aos atributos orientação familiar e orientação comunitária nos três tipos de UBS – tradicional, ESF e mista. No caso destes quesitos o resultado do estudo demonstrou que os três modelos de UBS não apresentaram escore satisfatório nesses atributos avaliados. Todavia, ficou demonstrado que as unidades que atuam com ESF, seja exclusiva ou nas unidades mistas, apresentam escores melhor nos atributos de orientação familiar e comunitária (SANTOS, N. C. C. B. et al., 2016).

Um estudo de abordagem qualitativa foi realizado em Cascavel - PR para identificar um dos atributos da APS - o acesso para a resolução de problemas de saúde em menores de um ano, baseado em relato de seus cuidadores. A população pesquisada se tratava de crianças atendidas em Unidades de Prontoatendimento (UPA), sendo inclusive uma das questões despertadas o fato de estarem procurando a UPA, mesmo sendo os problemas infantis, em sua grande maioria de fácil resolução na APS. A conclusão do trabalho foi o relato de obstáculos elencados pelas famílias entrevistadas, na resolução do problema de saúde da criança por dificuldade ao acesso na APS.

Foi interessante a discussão dessa pesquisa, que trouxe quatro temas após a transcrição das entrevistas realizadas. O primeiro seria o aconselhamento familiar em orientar o cuidador a levar a criança ao pronto-socorro, que origina da

questão cultural da sociedade de resolução imediata dos problemas com a procura inicial do pronto-atendimento ao invés da atenção primária. Além dos próprios sistemas de saúde ainda priorizarem muito aos atendimentos de urgência e emergência. O segundo tema foi a queixa de falta de acolhimento no primeiro contato na UBS, ratificando a importância da boa receptividade do paciente e sua família na APS por toda a equipe. O terceiro tema citado nas entrevistas foi a presença da classificação de risco, nesse caso as autoras frisam a necessidade de treinamento, pois essa classificação, por vezes elogiada, foi criticada, devido em vários casos não seguir protocolos e foi considerado como prioridade no atendimento apenas a hipertermia. E por fim, como quarto tema, foi discutido as barreiras que impedem o acesso à APS, tanto geográficas como funcionais (SILVA; VIEIRA, 2014).

O melhoramento na saúde da criança e do adolescente que vem ocorrendo desde a década de 1990 é traduzido nos números de avaliação da saúde pública como a mortalidade infantil e a mortalidade na infância. A história da saúde da criança confirma a importância da puericultura, hoje praticada não só pelo pediatra, mas pela equipe multidisciplinar na APS (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012).

Os estudos encontrados sobre a avaliação dos atributos da APS em relação à saúde da criança mostram que é necessária uma evolução no sentido de melhorar para que seja atingido escores satisfatórios. A inclusão da família no cuidado integral da saúde da criança é primordial para o êxito. Deste modo:

[...] faz-se necessário ampliar o olhar para a criança, com concepções macro e micropolíticas dos planejadores e gestores do cuidado em saúde, a fim de concretizar ações interdisciplinares para garantir a integralidade e efetividade da atenção à saúde infantil (REICHERT *et al.*, 2016, p. 126).

Há muito o que caminhar na solidificação da APS com seus atributos e consequente melhora no atendimento à criança. A Pnaisc é uma política que tem o objetivo na promoção de saúde, prevenção de agravos e proteção social da criança, desde a sua concepção intraútero. Executar essa política é cuidar do direito de cidadania da criança e do adolescente, com benefícios notórios para toda a saúde pública e o futuro do país.

4 A RELAÇÃO ENTRE A COVID-19 E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Em dezembro de 2019, iniciou-se de forma localizada, uma enfermidade identificada como uma pneumonia devido à infecção por um novo Coronavírus – o SARS-CoV-2, em Wuhan na província de Hubei na China. A doença foi perdendo seu caráter local e a disseminação de forma rápida e assustadora seguiu atingindo todos os continentes. Destarte, em 11 de março de 2020 foi declarado estado de Pandemia em virtude da Covid-19 pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020a).

Para tentar conter a disseminação do vírus e os casos da Covid-19, foram orientadas pela própria OMS medidas sanitárias e de isolamento social. Baseados nessas recomendações vários países adotaram medidas restritivas na circulação das pessoas e até mesmo a restrição máxima, denominada de *Lockdown*. No Brasil, essa limitação na circulação de pessoas não foi uniforme, variando o grau de maior ou menor isolamento social entre os estados e municípios, conforme o controle ou avanço da doença.

As modificações no cotidiano social para a prevenção da infecção e o objetivo de mitigar a pandemia geraram várias consequências na sociedade, incluindo na utilização dos serviços de saúde. Com base nisso, pode-se, possivelmente, inferir que a pandemia leva a aumento de mortalidade direta, pelo óbito causado pelo vírus, e indiretamente pelas alterações, secundárias à pandemia, no sistema de saúde, na economia e no convívio social (ROBERTON *et al.*, 2020).

Os autores supracitados fizeram um estudo, ainda nos primeiros meses da pandemia em 2020, sobre uma projeção de aumento da mortalidade materno-infantil pela redução em intervenções essenciais da assistência básica à esta população, como a anticoncepção, o pré-natal, os cuidados de rotina em puericultura, o tratamento de doenças da infância, a suplementação vitamínica e imunoprevenção. Essa redução na assistência poderia ocorrer pela falta de profissionais, falta de insumos e pelo medo da população em sair de casa (ROBERTON et al., 2020).

Serviços de saúde funcionantes, principalmente a atenção primária, apresentam um caráter preventivo, curativo, com um papel reabilitador e promotor

da saúde. O fato de não funcionarem adequadamente é ruim, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade, pois há perda na saúde, no desenvolvimento humano e na produtividade econômica. A pandemia modificou as prioridades nos sistemas de saúde em todo o mundo, com o aumento da necessidade de investimento no setor terciário, falta de profissionais, falta de equipamentos de proteção individual e insumos hospitalares e medicamentos em consequência da grande demanda (KHETRAPAL; BHATIA, 2020).

Mesmo em países já desenvolvidos, o reflexo da pandemia nos sistemas de saúde foi de grande monta e ainda demorará um tempo indeterminado para que se saiba o real impacto e a sua recuperação. Um exemplo seria o sistema de saúde inglês, que já era um modelo para vários países e hoje se depara com os desafios causados pela pandemia, seus líderes almejam mudanças na sua legislação atual para atender essa demanda do sistema (ALDERWICK et al., 2021).

A perda econômica derivada da pandemia ficou mais acentuada em países pobres ou em desenvolvimento. E mesmo nos países desenvolvidos, as pessoas mais vulneráveis são as que sentem o pior efeito da recessão econômica. Essa mudança ou perda da renda familiar causa piora na alimentação com desnutrição e maior susceptibilidade a várias enfermidades. Uma pesquisa realizada na África do Sul para avaliar a saúde antes e durante a pandemia, demonstrou uma piora significativa em quem já tinha uma saúde ruim, que no caso, seria o africano pobre. Nos resultados ficaram evidentes que a raça, a renda e a experiência de fome foram os fatores determinantes pela piora na saúde (NWOSU; OYENUBI, 2021).

Em todo o mundo ocorreu uma priorização em disponibilizar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dada a gravidade dos casos de infecção pelo coronavírus. Todavia a APS tem seu importante papel durante a pandemia, visto que a maior parte dos casos são de sintomas leves, por isso destaca:

Apostar naquilo que é a alma da atenção primária, como o conhecimento do território, o acesso, o vínculo entre o usuário e a equipe de saúde, a integralidade da assistência, o monitoramento das famílias vulneráveis e o acompanhamento aos casos suspeitos e leves, é estratégia fundamental tanto para a contenção da pandemia, quanto para o não agravamento das pessoas com Covid-19. À APS caberá também abordar problemas oriundos do isolamento social prolongado e da precarização da vida social e econômica, como transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo e

agudização ou desenvolvimento de agravos crônicos, cujas consequências são de difícil previsão, exigindo cuidados integrados longitudinais (SARTI *et al.*, 2020, p. 2).

Uma nova realidade no campo da saúde, que teve sua utilização disseminada pela pandemia foi a utilização dos serviços de telessaúde. Uma forma nova de contato para manter a relação médico-paciente, que durante a pandemia auxilia por exemplo no controle da ansiedade causada pela infecção em várias pessoas, devido ao medo da gravidade ou morte pela doença. Além de ser uma forma de monitoramento de casos leves e moderados, evitando a superlotação das unidades de saúde. É importante que a sociedade tenha consciência de que não é um tipo de atendimento utilizável em todos os casos, auxilia muito no caso de pacientes com doenças crônicas para revisão e atualização do tratamento, mas devem ser utilizadas com cautela para quadros agudos, não sendo indicada, principalmente para pacientes críticos (GREENHALGH *et al.*, 2020).

A telemedicina pode contribuir em muito com os sistemas de saúde do país de uma maneira geral, um exemplo, seria o fato de levar até o interior a oportunidade de uma consulta com especialistas diversos, em cidades que provém apenas de um médico geral, isso supriria demandas reprimidas. A agregação das teleconsultas à APS poderia trazer benefícios ao SUS, como a facilidade do primeiro contato do paciente com a rede, maior resolubilidade em demandas de consultas simples, melhor ordenação do fluxo de forma a reduzir a sobrecarga nos locais de atendimento de urgência e emergência, que em grande parte do tempo ficam superlotados de pacientes com problemas que seriam demanda da APS.

Mas para que a telemedicina seja exitosa, necessita de bom funcionamento, sua empregabilidade no SUS exige o dispêndio de recursos por parte do Ministério da Saúde direcionado para essa prática, como refere Sarti *et al.* (2020) sobre o investimento necessário: "[...] tanto na garantia de acesso à internet nas unidades de saúde, [...], quanto na obtenção de computadores e telefones, fundamentais para o estabelecimento de uma comunicação satisfatória."

Os autores ainda ponderam que:

Por outro lado, a desconfiança de alguns profissionais em relação a esta modalidade de atendimento, a falta de um prontuário eletrônico que tenha a interface com o e-SUS e a impossibilidade de emissão de receitas e solicitação de exames, devidamente assinadas eletronicamente e reconhecidas, são barreiras que precisam ser superadas, acrescentando a

necessária e urgente revisão dos marcos legais que sustentam a prática da telemedicina no Brasil (SARTI *et al.*, 2020, p. 3).

O papel da APS na pandemia é limitado no atendimento de casos moderados e graves, mas é importante organizador da rede, com auxílio do monitoramento dos casos leves. Ainda exerce seu papel social na comunidade adjunta, com a divulgação de maneiras de prevenção da doença e o auxílio na distribuição de recursos conquistados para alívio das mazelas deixadas pela crise econômica secundária à pandemia. No caso de unidades da ESF, os agentes comunitários de saúde (ACS) têm importante papel em destacar as famílias de maior vulnerabilidade socioeconômica (DAUMAS et al., 2020).

No enfrentamento de uma pandemia de tamanha monta como a provocada pelo coronavírus, é notório a importância do SUS. Conquanto, há a necessidade de mais artifícios para seu financiamento, haja vista o déficit de anos causado pelo subfinanciamento do SUS, e agora há ainda maior demanda de recursos. A gestão de uma crise sanitária como essa, depende além do provimento de leitos de UTI e recursos hospitalares, uma organização no fluxo de toda a rede com a devida valorização das atribuições da APS e o seu papel crucial no enfrentamento da pandemia (DAUMAS et al., 2020).

A sobrecarga tão prematura dos sistemas de saúde no nível especializado, como ocorre em situações caóticas tal qual em epidemias de outrora, e agora numa pandemia, ratifica o mal emprego de recursos, direcionados em sua maior parcela para a alta complexidade, sem a devida valorização do nível primário, que poderia absorver várias dessas demandas, se fosse devidamente preparado para isso (FARIAS *et al.*, 2020).

O papel da vigilância em saúde é fundamental na saúde de um país, ainda mais numa pandemia, porque é importante para o planejamento e execuções de medidas para controle da infecção, por meio da coleta dos dados e análise dos mesmos.

Prado et al. (2021) realizaram uma pesquisa de revisão na literatura, sobre as medidas de vigilância em saúde e a integração com a APS em vários países, que possuem diferentes sistemas de saúde para o enfrentamento da pandemia: África do Sul, Argentina, Austrália, China, Coreia do Sul, Cuba, Estados Unidos da América, França, Itália, Índia, Reino Unido e Singapura. Os autores encontraram estratégias diferentes de utilização de ações de vigilância ativa e

vigilância passiva nestes países pesquisados. Foi observado que, ainda que cada país tenha um modelo de gestão em saúde, também a sua cultura, com estilos de vida diferentes e a ocupação territorial distinta, influenciam na vigilância em saúde. Eles destacam que países que seguem moldes hospitalocêntricos, mesmo que tenham sistemas empoderados de vigilância, apresentam menor resolutividade para a população vulnerável. Em contrapartida, modelos focados na APS são mais ligados à comunidade e têm maior efetividade em vigilância. Com isso concluem:

[...] que os serviços de vigilância não podem operar isoladamente e precisam ser integrados aos sistemas públicos de saúde existentes. O uso de tecnologias digitais inovadoras e o compartilhamento de dados, apesar de potencializarem um efetivo controle, apresentam limitações para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por constituírem intervenções verticais baseadas nas práticas tradicionais de notificação, registro e investigação de casos de doenças infecciosas e vigilância sindrômica, persistindo na consequente desarticulação em relação às ações desenvolvidas na atenção primária, que abarcam 80% dos casos mais leves da doença. Ao passo que as ações de vigilância à saúde abrangentes e multissetoriais integradas com a APS, mostraram-se resolutivas e capazes de ofertar um monitoramento contínuo de todos os problemas de saúde que afetam a população, inclusive pós-pandemia (PRADO et al., 2021, p. 2853-2854).

Todos os grupos populacionais tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. As pessoas consideradas como grupo de risco vivem o misto de serem os mais atingidos pelas formas graves e maior mortalidade, juntamente com a deficiência no acesso aos serviços de saúde, devido à toda logística implantada para controle dos casos. O grupo de gestantes e puérperas, inicialmente, não foi considerado com risco diferenciado para a infecção pelo coronavírus, talvez pelo número baixo de gestantes nos países inicialmente acometidos pelo SARS-CoV-2, mas posteriormente foi incluído como tal, devido a maior morbidade e mortalidade da doença nessas mulheres (SOUZA; AMORIM, 2021).

Em um artigo que discute a mortalidade materna pela Covid-19 no Brasil, Souza e Amorim (2021) comparam os resultados de estudos brasileiros com os de outros países, evidenciam o aumento e gravidade da doença em gestantes e puérperas, todavia em países desenvolvidos não foi demonstrado o maior risco de morte materna, o qual diferencia dos países de baixa e média renda, incluindo o Brasil, que apresentou alta letalidade nesse grupo, o que seria consequência de lacunas graves do sistema de saúde somados aos aspectos sociais ligados à saúde.

Eles ainda reiteram:

[...] a maior mortalidade em gestantes no Brasil se deve a problemas crônicos da assistência à saúde da mulher no país, como recursos insuficientes, baixa qualidade pré-natal, leitos disponíveis menores que a real necessidade, dificuldade no acesso aos serviços, disparidades raciais e violência obstétrica (SOUZA; AMORIM, 2021, p. S259).

Mulheres grávidas tiveram a rotina de pré-natal e a assistência ao parto modificadas, inclusive com muitos serviços excluindo o acompanhante no parto, com intuito de evitar redução de pessoas circulando nas dependências hospitalares para redução do risco de contaminação de pacientes e dos profissionais ali envolvidos. As dúvidas sobre a evolução clínica da gestação, o medo de contaminação do seu bebê, a restrição ao pré-natal com dificuldades para consultas e realização dos exames indicados, são todos fatores que causam ansiedade e aumentam o risco de depressão pós-parto, denotando a dificuldade de gestar durante a pandemia (ESTRELA et al., 2020).

A atuação da APS no atendimento às gestantes e puérperas é crucial e deve manter a rotina de pré-natal, com a possibilidade do acompanhamento por telessaúde nos casos de mulheres infectadas ou com suspeita de infecção. A equipe de atendimento tem a incumbência de orientar sobre medidas sanitárias de prevenção de contágio e dar apoio no sentido de esclarecer dúvidas sobre os medos existentes (ESTRELA *et al.*, 2020).

A assistência à saúde deficiente, principalmente no pré-natal, aliado ao risco da maior gravidade da doença na gestação, acarreta também no número de nascimentos prematuros. Os cuidados em saúde dos bebês nascidos precocemente também estão inclusos no rol de sistemas de saúde com reflexos da pandemia.

Uma pesquisa qualitativa realizada por Reichert et al. (2022), na Paraíba, mostra as repercussões da pandemia no cuidado aos bebês prematuros. Os motivos de repercussão na assistência se devem à sobrecarga dos profissionais devido ao afastamento de integrantes da equipe de trabalho, desativação temporária da unidade Canguru, ausência de acompanhamento do prematuro na RAS, medo materno de exposição do lactente, que é de maior risco, à contaminação da doença e por questões de dificuldade socioeconômica pela restrição ao deslocamento até o atendimento. Como estratégia para organização e manutenção do fluxo de atendimento a esses pacientes durante a pandemia foi realizado: maior

espaçamento entre as consultas, para redução de pessoas atendidas no dia, adoção do acompanhamento por telefone, aumento das medidas sanitárias e cumprimento das normas da vigilância sanitária local. Esse desajuste no atendimento ao bebê prematuro denota o risco de redução de vínculo entre as famílias e o serviço, o que pode acarretar descontinuidade do acompanhamento de puericultura desses pacientes, que é tão essencial na redução da morbimortalidade ao qual esse público está suscetível; e risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, já que a estimulação nas fases iniciais da vida é crucial para aproveitar a plasticidade cerebral.

Muitas famílias reconhecem essa importância e tentam superar todas as dificuldades impostas pela pandemia para a manutenção do seguimento do seu filho. Por consequência as autoras frisam: "O novo contexto, desafiador e repleto de incertezas, impôs aos familiares e profissionais adaptações para garantia de um cuidado qualificado e efetivo ao lactente prematuro." (REICHERT *et al.*, 2022, p. 7).

Tal qual ocorre com o seguimento de crianças nascidas prematuras, a pandemia também alterou a rotina de puericultura de todas as faixas etárias. Houve uma alteração direta no modo de viver das pessoas, incluindo os serviços de saúde eletivos, no intuito de evitar a propagação do vírus. Uma prática em saúde que foi acometida pelas medidas adotadas como prevenção à pandemia foi a vacinação infantil de rotina (SATO, 2020). A Academia Americana de Pediatria (AAP) orienta e estimula a manutenção dos serviços de rotina no atendimento à criança durante a pandemia, inclusive com a importância da manutenção da práxis das imunizações de todas as idades (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2021).

A queda na cobertura vacinal é uma preocupação compactuada por autoridades de saúde de vários países, devido ao reflexo na vacinação pediátrica com a iminência de ressurgimento de casos de doenças imunopreveníveis que estão controladas, mas que exigem alta cobertura vacinal para se manterem como tal (NELSON, 2020). A OMS emitiu um documento em maio de 2020 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020b), alertando do perigo da interrupção da vacinação infantil de rotina, bem como das campanhas de vacinação, uma vez que aproximadamente 80 milhões de crianças estariam suscetíveis a contraírem doenças como Difteria, Sarampo e Poliomielite.

Com a manutenção da pandemia ao longo desses anos, esforços mundiais estão sendo feitos para o retorno de taxas de cobertura vacinal como na

era pré-pandêmica (CHANDIR; SIDDIQI, 2021). Na Semana Mundial da Imunização, em 2021, a OMS juntamente com o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e a Aliança das Vacinas (Gavi) clamaram por uma labuta global em prol do retorno da vacinação infantil conforme os calendários básicos de cada país e a execução de campanhas para atualizar os cartões de crianças em déficit com sua imunização preconizada para a idade. Isso devido à lentidão dos países na atuação nessa prática, colocando em risco milhões de pessoas. Na ocasião, uma pesquisa feita pela OMS, cerca de 37% dos países ainda estavam com os serviços de imunização de rotina paralisados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021a).

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em conjunto com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) manifestaram-se indicando e enaltecendo a manutenção da imunização infantil, durante a pandemia, sugerindo a adoção de estratégias para redução da disseminação da Covid-19, sem alterar a atualização vacinal das crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, [2020]).

Outro motivo de preocupação com a alteração do funcionamento dos serviços de saúde devido à pandemia, são os pacientes que vivem com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Patologias como diabetes, hipertensão arterial, doenças respiratórias, doenças cardíacas e câncer, são patologias que exigem acompanhamento regular e tratamento contínuo para o bom controle clínico, levando à redução na morbidade. Além destas doenças citadas, a obesidade é também um fator de morbidade e mortalidade e que são fatores de risco de maior gravidade na infecção pelo Coronavírus. A busca pelo isolamento social para mitigar a pandemia, o deslocamento dos profissionais de saúde de serviços eletivos para atendimento em urgência e hospitais aos infectados, a alteração na mobilidade urbana com redução de transportes públicos, são fatores contribuintes que fizeram com que o funcionamento de serviços médicos reduzisse ou parasse, o que acarreta prejuízo preocupante no controle desses pacientes com DCNT (KLUGE *et al.*, 2020).

Hábitos decorrentes do isolamento social como maior consumo de alimentos não saudáveis, álcool e tabaco, a ansiedade, a falta de exercícios físicos são condições que aumentam a descompensação das DCNT. A gestão pública deve buscar o controle da pandemia e não deixar de lado as estratégias para tratamento e prevenção de agudizações das DCNT (KLUGE *et al.*, 2020).

Malta et al. (2021) realizaram, no Brasil, um estudo entre adultos com doença crônica, a fim de quantificar a adesão ao distanciamento social e a utilização aos serviços de saúde no decorrer da pandemia em 2020. O desfecho do estudo foi que os pacientes com DCNT aderiram de forma consistente ao distanciamento social, que pode ser explicado pela vulnerabilidade e o pavor, em razão da condição crônica estar associada à maior morbidade e mortalidade pelo coronavírus. Todavia, foi também observado que esse grupo foi o que mais procurou os serviços de saúde e encontrou dificuldade para utilização dos mesmos.

À medida que a pandemia se prolonga, o mundo convive com o aumento de outras enfermidades, não só físicas, como as doenças não transmissíveis, mas também as mazelas geradas pelo contexto social, o que pode ser explicado no conceito de sindemia. As sindemias são caracterizadas pela interação de fatores biológicos e sociais, entre condições e estados que na sua interação aumentam a suscetibilidade de uma pessoa, prejudicando ou piorando os seus resultados de saúde. Grupos mais vulneráveis são os que mais sofrem com a infecção pelo Coronavírus e as consequências socioeconômicas geradas pelo combate a ela. O enfrentamento da Covid-19 não deve ser restrito a aspectos biomédicos, devem ser alvo das políticas para combate da doença o cuidado com as doenças não transmissíveis e as condições sociais que aumentam as disparidades na sociedade (HORTON, 2020).

Bispo Júnior e Santos (2021), descreveram um ensaio sobre a sindemia da Covid-19. Os autores destacam que por meio de uma abordagem sindêmica, os governos devem criar políticas que articulem as medidas clínicas, sanitárias, socioeconômicas e ambientais. Fica demonstrado uma convivência sinérgica da Covid-19 com três grupos: as DCNT, as doenças infecto-parasitárias e os problemas de saúde mental, todas essas interações são potencializadas por condições de vulnerabilidade social, ambientais e de baixo poder econômico. Um importante fato elencado pelos autores:

Em relação à atenção ambulatorial especializada, esta deve ser fortalecida especialmente para o acompanhamento, tratamento e reabilitação das sequelas da Covid-19. Embora as repercussões biológicas da doença não sejam totalmente conhecidas, problemas respiratórios, neurológicos, osteomusculares e relacionados à saúde mental têm afetado pessoas que foram infectadas. Neste sentido, os sistemas de saúde devem buscar ampliar e facilitar o acesso aos serviços ambulatoriais especializados, aos serviços de fisioterapia e à rede de atenção psicossocial. Destaca-se ainda

a importância da integração destes serviços com a APS para garantia do cuidado integral e longitudinal (BISPO JÚNIOR; SANTOS, 2021, p. 10).

O SARS-CoV-2 se disseminou pelo mundo, levando a perdas em todos os sentidos para as pessoas. Famílias amargaram, e ainda amargam, as perdas de vidas que se foram, o sofrimento de internações prolongadas, a dor e os transtornos trazidos pelo distanciamento social. A recessão econômica levou à piora evidente da qualidade de vida, com maior impacto nos grupos que já eram mais vulneráveis. Os sistemas de saúde tiveram que se adaptar para conseguir suprir prioritariamente os casos com necessidade de tratamento hospitalar, com isso muitos serviços de atenção primária ficaram suspensos ou foram readaptados. A pandemia ou sindemia, como melhor denominação, ainda está em curso e os governos necessitam traçar estratégias para minimizar os martírios gerados por ela, no sentido de mitigar as infecções como também cuidar das sequelas físicas e psíquicas do pós-Covid.

5 VACINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O nexo envolvendo saúde e desenvolvimento gera uma extensa discussão acerca do assunto. A relação da saúde com o desenvolvimento econômico denota um sentido restrito. Por exemplo, em seu relatório "Macroeconomia e saúde", a OMS ressalta o valor de políticas públicas com o propósito de prosperidade em saúde e redução da pobreza, fundamentalmente porque uma população saudável tem maior expectativa de vida, maior disposição e leva, assim, a prosperidade econômica ao país (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).

Contudo, dialogar sobre desenvolvimento, deve ser sinônimo de um debate além da economia, seria incluir aspectos socioambientais no sentido de exercitar plenamente o potencial do bem-estar humano. No que tange um país continental como o Brasil, ainda tem a questão do desenvolvimento territorial, para vencer as desigualdades sociais (GADELHA; COSTA, 2013).

Em um artigo que discute o conceito de desenvolvimento por várias nuances, Oliveira (2002, p. 40) chama atenção para o fato de que: "O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social."

O conceito de saúde, além de ser simplesmente a ausência de doença, vai ao encontro dessa busca pelo bem-estar humano. E baseado nesse aspecto destacam os autores:

Já em relação à saúde, destaca-se sua importância social (com forte impacto sobre as condições de vida e bem-estar da população) dado que é um bem público, um direito social e elemento estruturante do Estado de Bem-Estar Social brasileiro — uma vez que universalização desses direitos, marcando a desmercantilização do acesso, foi determinada na Constituição de 1988 (GADELHA; COSTA, 2013, p. 106).

O desenvolvimento, no sentido profuso, inclui o direito às conquistas e liberdades que levam à vivência com plenitude. Segundo Sen (2007, p. 17): "O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam." O acesso a serviços de saúde e a toda ação em saúde que promova aumento da longevidade com prevenção de morbidade e mortalidade leva ao desenvolvimento.

E ainda sobre liberdade e desenvolvimento refere:

Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes não só para a condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura), mas também para uma participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas (SEN, 2007, p. 56).

Para Arkeman (2014), o conceito mais amplo de desenvolvimento poderia originar no questionamento de qual razão se objetiva desenvolver e com quem é feito esse desenvolvimento. Assim o próprio autor responde:

A equidade e a inclusão social deveriam ser os princípios que norteiam um processo de desenvolvimento, o qual se configuraria como um meio, como um conjunto de ferramentas; o fim desse processo — ou o seu começo! — seria o fortalecimento da cidadania, da democracia e da promoção dos direitos em uma esfera pública reflexiva, dinâmica e criativa (ARKEMAN, 2014, p. 23).

O desenvolvimento social ajuda o ser humano a conquistar uma vida mais longeva e mais feliz. Possuir melhores condições de educação e saúde propiciam conquistas tão importantes quanto a prosperidade econômica, esse deve ser um foco das políticas públicas. Complementa Sen (2007, p. 334): "[...] os seres humanos não são meramente meios de produção, mas também finalidade de todo processo."

Faz parte apenas da história recente do Brasil, notadamente a partir da Constituição de 1988, a instituição de políticas públicas universais, que ainda necessitam de muita evolução e solidificação para efetivar de fato os direitos das pessoas, não baseado apenas no assistencialismo. Urge a necessidade de vencer a cultura concentradora de renda, advinda desde os tempos coloniais, que contribui por ainda manter grande parte da população vivendo sem acesso às condições mínimas de moradia, saúde e alimentação (ZAMBAM; KUJAWA, 2017).

Seguindo essa vertente, Gadelha (2012, p. 8) escreve sobre o conceito de desenvolvimento e saúde: "Torna-se necessário que as energias mobilizadoras da sociedade brasileira sejam motivadas por novos projetos do País e a saúde é um reflexo mundial do tipo de sociedade desejada."

O país precisa progredir muito no sentido de alcançar um desenvolvimento social para seu povo. Diante da inviabilidade de eliminar as desigualdades, as políticas públicas devem ser direcionadas no intuito de reduzi-las. Importante lembrar que:

Buscar essa redução é, também, requisito para que uma política pública possa ser considerada como social, já que nem toda ação governamental tem essa virtude apenas porque se situa em setores sociais como saúde, educação, previdência, habitação (VIANNA et al., 2001, p. 12).

Quando se fala em uma ação em saúde que na prática age diretamente permitindo uma melhora na qualidade de vida individual e coletiva da sociedade, há que se citar a vacinação. A imunização na infância, por exemplo, é responsável pela redução nas taxas de mortalidade infantil, todavia além de prevenir a morte precoce de uma criança, ela proporciona o direito à vida sem sequelas causadas por tais doenças. Gadelha et al. (2020, p. 2) afirma: "[...] o desenvolvimento de vacinas e o estabelecimento de estratégias globais de imunização contra enfermidades altamente infecciosas foram decisivas para a alteração radical no padrão de doenças que afetam a humanidade."

A mortalidade na infância, que é a mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade, é um considerável indicador, que espelha a saúde de uma população e por conseguinte, o desenvolvimento dessa nação. Um estudo que analisou as taxas de mortalidade e as principais causas de morte na infância no Brasil entre 1990 e 2015, demonstrou que houve uma evidente queda na mortalidade em menores de 5 anos em todo o país. Essa conquista se deve, principalmente, às melhorias nas condições sanitárias e nutricionais, que reduzem as mortes por doenças diarreicas, assim como ao sucesso do PNI, com redução nas mortes por doenças infectocontagiosas pela eficácia da vacinação (FRANÇA et al., 2017).

É importante entender os indicadores de saúde e sua importância para o planejamento de políticas públicas. Segundo o livro sobre conceito e aplicações dos indicadores em saúde, a interpretação da taxa de mortalidade em menores de 5 anos seria que:

^[...] expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura ambiental precários, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a ela associadas. O acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil são também determinantes da mortalidade

nesse grupo etário. É influenciada pela composição da mortalidade no primeiro ano de vida (mortalidade infantil), amplificando o impacto das causas pós-neonatais, a que estão expostas também as crianças entre 1 e 4 anos de idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo más condições de vida em segmentos sociais específicos (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008, p. 118).

A maior causa dos óbitos em menores de 5 anos no Brasil concentrase no primeiro ano de vida, devido à grande contribuição de causas perinatais, o que
denota a importância de políticas públicas em melhoria na assistência à gestação,
ao parto e os cuidados neonatais (FRANÇA et al., 2017). Contudo, condições
globais melhores de vida da população refletem nesse índice, como demonstrado
num estudo que avaliou os fatores associados à mortalidade infantil no município de
Joinville – SC, que é um município com elevado Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). Neste estudo as autoras concluem que fatores biológicos passam a ter mais
importância nos óbitos infantis e as causas evitáveis são reduzidas, justamente
pelas melhores condições em saúde, educação, moradia e saneamento que a
população goza no município, ratificados no elevado IDH do município
(KROPIWIEC; FRANCO; AMARAL, 2017).

Um estudo realizado por Chang et al. (2018), para avaliar o impacto da equidade que as vacinas podem ter na prevenção de mortes e os benefícios econômicos nos países em desenvolvimento. Foi estimado o impacto diferencial na saúde, medindo as mortes evitáveis e o impacto econômico familiar, medindo o número de casos de adoecimento evitados, com 10 tipos de antígenos e suas vacinas correspondentes, em todos os quintis de renda, para 41 países de baixa e média renda. Como desfecho, a pesquisa indicou que os benefícios dessas vacinas se acumulariam predominantemente nos quintis de renda mais baixa. Alertando gestores políticos sobre o grande impacto na saúde e na distribuição econômica que as vacinas podem ter, assim, eles devem ver as políticas de vacinação como canais potencialmente importantes para melhorar a equidade em saúde.

Os autores ainda concluem que além do importante benefício para a saúde e a economia, deve-se destacar que esses benefícios podem ocorrer em grande parte entre os pobres. Os quintis mais pobres ganhariam mais com os programas de vacinas porque têm mais a ganhar, tanto em termos de saúde quanto econômicos. Com a redução da pobreza e a melhoria da equidade na agenda de desenvolvimento global, investimentos sustentados em vacinas podem dar uma

grande contribuição para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a cobertura de saúde universal (CHANG *et al.*, 2018).

Para que a vacinação tenha êxito em uma localidade, em termos de saúde pública, ou mesmo individualmente, na proteção do adoecimento e da morte, é necessário a cooperação da sociedade para que se atinja e mantenha altas taxas de cobertura vacinal. A maior parte das doenças só é efetivamente controlada ou eliminada atingindo altas cifras de cobertura vacinal. No Brasil, o PNI conseguiu esse mérito com sua atuação independente, sem sofrer grandes alterações com as trocas de governo (BRASIL, 2003).

A baixa cobertura vacinal leva a um malefício coletivo com surtos e epidemias e um prejuízo individual pelo acometimento da criança, privando-a da liberdade de não adoecer, sofrendo todas as consequências da enfermidade, inclusive com os riscos de sequelas que tais doenças poderiam provocar, ou efeitos adversos de seu tratamento. Além de uma sobrecarga ao setor de saúde, seja por consultas na atenção primária ou até internações, demandando do setor terciário da saúde.

O absenteísmo escolar seria outra consequência da infecção por doenças evitáveis com a vacina, no caso da não vacinação, acarretando baixo rendimento escolar. Ademais os próprios pais, muitas vezes faltariam ao trabalho em decorrência da necessidade do cuidado ao filho doente. Toda essa consequência da não vacinação foi exemplificada a seguir:

Como podemos observar no recente surto de sarampo (em 2011), em São Paulo, com início em uma escola onde muitas crianças não haviam sido vacinadas por opção dos pais, a decisão de não vacinação de alguns pode representar um sério risco para a saúde de outros e um pesado ônus para nossos serviços de saúde, bastando verificar quantas doses de vacinas de bloqueio tiveram de ser aplicadas em consequência desse surto. As liberdades individuais devem ser comparadas aos benefícios públicos, e o bem-estar da comunidade deve ser anteposto aos desejos individuais" (LEVI, 2013, p. 57-58).

Apesar do inegável sucesso da vacinação, esse êxito é ameaçado pelo fenômeno da hesitação vacinal, que é a recusa por determinado imunobiológico ou por todos, mesmo estando disponível gratuitamente nos serviços de saúde (MACDONALD; SAGE WORKING GROUP ON VACCINE HESITANCY, 2015). A hesitação vacinal existe desde a criação das primeiras vacinas e está presente em todo o mundo e tem causas diversas. No Brasil, o evento mais famoso foi a "Revolta"

da Vacina" que ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro, devido a obrigatoriedade da vacinação de Varíola (LEVI, 2013). Essa questão da obrigatoriedade na vacinação inclusive levanta uma discussão ética sobre a liberdade individual perpassando uma benfeitoria coletiva (LESSA; SCHARAMM, 2015).

O amplo conceito de desenvolvimento aqui debatido denota que ele caminha no sentido de ser uma palavra plural, quando relacionado ao bem mais precioso que é a saúde. O objetivo de desenvolvimento de uma sociedade deve ser a busca pela vivência plena, gozando da liberdade de ter saúde, educação, moradia digna e um subsídio econômico. As políticas públicas devem ser voltadas para a melhoria de vida das pessoas com consequente prosperidade econômica do país, e não o contrário. A saúde deve ser o foco, no seu conceito mais amplo de bem-estar físico, psíquico e social. A vacinação é somente um ponto importante nesse caminho, dentre tantos outros na construção de uma sociedade saudável.

6 OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a cobertura vacinal, durante a pandemia Covid-19, em crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP e discutir as possíveis repercussões no desenvolvimento social.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Descrever o perfil sociodemográfico das famílias entrevistadas de crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca SP;
- b) Verificar a situação vacinal, em relação às doses das vacinas indicadas aos 4 anos conforme calendário do PNI;
 - c) Identificar as falhas vacinais como atrasos e ausência;
- d) Demonstrar as variáveis associadas às falhas vacinais nessa faixa etária.

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

7.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa. Os estudos mistos vêm sendo aplicados nas pesquisas na área da saúde com intuito de complementaridade na interpretação do fenômeno investigado (SANTOS, J. L. G. *et al.*, 2017). Compactuando dessa ideia, neste artigo os autores descrevem:

Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem que ser operacionalmente exequível. [...] ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 239-240).

Para a realização da pesquisa foi feita um levantamento bibliográfico na literatura acerca do tema abordado. Essa pesquisa bibliográfica se estende durante todo o percurso até a entrega da dissertação, no sentido de robustecer o conhecimento sobre a temática. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 200): "[...] a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, visto que propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras."

Efetuou-se uma busca de artigos científicos e publicações na base de dados do *Pubmed* e nas bibliotecas virtuais – *Scielo*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de periódicos da CAPES e no *Google Scholar*.

Como fonte secundária, foi utilizada a fotografia do cartão de vacina da criança, enviado pelo cuidador através do aplicativo *WhatsApp*, com a finalidade de obtenção dos dados vacinais do pesquisado.

A constituição da metodologia da pesquisa é o segmento mais complicado do estudo, a partir do momento que demonstra a bagagem adquirida pelo pesquisador para a sua produção, com a demonstração das técnicas utilizadas (DESLANDES, 1994).

7.2 CAMPO DE ESTUDO

O recorte de espaço da pesquisa foi o município de Franca, interior do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, tem uma população estimada em 2021 de 358.539 pessoas, o censo de 2010 demonstrava uma população de 318.640 pessoas. A taxa de mortalidade infantil em 2019 é de 7,09 óbitos por mil nascidos vivos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 é de 0,78 (IBGE, 2022).

7.3 AMOSTRA

A coorte de estudo são crianças nascidas no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Segundo o Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (SINASC), nasceram 4954 crianças de mães residentes no município de Franca - SP no ano de 2016 (BRASIL,2022).

A pesquisa inicial seria feita com um inquérito domiciliar com amostragem por conglomerados 30x7, que é o método indicado pela OMS para estudos de coberturas vacinais, em que são entrevistadas 7 crianças em 30 conglomerados, totalizando uma amostragem de 210 crianças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).

Realizado o sorteio de 30 bairros de Franca - SP, sendo cada bairro um conglomerado. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi sorteado um bairro piloto, para realizar um teste com intuito de avaliar a exequibilidade da pesquisa e detectar possíveis falhas no formulário. A pesquisadora foi a campo e constatou extrema dificuldade nessa coleta domiciliar, porque ao serem abordadas em suas casas, muitas pessoas se recusaram a responder ou nem atendiam a porta, por vários motivos, como o medo devido à pandemia ou desconfiança na pesquisa. Em outros casos que a pessoa se dispôs a responder, no domicílio não havia criança da faixa etária alvo da pesquisa. Com isso foi optado por modificar a pesquisa, com a troca do que seriam os conglomerados, devido ao prazo para coleta de dados para a conclusão deste estudo.

Em vez de bairros, cada conglomerado passaria ser uma escola do município que atuasse com educação infantil, com as crianças da coorte da pesquisa. Foram solicitados à Secretaria de Educação e à Delegacia Regional de

Ensino os dados necessários sobre número de escolas e a quantidade de crianças matriculadas em cada uma, os dados solicitados foram fornecidos via e-mail.

As crianças nascidas no ano de 2016 estão divididas em 2 séries escolares diferentes, sendo na fase II (pré II) as crianças nascidas de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2016 e na fase I (pré I) as nascidas de 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2017. O total de crianças matriculadas na fase I e fase II no ano de 2021 foi de 8657 crianças. Desse total 4429 crianças estavam matriculadas na rede municipal (escolas municipais) e 1410 crianças estavam matriculadas na rede privada (escolas particulares) e 2818 crianças matriculadas em creches conveniadas com o município. Com base no número de nascidos vivos em 2015, 2016 e 2017 (BRASIL, 2022), a média de crianças desse total de matriculados que corresponde aos nascidos em 2016 seria em torno de 4328 crianças.

Em 2021 o número total de escolas em Franca que atende a educação infantil é 182, assim divididas: 30 escolas particulares cuja responsabilidade é da Delegacia de Ensino, 23 escolas particulares que são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 81 creches conveniadas com o município e 48 escolas municipais que atendem a educação infantil da faixa etária da pesquisa. Foram sorteadas 30 escolas do município de Franca, que seriam os 30 conglomerados da pesquisa. O sorteio procedeu de forma proporcional ao número de escolas de cada região geográfica da cidade e fazendo a proporção de alunos da rede privada, creches conveniadas e escolas municipais.

As 30 escolas particulares que são de responsabilidade da Delegacia de Ensino, foram excluídas do sorteio inicial, devido a Secretaria Municipal de Educação não ser responsável pelas mesmas e referir não possuir os dados necessários. Foi fornecido para a Secretaria Municipal de Educação a listagem das escolas sorteadas. Em cada escola seriam sorteados os nomes das crianças até completar um total 7 crianças da coorte por escola, cujos responsáveis concordassem em responder a pesquisa. A Secretaria de Educação não concordou em fornecer as listas com nomes dos alunos matriculados nas escolas sorteadas para o seguimento da pesquisa, mesmo sendo um estudo que já possuía aprovação do CEP. A Secretaria de Educação alegava que a escola possui a governabilidade dos dados dos alunos e os mesmos só poderiam ser passados com autorização dos pais. Foi confeccionado uma carta-convite aos pais para participação na pesquisa

(APÊNDICE A). Após a confecção da carta a Secretaria autorizou a pesquisa e a mesma foi novamente submetida ao CEP, com aprovação.

A combinação com a Secretaria de Educação é que esta carta-convite seria enviada apenas aos pais das crianças da faixa etária da pesquisa das escolas sorteadas, mas a Secretaria na verdade utilizou um portal de comunicação com os pais, para falar sobre a pesquisa. Assim, os pais de crianças de variadas escolas e de várias faixas etárias acabaram respondendo no portal esse convite da pesquisa. Até então sem o conhecimento da pesquisadora, que o processo foi realizado dessa forma.

Foi laboriosa a relação com a Secretaria de Educação, no sentido de que a pesquisa só seria autorizada na forma que eles determinassem. Vale ressaltar que foi um período de retorno de aulas presenciais nas escolas públicas no município, durante a pandemia, o que pode ter contribuído com a dificuldade no contato com a Secretaria de Educação, pelo excesso de carga laboral que eles vivenciavam no momento. Apesar dos obstáculos, vários funcionários foram muito solícitos em ajudar na pesquisa.

Após aproximadamente quase dois meses do primeiro contato com a Secretaria de Educação foi fornecida para a pesquisadora uma lista no e-mail contendo o nome das crianças, dos responsáveis e os contatos telefônicos, além da resposta sobre a participação na pesquisa. Os nomes dos alunos foram fornecidos sem identificação de qual escola eram oriundos, não foi possível a separação por conglomerados conforme o projeto do estudo e devido ao curto prazo para a coleta de dados, foi optado por fazer a técnica de amostragem aleatória simples, sendo sorteado os nomes dos alunos na listagem fornecida. Para a amostra aleatória simples com um nível de confiança de 95% e erro de 10%, calculou-se o limite mínimo de 97 crianças.

A lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação continha 389 nomes de crianças, excluídos os nomes repetidos e os que já constava o não interesse em responder a pesquisa, restaram 354 nomes.

Após abordagem de todos os nomes possíveis do rol não foi atingida a amostra calculada. Enviado e-mail diretamente a todas as diretoras das escolas particulares, inclusive as que haviam sido excluídas do sorteio inicial, e também para todas as diretoras das creches conveniadas. Explicado sobre a pesquisa e anexada

a carta-convite aos pais e a autorização da pesquisa assinada pela Secretária Municipal de Educação e pelo Secretário Municipal de Saúde.

A maior parcela dos *e-mails* não foi respondida, exceto, algumas escolas que referiram não ter matriculadas crianças na faixa etária alvo da pesquisa e as diretoras de três escolas que enviaram a lista com o contato dos pais que concordaram em participar. Totalizando mais 134 nomes de crianças com o contato de seus responsáveis.

Portanto, ao final de todo o processo de busca por participantes deste estudo, foi possível identificar 488 nomes de possíveis participantes. Dentre estes: 290 crianças estavam fora da faixa etária da pesquisa, 17 crianças estavam na faixa etária, mas o responsável não quis participar da pesquisa, 64 crianças os responsáveis não atenderam a ligação e nem responderam o *WhatsApp*, 13 crianças não foi conseguido contato devido ao número estar errado ou não possuir *WhatsApp* e 104 crianças que estavam na faixa etária e os pais concordaram em responder a pesquisa, constituindo a amostra. Sintetizado a amostra no fluxograma da Figura 1.

488 crianças possíveis participantes da pesquisa 64 crianças - os 290 crianças - estavam fora da responsáveis não faixa etária atenderam ligação e nem responderam o Whatsapp 13 crianças - não foi 17 crianças - da faixa etária o conseguido contato devido responsável não quis participar ao número estar errado ou não possuir Whatsapp 104 Crianças - constituintes a amostra da pesquisa

FIGURA 1 - Fluxograma da amostra da pesquisa

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2022).

7.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Foi realizado o contato com os pais ou responsáveis pela criança, por chamada de voz no telefone ou por meio de mensagem pelo aplicativo *WhatsApp*, utilizando os números fornecidos nas listagens da Secretaria Municipal de Educação e das três escolas, conforme explicado anteriormente.

O primeiro contato foi uma apresentação da pesquisadora e um agendamento de melhor horário que a pessoa poderia responder a pesquisa, foi explicada a pesquisa e ratificado sobre o anonimato dos participantes. Houve vários casos, dentre os 488 nomes de crianças, que foram necessárias várias tentativas até que a pessoa respondesse a chamada telefônica ou a mensagem escrita, sendo excluído o nome da criança após a quarta abordagem sem sucesso.

Para os cuidadores concordantes com a pesquisa, foi enviado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), pelo aplicativo *WhatsApp*, um link do *Google Forms*.

Além da explicação sobre a pesquisa, o TCLE informou aos participantes sobre os riscos e benefícios do trabalho. O benefício direto recebido pelo participante foi a orientação sobre a situação vacinal da criança quando havia ausência de doses ou atrasos de doses que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Quanto aos riscos de participação nessa pesquisa são mínimos, apenas decorrente da ansiedade de responder ao formulário e possível constrangimento em responder às perguntas ou em mostrar a caderneta de vacinação da criança.

Na data e horário agendados com o respondente da pesquisa, a pesquisadora solicitava a foto do cartão de vacina da criança, que era enviada via aplicativo *WhatsApp*. Após avaliar o cartão de vacina da criança, no intuito de checar a conformidade com o calendário de vacinação do estado de São Paulo do ano de 2020 (ANEXO B), era feita a ligação de áudio no telefone e o responsável respondia às perguntas do formulário (APÊNDICE B), feitas pela pesquisadora, que o preenchia no *Google Forms*. Cada entrevista durou em média 8 minutos. Alguns respondentes pediram para que não fosse feita a ligação telefônica devido sua ocupação e preferiram responder às perguntas pelo áudio do *WhatsApp*. Tanto na ligação por telefone ou nas mensagens de áudios no *WhatsApp* foram entrevistas compreensíveis.

O formulário estruturado continha as variáveis com dados demográficos e socioeconômicos como identificação da criança e do responsável, renda familiar e recebimento de auxílio do governo, nível de escolaridade do responsável, número de filhos por mãe e ordem de nascimento da criança pesquisada, número de moradores da residência. Sobre a saúde da criança foi questionado se ela fazia acompanhamento regular com médico de família ou pediatra, utilização de serviço de saúde gratuito, particular ou em convênio, se havia cadastro na UBS.

Os antecedentes vacinais foram transcritos diretamente da caderneta de vacinação da criança: as datas de recebimento dos reforços dos imunizantes Tríplice bacteriana (DTP- Difteria, Tétano e Pertussis), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Varicela, Febre Amarela e a dose anual da Influenza. Foi questionado sobre a participação em campanhas de vacinação e conferido se a resposta condizia com a marcação na caderneta sobre as campanhas. Inquerido ao cuidador se a imunização da criança é feita pelo SUS ou em clínicas privadas. Quando constatado atraso ou ausência vacinal foi interrogado o motivo do mesmo.

Neste estudo, foi considerado como atraso vacinal, quando os reforços indicados aos 48 meses - DTP, VOP, Varicela e Febre Amarela, foram aplicados após 51 meses de idade da criança, ou seja, um atraso de três meses em relação à idade recomendada. No caso da vacina de influenza foi considerada a aplicação ou não da dose no ano de 2020.

A coleta de dados por entrevistas foi realizada no período de 19 de outubro de 2021 a 02 de dezembro de 2021.

7.5 ANÁLISE DADOS

A coleta de dados se deu por meio de um formulário criado no *Google Forms* constituindo assim o banco de dados com variáveis quantitativas e qualitativas. Posteriormente os dados foram exportados para o *Microsoft Excel* e analisados no suplemento *Real Statistics*.

A abordagem quantitativa, recorreu-se às medidas da estatística descritiva e regressão logística, com um nível de confiança de 95%. Os métodos de estatística descritiva objetivaram organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto de dados (MORETTIN; BUSSAB, 2017).

Já a regressão logística:

[...] é uma técnica estatística utilizada para descrever o comportamento entre uma variável dependente binária e variáveis independentes métricas ou não métricas. Ou seja, destina-se a investigar o efeito das variáveis pelas quais os indivíduos, objetos ou sujeitos estão expostos sobre a probabilidade de ocorrência de determinado evento de interesse (FÁVERO et al., 2009, p. 440).

A abordagem qualitativa foi realizada por meio da análise de conteúdo, cuja definição seria:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48).

A análise de conteúdo foi realizada em etapas conforme a orientação da técnica, iniciando com uma pré-análise das respostas dos cuidadores, que seria a denominada leitura "flutuante", a exploração dessas falas e por fim, o tratamento dos resultados obtidos, com a interpretação dos mesmos e as possíveis inferências (BARDIN, 2011).

7.6 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo possui autorizações dos Secretários de Saúde e de Educação do município de Franca - SP.

A presente pesquisa foi submetida ao CEP do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca, em cumprimento à Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, por envolver seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

Foi obtida a aprovação em julho de 2021, todavia devido a alteração na pesquisa, foi feita uma emenda e novamente em outubro de 2021, sendo obtida a aprovação pelo n. do Parecer: 5.044.809 (ANEXO A).

8 RESULTADOS

Após as entrevistas com os cuidadores das crianças, foi constituída uma amostra de 104 famílias participantes da pesquisa (n = 104). Nesta amostra, 56 crianças (53,8%) receberam as vacinas de 4 anos na idade indicada e receberam a vacina anual de Influenza. Porém, 48 (46,2%) crianças apresentaram inconformidade na vacinação do ano de 2020 em relação ao indicado pelo PNI. O atraso vacinal foi encontrado em 38 crianças, dentre estas, 2 (1,92%) crianças não receberam nenhuma vacina no ano avaliado, o que foi considerado como um atraso, com a vacinação feita com idade superior a 63 meses (Tabela1).

Em relação a vacina de Influenza, 26 crianças não receberam a dose em 2020, dentre elas, 16 crianças atrasaram as doses de reforço dos 4 anos e outras 10 crianças não atrasaram as doses de reforço feitas com 4 anos, contudo não receberam a vacina anual de Influenza em 2020. Em resumo, foi encontrado conformidade vacinal em 56 crianças (53,8%) e inconformidade vacinal em 48 crianças (46,2%) (Tabela 1).

TABELA 1 - Situação vacinal de crianças nascidas em 2016, em relação às doses indicadas para o ano de 2020, Franca/SP, 2021

Variáveis	N	%
Atraso vacinal dos reforços		
Sim	38	36,5
Não	66	63,5
Idade de vacinação dos reforços (em meses)		
48 a 51	66	63,47
51 a 54	16	15,38
54 a 57	14	13,46
57 a 60	5	4,81
60 a 63	1	0,96
Acima de 63	2	1,92
Vacina de Influenza 2020		
Sim + Reforços correto	56	53,8
Sim + Reforços atrasado	22	21,2
Não + Reforços correto	10	9,6
Não + Reforços atrasado	16	15,4
Conformidade vacinal		
Sim	56	53,8
Não	48	46,2

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Dentre os respondentes da pesquisa tem-se que os cuidadores são em sua maioria a mãe (94,2%), sendo que 47 (45,2%) pertencem a faixa etária de 30 a 39 anos, média de 34 anos, 77 (74%) vivem com o cônjuge em união estável (24%) ou casado (50%). A maioria dos cuidadores se denominam de cor branca (63,4%) e tem pelo menos o ensino médio completo (78,8%) (Tabela 2 e 4).

Quanto à renda familiar, observa-se que a média, em salários-mínimos, é de 2,59. A maioria, 54 (51,9%), recebem até dois salários-mínimos por família. E 78 (75,0%) das famílias entrevistadas não recebem nenhum tipo de benefício social dos governos (Tabela 2 e 4).

TABELA 2 - Características sociodemográficas dos cuidadores de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Faixa etária (anos)		
20 a 29	33	31,7
30 a 39	47	45,2
40 a 49	22	21,15
50 a 59	1	1,0
60 a 60	1	1,0
Grau de parentesco com a criança		
Mãe	98	94,2
Pai	5	4,8
Avós	1	1,0
Situação conjugal		
Casado	52	50,0
União estável	25	24,0
Solteiro	20	19,2
Separado	6	5,8
Viúvo	1	1,0
Grau de escolaridade		
Ensino fundamental ou menos	12	11,6
Ensino médio incompleto	10	9,6
Ensino médio completo	46	44,2
Ensino técnico	4	3,8
Ensino superior incompleto	9	8,7
Ensino superior ou mais	23	22,1
Cor		
Branca	66	63,4
Parda	27	26,0
Negra	11	10,6
Renda familiar (salários-mínimos)		
0 a 2	54	51,9
3 a 5	46	44,2
6 a 9	4	3,9
Benefício social dos governos		
Sim	26	25,0
Não	78	75,0

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Em relação às crianças participantes da pesquisa em sua maioria, 60 (57,7%) era primogênita, com discreta predominância do sexo masculino (53,8%) e de cor branca (73,1%), segundo denominação de seus cuidadores. A maioria dessas crianças, 65 (62,5%) faz acompanhamento regular de puericultura com pediatra ou médico de família, sendo que destes acompanhamentos, 35 (33,7%) crianças acompanham no SUS e 30 (28,8%) crianças acompanham no convênio médico (Tabela 3).

TABELA 3 - Características sociodemográficas de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Sexo da criança		
Masculino	56	53,8
Feminino	48	46,2
Raça da criança		
Branca	76	73,1
Parda	21	20,2
Negra	6	5,8
Amarela	1	0,9
Indígena	0	0,0
Ordem de nascimento da criança		
Primogênito	60	57,7
2º filho	25	24,0
3º filho	10	9,6
4º filho ou mais	9	8,7
Acompanhamento médico regular		
Não	39	37,5
UBS	35	33,7
Convênio médico	30	28,8

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Em média, cada residência possui aproximadamente 4 pessoas, incluindo a criança. Cada mãe tem o número aproximado de 2 filhos. A idade que foi realizada a vacinação das crianças que atrasaram as doses de reforço foi próxima de 55 meses, ou seja, 7 meses após a idade recomendada para as vacinas avaliadas (Tabela 4).

TABELA 4 - Estatística Descritiva do perfil das famílias participantes, Franca/SP. 2021

Variáveis	Média	Moda	Mediana	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Idade do cuidador	34,08	26	33	7,54	20	62
Renda familiar (salários mínimos)	2,59	2	2	1,58	0	9
Moradores da residência	3,8	4	4	1,06	2	7
Filhos por mãe	2,08	2	2	1,22	1	8
Idade de vacinação com atraso (em meses)	55,31	54,32	54,88	3,2	51,73	64,26

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Em relação à vacinação das crianças constituintes da amostra, todas as crianças, 104 (100%), possuíam o cartão de vacinação e quase a totalidade das crianças, 96 (92,3%), sempre se vacinaram exclusivamente no SUS. Uma pequena parte das crianças, 8 (7,7%), recebeu alguns imunobiológicos em rede privada, mas a maior parte das vacinas foram feitas no SUS. Não houve criança com vacinação exclusivamente em serviço privado (Tabela 5).

No que tange a participação em campanhas de vacinação, a maioria dos cuidadores, 62 (59,6%), referiram que a criança participa em todas as campanhas. Enquanto alguns cuidadores, 21 (20,2%), referem que quase sempre levam, outros, 18 (17,3%) levam apenas em algumas campanhas e somente 3 (2,9%) crianças nunca participaram de campanhas de vacinação (Tabela 5).

TABELA 5 - Dados relacionados à vacinação de crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Participação em campanha		
Sempre	62	59,6
Quase sempre	21	20,2
As vezes	18	17,3
Não participa	3	2,9
Recebeu VOP em campanha		
Sim	91	87,5
Não	13	12,5
Vacinação ocorre		
Sempre no SUS	96	92,3
Predominantemente no SUS	8	7,7
Mostrou o cartão de vacina		
Sim	104	100
Não	0	0

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Dentre as 38 crianças que apresentavam atraso vacinal, a maioria, 23 (60,5%), era do sexo feminino, 31 (82%) de cor branca, 20 (52,6%) primogênito e 20 (52,6%) não fazem acompanhamento de rotina com pediatra (Tabela 6).

TABELA 6 - Características das crianças nascidas 2016 com atraso vacinal, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Sexo		
Feminino	23	60,5
Masculino	15	39,5
Cor		
Branca	31	82,0
Negra	3	8,0
Parda	4	10,0
Ordem de nascimento		
Primogênito	20	52,6
2º filho	8	21,1
3º filho	7	18,4
4º filho	3	7,9
Acompanhamento médico de rotina		
Não	20	52,6
UBS	9	23,7
Convênio	9	23,7

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

As crianças com atraso vacinal, participantes do estudo, n= 38, possuem como seu cuidador a mãe (89,0%), cuja idade está na faixa etária de 24 a 33 anos ((55,2%) ou em união estável (26,3%), denominam-se de cor branca (71,0%), possuem o ensino médio completo ou mais (86,8%). A maioria possui 1 ou 2 filhos (76,3%) e a faixa de renda familiar da metade dessas famílias está entre 3 a 5 salários mínimos (50%). A maioria dessas famílias não recebe benefício social dos governos (76,3%) (Tabela 7).

TABELA 7 - Características dos cuidadores das crianças nascidas 2016 com atraso vacinal, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Escolaridade		
Ensino fundamental completo ou menos	2	5,3
Ensino médio incompleto	3	7,9
Ensino médio completo	19	50,0
Ensino técnico	1	2,6
Ensino superior incompleto	6	15,8
Ensino superior ou mais	7	18,4
Situação conjugal		, .
Casado	21	55,2
União estável	10	26,3
Solteiro	5	13,2
Separado	2	5,3
Faixa etária (anos)		0,0
24 a 33	20	53,0
34 a 43	13	34,0
44 a 53	4	11,0
54 a 63	1	2,0
Raça		2,0
Branca	27	71,0
Negra	6	15,8
Parda	5	13,2
Grau de parentesco	J	13,2
Mãe	34	89,0
Pai	3	8,0
Avô	1	
		3,0
Número de filhos por mãe	14	36,8
1 2	15	•
3	4	39,5
3	3	10,5
		7,9
	2	5,3
Renda familiar (salários mínimos)	40	47.4
0 a 2	18	47,4
3 a 5	19	50,0
Acima de 6	1	2,6
Benefício social dos governos		20.7
Sim	9	23,7
Não	29	76,3

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Quanto ao motivo da inconformidade do cartão vacinal da criança em relação ao ano de 2020, foi considerado o atraso vacinal (n= 38) e a ausência isolada da vacina de Influenza (n= 10), os motivos mais citados pelos cuidadores foram razões relacionadas à pandemia (39,6%), seguido pelo motivo de não saber ou esquecer a dose (35,4%) (Tabela 1 e 8).

TABELA 8 - Motivo da inconformidade vacinal em 2020 das crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 2021

Variáveis	n	%
Motivo do atraso vacinal		
Pandemia	19	39,6
Não sabia ou esqueceu da dose ou da idade	17	35,4
Criança estava doente na época	1	2,1
Dificuldade de aceitação da criança	1	2,1
Medo de reação adversa	3	6,2
Ocupação do responsável	7	14,6

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

Realizou-se, utilizando o suplemento do *Excel*: *Real Statistics*, a técnica de regressão logística na análise se o atraso vacinal (variável dependente) estava relacionado com as demais variáveis (variáveis independentes): pandemia, grau de parentesco do cuidador, idade do cuidador, raça do cuidador, situação conjugal do cuidador, escolaridade do cuidador, número de pessoas que moram na residência, número de filhos por mãe, sexo da criança, raça da criança, acompanhamento médico regular, ordem de nascimento, renda familiar e se recebe ou não algum benefício do governo.

Conforme observado na Tabela 9, verifica-se que, das variáveis independentes analisadas, podemos considerar que o evento de interesse que seria o atraso vacinal, possui relação com a pandemia e a raça do cuidador, pois ambas apresentaram significância estatística (p< 0,05), ou seja, podemos rejeitar a hipótese nula, concluindo assim que essas duas variáveis foram significativas em relação ao atraso vacinal.

TABELA 9 - Modelo de regressão logística para influência de características relativas à criança com atraso vacinal, Franca/SP, 2021

Variáveis	p-Valor	qui-	df	alpha	significância
quadrado					
Pandemia	0,00000008*	33,27	1	0,05	sim
Grau de parentesco do cuidador	0,08	3,16	1	0,05	não
Idade do cuidador	0,73	0,12	1	0,05	não
Cor do cuidador	0,04*	4,42	1	0,05	sim
Situação conjugal do cuidador	0,46	0,54	1	0,05	não
Escolaridade do cuidador	0,99	0,00	1	0,05	não
Número de moradores da residência	0,89	0,020508405	1	0,05	não
Número de filhos por mãe	0,96	0,002	1	0,05	não
Sexo da criança	0,07	3,33	1	0,05	não
Cor da criança	0,18	1,78	1	0,05	não
Acompanhamento médico regular	0,05	3,82	1	0,05	não
Ordem de nascimento	0,79	0,07	1	0,05	não
Renda familiar	0,96	0,002	1	0,05	não
Benefício do governo	0,81	0,06	1	0,05	não

^{*}Significância estatística - p< 0,05

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2020).

As respostas obtidas com os cuidadores sobre o motivo da inconformidade vacinal foram divididas em dois grupos de motivos conforme a resposta. No caso de a resposta ter sido algo relacionado a pandemia, foi denominada a resposta como sim e os demais motivos como não, a partir daí foi realizada a regressão logística também dessa variável para avaliar o nível de significância da mesma sobre o atraso vacinal, conforme citado anteriormente e consta na tabela 9.

A compreensão dos outros motivos relacionados à inconformidade vacinal das crianças participantes da pesquisa e a influência da pandemia na situação vacinal delas, foram, após uma pré-análise, divididos em categorias para análise de conteúdo conforme quadro 1. Para manter o anonimato, os cuidadores das crianças com inconformidade vacinal foram numerados de 1 a 48 e após cada resposta foi identificado o autor da mesma.

QUADRO 1 - Categorização da inconformidade vacinal em 2020 das crianças nascidas em 2016, Franca/SP, 2021

Categorias	Respostas			
Motivo do atraso vacinal				
Pandemia	"Medo de contaminação de Covid" (CUIDADOR 2)			
	"Pandemia, medo de contaminar" (CUIDADOR 6)			
	"Fiquei com medo devido a pandemia" (CUIDADOR 17)			
	"Pandemia, medo de contaminar"			
	(CUIDADOR 21)			
	"Por causa da pandemia, medo de ir no posto" (CUIDADOR 22) "Por causa da pandemia" (CUIDADOR 23)			
	"Medo de contaminar" (CUIDADOR 24)			
	"Medo de contaminar" (CUIDADOR 25)			
	"Por causa dos horários da vacina na pandemia" (CUIDADOR 26) "Por medo de contaminar na pandemia" (CUIDADOR 30)			
	"Por causa da pandemia" (CUIDADOR 31)			
	"Por causa da pandemia, medo de contaminar" (CUIDADOR 32)			
	"Por causa da pandemia a vacina de gripe era em outra UBS" (CUIDADOR 33)			
	"Fiquei com medo da pandemia" (CUIDADOR 34)			
	"Medo da pandemia" (CUIDADOR 35)			
	"Por causa da pandemia, medo de contaminar" (CUIDADOR 40) "Dificuldade porque só estava fazendo no posto longe e medo de contaminar"			
	(CUIDADOR 43)			
	"Por causa da pandemia e eu estava sozinha com minhas filhas" (CUIDADOR 45)			
	"Devido a pandemia, fui esperando melhorar para ir" (CUIDADOR 47)			
Esquecimento	"Esqueci da dose" (CUIDADOR 10)			
	"Esqueci" (CUIDADOR 12) "Esqueci" (CUIDADOR 16)			
	"Esqueci" (CUIDADOR 16)			
	"Displicência" (CUIDADOR 20)			
	"Não lembrei dessa dose nessa idade" (CUIDADOR 28) "Esqueci das vacinas de 4 anos"			
	"Esqueci das vacinas de 4 anos" (CUIDADOR 36)			
	"Esqueci das doses de 4 anos" (CUIDADOR 41)			
	"Porque esqueci das doses" (CUIDADOR 42)			
	"Não sei o que houve, esqueci" (CUIDADOR 44)			
	"Esqueci e também não gosto da vacina de gripe" (CUIDADOR 46)			
Ocupação do	"Esqueci das doses" (CUIDADOR 48) "Pai enrolou para levar" (CUIDADOR 7)			
responsável	"Pai enrolou para levar" (CUIDADOR 8)			
	"Não levo sempre na campanha" (CUIDADOR 13)			
	"Devido ao trabalho" (CUIDADOR 14) "Pelo trabalho, dificuldade de horário" (CUIDADOR 27)			
	"Pelo trabalho, dificuldade de horário" (CUIDADOR 27) "Pelo trabalho, faltou tempo"			
	(CUIDADOR 37)			
	"Ficou as vezes com a outra avó que não levou" (CUIDADOR 38) "Pelo trabalho" (CUIDADOR 39)			
Desconhecimento	"Achava que era para fazer com outra idade" (CUIDADOR 1)			
(dose ou idade)	"Não sabia que tinha que dar" (CUIDADOR 4)			
	"Não sabia e o pediatra que alertou posteriormente" (CUIDADOR 5)			
	"Não sabia da vacina" (CUIDADOR 11)			

Continuação

Categorias	Respostas		
Motivo do atraso vacinal			
Medo de reação da vacina	"Teve reação forte" (CUIDADOR 3) "Alergia, aguardou o pediatra liberar" (CUIDADOR 9) "Tenho medo de reação alérgica" (CUIDADOR 15)		
Dificuldade com a criança	"Dificuldade para levar a criança pela resistência dela" (CUIDADOR 18)		
Adoecimento	"Ele estava em tratamento de leucemia, esperei a médica liberar" (CUIDADOR 29)		

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021).

A tabela 8 e o quadro 1 tratam do motivo da inconformidade vacinal, a diferença seria apenas que a tabela 8 foi obtida com base nas respostas marcadas no próprio formulário da pesquisa, no *Google Forms*, para análise quantitativa que colocou as respostas relacionadas ao esquecimento ou desconhecimento da vacina em uma mesma categoria. Enquanto o Quadro 1, as respostas dadas pelos cuidadores foram categorizadas para uma análise qualitativa, após uma pré-análise das respostas de forma que permita uma maior discussão dos motivos relacionados à inconformidade vacinal.

9 DISCUSSÃO

O declínio da cobertura vacinal infantil vem ocorrendo no Brasil desde 2016, por vários fatores associados, sendo a hesitação vacinal um fator de grande relevância para tal ocorrido (SATO, 2018). Um estudo ecológico, baseado em informações do Departamento de Informática do SUS, avaliou a cobertura vacinal de 2006 a 2016, em todas as regiões brasileiras, e demonstrou tendência de queda na imunização de forma heterogênea entre os municípios brasileiros (ARROYO *et al.*, 2020). Outras condições que influenciam na cobertura vacinal devem ser conhecidas e a pandemia da Covid-19 modificou todo o cotidiano da população mundial, inclusive no que concerne à vacinação infantil (WORLD HEALTH ORGANIZZATION, 2021a).

Este estudo avaliou a cobertura vacinal de crianças nascidas em 2016, residentes do município de Franca- SP, no ano de 2020, que foi o ano inicial da pandemia da Covid-19. Neste referido ano as crianças pesquisadas deveriam receber, segundo o calendário vacinal do estado de São Paulo, as doses de reforços das vacinas Varicela, DTP, Febre amarela e VOP, além da dose anual de Influenza (ANEXO B). O conceito do tempo considerado como um atraso vacinal varia entre as pesquisas no tema, sendo encontrado trabalhos de avaliação de cobertura vacinal onde, por exemplo, o atraso seria quando a dose foi aplicada em qualquer dia posterior à data agendada (FERNANDES, A. C. N. et al., 2015) ou 30 dias da idade determinada (YOKOKURA et al., 2013; CARDOSO et al., 2015; FERREIRA et al., 2018).

O ideal que essas doses sejam feitas exatamente aos 4 anos, porque coincide com a necessidade de reforço para proteção contra os patógenos na idade que a criança inicia a vida escolar. Para esta pesquisa, foi considerado atraso vacinal quando as doses foram realizadas 3 meses após a idade recomendada e, no caso da vacina de Influenza, foi avaliada a aplicação, ou não, da dose anual.

A participação em campanhas de vacinação, como no Dia Nacional de Vacinação, é de grande importância para corrigir as falhas da vacinação de rotina (MELLO *et al.*, 2010). Os estudos com inquéritos vacinais permitem conhecer os dados reais de vacinação, suprindo as falhas dos sistemas de informação (MORAES *et al.*, 2003). Nesta pesquisa mostra a importância do inquérito vacinal em cruzar

dados do registro na caderneta de vacinação e a resposta do cuidador. Pois a maioria dos cuidadores referiram levar sempre em campanhas, no entanto, em vários cartões de vacina não constava nenhuma marcação de VOP de campanha e nem da vacinação de Influenza, que é feita anualmente, sendo esta última avaliada também a participação nos anos de 2019 e 2021. As duas crianças da amostra que não receberam nenhuma vacinação no ano de 2020, nem as doses de reforço dos 4 anos e nem a vacina de influenza, também nunca haviam recebido nenhuma dose de campanha de VOP, no entanto seus cuidadores responderam que levavam em campanhas de vacinação.

No tocante às características sociodemográficas das crianças com atraso vacinal da amostra pesquisada, não houve significância estatística em relação às variáveis sexo da criança, cor da criança, número de filhos por mãe e nem quanto a ordem de nascimento da criança. O que poderia ser justificado por um viés de seleção da amostragem. Nunes *et al.* (2018) demonstraram, em seu trabalho, que ter três ou mais filhos aumentou a chance de não ser vacinado em duas vezes, assim como a ordem de nascimento, o fato de ser o quarto filho, ou mais, aumentou em 1,5 vezes a chance de não ser vacinado em relação a ser o primeiro até terceiro filho. A maior paridade também esteve relacionada à maior incompletude vacinal na avaliação da cobertura de menores de 12 meses em Pelotas-RS (BUFFARINI; BARROS; SILVEIRA, 2020). Estudos realizados fora do Brasil também evidenciaram essa relação com o tamanho da família maior ser significativo para uma menor vacinação (OLIVEIRA; MARTINEZ; ROCHA, 2014; NOUR *et al.*, 2020; MINTO'O *et al.*, 2022).

A consulta de rotina periódica na criança é denominada consulta de puericultura, onde o principal objetivo é a prevenção de doenças e educação em saúde, sendo a avaliação e a orientação do estado vacinal um dos objetivos dessa consulta (FERNANDES, T. F., 2017). Nesta pesquisa, mais da metade das crianças com atraso vacinal só procuram o pediatra quando estão doentes, não são levadas em consultas de rotina, apesar dessa variável não ter apresentado significância estatística sobre o atraso vacinal, esta variável serve como um alerta de que as crianças regularmente acompanhadas podem ter menos inconformidades vacinais. Um exemplo que ratifica esse fato é que Ana Catharina Nunes Fernandes *et al.* (2015) demonstraram em seu trabalho a relação estatisticamente significativa das crianças que não comparecem em consultas de puericultura e o atraso vacinal.

Kujawski *et al.* (2022) também encontraram redução nas consultas pediátricas de rotina e na vacinação, nos Estados Unidos, durante os meses iniciais da pandemia, e foi maior a redução em crianças de maior idade.

As variáveis relacionadas aos cuidadores das crianças com atraso vacinal desta pesquisa, como idade, escolaridade, grau de parentesco e situação conjugal também não tiveram relação significativa com a inconformidade vacinal da criança. Todavia, a variável cor do cuidador, neste estudo, foi significativa no atraso vacinal, na qual a maior parte dos cuidadores de crianças com atraso vacinal se declararam de cor branca. Essa predominância da cor branca entre os cuidadores da amostra da pesquisa, poderia também ser secundário a um viés de seleção da amostra. Já Yokokura *et al.* (2013) encontraram maior incompletude vacinal em filhos de cuidadores que se denominam de cor preta.

A idade do cuidador foi significativa num estudo com pré-escolares no Piauí, onde foi demonstrado que cuidadores com idade inferior a 24 anos tem maior associação com a incompletude vacinal (FERNANDES, A. C. N. *et al.*, 2015). Em uma revisão sistemática e meta-análise sobre preditores de cobertura vacinal na Etiópia, Nour *et al.* (2020) demonstraram que a educação formal dos cuidadores, pai e mãe, foi significante na maior imunização dos filhos, assim como o conhecimento da mãe sobre a idade correta do calendário vacinal.

A relação entre a renda familiar das crianças com o atraso vacinal, varia entre os inquéritos vacinais encontrados na literatura. Neste estudo, não houve significância estatística entre a renda familiar e o atraso vacinal, a maior parte das famílias das crianças com inconformidade vacinal recebiam entre 3 a 5 salários mínimos e as outras crianças pertenciam a famílias com renda de até 2 salários mínimos, apenas 1 criança tinha renda familiar superior a 6 salários mínimos. Alguns estudos encontraram relação significativa de maior inconformidade vacinal em crianças dos estratos econômico D e E (YOKOKURA *et al.*, 2013; BARATA; PEREIRA, 2013). Contudo, em um inquérito nas 27 capitais brasileiras, Barata *et al.* (2012) encontraram menor cobertura vacinal no quintil econômico mais alto em 10 capitais, já em 3 capitais a menor cobertura estava no estrato socioeconômico mais baixo.

As medidas preventivas como a vacinação, é deixada em segundo plano devido às condições econômicas desfavoráveis de vida, como a baixa renda, associada à família numerosa, em que a mãe é a cuidadora central, por vezes

sozinha, focada em tantos afazeres domésticos, que acaba por priorizar a alimentação e o tratamento de doenças (TERTULIANO; STEIN, 2011). Essa variação entre as pesquisas de coberturas vacinais e o estrato socioeconômico possibilita a investigação de novos estudos para aprofundar o conhecimento sobre determinantes e condicionantes da vacinação em estratos sociais mais altos e baixos.

Apesar das dificuldades na vacinação encontrada em situações econômicas desfavoráveis, a prosperidade econômica não é sinônimo de vacinação. Em um trabalho qualitativo com famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, Couto e Barbieri (2015) descreveram os motivos elencados por famílias cujos pais não-vacinam, de forma consciente, acreditam estar protegendo seus filhos com a não-vacinação. Ou seja, mesmo em condições de bom desenvolvimento econômico, pode-se encontrar famílias com desenvolvimento social ruim, quando se analisa a falta de liberdade dada aos filhos de viver com condições plenas de saúde, livre de doenças que seriam prevenidas com a vacinação

Receber algum tipo de benefício social e/ou eventuais do governo, não foi uma variável com relação significativa com o atraso vacinal neste estudo. Porém, em um trabalho qualitativo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (2020) que busca entender os motivos que levam as famílias a vacinarem, ou não, os seus filhos, foi relatado entre os principais fatores elencados pelos grupos focais como um motivo para vacinar, é o fato da obrigatoriedade de apresentar o cartão vacinal da criança para a matrícula escolar e para o recebimento de benefício como o Bolsa Família. Em seu estudo, Yokokura *et al.* (2013), supõem que o recebimento do Bolsa Família possa ter contribuído para elevar a cobertura vacinal no município de São Luís. Estudos como estes demonstram como programas de transferência de renda dos governos podem contribuir no desenvolvimento social.

Ao ser detectado no cartão da criança o atraso ou ausência vacinal em relação às doses de reforços dos 4 anos e/ou ausência da vacina de Influenza de 2020, foi questionado ao cuidador o motivo da inconformidade vacinal, sendo as respostas categorizadas de forma sistemática para análise de conteúdo. Como se trata de uma resposta direta a um questionamento, a categorização das respostas exige um nível baixo de teorização (BARDIN, 2011, p. 68), mas que se pode fazer a interpretação e inferências.

A categoria pandemia foi o motivo mais citado para justificar a inconformidade vacinal entre os participantes da pesquisa. E ela apareceu nas respostas mostrando sua influência na vacinação em mais de um aspecto, o que poderia ser dividido em subcategorias – relacionada ao medo, à modificação do funcionamento do sistema de saúde e uma subcategoria mista, relacionar os dois anteriormente citados.

O medo da contaminação, que foi o sentimento mais vivenciado, ficou explícito na maior parte das respostas. Sendo a palavra "medo" evidente nas falas de 12 dos cuidadores, por vezes de forma semelhante:

"Medo de contaminar"; "Por causa da pandemia, medo de ir no posto"; "Medo de contaminação de Covid"; "Fiquei com medo devido a pandemia"; "Pandemia, medo de contaminar" (QUADRO 1, 2021).

O impacto da pandemia na saúde mental gera longas discussões, tamanha sua repercussão, mas o medo vivenciado pode ser o causador de uma pandemia paralela, o temor pela contaminação não é apenas devido ao risco da própria morte ou de algum ente próximo, é também acompanhado do sentimento de desarrimo, pelas incertezas sociais e econômicas (ORNELL *et al.*, 2020). E nas respostas de três cuidadores esse medo apareceu também de forma subentendida:

"Por causa da pandemia e eu estava sozinha com minhas filhas"; "Por causa da pandemia"; "Devido à pandemia, fui esperando as coisas melhorarem" (QUADRO 1, 2021).

Outro aspecto que a pandemia influenciou na vacinação foi a modificação no funcionamento do sistema de saúde. No município de Franca- SP, as Unidades Básicas de Saúde não estavam todas aplicando as vacinas de rotina ou a vacina de influenza, devido utilização de algumas unidades para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, outras atendiam as outras patologias não-respiratórias para não sobrecarregar os serviços de urgência. Assim, as salas de vacinas funcionavam em formato de rodízio entre as unidades e com horários escalonados. Dois cuidadores justificaram o atraso nas doses de reforço ou a ausência da vacina de influenza devido essas mudanças ocorridas nos serviços de saúde durante a pandemia:

"Por causa dos horários da vacina na pandemia"; "Por causa da pandemia, a vacina de gripe era em outra UBS" (QUADRO 1, 2021).

Essa mudança no sistema de saúde dificulta a vacinação de rotina, até mesmo no fato de exigir um maior deslocamento com maior gasto econômico e de tempo da família. Outras localidades vivenciaram essa mesma alteração de logística. No Texas, houve um declínio da vacinação infantil de rotina durante a pandemia e foi mais evidente nas crianças moradoras da zona rural (NUZHATH *et al.*, 2021). Pesquisa colombiana com crianças até 5 anos de idade, mostrou redução na cobertura vacinal quando comparado os meses de março a outubro dos anos de 2019 e 2020, em todas as faixas etárias, para comparar a vacinação entre os dois anos nos meses de maior restrição devido a pandemia. Sendo nas crianças de 5 anos redução de 10,2% no reforço da DTP e 11,4% no segundo reforço da VOP, no entanto, a maior queda encontrada foi nas crianças menores de 12 meses que vivem em áreas rurais (MORENO-MONTOYA *et al.*, 2021).

Destaca-se ainda que um maior deslocamento para vacinação significa maior exposição e maior risco de contágio, o que justifica a resposta de um cuidador, que se encaixaria em uma subcategoria mista:

"Dificuldade porque só estava fazendo no posto longe e o medo de contaminar" (QUADRO 1, 2021).

A pandemia como um fator influenciador no declínio da cobertura vacinal infantil de rotina já foi mostrada em alguns trabalhos, principalmente baseados em dados de sistema de informação nacional considerando o registro do número de doses aplicadas. Por exemplo, segundo Tércia Moreira Ribeiro da Silva et al. (2021), no Brasil, houve redução na aplicação de doses da vacina de Tríplice Viral (MMR) no período de início da pandemia, principalmente as regiões Norte, Nordeste e Sul. Em um estudo ecológico, Procianoy et al. (2022), compararam a cobertura vacinal no território nacional de 2013 a 2020, sendo registrado no ano inicial da pandemia o menor valor histórico de cobertura em nove das dez vacinas analisadas.

Em uma revisão narrativa, Chiappini *et al.* (2021), selecionaram 48 artigos na literatura, onde concluiu-se que houve um declínio na cobertura vacinal infantil de rotina nos primeiros meses de 2020, como um efeito indireto da pandemia

Covid-19. Estudo americano também encontrou resultado semelhante no que tange a vacinação de crianças e adolescentes no ano de 2020 (KUJAWSKI *et al.*, 2022).

No Canadá, um estudo realizado com crianças de zero a 2 anos participantes de uma rede de pesquisa de atenção primária, Lee *et al.* (2022) encontraram que aumentou em até 3 vezes as chances de as vacinas de rotina infantil atrasarem durante a pandemia. Um estudo ecológico feito na República Dominicana demonstrou redução em torno de 10% na redução global de todas as vacinas da infância durante a pandemia (COLOMÉ-HIDALGO; CAMPOS; MIGUEL, 2022).

Um trabalho indiano comparou a vacinação de crianças de 1 ano de idade, conforme a completude vacinal antes do lockdown no país devido a pandemia, durante e após. Os dados revelaram que as crianças que completaram a idade para imunização durante o bloqueio foram as que tiveram maior inconformidade vacinal e várias delas não haviam atualizado o cartão até a data do estudo. Este declínio foi mais evidente entre famílias mais pobres, de castas inferiores, menos instruídas e residentes de áreas de maior contaminação da Covid-19, mas sem significância estatística (JAIN *et al.*, 2021).

As medidas de distanciamento social para controle da disseminação do SARS-CoV-2, acabaram por reduzir a disseminação de outros vírus e bactérias causadores de enfermidades respiratórias, como estudo inglês que demonstrou que o número de casos de Coqueluche durante o ano de 2020 foi o menor da última década (TESSIER et al., 2022). Os casos de infecção pelo vírus da Influenza também foram menores durante o tempo de bloqueio, mas a importância da vacinação anual de Influenza ficou mais evidente a partir do momento que ela reduz os casos de síndrome respiratória aguda pelo vírus da Influenza, o que auxilia no diagnóstico diferencial e na sobrecarga do sistema de saúde durante a pandemia (CHIAPPINI et al., 2021). Contudo, Roman et al. (2021), demonstrou uma queda na vacinação de Influenza em crianças americanas, chegando a 11,9% na faixa etária de 2 a 4 anos, quando comparado o ano de 2020 com 2018 e 2019.

A ausência da vacinação de Influenza neste estudo foi fundamentada, pelos cuidadores, por razões pertencentes a várias categorias de motivos elencadas. Dentre as respostas, destaca-se aquelas que são fruto de ideias errôneas acerca de efeitos colaterais da vacina:

"Tenho medo de reação alérgica"; "Esqueci e também não gosto da vacina de gripe"; "Teve reação forte"; "Não levo sempre na campanha" (QUADRO 1, 2021).

É relevante destacar que a decisão, entre vacinar ou não o filho, é muito influenciada por informações veiculadas na mídia e redes sociais (SUCCI, 2018). Em vários casos há uma desinformação baseada em notícias falsas, o que compromete a cobertura vacinal (CRUZ, 2017). O medo de reação alérgica às vacinas é um motivo que leva ao atraso vacinal ou a não-vacinação como apareceu nos grupos focais do estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (2020). Por vezes, o que o cuidador refere como reação alérgica, trata-se de reações adversas comuns da imunização. Nesta pesquisa, esse medo de reação alérgica foi declarado por três cuidadores e dentre elas, nota-se o medo da reação é devido a um motivo real que ficou bem fundamentado apenas na fala de um dos cuidadores:

"Alergia, aguardou o pediatra liberar" (QUADRO 1, 2021).

A segunda categoria de maior frequência, como motivo da inconformidade vacinal, foi a relacionada ao esquecimento, presente na fala de 12 cuidadores, que se expressaram com apenas o verbo ou acompanhado do objeto do esquecimento, as referidas doses das vacinas:

"Esqueci da dose"; "Esqueci"; "Não lembrei dessa dose nessa idade"; "Esqueci das vacinas de 4 anos"; "Esqueci das doses de 4 anos"; "Porque esqueci das doses"; "Não sei o que houve, esqueci" (QUADRO 1, 2021).

O esquecimento foi o motivo de não-vacinação mais citado pelos cuidadores de crianças faltosas à vacinação, demonstrado em um inquérito domiciliar em Bauru - SP, onde 16% apontaram essa causa (GATTI; OLIVEIRA, 2005).

Conhecer o cartão vacinal da criança e saber as vacinas que ela precisará tomar ao longo de sua infância é um importante fator contribuinte na cobertura vacinal. As marcações feitas pelos profissionais da sala de vacina auxiliam aos pais no traquejo de vacinarem seus filhos rotineiramente. As consultas pediátricas de rotina, assim como a participação em campanhas auxiliam na correção das arestas no calendário vacinal da criança. Na revisão etíope, já citada

anteriormente, foi demonstrado a importância, para a adequada imunização infantil, da instrução materna e do conhecimento da mesma sobre a idade de vacinação (NOUR *et al.*, 2020). A baixa escolaridade materna também foi relacionada à menor vacinação, quando são introduzidas novas vacinas no calendário de rotina (SILVA, F. S. *et al.*, 2018).

O desconhecimento da dose ou da idade de vacinação foi um motivo citado por quatro cuidadores, na maior parte das vezes utilizando o verbo saber:

"Achava que era para fazer com outra idade"; "Não sabia que tinha que dar"; "Não sabia e o pediatra que alertou posteriormente"; "Não sabia da vacina" (QUADRO 1, 2021).

Ter um trabalho remunerado foi associado a completude vacinal em um inquérito na Amazônia peruana (GUIMARÃES et al., 2020). Não obstante, o horário de funcionamento das salas de vacina constitui um obstáculo aos cuidadores que trabalham fora de casa, sendo este um motivo alegado por responsáveis em vários estudos sobre cobertura vacinal (GATTI; OLIVEIRA, 2005; CARDOSO et al., 2015; NUNES et al., 2018; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2020). A categoria ocupação do responsável, incluiu oito cuidadores nesta pesquisa. Algumas respostas denotaram a clara relação com a dificuldade relacionada ao trabalho e o horário de vacinação:

"Devido ao trabalho" "Pelo trabalho, dificuldade de horário" "Pelo trabalho, faltou tempo" "Pelo trabalho" (QUADRO 1, 2021).

Em outras respostas, não aparece de forma nítida a relação com a ocupação do responsável, ou se trata de displicência com a situação vacinal do infante:

"Pai enrolou para levar"; "Não levo sempre na campanha"; "Ficou as vezes com a outra avó que não levou" (QUADRO 1, 2021).

O adoecimento da criança na data indicada para a vacinação é uma razão alegada por cuidadores para a inconformidade vacinal (GATTI; OLIVEIRA, 2005; CARDOSO *et al.*, 2015; NUNES *et al.*, 2018). É importante frisar que há doenças que realmente contraindicam a vacinação ou necessitam de tempo

oportuno para que ela seja realizada, como ficou evidente na resposta do cuidador que se encaixa nesta categoria:

"Ele estava em tratamento de leucemia, esperei a médica liberar" (QUADRO 1, 2021).

Os inquéritos vacinais que pesquisam o motivo do atraso vacinal, por vezes, trazem a categoria denominada de outros, onde se encaixariam causas diversas que não esclarecem de fato a razão da inconformidade vacinal (GATTI; OLIVEIRA, 2005). Neste estudo foi classificada ainda uma última categoria para o motivo de inconformidade vacinal, que também poderia ser colocado em um grupo de miscelâneas, mas preferiu-se pontuar o motivo apontado que ficou marcado na resposta do cuidador e poderia influenciar numa menor cobertura vacinal nesta idade:

"Dificuldade para levar a criança pela resistência dela" (QUADRO 1, 2021).

A partir da interpretação das respostas obtidas com os cuidadores quanto ao motivo da inconformidade vacinal na coorte pesquisada, podemos inferir a importância da pandemia da Covid-19 como um fator influenciador na vacinação infantil de rotina, tanto pelo medo que a mesma causou, como também pela alteração no funcionamento dos serviços de saúde. Além do fato de que foi um motivo estatisticamente significativo neste estudo.

Os outros motivos elencados, anteriormente discutidos, são de grande relevância e seu conhecimento pode contribuir na redução da queda na cobertura vacinal que vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil. Estudos sobre a cobertura vacinal infantil de uma localidade, principalmente os inquéritos vacinais, são de fundamental importância para o conhecimento real da imunização infantil (YOKOKURA *et al.*, 2013), pois propiciam diagnósticos de falhas na vacinação com consequentes ações de saúde pública direcionadas (TERTULIANO; STEIN, 2011).

A relação entre a cobertura vacinal e o desenvolvimento social parte da premissa que a vacina propicia ao indivíduo o não-adoecimento, manter-se saudável para ter condições de viver de forma plena. O investimento em vacinas faz parte da meta a ser alcançada da ODS 3 (Objetivos de Desenvolvimento sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja Agenda de Imunização 2030 é uma

estratégia global para a década de 2021 a 2030, a fim de manter os ganhos já conquistados até o momento com a imunização e aumentar os mesmos com a melhoria na cobertura global e maior acesso universal às vacinas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021b).

Nota-se que apesar da presença do atraso na vacinação e a ausência da dose da vacina anual de Influenza em algumas crianças, foi baixo o número de crianças sem nenhuma dose das vacinas alvo do estudo. O resultado da pesquisa pode ter influência de um viés de seleção, por consequência da amostra ter sido limitada aos alunos matriculados em escolas públicas do município cujo os cuidadores concordaram em participar do estudo. Além disso, reconhece-se as limitações do estudo, por ser um estudo retrospectivo, pode ter ocorrido um viés de memória dos cuidadores durante as entrevistas e ainda um viés de informação devido à circunstância da utilização de fonte secundária, que seriam os cartões de vacinas das crianças, que podem conter erros de anotações.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa contempla uma temática relevante para a saúde pública e que influencia no desenvolvimento social. A pandemia Covid-19 ainda faz parte do presente e só futuramente será conhecido o seu real impacto para toda uma geração. É fato que seus efeitos diretos já foram, e continuam sendo, devastadores. Os efeitos indiretos são inúmeros e já fazem com que essa pandemia seja denominada como uma sindemia.

Este modelo de estudo permitiu reconhecer a situação vacinal da faixa etária pesquisada e os fatores associados à inconformidade na imunização. Bem como demonstrar que houve relação entre a pandemia e a vacinação infantil. Necessita-se de mais estudos, preferencialmente do tipo inquérito vacinal, para avaliação da real cobertura vacinal no município, em especial nos anos de vivência da pandemia da Covid-19.

Mesmo considerando os vieses do estudo, foi demonstrado a influência significativa da pandemia na inconformidade vacinal e a análise de conteúdo das falas dos cuidadores entrevistados ratificaram esse achado.

Espera-se que o mesmo possa contribuir com a produção de conhecimento científico sobre a relação da pandemia da Covid- 19 com a cobertura vacinal infantil. Que este estudo possa estimular a realização de outros trabalhos com a mesma temática, englobando faixas etárias diversas, para que planejamentos governamentais sejam realizados no sentido de traçar estratégias para atingir os índices desejáveis de cobertura vacinal, prevenindo a ocorrência de surtos de doenças imunopreveníveis com consequente ganho no desenvolvimento social.

REFERÊNCIAS

ALDERWICK, Hugh *et al.* Will a new NHS structure in England help recovery from the pandemic? *BMJ*, London, v. 372, n. 248, p. 1-5, Feb. 2021. Disponível em: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n248.abstract. Acesso em: 16 jan. 2022.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Guidance on Providing Pediatric Well-Care During Covid-19. Itasca, 2020. Disponível em:

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/guidance-on-providing-pediatric-well-care-during-covid-19/. Acesso em: 16 jun. 2021.

ARAÚJO, Juliane Pagliari *et al.* História da saúde da criança: conquista, políticas e perspectivas. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, DF, v. 67, n. 6, p. 1000-1007, nov./dez. 2014. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/reben/a/rBsdPF8xx9Sjm6vwX7JLYzx/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 7 jan. 2022.

ARKEMAN, Marco. Saúde e desenvolvimento local: princípios, conceitos, práticas e cooperação técnica. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

ARROYO, Luiz Henrique *et al*. Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006 – 2016): mapas da heterogeneidade regional. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, p. 1-18, 2020. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/qw4q8qKLKvC4fDJ5S3BrDkJ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 jun. 2022.

AVAAZ; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. As fake News estão nos deixando doentes? São Paulo, nov. 2019. Disponível em: https://sbim.org.br/images/files/po-avaaz-relatorio-antivacina.pdf. Acesso em: 10 set. 2021.

BARATA, Rita Barradas *et al.* Socioeconomic inequalities and vaccination coverage: resultus of na immunisation coverage survey in 27 Brazilian capitals, 2007-2008. *Journal of Epidemiology Community Health*, London, v. 66, n. 10, p. 934-941, Oct. 2012. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3433223/. Acesso em: 15 jun. 2022.

______.; PEREIRA, Susan M. Desigualdades sociais e cobertura vacinal na cidade de Salvador, Bahia. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 266-277, jun. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepid/a/3NsdZWTHFFL5MRrKVStcBPm/?format=pdf&lang=pt.

Acesso em: 15 jun. 2022.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo.* Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

BISPO JÚNIOR, José Patrício; SANTOS, Djanilson Barbosa dos. Covid-19 como sindemia: modelo teórico e fundamentos para a abordagem abrangente em saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 37, n. 10, p. 1-14, 2021. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/LVBpYxSZ7XbdXKm74TPPmzR/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 18 jan. 2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da* União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 fev. 2022. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, Seção 1, p. 18055-18059, 20 set. 1990a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 fev. 2022. . Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 25694-25695, 28 dez. 1990b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/l8142.htm. Acesso em: 10 fev. 2022. . Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquistas. Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus principios.pdf. Acesso em: 2 jan. 2022. . Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Imunizações: 30 anos. Brasília, DF, 2003. (Série C. Projetos e Programas e Relatórios). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro 30 anos pni.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021. . Ministério da Educação. Assessoria de Comunicação Social. Estatuto da Criança e do Adolescente: hora de fazer valer. Brasília, DF, 2005. . Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2011. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 1). Disponível em: https://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro 1.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022. . Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos. Brasília, DF, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40. pdf. Acesso em: 2 jan. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. *Manual de normas e procedimentos para vacinação*. Brasília, DF, 2014. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança:* orientações para implementação. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <a href="https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.

_____. Ministério da Saúde. *Banco de Informações do Sistema Único de Saúde* – DATASUS. Brasília, DF, 2022. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvsp.def. Acesso em: 20 jan. 2022.

BUFFARINI, Romina; BARROS, Fernando C.; SILVEIRA, Mariângela F. Vaccine coverage within the first year of life and associated factors with incomplete Immunization in a Brazilian birth cohort. *Archives of Public Health*, Brussels, v. 78, n. 21, p-. 1-8, 2020. Disponível em:

https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-020-00403-4. Acesso em: 2 jan. 2022.

CARDOSO, Márcia Dorcelina Trindade *et al.* Avaliação da cobertura vacinal em crianças de 2 meses a 5 anos na Estratégia de Saúde da Família. *Revista da APS*, Juiz de Fora, v. 18, n. 3, p. 273-280, jul./set. 2015. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/15346. Acesso em: 18 nov. 2022.

CHANDIR, Subhash; SIDDIQI, Danya Arif. Inequalities in Covid-19 disruption of routine immunisations and returning to pre-Covid immunization rates. *The Lancet Regional Health*: Western Pacific, London, v. 10, p. 1-2, 2021. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(21)00065-1/fulltext. Acesso em: 16 jun. 2021.

CHANG, Angela Y. *et al.* The equity impact vaccines may have on averting deaths and medical impoverishment in developing countries. *Health Affairs*, Millwood, v. 37, n. 2, p. 316-324, 2018. Disponível em:

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2017.0861. Acesso em: 21 jan. 2022.

CHIAPPINI, Elena *et al.* Impact that the Covid-19 pandemic on routine childhood vaccination and challenges ahead: a narrative review. *Acta Paediatrica*, Oslo, v. 110, n. 9, p. 2529-2535, Sept. 2021. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34028088/. Acesso em: 5. Jun. 2022.

COLUMÉ-HIDALGO, Manuel; CAMPOS, Juan Donado; MIGUEL, Ángel Gil de. Tracking the impact of the Covid-19 pandemic on routine infant vaccination in the Dominican Republic. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, Philadelphia, v. 18, n. 1, p. 1-6, 2022. Disponível em:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21645515.2021.1972708?needAccess=true. Acesso em: 5 jun. 2022.

COSTA, Glauce Dias da *et al.* Avaliação da atenção à saúde da criança no contexto da Saúde da Família no município de Teixeiras, Minas Gerais (MG, Brasil). *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3229-3240, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/nXC3ssKr9bpKNPB73sChncK/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 jan. 2022.

COUTO, Maria Thereza; BARBIERI, Carolina Luisa Alves. Cuidar e (não) vacinar no contexto de famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, SP, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 105-114, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/Mxwd64Cq9mfjSRtmjx3VpdK/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 2 jan. 2022.

CRUZ, Adriane. A queda da imunização no Brasil. *Revista CONSENSUS*, Brasília, DF, ano 7, n. 25, p. 20-29, 2017. Disponível em: https://www.conass.org.br/consensus/queda-da-imunizacao-brasil/. Acesso em: 8 ago. 2021.

DAUMAS, Regina Paiva *et al.* O papel da atenção primária na rede de saúde no Brasil: limites e possibilidades no enfrentamento da Covid-19. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 6, p. 1-7, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/LpxCJfYrMkRWnBr7K9pGnXv/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 jan. 2022.

DESLANDES, Suely Ferreira. A construção do projeto de pesquisa. *In:* MINAYO, Maria Cecília de Souza. (org.). *Pesquisa social:* teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

DOMINGUES, Carla Magda Allan Santos *et al.* Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, DF, v. 28, n. 2, p. 1-4, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ress/a/XRqmb64fFWpBpCCnHCrQjcf/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 5 jan. 2022.

<i>et al</i> . 46 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma história repleta de
conquistas e desafios a serem superados. <i>Cadernos de Saúde Pública</i> , Rio de
Janeiro, v. 36, n. 2, p. 1-17, 2020. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/csp/a/XxZCT7tKQjP3V6pCyywtXMx/?format=pdf⟨=pt.
Acesso em: 3 jan. 2022.

ESTRELA, Fernanda Matheus *et al.* Gestantes no contexto da pandemia da Covid-19: reflexões e desafios. *Physis*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 1-5, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/physis/a/zwPkqzqfcHbRqyZNxzfrg3g/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 jan. 2022.

FARIAS, Luís Arthur Brasil Gadelha *et al.* O papel da atenção primária no combate ao Covid-19: impacto na saúde pública e perspectivas futuras. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 42, p. 1-8, jan./dez. 2020. Disponível em: https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2455/1539. Acesso em: 16 jan. 2022.

FÁVERO, Luiz Paulo *et al. Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FERNANDES, Ana Catharina Nunes *et al.* Análise da situação vacinal de crianças pré-escolares em Teresina (PI). *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 870-882, out./dez. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepid/a/zYfxhdWGBQpSckZXjWxNHFy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 1 iun. 2021.

FERNANDES, Tadeu Fernando. Habilidades básicas da pediatra. *In:* BURNS, Dennis Alexander Rabelo *et al.* (org.). *Tratado de pediatria*. 4. ed. Barueri: Manole, 2017. Seção 2. Cap. 1. p. 52.

FERREIRA, Vinícius Leati de Rossi *et al.* Avaliação de coberturas vacinais de crianças em uma cidade de médio porte (Brasil)utilizando registro informatizado de imunização. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 34, n. 9, p. 1-11, 2018. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/JyFnkHGTfvQLcvnMqmB7Nxc/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 mar. 2021.

FRANÇA, Elizabeth Barboza *et al.* Principais causas da mortalidade na infância no Brasil, em 1990 e 2015: estimativas do estudo de Carga Global de Doença. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Rio de Janeiro, v. 20, suppl. 1, p. 46-60, maio 2017. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rbepid/a/PyFpwMM3fm3yRcqZJ66GRky/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 ago. 2021.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Estudo qualitativo sobre os fatores econômicos, sociais, culturais e da política de saúde relacionados à redução das coberturas vacinais de rotina em crianças menores de cinco anos: sumário executivo. Brasília, DF, out, 2020. Disponível em:

https://www.unicef.org/brazil/relatorios/estudo-sobre-reducao-das-coberturas-vacinais-em-criancas-menores-de-5-

<u>anos#:~:text=Para%20entender%20os%20motivos%20que,2019%20a%20maio%20de%202020</u>. Acesso em: 4 fev. 2022.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois. Saúde e desenvolvimento: uma nova abordagem para uma nova política. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 46, suppl. 1, p. 5-8, 2012. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rsp/a/vCrpxrBvZPNmjRyz397BB3w/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 5 set. 2021.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois; COSTA, Laís Silveira. A saúde na política nacional de desenvolvimento: um novo olhar sobre os desafios da saúde. *In:* FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. *A saúde no Brasil em 2030 – prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro:* desenvolvimento, Estado e políticas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz/IPEA/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. v. 1. p. 103-132. Disponível em: https://books.scielo.org/id/895sg/pdf/noronha-9788581100159-05.pdf. Acesso em: 30 set. 2021.

_____. *et al.* Acesso a vacinas no Brasil no contexto da dinâmica global do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 36. n. 2, p. 1-17, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/DZrjZbq6GZFHzDQFFLGwhcb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 6 jan. 2022.

GATTI, Márcia Aparecida Nuevo; OLIVEIRA, Luiz Roberto. Crianças faltosas à vacinação, condições de vida da família e concepção sobre vacina: um inquérito domiciliar. *Salusvita*, Bauru, v. 24, n. 3, p. 427-436, 2005. Disponível em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.5476&rep=rep1&type=pdf. Acesso em:10 ago. 2021.

GREENHALGH, Trisha *et al.* Video consultations for Covid-19. *BMJ*, London, v. 368, p. 1-2, 2020. Disponível em: https://www.bmj.com/content/368/bmj.m998. Acesso em: 16 jan. 2022.

GUIMARÃES, Maria Gabriela Silva *et al*. Avaliação da cobertura vacinal e fatores associados à aderência ao calendário vacinal em menores de 5 anos em Iñapari, na Amazônia peruana. *Scientia Naturalis*, Rio Branco, v. 2, n. 1, p. 72-83, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/3395. Acesso em: 17 fev. 2021.

HARZHEIM, Erno; STEIN, Airton T.; ÁLVAREZ-DARDET, Carlos. A efetividade dos atributos da atenção primária sobre a saúde infantil. *Boletim de Saúde,* Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 24-40, jan./jun. 2004. Disponível em: http://www.boletimdasaude.rs.gov.br/conteudo/1270/a-efetividade-dos-atributos-da-atencao-primaria-sobre-a-saude-infantil Acesso em: 12 jan. 2022.

HORTON, Richard. Offline: Covid-19 is not a pandemic. *The Lancet*, London, v. 396, p. 874, Sept. 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext. Acesso em: 19 jan. 2022.

IBGE. *Cidades e Estados:* Franca/SP. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama. Acesso em: 23 jan. 2022.

JAIN, Radhika *et al.* Covid-19 related immunization disruptions in Rajasthan, India: A retrospective observational study. *Vaccine*, Kidlington, v. 39, n. 31, p. 4343-4350, July 2021. Disponível em:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21007581?via%3Dihub. Acesso em: 5 jun. 2022.

KHETRAPAL, Sonalini; BHATIA, Rajesh. Impact of Covid-19 pandemic on health system & Sustainable Development Goal 3. *Indian Journal of Medical Research*, New Delhi, v. 151, n. 5, p. 395-399, May 2020. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7530436/. Acesso em: 15 jan. 2022.

KLUGE, Hans Henri P. *et al.* Prevention and control of non-communicable diseases in the Covid-19 response. *The Lancet*, London, v. 395, p. 1678-1680, May 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31067-9/fulltext. Acesso em: 18 jan. 2022.

KROPIWIEC, Maria Volpato; FRANCO, Selma Cristina; AMARAL, Augusto Randüz do. Fatores associados à mortalidade infantil em município com Índice de Desenvolvimento Humano elevado. *Revista Paulista de Pediatria*, São Paulo, v. 35, n. 4, p. 391-398, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rpp/a/x84JKrDFxCyfWGHKxwx8cFQ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 jan. 2022.

KUJAWASKI, Stephani A. *et al.* Impact of the Covid-19 pandemic on pediatric and adolescente vaccination and well child in the United States: a database analysis. *Vaccine*, Kidlington, v. 40, n. 5, p. 706-713, jan. 2022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35012776/. Acesso em: 5 jan. 2022.

LEÃO, Cláudia Danyella Alves; CALDEIRA, Antônio Prates; OLIVEIRA, Mônica Maria Celestina de. Atributos da atenção primária na assistência à saúde da criança: avaliação dos cuidadores. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife v. 11, n. 3, p. 323-334, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/4sMPHyWjcRPQqJnWXfkHCBf/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 5 jan. 2022.

LEE, Da In Diane *et al.* Delay in childhood vaccination during the COVID-19 pandemic. *Canadian Journal of Public Health*, Ottawa, v. 113, n. 1, p. 126-134, Feb. 2022. Disponível em:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8773389/pdf/41997_2021_Article_601_pdf. Acesso em: 5 jun. 2022.

LEVI, Guido Carlos. *Recusa de vacinas:* causas e consequências. São Paulo: Segmento Farma, 2013

LESSA, Sérgio de Castro; SCHARAMM, Fermin Roland. Proteção individual *versus* proteção coletiva: análise bioética do programa de vacinação infantil em massa. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 115-124, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/VjfWZvktRQKHS3cvsWZkfpJ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 jan. 2022.

LIMA, Luciana Dias de; CARVALHO, Marília Sá; COELI, Cláudia Medina. Sistema Único de Saúde: 30 anos de avanços e desafios. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, p. 1-2, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/8vzRfCDsP6rP6NNDFxxHpht/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 3 jan. 2022.

MACDONALD, Noni E.; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitance: Definition, scope and determinants. *Vaccine*, Kidlington, v. 33, n. 34, p. 4161-4164, 2015. Disponível em:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X15005009?via%3Dihub. Acesso em: 15 set. 2021.

MALTA, Deborah Carvalho *et al.* Uso dos serviços de saúde e adesão ao distanciamento social por adultos com doenças crônicas na pandemia de Covid-19, Brasil, 2020. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2833-2842, 2021. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csc/a/4PDxPLNLNnKwwzR7bBrdW3L/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 jan. 2022.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MATTA, Gustavo Corrêa. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. *In:*______.; PONTES, Ana Lucia de Moura (org.). *Políticas de saúde*: a organização e a operacionalização do Sistema Único e Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV: FIOCRUZ, 2007. p. 61-79.

MELLO, Maria Lúcia Rocha *et al.* Participação em dias de vacinação contra poliomielite: resultados de inquérito de cobertura vacinal em crianças nas 27 capitais brasileiras. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 278-288, 2010. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rbepid/a/xPVzTgYQhkpzzM3TkGPj8tw/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 25 mar. 2021.

MENDES, Eugênio Vilaça. *A construção social da atenção primária.* Brasília, DF: CONASS, 2015.

MINAYO, Maria Cecília S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, jul./set. 1993. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/Bgpmz7T7cNv8K9Hg4J9fJDb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 maio 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as Normas Éticas para Pesquisa em Seres Humanos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 12, Seção 1, p. 59, 13 jun. 2013. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em: 23 jan. 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n. 1.130, de 5 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, Seção 1, p. 37, 6 ago. 2015. Disponível em:

http://www.poderesaude.com.br/novosite/images/publicacoes_06.08.2015-I.pdf Acesso em: 11 jan. 2022.

MINTO'O, Steeve *et al.* Hepatitis B vaccination coverage of preschool children in Libreville, Gabon: prevalence and determining factors. *Indian Pediatrics*, New Delhi, v. 59, n. 4, p. 290-292, abr. 2022. Disponível em:

https://www.indianpediatrics.net/apr2022/290.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022.

MORAES, José Cássio de *et al.* Qual é a cobertura vacinal real? *Epidemiologia e Serviços de Saúde,* Brasília, DF, v.12, n. 3, p. 147-153, set. 2003. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?pid=S1679-

49742003000300005&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: 17 mar. 2021.

MOREO-MONTOYA, Jose *et al.* Impact of the Covid-19 pandemic on routine immunization in Colombia. *Archives of Disease in Childhood*, London, v. 107, n. 3, p. 1-6, 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8295013/. Acesso em: 5 jun. 2022.

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton Oliveira. *Estatística básica*. São Paulo: Saraiva, 2017.

NELSON, Roxanne. COVID-19 disrupts vaccine delivery. *The Lancet Infectious Diseases*, London, v. 20, n. 5, p. 546, May 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30304-2/fulltext. Acesso em: 14 abr. 2021.

NOUR, Tahir Yousuf *et al.* Predictors of immunization coverage among 12-23 month old children in Ethiopia: systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, London, v. 20, p. 1-19, Nov. 2020. Disponível em:

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09890-0. Acesso em: 18 fev. 2021.

NUNES, Daniele Monteiro *et al.* Inquérito da cobertura vacinal de tríplice bacteriana e tríplice viral e fatores associados à não vacinação em Santa Maria, Distrito Federal, Brasil, 2012. *Revista Pan-Amazônica de Saúde,* Ananindeua, v. 9, n. 1, p. 9-17, 2018. Disponível em:

http://revista.iec.gov.br/submit/index.php/rpas/article/view/346. Acesso em: 24 mar. 2021.

NUZHATH, Tasmiah *et al.* Childhood immunization during the Covid-19 pandemic in Texas. *Vaccine*, Kidlington, v. 39, n. 25, p. 3333-3337, jun. 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8078904/. Acesso em: 5 jun. 2022.

NWOSU, Chijioke; OYENUBI, Adeola. Income-related health inequalities associated with the coronavirus pandemic in South Africa: A decomposition analysis. *International Journal for Equity in Health*, [London], v. 20, p. 21, 2021. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12939-020-01361-7.pdf. Acesso em: 15 jan. 2022.

OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. *Revista da FAE*, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 37-48, maio/ago. 2002. Disponível em: https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/477/372. Acesso em: 3 fev. 2022.

OLIVEIRA, Manuel Falcão Saturnino de; MARTINEZ, Edson Zangiacomi; ROCHA; Juan Stuardo Yazlle. Fatores associados à cobertura vacinal em menores de cinco anos em Angola. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 48, n. 6, p. 906-915, 2014. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rsp/a/Gvpsg67FHD3skMHBMJwQ7Vw/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 mar. 2021.

OLIVEIRA, Vanessa Bertoglio Comassetto Antunes de; VERÍSSIMO, Maria de La Ó Ramalho. Assistência à saúde da criança segundo suas famílias: comparação entre modelos de Atenção Primária. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 49, n. 1, p. 30-36, 2015. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/reeusp/a/GLch6HCVpSFBR54ZNDbKThv/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 jan. 2022.

ORNELL, Felipe *et al.* "Pandemic fear" and Covid-19: mental health burden and strategies. *Brazilian Journal of Psychiatry*, São Paulo, v. 42, n. 3, p. 232-235, May/Jun. 2020. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rbp/a/WGD9CnJ95C777tcjnkHq4Px/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 10 jun. 2022.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/Qg7SJFjWPjvdQjvnRzxS6Mg/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 2 jan. 2022.

_____. *et al.* O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. *The Lancet,* London, v. 377, n. 9779, p. 11-31, 2011. Disponível em: https://actbr.org.br/uploads/arquivo/925 brazil1.pdf. Acesso em: 9 jan. 2022.

PINTO, Luiz Felipe; GIOVANELLA, Lígia. Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1903-1913, 2018. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csc/a/dXV7f6FDmRnj7BWPJFt6LFk/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 13 jan. 2022.

PRADO, Nilia Maria de Brito Lima *et al.* Ações de vigilância à saúde integradas à Atenção Primária à Saúde diante da pandemia da Covid-19: contribuições para o debate. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2843-2857, 2021. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csc/a/z5WSwQfqN6348KfWcnS34pL/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 jan. 2022.

PROCIANOY, Guilherme Silveira *et al.* Impacto da pandemia do Covid-19 na vacinação de crianças de até um ano de idade: um estudo ecológico. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 969-978, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/HRMwSZF7GT96MMx7pBTJfkD/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 3 jun. 2022.

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE. *Indicadores básicos para a saúde no Brasil:* conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. Disponível em:

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.

REICHERT, Altamira Pereira da Silva *et al*. Orientação familiar e comunitária na Atenção Primária à Saúde da criança. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 119-127, 2016. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csc/a/KhSc3RFYnKgph9DFJbP9bsy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 12 jan. 2022.

_____. Repercussões da pandemia da Covid-19 no cuidado de lactentes nascidos prematuros. *Escola Anna Nery*: Revista de Enfermamgem, Rio de Janeiro, v. 26, n. esp., p. 1-9, 2022. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/ean/a/zvRs5mB5WQJ7jLvq4S6Hv9L/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 jan. 2022.

ROBERTON, Timothy *et al.* Early estimates of the indirect effects of the Covid-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a moddeling study. *The Lancet Global Health*, [London], v. 8, n. 1, p. e901-e908, July, 2020. Disponível em:

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext. Acesso em: 4 jun. 2021.

ROMAN, Patrícia Castro *et al.* Influenza vaccination during the Covid-19 pandemic – 11 U.S. jurisdictions, September-December 2020. *Morbidity and Mortalily Weekly Report*, Atlanta, v. 70, n. 45, p. 1575-1578, nov. 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580205/pdf/mm7045a3.pdf. Acesso em: 5 jun. 2022.

SANINE, Patrícia Rodrigues *et al.* Do preconizado à prática: oito anos de desafios para a saúde da criança em serviços de atenção primária no interior de São Paulo, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 1-15, 2018. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/Qpzxqy35qNhzFZ3QBMrgFWd/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 13 jan. 2022.

SANINE, Patrícia Rodrigues; CASTANHEIRA, Elen Rose Lodeiro. Explorando nexos entre a construção social da criança e as práticas de saúde. *História, Ciências, Saúde*: Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 199-215, jan./mar. 2018. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/hcsm/a/rVXSrMrXQdFwfyR5df4thVb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 13 jan. 2022.

_____. et al. Influência da gestão municipal na organização da atenção à saúde da criança em serviços de atenção primária do interior de São Paulo, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, p. 1-14, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/sLQfrVDxWw7ZMM36LtJ9Wjt/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 11 jan. 2022.

SANTOS, José Luís Guedes dos *et al.* Integração entre dados quantitativos e qualitativos em uma pesquisa de métodos mistos. *Texto & Contexto Enfermagem*, Florianópolis, v. 26, n. 3, p. 1-9, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/cXFB8wSVvTm6zMTx3GQLWcM/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 25 jan. 2022.

SANTOS, Nathanielly Cristina Carvalho de Brito *et al.* Orientação familiar e comunitária segundo três modelos de atenção à saúde da criança. *Acta Paulista de Enfermagem*, São Paulo, v. 29, n. 6, p. 610-617, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ape/a/VRszJwJLbJ7vdQZT54BBGhm/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 12 jan. 2022.

_____. *et al.* Presença e extensão dos atributos de atenção primária à saúde da criança em distintos modelos de cuidados. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 1-12, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/zd6tmsj4qD5VGm9xvhqtjNg/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 12 jan. 2022.

SANTOS, Nelson Rodrigues dos. SUS, política pública de Estado: seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca de saídas. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 273-280, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/vC78GwbjwNdfQpvLRLHFGZB/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 4 jan. 2022.

SANTOS, Renata Cavalcante Kuhn dos; RESENGUE, Rosa; PUCCINI, Rosana Fiorini. Puericultura e a atenção à saúde da criança: aspectos históricos e desafios. *Journal of Human Growth and Development*, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 160-165, 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v22n2/pt_06.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.

SARTI, Thiago Dias *et al.* Qual o papel da Atenção Primária à Saúde diante da pandemia provocada pela Covid-19? *Epidemiologia e Serviços de Saúde,* Brasília, DF, v. 29, n. 2, p. 1-5, 2020. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/ress/a/SYhPKcN7f8znKV9r93cpF7w/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 set. 2021.

SATO, Ana Paula Sayuri. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 52, n. 96, p. 1-9, 2018. Disponível em:

https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/152007/148791. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. Pandemia e coberturas vacinais: desafios para o retorno às escolas. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 54, n. 115, p. 1-8, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQsNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 set. 2021.

SEN, Amartya Kumar. *Desenvolvimento como liberdade*. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo Doniselli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SILVA, Francelena de Sousa *et al.* Incompletude vacinal infantil de vacinas novas e antigas e fatores associados: coorte de nascimento BRISA, São Luís, Maranhão, Nordeste do Brasil. *Cadernos de Saúde Pública,* Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, p. 1-21, 2018. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/csp/a/rffgtWkzw7ndPSwHzVfttsz/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 mar. 2021.

SILVA, Rosane Meire Munhak da; VIEIRA, Cláudia Silveira. Acesso ao cuidado à saúde da criança em serviços de atenção primária. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, DF, v. 67, n. 5, p. 794-802, set./out. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reben/a/CKyYTH9NX8B6SXyBRbJfZvw/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 12 jan. 2022.

SILVA, Tércia Moreira Ribeiro da *et al.* Number of doses of Measles-Mumps-Rubella vaccine Applied in Brazil before and during the Covid-19 pandemic. *BMC Infectious Diseases*, London, v. 21, n. 1237, p. 1-8, dez. 2021. Disponível em: https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06927-6. Acesso em: 5 jun. 2022.

SILVA-JÚNIOR, Jarbas Barbosa da. 40 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma conquista da Saúde Pública brasileira. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. Brasília, DF, v. 22, n. 1, p. 7-8, jan./mar. 2013. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v22n1/v22n1a01.pdf. Acesso em: 3 jan. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Programa Nacional de Imunizações (PNI) comemora 48 anos de sucesso. *Notícias SBIm* São Paulo, 23 set. 2021. Disponível em: https://sbim.org.br/noticias/1577-programa-nacional-de-imunizacoes-pni-comemora-48-anos-de-sucesso. Acesso em: 4 jan. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. *Calendário vacinal da criança e a pandemia pelo coronavírus*. Rio de Janeiro, [2020]. Disponível em: <a href="https://nt-subp

SOUZA, Alex Sandro Rolland; AMORIM, Melania Maria Ramos. Mortalidade materna pela Covid-19 no Brasil. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*. Recife, v. 21, n. 1, p. S257-S261, 2021. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/R7MkrnCgdmyMpBcL7x77QZd/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 jan. 2022.

STARFIELD, Bárbara. *Atenção primária*: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviço e tecnologia. Brasília, DF: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

SUCCI, Regina Célia de Menezes. Vaccine refusal-what we need to Know. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 94, p. 574-581, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021755717310045?via%3Dihub. Acesso em: 8 set. 2021.

TEMPORÃO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e desenvolvimentos. *História, Ciências, Saúde*: Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 10 supl. 2, p. 601-617, 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/hcsm/a/XqLKLcj6NYjHdywSF6XPRZs/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 set. 2021.

TERTULIANO, Gisele Cristina; STEIN, Airton Tetelbom. Atraso vacinal e seus determinantes: um estudo em localidade atendida pela Estratégia Saúde da Família. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 523-530, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSrLtt3F/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 1 jun. 2021.

TESSIER, Elise *et al.* Impact of the Covid-19 pandemic on *Bortedella pertussis* infections in England. *BMC Public Health*, London, v. 22, n. 1, p. 405, Feb. 2022. Disponível em: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-022-12830-9.pdf/. Acesso em: 5 jun. 2022.

VIANA, Solon Magalhães *et Medindo as desigualdades em saúde no Brasil: al.* uma proposta de monitoramento. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 2001.

VICTORA, Cesar Gomes. 40 anos do Programa Nacional de Imunizações: o desafio da equidade. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, DF, v. 22, n. 2, p. 201-202, abr./jun. 2013. Disponível em:

http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v22n2/v22n2a01.pdf. Acesso em: 3 jan. 2022.

WECKX, Lily Yin; KFOURI, Renato de Ávila; AMATO NETO, Vicente. *Controvérsias em imunizações*. São Paulo: Segmento Farma, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Macroeconomics and health:* investing in health for economic development: executive summary. Geneva, 2001. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42463. Acesso em: 4 set. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Training for mid-level managers (MLM). Module 7: the EPI coverage survey. Geneva 2008. (republished 2020 under the licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337065/9789240015753eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 jun. 2021. . Then threats to global health in 2019. Geneva, 2019. Disponível em: https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019. Acesso em: 30 set. 2021. . Archived: Who Timeline - COVID-19: Dec. 2019/Mar. 2020. Geneva: 2020a. Disponível em: https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19. Acesso em: 4 jun. 2021. . At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria. measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warn Gavi, WHO and UNICEF. Geneva, May 2020b. Disponível em: https://www.who.int/news/item/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-asdiphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warngavi-who-and-unicef. Acesso em: 16 abr. 2021. . Immunization services begin slow recovery from COVID-19 disruptions, though millions of children remain at risk from deadly diseases: WHO, UNICEF, Gavi. Geneva, 2021a. Disponível em: https://www.who.int/news/item/26-04-2021immunization-services-begin-slow-recovery-from-covid-19-disruptions-thoughmillions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-gavi. Acesso em: 16 jun. 2021. . Immunization Agenda 2030: a global strategy to leave no one behind. Geneva, 2021b. Disponível em: https://www.who.int/docs/default-

YOKOKURA, Ana Valéria Carvalho Pires *et al.* Cobertura vacinal e fatores associados ao esquema vacinal básico incompleto aos 12 meses de idade, São Luís, Maranhão, Brasil, 2006. *Cadernos de Saúde Pública,* Rio de Janeiro, v. 29, n. 3, p. 522-534, mar. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/i/csp/a/X6NmNG3gWcvGv75BhfqtdJh/?format=pdf&lang=pt.

source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-document-en.pdf. Acesso em: 8 jun.

2022.

https://www.scielo.br/j/csp/a/X6NmNG3gWcvGv75BhfqtdJh/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 mar. 2021

ZAMBAM, Neuro José; KUJAWA, Henrique Aniceto. As políticas públicas em Amartya Sen: condição de agente e liberdade social. *Revista Brasileira de Direito*, Passo Fundo, v. 13, n. 1, p. 60-85, mar. 2017. Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1486/1098. Acesso em: 15 jan. 2022.

APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS



CONVITE



SENHORES PAIS (OU RESPONSÁVEL)

MEU NOME É TATIANE MACHADO, SOU MÉDICA PEDIATRA E ESTOU FAZENDO UMA PESQUISA DE MESTRADO QUE AVALIARÁ A VACINAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE FRANCA. QUE É UM ASSUNTO MUITO IMPORTANTE PARA PREVENIRMOS DOENÇAS EM NOSSAS CRIANÇAS. ESTE É UM CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO(A) SEU (SUA) FILHO (A) NESTA PESQUISA.

A PESQUISA CONSISTE APENAS NA MÃE, PAI OU ALGUM RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA RESPONDER ALGUMAS PERGUNTAS QUE SERÃO FEITAS POR MIM DIRETAMENTE A VOCÊS, PESQUISA RÁPIDA, SEM TOMAR MUITO DO SEU TEMPO, MAS CONTRIBUIRÁ MUITO COM O ESTUDO E A SAÚDE EM NOSSA CIDADE. NÃO TEREI CONTATO COM A CRIANÇA.

SE VOCÊ CONCORDA COM A PARTICIPAÇÃO DO(A) SEU(SUA) FILHO(A) NESSA PESQUISA POR FAVOR ENVIE UM TELEFONE PARA CONTATO, ASSIM COMBINAMOS UM MELHOR DIA PARA QUE VOCÊ RESPONDA A PESQUISA.

NOME DA CRIANÇA:
NOME DA MÃE, PAI OU RESPONSÁVEL:
TELEFONE PARA CONTATO:
EU, AUTORIZO A ESCOLA FORNECER O CONTATO DO MEU (MINHA) FILHO (A) PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA () SIM () NÃO
ASSINATURA:
CONTO COM CUA DARTICIDAÇÃO E RECRETÁ A CRARECO

CONTO COM SUA PARTICIPAÇÃO E DESDE JÁ AGRADEÇO. TATIANE MACHADO.

APÊNDICE B – FORMULÁRIO UTILIZADO PARA ENTREVISTAS AOS PAIS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES



Formulário inquérito vacinal infantil

• Dados da criança

- Nome:				
- Endereço:				
- Bairro:Telefone contato:				
- Data de nascimento:				
- Local de nascimento:				
- Há quanto tempo a criança reside no município de Franca?				
- Sexo: () Feminino () Masculino				
- Raça: () Negra () Branca () Parda () Amarela() Indígena				
- Ordem de nascimento:				
- Escola / creche que estuda:				
- Possui cadastro na UBS: () Não () Sim - qual?				
- A criança faz acompanhamento regular com médico de família ou pediatra? () Sim, na UBS () Sim, no convênio médico () Sim, médico particular () Não faz acompanhamento, só consulta quando precisa				
• Dados do responsável e da família				
- Quem é o responsável? () Mãe () Pai () Outro				
- Se o responsável for diferente de pai oi mãe, que é? (grau de parentesco) () Avó ou avô () Tio ou tia () Irmã ou irmão () Primo ou prima () Não é pessoa com consanguinidade				
Idado do recponsávol:				

- Raça: () Negra () Branca () Parda () Amarela () Indígena
- Escolaridade do responsável: () Não estudou () Ensino Fundamental incompleto () Ensino Fundamental completo () Ensino médio incompleto () Ensino médio completo () Ensino técnico () Ensino Superior ou mais () Ensino Superior incompleto
- Situação conjugal: () Solteiro () Casado () Separado/divorciado () Viúvo () União estável
 Remuneração da família: (pode ser marcada mais de uma opção) () Mãe possui trabalho remunerado formal () Pai possui trabalho remunerado formal () Mãe possui trabalho remunerado informal () Pai possui trabalho remunerado informal () Responsável (que não seja pai ou mãe) possui trabalho remunerado formal () Responsável (que não seja pai ou mãe) possui trabalho remunerado informal () Não possui trabalho remunerado (pais ou responsáveis)
- Quantas pessoas moram na residência, incluindo a criança?
- Quantas pessoas do núcleo familiar contribuem com a renda?
- Renda familiar: (colocar o número em salários mínimos)
- Recebe algum benefício social do governo? () Sim () Não
- Número de filhos por mãe:
■ Dados da Vacinação
- Possui cartão de vacina: () Sim () Não
- Mostrou cartão de vacina: () Sim () Não
 - A criança participa de campanhas de vacinação? () Sempre () Quase sempre () As vezes () Não participa de campanha
- Vacinação ocorre:

 () Sempre no SUS () Predominantemente no SUS () Sempre em serviço privado () Predominantemente em serviço privado
 - Vacinas Tríplice bacteriana - 1ª dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Tríplice bacteriana - 1ª dose de reforço Data:
- Vacinas Tríplice bacteriana - 2ª dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Tríplice bacteriana - 2ª dose de reforço Data:
- Vacinas Poliomielite - dose de reforço aos 4 anos () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Poliomielite - dose de reforço aos 4 anos Data:
 - Vacinas Poliomielite - reforço de campanhas () Já recebeu () Não recebeu
- Vacinas Varicela - 1ª dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Varicela - 1º dose de reforço Data:
- Vacinas Varicela - 2ª dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Varicela - 2ª dose de reforço Data:
- Vacinas Febre amarela - 1º dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Febre amarela - 1º dose de reforço Data:
- Vacinas Febre amarela - 2º dose de reforço () Já recebeu () Não recebeu
Vacinas Febre amarela - 2º dose de reforço Data:
- Vacinas Influenza Em 2019 () Recebeu () Não recebeu

Em 2020 () Recebeu () Não recebeu Em 2021 () Recebeu () Não recebeu
- Houve atraso em alguma das vacinas que deveriam ser recebidas aos 4 anos? (considerar atraso superior 3 meses da data do aniversário de 4 anos)
() Sim () Não
- Houve ausência em alguma das vacinas que deveriam ser recebidas aos 4 anos? () Sim
Se a resposta de uma das 2 perguntas imediatamente anteriores foi "SIM". Por que a criança não recebeu, ou recebeu com atraso a (as) vacina (s) de 4 anos?
Conforme a resposta da pergunta anterior, em qual opção abaixo seria a mais ou as mais relacionadas ao atraso/ausência vacinal?
() Não sabia da necessidade dessa (s) doses ou da idade de aplicação do reforço ou esqueceu a dose
() Medo de reação adversa
() Não acredita na vacina / Não acha necessário o reforço da vacina
() Local de vacinação longe / Horário ruim de vacinação / Tempo longo de espera – sem relação com a pandemia
a pantierna () Ocupação do responsável
() Criança doente por outra causa não relacionada a Covid-19
() Criança doente com Covid- 19
() Responsável ou alguem da família doente por outra causa não relacionada a Covid-19 () Responsável ou alguem da família com Covid-19
() Para respeitar o isolamento social devido a Pandemia da Covid-19/ Medo de se contaminar
() Desconhecimento sobre o funcionamento da sala de vacinação durante a Pandemia da Covid.

(ESTE FORMULÁRIO FOI TRANSCRITO NA ÍNTEGRA PARA O GOOGLE FORMS)

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

"Cobertura vacinal das doses aplicadas em crianças aos 4 anos durante a pandemia COVID-19: impacto no desenvolvimento regional"

Este é um convite para sua participação, como responsável legal da criança							
	na	pesquisa	acima	citada,	cuja	a	
pesquisadora responsável é a mestranda Tatiane Ferreira	Souz	a Machad	lo com	a orient	ação c	la	
Professora Dra. Lívia Maria Lopes. Projeto apresentado ao M	1estr	ado em De	esenvolv	vimento	Region	al	
do Centro Universitário Municipal de França.							

A vacinação infantil tem grande importância no controle e erradicação de doenças que causam sequelas graves e/ou mortes nas crianças. O efeito desejado das vacinas sobre o controle das doenças é obtido quando uma grande parte da população é vacinada. Para ter uma ideia real do número de crianças que são vacinadas, a Organização Mundial de Saúde orienta que seja realizado inquéritos domiciliares onde é checado o cartão de vacina das crianças pesquisadas para avaliação da situação vacinal. São através desses estudos que os órgãos governamentais de saúde podem elaborar estratégias para aumentar a cobertura vacinal, assim, mais crianças ficam protegidas e previne epidemias por essas doenças na população. Daí vem a contribuição que esse estudo pode trazer.

A sua participação consiste em responder um formulário para conhecimento de características sociodemográficas da criança e da família, algumas questões clínicas da criança participante e a situação vacinal dela. Será solicitada a apresentação do cartão de vacina da criança.

O consentimento para sua participação e da criança na pesquisa é voluntário e vocês poderão desistir a qualquer momento durante a pesquisa. Nenhum participante da pesquisa sofrerá penalidades por desistência da pesquisa e não receberá nenhum benefício financeiro para participação na pesquisa. O benefício recebido pelo participante será a orientação sobre a situação vacinal da criança quando houver ausências de doses ou atraso de doses que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde.

Quanto aos riscos de participação nessa pesquisa são mínimos, apenas decorrente da ansiedade de responder ao formulário e possível constrangimento em responder às perguntas ou em mostrar a caderneta de vacinação da criança.

Caso você decida concordar com a participação da criança na pesquisa, saiba que todas as informações são sigilosas e os formulários serão guardados de forma segura pela pesquisadora responsável. Os dados coletados na pesquisa serão analisados e nas publicações originadas deste estudo não constará nenhuma forma de identificação dos participantes da pesquisa.

As dúvidas que você tiver quanto a esse estudo podem ser perguntadas diretamente à pesquisadora responsável pela pesquisa, mestranda Tatiane Ferreira Souza Machado, através do telefone (16) 34326848 ou pelo e-mail <u>tatyfeso@hotmail.com</u>. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, localizado na Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2400 – Bairro São José – CEP – 14403-430, telefone (16) 3713-4630 e e-mail: <u>comep@facef.br</u>.

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, a forma que ela será realizada, os riscos e os benefícios da participação. Consinto a participação voluntária da criança, que sou responsável legal.

iegai.	Franca,	_ de	_ de 2021.			
Nome	Nome do responsável legal da criança participante:					
Assinatura do responsável legal da criança participante: -						
Impressão digital do responsável legal do menor (caso não consiga assinar):						

(ESTE TERMO FOI TRANSCRITO PARA O GOOGLE FORMS E EM VEZ DE ASSINATURA O RESPONSÁVEL CLICAVA NO SIM OU NÃO QUANTO A CORCODÂNCIA EM PARTICIPAR DA PESQUISA)

ANEXO A - PARECER DO CEP



CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: COBERTURA VACINAL DAS DOSES APLICADAS EM CRIANÇA AOS 4 ANOS

DURANTE A PANDEMIA COVID-19: IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Pesquisador: TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO

Área Temática: Versão: 2

CAAE: 48521421.9.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.044.809

Apresentação do Projeto:

A vacinação é uma ação em saúde efetiva na prevenção de morbimortalidade infantil, refletindo diretamente nas taxas de mortalidade infantil. A boa

cobertura vacinal é um bom indicador de saúde e está relacionada ao desenvolvimento regional, pois leva a redução nos casos de doenças na faixa

etária pediátrica, com menor sobrecarga aos serviços de saúde, maior rendimento escolar por ocorrer redução nas abstenções escolares

decorrentes de patologías imunopreveníveis e inclusive menor abstenções dos pais no trabalho em decorrências de doenças dos filhos. O Programa

Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é um programa com grande eficiência e conseguiu ao longo desses anos, desde a sua criação, o controle de

várias doenças imunopreveníveis e até a erradicação de algumas doenças como a Poliomielite. A queda na cobertura vacinal é um fenômeno que

vem ocorrendo no Brasil desde 2016, colocando em risco o retorno de doenças já controladas, isso é combatido pelo PNI com estratégias rápidas

promovendo campanhas de vacinação e os trabalhos na rede de atenção primária de saúde para não ocorrer as perdas de oportunidades vacinais.

Desde março de 2020, foi decretado pela OMS a pandemia COVID-19, que modificou muito nossos hábitos de vida com a necessidade do

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Bairro: São José CEP: 14.403-430

Município: FRANCA UF: SP

Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF



Continuação do Parecer: 5.044.809

distanciamento e isolamento social. O acesso aos serviços de saúde também sofreu modificação, com redução nas consultas médicas de rotina e

também na procura pela vacinação infantil. A Organização Mundial de Saúde já emitiu documentos de alerta com a redução da imunização infantil

de rotina em todo o mundo decorrente da pandemia e o risco de epidemias de doenças que exigem altas taxas de cobertura vacinais para se

manterem controladas. No Brasil ainda existem poucos trabalhos demonstrando o reflexo na pandemia COVID-19 na cobertura vacinal infantil.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo: Descrever a cobertura vacinal, durante a pandemia COVID-19, das doses aplicadas aos 4 anos em crianças nascidas em 2016 residentes

no munícipio de Franca-SP.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

A pesquisa prevê riscos mínimos, apenas decorrente da ansiedade em responder ao formulário e possível constrangimento em responder às

perguntas ou em mostrar a caderneta de vacinação da criança.Não há riscos direto à criança pesquisada.

Beneficios:

Ao participante da pesquisa: Não há benefício financeiro direto pela participação na pesquisa. Os benefícios recebidos pelo participante estão

relacionados ao recebimento de orientação sobre a situação vacinal da criança quando houver ausências de doses ou atraso de doses que estão

disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, além de contribuir com a produção de novos conhecimentos sobre a cobertura vacinal.

Ao município: contribuir com avaliação da cobertura vacinal na faixa etária pesquisada para auxiliar na elaboração de estratégias preventivas em saúde

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

É um estudo transversal, do tipo inquérito domiciliar, com amostras por conglomerados 30 por 7. A técnica de amostragem por conglomerado 30 por

7 implica pesquisar 7 crianças na faixa etária estabelecida em cada conglomerado, num total de

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Bairro: São José CEP: 14.403-430

UF: SP Município: FRANCA

Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF



Continuação do Parecer: 5.044.809

30 conglomerados por inquérito resultando numa

amostra de 210 crianças. Os parâmetros estatísticos considerados para o cálculo da amostra foram os seguintes: precisão de ± 10%; intervalo de

confiança (IC) de 95%; efeito de desenho 2; cobertura esperada de 50%; erro padrão de ± 10%; e desvio padrão de 1.96.

Faz parte da coorte de interesse da pesquisa, nascidas entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, para que seja avaliada como foi sua

vacinação aos 4 anos de idade no ano de 2020.

O recorte de espaço da pesquisa será o município de Franca, interior do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, tem uma população estimada em

2020 de 355.901 pessoas, o censo de 2010 demonstrava uma população de 318.640 pessoas. A taxa de mortalidade infantil em 2019 é de 7,09

óbitos por mil nascidos vivos (IBGE, 2021).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O TCLE foi apresentado e está adequado.

As autorizações das secretarias de educação e saúde foram entregues e estão adequadas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O formulário que será respondido apresenta riscos mínimos ao participante, e está adequado.

Sem adequações.

Sem pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

O Comite aprova a ementa do projeto .

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_183767	08/10/2021		Aceito
do Projeto	1 E1.pdf	14:30:23		
Projeto Detalhado /	ProjetoMestradoPlataformaBrasil.doc	08/10/2021	TATIANE FERREIRA	Aceito
Brochura		14:29:17	SOUZA MACHADO	
Investigador				
Declaração de	Autorizacao_da_Secretaria_de_Educaca	08/10/2021	TATIANE FERREIRA	Aceito
Instituição e	o.pdf	14:26:44	SOUZA MACHADO	
Infraestrutura				

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Bairro: São José CEP: 14.403-430

UF: SP Município: FRANCA

Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br



CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNIFACEF



Continuação do Parecer: 5.044.809

Declaração de Instituição e	Autorizacao_secretariodesaude.pdf		TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO	Aceito
Infraestrutura				
Outros	formulario.pdf	25/06/2021	TATIANE FERREIRA	Aceito
			SOUZA MACHADO	
Projeto Detalhado /	Projeto_Mestrado.pdf		TATIANE FERREIRA	Aceito
Brochura		12:37:48	SOUZA MACHADO	
Investigador				
TCLE / Termos de	TERMO_DE_CONSENTIMENTO_LIVR	25/06/2021	TATIANE FERREIRA	Aceito
Assentimento /	E_E_ESCLARECIDO.pdf	12:37:30	SOUZA MACHADO	
Justificativa de			1 1	
Ausência				
Folha de Rosto	Folha_de_rosto.pdf	23/06/2021	TATIANE FERREIRA	Aceito
		21:40:35	SOUZA MACHADO	

Assinado por: Antonio Cezar Peron (Coordenador(a))	

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Bairro: São José CEP: 14,403-430

UF: SP Município: FRANCA

Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br

ANEXO B - CALENDÁRIO VACINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO **DE 2020**



ESTADO DE SÃO PAULO

Calendário de vacinação para crianças até 2020 seis anos de idade

Idade	Vacina	
A partir do nascimento	BCG ¹ , Hepatite B ²	
2 meses	VIP³, Pentavalente (DTP+Hib+HB)⁴, Rotavírus⁵, Pneumocócica 10 valente⁶	
3 meses	Meningocócica C	
4 meses	VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus ⁷ , Pneumocócica 10 valente	
5 meses	Meningocócica C	
6 meses	VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB)	
9 meses	Febre Amarela	
12 meses	Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Pneumocócica 10 valente ⁸ Meningocócica C ⁸ ,	
15 meses	VOP ⁹ , DTP ¹⁰ , Hepatite A ⁸ , Tetraviral (SCR+Varicela) ¹¹	
4 anos	VOP, DTP, Varicela ¹² , Febre amarela ¹³	
Anualmente	Influenza ¹⁴	
DOE – Resolução SS nº 34 de 23/03/202 retificada em 24/04/2020		



ESTADO DE SÃO PAULO

2020

Calendário de vacinação para crianças até seis anos de idade

Notas

- 1. Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde.
- 2. A vacina Hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12h de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita ocorrer após a 6ª semana de vida administrar a vacina Pentavalente (DTP-Hib-Hepatite B).
- 3. Vacina poliomi elite 1, 2 e 3 (inativada).
- 4. A vacina pentavalente (DTP-Hib-Hepatite B) NÃO deve ser administrada antes de 6 semanas de vida, pois poderá induzir tolerância imunológica às doses adicionais dos componentes Hib e Pertussis.
- 5. A 1º dose da vacina Rotavírus deve ser aplicada aos 2 meses de idade. A idade mínima para a administração desta dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias.
- 6. A vacina Pneumocócica 10 valente NÃO deve ser administrada antes de 6 semanas de vida, pois poderá induzir tolerância imunológica às doses adicionais.
- 7. A 2º dose da vacina Rotavírus deve ser aplicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para a administração desta dose é de 3 meses e 15 dias, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas da 1º para a 2º dose, e a idade máxima é de 7 meses e vinte e 29 dias.
- 8. As vacinas pneumocócica 10 valente, meningocócica C e hepatite A podem ser administradas até 4 anos, 11 meses e 29 dias de acordo com a situação vacinal.
- 9. Vacina oral poliomielite 1 e 3 (atenuada).
- 10. A vacina DTP só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 7 anos de idade utilizar a vacina dT.
- 11. A vacina tetraviral deverá ser administrada em crianças que já receberam uma dose de vacina sarampo-caxumba-rubeola (SCR), com intervalo mínimo de 4 semanas.
- 12. A vacina varicela pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.
- 13. O reforço (2ª dose) da vacina febre amarela deve ser administrado aos 4 anos de idade. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.
- 14. Disponível na rede pública durante os períodos de campanha, para crianças a partir de 6 meses até 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) de idade.

BCG – vacina contra tuberculose VIP – vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada) SCR – vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) DTP – vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana\) VOP – vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) dT – vacina adsorvida difteria e tétano adulto