

UNI-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

THALITA LEAL LEITE PIMENTA

**EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE**

**FRANCA
2022**

THALITA LEAL LEITE PIMENTA

**EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário.

**FRANCA
2022**

Pimenta, Thalita Leal Leite

Efetividade do automonitoramento do paciente com diabetes mellitus tipo 2, insulínodépendente. / Thalita Leal Leite Pimenta. – Franca (SP): Uni- FACEF, 2022.
72f.;

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento regional. 2.Políticas públicas.
3.Diabetes mellitus. 4.Qualidade de vida. 5. Autocuidado.
I.T.

CDD 616.462

THALITA LEAL LEITE PIMENTA

**EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário

Franca, ____ de ____ de 2022.

Orientadora: _____
Nome: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário
Instituição: Uni-Facef – Franca-SP.

Examinador: _____
Nome: Profa. Dra. Janise Braga Ferreira
Instituição: USP – Ribeirão Preto-SP.

Examinador: _____
Nome: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes
Instituição: Uni-Facef – Franca-SP

Quero dedicar esta monografia à minha orientadora prof. Dra. Raquel Cesário, cuja dedicação e paciência serviram como pilares de sustentação para a conclusão deste trabalho. Me fez aprender e compreender o poder do embasamento teórico e argumentação para sanar minhas dúvidas e fomentar as hipóteses inicialmente propostas e chegar aos resultados da pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Agradeço:

- À Universidade FACEF e a todos mestres do programa de mestrado em desenvolvimento regional, que contribuíram com a minha formação acadêmica durante a realização do mestrado e me proporcionaram um ensino de alta qualidade;
- A Deus, que me ajudou a superar os obstáculos, me dando forças para concluir essa dissertação de mestrado que tanto me ajudou a evoluir na vida acadêmica;
- Ao meu marido Adriano, que esteve ao meu lado em todas as adversidades que surgiram no meio do caminho e acreditou que seríamos capazes de concluir essa nova etapa proposta, com êxito;
- Aos meus filhos, Adriano e Artur, por estarem ao meu lado e me fazer acreditar nas minhas decisões e compreender que seria uma fase que não teria tanto tempo disponível como demandavam, mas que, eu conseguiria ser presente na vida deles;
- À minha orientadora, professora Raquel Cesário, por sua dedicação e paciência durante o projeto. Seus conhecimentos fizeram grande diferença na minha vida profissional e acadêmica e culminaram para o resultado deste trabalho;
- Enfim, agradeço a todas as pessoas presentes em minha vida, que acreditaram que realizar o mestrado seria possível.

A dúvida é o princípio da sabedoria

Aristóteles

RESUMO

Este estudo tem como objetivo discutir a efetividade da política pública de saúde no fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulino dependentes e avaliar o controle metabólico destes pacientes que participam do programa de insumos. O estudo se alicerçou em dados coletados de 106 prontuários de pacientes com diabetes *mellitus* tipo 2 (DM2) insulino dependentes atendidos na Casa do Diabético, no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019. A pesquisa foi classificada como documental, analítica observacional, transversal, com abordagem quantitativa por expor com dados estatísticos o perfil de controle metabólico do paciente DM2. Foi possível verificar uma amostra de 106 prontuários, selecionados de forma aleatória por critério não probabilístico, dos quais 57 estão incluídos no programa de insumos (PAMGC). A caracterização da amostra revelou que 63,21% eram mulheres, sendo a média de idade dentre os casos analisados de 67 anos. Para fins de análise do controle metabólico, procedeu-se à uma segunda classificação por faixas etárias, com corte em 64 anos completos. Aqueles de 40 a 64 anos foram chamados “Adultos”, e a normalidade da hemoglobina glicada (HbA1c) foi considerada na faixa de 6,5 a 7,0. Os maiores de 65 anos foram chamados “Idosos”, e a faixa de normalidade considerada foi mais ampla, variando de 6,5 a 8,5, conforme Diretrizes Brasileiras de Diabetes. Dos participantes, 53,77% receberam insumos, enquanto 46,23% não receberam. Os resultados mostram que 71,7% da população em estudo, em 2017, apresentava níveis de HbA1c inadequados, indicando controle metabólico inadequado, de acordo com os valores preconizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes e o mesmo acontece em 2019. Assim, foi possível inferir que, independente da aquisição ou não de insumos, não houve controle metabólico, tendo ambos os grupos sustentado altos índices de hemoglobina glicada inadequada, sugerindo que o maior desafio enfrentado tem sido a falta de conhecimento e a baixa adesão dos pacientes ao tratamento de longo prazo, comum nas condições crônicas como o DM2. Dessa forma, fica em evidência a necessidade de mudança nas políticas internas do município de Franca na distribuição de insumos aos portadores de DM2.

Palavras-chave: Diabetes *mellitus*. Autocuidado. Qualidade de vida. Políticas Públicas de Saúde.

ABSTRACT

This study aims to discuss the effectiveness of public health policy in providing inputs for glycemic self-monitoring in the metabolic control of insulin-dependent patients with DM2 and to evaluate the metabolic control of these patients who participate in the input program. The study was based on data collected from 106 medical records of insulin-dependent patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) treated at Casa do Diabético, from January 1, 2017, to December 31, 2019. The research was classified as documentary, analytical observational, cross-sectional, with a quantitative approach by exposing with statistical data the profile of metabolic control of the DM2 patient. It was possible to verify a sample of 106 medical records, randomly selected by non-probabilistic criteria, of which 57 are included in the input program (PAMGC). The characterization of the sample revealed that 63.21% were women, with an average age of 67 years among the analyzed cases. For the purposes of analyzing the metabolic control, a second classification by age groups was carried out, with a cut-off of 64 years of age. Those aged 40 to 64 years were called "Adults", and normal glycated hemoglobin (HbA1c) was in the range of 6.5 to 7.0. Those over 65 years old were called "Elderly", and the normal range considered was wider, ranging from 6.5 to 8.5, according to the Brazilian Diabetes Guidelines. Of the participants, 53.77% received inputs, while 46.23% did not. The results show that 71.7% of the study population, in 2017, had inadequate HbA1c levels, indicating inadequate metabolic control, according to the values recommended by the Brazilian Society of Diabetes and the same happens in 2019. Thus, it was possible to infer that, regardless of the acquisition or not of supplies, there was no metabolic control, with both groups having sustained high levels of inadequate glycated hemoglobin, suggesting that the greatest challenge faced has been the lack of knowledge and low adherence of patients to long-term treatment, common in chronic conditions such as DM2. Thus, the need to change the internal policies of the municipality of Franca in the distribution of inputs to DM2 patients is evident.

Keywords: Diabetes *mellitus*. Self-care. Quality of life. Public Health Policies.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico - 1 - Caracterização da Amostra, por Sexo	63
Gráfico - 2 - Percentual de adultos e idosos na Amostra	64
Gráfico - 3 - Percentual de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 integrantes do Programa de Automonitoramento de Glicemia.....	65
Gráfico - 4 - Taxa de prevalência, para cada 100 pacientes, de adequabilidade no controle metabólico, respectivamente em 2017 e 2019	66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Número absoluto, percentual e percentual acumulado, por faixa etária, dos integrantes da amostra.....	64
Tabela 2 - Comparação de médias de HbA1c por inserção no Programa de Automonitoramento Glicêmico, em 2017 e em 2019.....	67
Tabela 3 - Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e estar inserido no Programa de Automonitoramento Glicêmico, em 2017 e em 2019	67
Tabela 4 - Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, em 2017	68
Tabela 5 - Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, em 2019	68

LISTA DE SIGLAS

AMGC	Automonitoramento da Glicemia Capilar
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
CITEC	Comissão para Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde
CMMAD	Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
CONITEC	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
DCNT	Doença Crônica Não Transmissível
DM	Diabetes Mellitus
HbA1c	Hemoglobina glicada
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDF	Federação Internacional de Diabetes
ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PAMGC	Programa de Dispensação de Glicosímetros e Insumos para Automonitoramento da Glicemia Capilar
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
SAS	Secretaria de Atenção à Saúde
SBD	Sociedade Brasileira de Diabetes
SCIELO	Scientific Eletronic Library Online
SCTIEQ	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
SIOPS	Sistema de Orçamentos Públicos em Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
SVS	Secretaria de Vigilância em Saúde
TOTG	Teste Oral de Tolerância à Glicose
VIGITEL	Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	19
2.1 A SUSTENTABILIDADE E A SAÚDE NA AGENDA 2030	27
3. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: CONTEXTUALIZAÇÃO	31
3.1 O DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)	36
3.2 AUTOCUIDADO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS	40
4. POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA GESTÃO, NA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS, CUSTO E EFETIVIDADE	43
4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE – CASA DO DIABÉTICO	51
5.OBJETIVO	53
5.1 OBJETIVO GERAL	53
5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	53
6. MÉTODO	54
6.1 LOCAL DO ESTUDO	56
6.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO	60
6.3 COLETA DE DADOS	61
6.4 ANÁLISE DOS DADOS	62
6.5 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO	62
7. RESULTADOS	63
8. DISCUSSÃO	69
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	75
REFERÊNCIAS	79
APÊNDICES	87
ANEXOS	88

1. INTRODUÇÃO

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida, segundo Macedo et al. (2020), como um distúrbio de múltiplas etiologias, resultantes de defeitos e ineficácia da insulina secretada pelo pâncreas, ocasionando a resistência insulínica. Essa hiperglicemia persistente causa inúmeros danos fisiológicos, responsáveis pelo aumento da morbidade, redução da qualidade de vida e elevação da taxa de mortalidade.

Atualmente o DM2 configura-se como um dos principais problemas de saúde pública devido a seu alto índice de complicações, que culminam para as incapacidades produtivas e diárias na rotina dos pacientes, gerando investimentos onerosos no seu tratamento, que nem sempre são efetivos, se não forem rigorosamente cumpridos, levando à mortalidade prematura. Essa prevalência está relacionada ao envelhecimento populacional, à maior taxa de urbanização, aumento do sedentarismo e obesidade (SBD, 2009; FRANCISCO et al., 2010; IDF, 2015).

Uma das mais temíveis complicações são as doenças cardiovasculares, estando associadas às várias condições como: hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade, precisando ser alvo de ações governamentais, participação de equipes multidisciplinares com incentivo de práticas de autocuidado, inclusão dos usuários e da sociedade (EID et al., 2018).

O Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), em sua 9ª. edição, aponta que existem 463 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo. A prevalência global de diabetes atingiu 9,3%, com mais da metade (50,1%) dos adultos não diagnosticados, sendo o DM2 responsável por cerca de 90% dos diagnósticos. Segundo a IDF, a previsão é que o número total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões em 2045 (SBEM, 2021). Para o Brasil, a expectativa é que em 2030 tenha-se 11,3 milhões de diabéticos, podendo chegar a aproximadamente 23,3 milhões de portadores em 2040 (FREITAS et al., 2020).

Em conformidade com a *Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)*, *American Diabetes Association* e Organização Mundial de Saúde, existem vários tipos de diabetes, dentre estes citamos, diabetes *mellitus* tipo 1 (autoimune ou idiopático); diabetes *mellitus* tipo 2; LADA; MODY; diabetes *mellitus* gestacional.

O diabetes é uma doença crônica, com opções terapêuticas eficazes desde que sejam realizadas de maneira correta, associadas a mudanças no estilo de vida, como por exemplo; alimentação saudável, cessação do tabagismo e etilismo, atividade física regular, uso correto das medicações (IDF, 2015).

Em 2006, o Ministério da Saúde lançou o Pacto pela Saúde, que contemplava os eixos Pacto pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão, com o objetivo de melhorar a efetividade, eficiência e qualidade do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Uma de suas metas nacionais era reduzir a taxa de internações por DM2 e suas complicações (BRASIL, 2008).

Os sistemas de saúde necessitam adequar-se à tendência de ascensão do DM2. A informação oportuna, o apoio e o monitoramento podem contribuir para a melhoria da adesão, o que proporcionará ganho na qualidade de vida e redução das complicações. Smeltzer e Bare (2009) destacam os cinco componentes essenciais ao tratamento do diabetes: educação, abordagem nutricional, exercício físico, monitorização, terapia medicamentosa. A problemática que envolve os indivíduos afetados pelo DM é a complexidade de sua patologia e suas necessidades diárias, o que demanda uma equipe multidisciplinar completa, com profissionais de saúde competentes que proporcionem a realização de atividades que envolvam a orientação, acompanhamento e controle dos indivíduos acometidos por esse agravo.

Nesse sentido, Cortez et al. (2015) destacam que identificar os pacientes que não realizam autocuidado (mudança de estilo de vida, automonitoramento e adesão à terapêutica proposta) pode ser uma das estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde, com a finalidade de proporcionar uma melhor atenção a estes, reforçando a sua contribuição para boa evolução de sua patologia.

Entretanto, o conhecimento do paciente diabético sobre a gravidade da doença ainda é insatisfatório, indivíduos que possuem baixa escolaridade têm grandes chances de não valorizar as ações de prevenção, ocasionando várias complicações indesejáveis e irreversíveis, dificultando o tratamento e consequentemente causando piora da sua qualidade de vida. A falta de conhecimento decorre também de atendimentos por profissionais de saúde, nos quais o profissional não analisa todo o contexto do paciente, e não repassa as orientações de forma clara e compreensiva, o que dificulta a adesão e qualidade do tratamento (AMARAL et al., 2019). Tais considerações devem ser analisadas sob a formação do profissional que faz a abordagem e o período que pode disponibilizar para atendimento adequado deste paciente crônico.

Amaral et al. (2019) relatam que a manutenção do controle inadequado do DM2, com hiperglicemia sustentada é a base de todas as complicações crônicas e que, para evitar essa evolução negativa, não se pode focar apenas no paciente com DM2, mas buscar apoio familiar, para garantir um melhor conhecimento de sua patologia, frente aos problemas enfrentados, contribuindo assim, para a manutenção de hábitos saudáveis e resultados positivos.

O SUS tem estratégias necessárias e adequadas para a abordagem destes pacientes, contam com uma equipe multidisciplinar (médicos, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, dentistas entre outros...), para adequada orientação e abordagem dos pacientes; programa de insumos (glicosímetros, tiras de glicosimetrias, lancetas, seringas, agulhas) para adequado monitoramento glicêmico, o que lhes permite evitar hiperglicemias e hipoglicemias, buscando o equilíbrio fundamental para seu controle metabólico, reforçando a necessidade da individualização do tratamento.

Para suprir todas as necessidades de cuidados, tal equipe deve contar com um treinamento constante, aprimorando os seus conhecimentos básicos. O aprendizado de habilidades técnicas (aplicação e armazenamento de insulina, glicemia capilar), os termos utilizados pelos profissionais de saúde (hipoglicemia, cetonúria), aquisição de hábitos saudáveis e a identificação das dificuldades pessoais podem contribuir para um controle mais adequado, diminuindo o número de complicações e de internações. É necessário, portanto, que os profissionais da saúde capacitem os indivíduos com DM2 para serem responsáveis por suas atitudes e autocuidado frente a doença, enfatizando que o sucesso de seu tratamento, está sedimentado na aceitação consciente da sua mudança de estilo de vida e adesão ao tratamento. Existem formas de aprimorar esta capacitação, a partir de informações dos indivíduos com DM2 sobre conhecimento e crenças relacionadas à condição de saúde; as atitudes, a confiança e a motivação diante das mudanças; a importância dada à condição; a presença e a força das redes de suporte social (MENDES, 2012).

O sistema de saúde, com objetivo de promoção da saúde, utiliza o termo “*empowerment*” e autocuidado, com uma frequência crescente, uma vez que a promoção da saúde envolve o desenvolvimento de habilidades individuais, a fim de permitir a tomada de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde (BRASIL, 2007). Os comportamentos de autocuidado em DM2 são definidos como ações que os usuários realizam para cuidar de sua saúde. Essas ações estão relacionadas à dieta alimentar, exercício físico, monitoramento glicêmico e uso medicamentoso (ORTIZ et al., 2010).

A adesão deve ser pensada como um construto multidimensional e não isolado, pois as pessoas podem aderir muito bem a um aspecto do regime terapêutico, mas não aderir aos outros (DELAMATER, 2006).

No que se refere ao automonitoramento, o paciente deve ser orientado quanto a sua importância, regras para realização efetiva, registros pertinentes para conhecimento de seu controle, sabendo quais são os valores-alvo nos horários que estariam sendo feitos e seu comprometimento em atitudes adotadas para que tal melhore aconteça. Lembrando sempre ao paciente que o automonitoramento não deve ser considerado uma medida isolada, que só justifica sua aplicação quando o paciente entende a patologia, aceita e pratica tais mudanças de estilo de vida em sua rotina diária (BRASIL, 2007).

Segundo a Portaria 2.583, de 10 de outubro de 2007, o Automonitoramento da Glicemia Capilar (AMGC) deve ser incentivado para pacientes insulínodépendentes associados à educação em saúde, que visam aumentar sua autonomia desde que tenha adequada adesão ao seu tratamento (BRASIL, 2007). Desta forma, o paciente tem seus direitos, sobre seus insumos, mas não podem anular seus deveres para manutenção de seu acompanhamento adequado, registros adequados e verdadeiros de suas glicosimetrias, através de curvas glicêmicas, pertinentes para ajustes de terapias medicamentosas. O ideal é o profissional de saúde avaliar as anotações do paciente e confrontá-las com as informações registradas na memória do glicosímetro, caso haja um conflito nas informações, os dados devem ser então comparados aos respectivos resultados de exames laboratoriais. Se quaisquer uma destas informações e necessidades são falhas, todo acompanhamento estará prejudicado.

O município a ser pesquisado, desde 1985 possui uma unidade para atendimento destes pacientes, a Casa do Diabético, na qual são atendidos, dentre outros, pacientes com DM tipo 2 em insulínoterapia, direcionando um atendimento especializado para sua patologia, onde conhecem a doença e compreendem sua cronicidade, depois entendem o tratamento e assimilam o tamanho da importância de sua contribuição para que tenha uma boa evolução. Entretanto, a equipe multidisciplinar desta unidade, com administração pública, oferecida pela Prefeitura Municipal, encontra-se reduzida e incompleta, por falta de alguns profissionais essenciais (SILVA, F.C.P.; BARBOSA, I.E.; BESSA FILHO, L.R., 2021).

Os pacientes diabéticos tipo 2 de difícil controle, insulínodépendentes, tem alta probabilidade de desenvolvimento de complicações agudas e crônicas, danosas ao paciente, familiares e ao atendimento público, gerando custos exorbitantes para o município, o que poderia ser amenizado com a aplicabilidade adequada das políticas públicas direcionadas para abordagem destes pacientes.

Neste sentido, se torna importante trabalhar de forma adequada o atendimento e o suporte inicial do paciente com DM2, orientando também a importância primordial de sua contribuição para a sua boa evolução mediante tal patologia.

Diante do exposto, as questões que se abrem são: As pessoas DM2 insulínodépendentes que recebem insumos para automonitoramento glicémico têm melhor controle metabólico que as pessoas DM2 insulínodépendentes que não recebem os insumos para automonitoramento glicémico? ou, em outras palavras, o fornecimento de insumos para automonitoramento glicémico (PAMGC) é efetivo no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulínodépendentes?

Assim, o trabalho objetiva discutir a efetividade da política pública de fornecimento de insumos para automonitoramento glicémico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulínodépendentes. Como objetivos específicos, descrever a política pública de saúde sobre Diabetes *mellitus* tipo 2 no município de Franca- SP e avaliar a efetividade no controle metabólico de pacientes com DM2 insulínodépendentes que participam do programa de Insumos.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quando da formulação de políticas públicas, os gestores devem estar conscientes de que suas atuações devem se pautar pelo entendimento de que a vida social e a melhoria da qualidade de vida acontecem em um ambiente complexo e conflituoso. Devem entender e buscar ações e soluções, de forma consensual, contribuindo para a superação das desigualdades sociais instaladas no País, promovendo o desenvolvimento e o reconhecimento da saúde e da vida como direito social e de cidadania. É necessário repensar a forma de elaboração das políticas públicas de saúde, incentivando a efetiva participação da sociedade, descaracterizando o caráter de decisão do poder central. No contexto da saúde, Franco Neto et al., citado por Akerman (2005), afirmam que esta atitude contribuiria para:

O aprimoramento do atual modelo de atenção, onde a agenda da promoção da saúde seja compreendida numa dimensão em que a produção da saúde é realizada fundamentalmente, embora não exclusivamente, fora da prática das unidades de saúde, ocorrendo nos espaços do cotidiano da vida humana, nos ambientes dos processos produtivos e na dinâmica da vidas das cidades e do campo, buscando compreender o ambiente como um território vivo, dinâmico, reflexo de processos políticos, históricos, econômicos, sociais e culturais, onde se materializa a vida humana e a sua relação com o universo (AKERMAN, 2005, p. 23).

Os atores responsáveis pela formulação de políticas públicas devem entender o território como o “espaço vivo e interativo” e principal colaborador para o real entendimento das necessidades sociais. O espaço territorial deve ser considerado para a identificação e implementação de estratégias que busquem o desenvolvimento. É importante o entendimento do território e suas relações, pois, na formulação de políticas públicas, o “local” se expressa como um território vivo de interações. No “local”, fluem vidas em suas múltiplas interações sociais, culturais, amorosas, espirituais, intelectuais, políticas, econômicas, dentre outras, manifestando-se na construção da cidadania, buscando a coesão social em um “campo” repleto de interesses conflitantes (AKERMAN, 2005).

O processo de desenvolvimento deve estar sustentado pela busca dos princípios da equidade e da inclusão social, objetivando o fortalecimento da cidadania e da democracia, amparando a promoção e ampliação dos direitos, diminuindo as desigualdades sociais. É imperiosa a compreensão de que a manutenção do “estado de condições precárias de saúde” é determinante negativo, que se contrapõe ao desenvolvimento. O desenvolvimento exige uma lógica diferente e é importante salientar que ele não busca e não deve, portanto, minar os poucos benefícios alcançados no campo da saúde. Nesse contexto, a mobilização social mais uma vez desponta como necessária ao fortalecimento de capacidades e potencialidades e à garantia de que os benefícios oriundos do processo de desenvolvimento sejam distribuídos de forma democrática e com largo alcance social.

As questões abordadas pelo desenvolvimento são comumente confundidas pelas inerentes ao crescimento. Inicialmente, pode-se afirmar que crescimento é um conceito ligado à mudança e seus aspectos quantitativos, aos aspectos da expansão econômica, estando, por vezes, ligado a análises específicas de determinados setores econômicos. O conceito de crescimento geralmente está associado à ampliação quantitativa da produção, ensejando que esse processo está beneficiando a todos dentro de um país, que, por sua vez, é considerado desenvolvido, se apresentar altas taxas relacionadas à condição e qualidade de vida dos seus habitantes (AKERMAN et al., 2012).

No entanto, o crescimento econômico não contribui, necessariamente, para a melhoria do extrato social. Por seu lado, o desenvolvimento projeta um estado de ações que busca a melhoria dos processos produtivos e da infraestrutura do país, preocupando-se fortemente em gerar resultados qualitativos, que se reflitam no incremento do bem-estar social, principalmente dos mais necessitados.

É consenso que o crescimento pode existir sem o desenvolvimento ou até mesmo ser consequência deste, mas não existe desenvolvimento sem crescimento, o que não diminui a importância do desenvolvimento em relação ao crescimento. O fato é que desenvolvimento é a presunção de planejamento, objetivos, metas e ações, que buscam o equilíbrio do crescimento e que melhorem, também, a qualidade de vida da população. As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento necessitam de decisões políticas firmes e, para obterem maiores condições de acerto, do envolvimento da própria sociedade. É indiscutível que a participação social é fundamental para o sucesso das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Não é mais aceitável a concepção, o planejamento, a implementação e controle de ações públicas, sem a efetiva participação popular.

Sen, economista indiano ganhador do prêmio Nobel em 1998, correlaciona o desenvolvimento aos aspectos da conquista e garantia da liberdade que a sociedade deve desfrutar, bem como do seu acesso às melhorias de vida. O autor defende, ainda, a ideia de que a riqueza não basta em si própria e que ela deve proporcionar a aquisição de liberdade para o gozo da vida que se deseja; e ao afirmar que o desenvolvimento é muito mais que acumulação de riqueza ou de crescimento, relaciona-o, com destaque, à melhoria de vida e de liberdade (SEN, 2000).

Para o autor, vive-se em um mundo repleto de opulência e, contraditoriamente, em um mundo onde a privação e a opressão são extraordinárias. Nesse contexto, o desenvolvimento consiste na real eliminação de privações de liberdade, que limitam as escolhas e oportunidades de as pessoas exercerem sua condição de cidadania (SEN, 2000, p.9).

A impossibilidade da escolha é perceptível, quando se vê milhões de pessoas à margem, sem acesso à saúde, educação e alimentação, dentre outros aspectos que garantam melhores condições de vida. As restrições à liberdade política e aos direitos civis básicos, elementos construtivos da liberdade humana, também ilustram tal fato. Portanto, é salutar incentivar a valorização das liberdades e aplicá-las nas questões inerentes às liberdades individuais. A liberdade é importante por propiciar o potencial próprio da sociedade, levando-a a ser agente de mudanças, de maneira a influenciar o meio e, conseqüentemente, o *status quo* (expressão do Latim que significa “o estado das coisas”). O crescimento pode, ainda, ocorrer isoladamente para um determinado segmento social, empresarial, ou para determinada região. Pode-se afirmar que uma região geográfica pode crescer economicamente, sem, no entanto, ter contribuído para o desenvolvimento da sociedade local.

A liberdade é um dos pontos mais importantes quando se trata do desenvolvimento. É através dela que o homem efetivamente participa das decisões sobre o modelo de desenvolvimento, interferindo nele, de forma a conseguir ainda maior liberdade e acesso às melhorias. Quanto maior a capacidade de organização dos atores locais, maiores são as possibilidades de participação “[...] e, conseqüentemente, as deste ciclo de atividades indispensáveis ao processo de desenvolvimento” (WITTMANN; DOTTO, BOFF, 2004, p. 36-37).

A ampliação da liberdade humana é o principal fim e o principal meio do desenvolvimento. O acesso às facilidades e liberdades econômicas, às oportunidades sociais, às garantias de transparência e segurança protetora são papéis instrumentais da liberdade e influenciam fortemente no desenvolvimento (SEN, 2000, p. 710). Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco. As pessoas são agentes participativos e não apenas receptores de políticas e/ou projetos de desenvolvimento.

O Estado necessita fortalecer-se, enquanto formulador e divulgador de políticas públicas, para regular as distorções provocadas pelos mecanismos de crescimento em desfavor do desenvolvimento, tanto no campo social, cultural, jurídico e, principalmente, no político. É indispensável indagar se o desenvolvimento está contribuindo para o processo de conquista de liberdade do cidadão ou se

simplesmente reproduz o modelo dominante existente, que tem uma lógica mercadológica.

Outro aspecto muito importante é o entendimento de que o desenvolvimento local ou endógeno deve ser visto sob pontos de vistas de todos os atores envolvidos, buscando o envolvimento para se obter o desenvolvimento. Deve-se envolver para desenvolver, aspecto que trará legitimidade e legalidade ao processo de desenvolvimento. Por ser um processo cujo resultado é um conflito de interesses, as prioridades a serem estabelecidas devem ser bem debatidas, objetivando identificar as reais necessidades da maioria da população, o que implica, às vezes, renúncias de alguns a favor de outros.

Esse argumento reforça a análise situacional, quando da elaboração das políticas públicas de saúde, de que os atores locais e suas representatividades é que têm maiores e melhores condições e conhecimentos das ações que atenderão às suas necessidades, e, portanto, sua participação na elaboração dos planos municipais de saúde ganha contorno de fundamental importância. É relevante ainda, salientar que se deve procurar ações de desenvolvimento que respeitem a sustentabilidade. É necessário desenvolver, respeitando o futuro.

O desenvolvimento sustentável tem como premissa fundamental o reconhecimento da “inadequação” econômica, social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. As inadequações econômicas, sociais e ambientais causadas pelo modelo de desenvolvimento atual não reconhecem a finitude dos recursos naturais e as injustiças sociais praticadas. É necessário pensar na biodiversidade e na sociodiversidade. Só se pode entender o desenvolvimento através de um olhar integrado, sob todas as óticas (não apenas econômica, social etc.).

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável que se consolidou no final da década de 1980, quando do lançamento do documento “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland), elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1983, que propôs o termo “sustentável” como estratégia de desenvolvimento, transformou-se numa ferramenta importantíssima para a preservação do planeta Terra e a manutenção da qualidade de vida do ser social inserido neste conjunto. Completando esta visão, Alencastro (2015) enfatiza que o homem se vê, atualmente, num caminho de bifurcação; ou segue os princípios da

sustentabilidade ou permanece no modelo econômico de desenvolvimento que estimula o consumo e a produção descontrolada.

O conceito de desenvolvimento sustentável está em construção. Seu ponto de partida foi o compromisso político, em nível internacional, com um modelo de desenvolvimento em novas bases, que compatibilizasse as necessidades de crescimento com a redução da pobreza e a conservação ambiental (VEIGA, 2005).

Assim, Rodrigues e Rippel (2015) apontam que o desenvolvimento sustentável:

“[...] não busca somente compreender os limites do crescimento econômico, mas deixa explícita a responsabilidade do sistema econômico em proporcionar uma sociedade mais sustentável, pautada em valores humanos e ambientais.

Não obstante, Rodrigues e Rippel (2015) argumentam ainda que em um primeiro momento a ideia de sustentabilidade se limitaria a uma noção econômica e ecológica, mas que esse conceito evoluiu e incorporou outras noções essenciais para a geração de bem-estar. Assim, para os autores:

Considerando a evolução do conceito nos últimos 50 anos, o desenvolvimento sustentável pode ser caracterizado como: econômico, social, político, cultural e institucional. Dessa forma, afirma-se que o desenvolvimento sustentável é social e ético, mas condicionado aos fatores ambientais, institucionais e a viabilidade econômica (RIPPEL, RODRIGUES, 2015, p. 81).

Wang (2008) também trabalha o conceito do desenvolvimento sustentável, abordando esse conceito a partir da problemática de que esse ainda não é expressado como um direito humano e, também, criticando a sua não-relação com o direito ao desenvolvimento – posto o reconhecimento desse último em 1986, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Dessa forma, tem-se que o desenvolvimento sustentável é pensado como uma relação entre as pessoas e o meio.

Nesse sentido, o autor, ao elaborar o conceito de desenvolvimento sustentável reconhece a existência de 6 dimensões para esse, quais sejam ecológicas, sociológica, econômica, tecnológica, ética e abrangente. Para Wang, na perspectiva ecológica, o conceito de desenvolvimento sustentável está relacionado à ideia de ecologia sustentável, isto é, o desenvolvimento sustentável a partir da sua dimensão ecológica estaria relacionada à proteção do meio ambiente e ao *“enforcement of capability of creating and renovating environmental systems”* (WANG, 2008, p. 39). A perspectiva sociológica, por sua vez, refere-se a de que forma o desenvolvimento sustentável é pensado de modo a proporcionar a melhora na qualidade e vida das pessoas, *“while living within the carrying capacity of supporting ecosystems”* (WANG, 2008, p. 39).

A terceira dimensão – econômica – tem como foco manutenção de um equilíbrio, uma harmonia entre crescimento econômico e o consumo do meio ambiente; ou seja, o desenvolvimento sustentável – por essa lógica – consiste na maximização dos benefícios concretos provenientes do desenvolvimento econômico, de forma a se manter a preservação da qualidade dos recursos naturais e os serviços que dele são provenientes.

Já a dimensão tecnológica, segundo ensina Wang, considera o desenvolvimento sustentável *“as an objective directed toward finding clearer and more effective techniques in order to reduce consumption of energy and other natural resources”* (WANG, 2008, p. 39), ou seja, aqui trata-se de encontrar técnicas que possuam maior eficácia para a diminuir o consumo de energia e dos recursos naturais.

A quinta dimensão é a ética. Conforme explica Wang: *“In ethical terms, sustainable development means fairness at three levels: intra-generation, inter-generation, and between humans and the environment”* (WANG, 2008, p. 40). De modo que, o que se busca é reforçar nas pessoas uma consciência moral de proteção ao meio ambiente, promovendo a desconstrução de ideias e comportamentos, promovendo, assim, uma sobrevivência sustentável. Por fim, a última dimensão que o autor coloca é por ele chamada de perspectiva abrangente; essa dimensão é, portanto, nas palavras de Wang (2008, p. 40):

The most representative formulation of a holistic approach to sustainable development is found in the UN's official definition, building on the report of the commission chaired by Gro Harlem Brundtland, namely, development that meets the needs of the present without compromising the capability of future generations to meet their needs.

A formulação mais representativa de uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável encontra-se na definição oficial da ONU, com base no relatório da comissão presidida por Gro Harlem Brundtland, ou seja, o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades

Assim sendo, Melina Fachin (2015) também discorre acerca do direito humano ao desenvolvimento e sua (não) relação com o desenvolvimento sustentável. Contudo, no que tange o conceito de desenvolvimento sustentável, Fachin elucida que o direito sustentável pode ser pensado a partir de 3 dimensões: econômica, social e ambiental (FACHIN, 2015, p. 269).

Nesse sentido, Fachin ensina que o desenvolvimento sustentável está atrelado à possibilidade de “tornar compatíveis o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a preservação ambiental” (FACHIN, 2015, p. 269), sendo que a erradicação da pobreza é essencial para que se possa aferir a efetivação desse desenvolvimento. Portanto, explica:

O desenvolvimento, mirado por meio das lentes da sustentabilidade, expõe a visão holística e humana do desenvolvimento. Holística, porque há necessidade de integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Humana, porque as pessoas ocupam posição central e são protagonistas do desenvolvimento sustentável que deve por sua vez, beneficiar a todos de modo justo, equitativo e inclusivo, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade (FACHIN, 2015, p. 270).

Compreende-se, nessa perspectiva, que para a efetivação do desenvolvimento sustentável essas três dimensões devem ser contempladas e, para tanto, é necessária uma ação protagonista humana. Portanto, conforme expõe Fachin, “[...] o desenvolvimento humano, sob a perspectiva sustentável, vai demandar ações à nível nacional e internacional e o reforço da cooperação internacional” (FACHIN, 2015, p. 270), de modo que “[...] o direito ao desenvolvimento é um direito humano de realização das capacidades humanas” (FACHIN, 2015, p. 270).

Além disso, no que se refere ao conceito de desenvolvimento sustentável para a ONU, tem-se que esse é definido pela Agenda 21 de 1992. No aludido documento, é formulada a concepção de que o desenvolvimento possui 3 dimensões, para que seja efetivado: a dimensão social, a econômica e a ambiental. Desse modo, a Agenda 21 compreende que o desenvolvimento sustentável demanda

[...] comprometimento com políticas econômicas saudáveis e um gerenciamento igualmente saudável; uma administração pública eficaz e previsível; integração das preocupações ambientais ao processo de tomada de decisões; e avanço para um Governo democrático, à luz das situações específicas dos países, com a plena participação de todos os grupos envolvidos (ONU, 1992, p. 8).

No mesmo sentido é o entendimento apresentado pela Agenda 2030. Em seu preâmbulo, a Agenda vai apresentar 17 objetivos para a promoção do desenvolvimento, os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), afirmando que “eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental” (ONU, 2015, p. 1). É evidente, portanto, que a ONU compreende o desenvolvimento sustentável como uma forma alternativa de se atingir o desenvolvimento das sociedades, sem o foco único e exclusivo no lucro, primando por desenvolver o mundo nestas três dimensões.

2.1 A SUSTENTABILIDADE E A SAÚDE NA AGENDA 2030

A Agenda 2030 desponta num acordo sobre a necessidade de seguir rumo às sociedades mais inclusivas, solidárias e coerentes rumo ao desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma agenda global e integrada que coloca a área da saúde num espaço importante como “condição prévia e um resultado e indicador de todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável”.

A saúde tem uma posição central na agenda por meio do ODS 3 e está intimamente ligada a mais de uma dezena de metas em outras relacionadas à saúde urbana, igualdade de acesso a tratamentos e doenças não transmissíveis, entre outras. De fato, os ODS representam uma oportunidade única para promover a

saúde pública por meio de uma abordagem integrada de políticas públicas em diferentes setores.

O ODS 3 reconhece que, apesar do progresso na saúde global nas últimas décadas, continua a haver morbidade e mortalidade significativas e evitáveis em todo o mundo. Grande parte dessa carga de saúde está associada a fatores ambientais que devem mudar nas próximas décadas com mudanças no clima, biodiversidade, uso da terra e outros fatores.

Indiscutivelmente que as transformações socioeconômicas e as mudanças ambientais se cruzam com a saúde humana e identificam áreas de pesquisa prioritárias. A atenção aos sistemas humanos (econômico, social e político) e aos sistemas naturais da Terra pode melhorar a saúde e o bem-estar de todos. O *Future Earth Health KAN* responde a esse chamado, reunindo pesquisadores de saúde com outros cientistas naturais e sociais, especialistas em políticas de saúde e meio ambiente e líderes do governo, do setor privado e da sociedade civil. (FUTURE EARTH, 2020).

A *Future Earth Health Knowledge-Action Network* é uma plataforma de pesquisa internacional que fornece conhecimento e suporte para acelerar as transformações para um mundo sustentável. Nessa empreitada, a *Future Earth* elaborou uma agenda que identifica quatro temas prioritários de pesquisa para proteger e promover de forma sustentável a saúde planetária e o bem-estar humano:

- (a) identificação e gestão de riscos (incluindo relacionados à água, higiene, saneamento e gestão de resíduos; produção e consumo de alimentos; oceanos; e eventos climáticos extremos e mudanças climáticas);
- (b) fortalecer os sistemas de saúde resilientes ao clima;
- (c) monitoramento, vigilância e avaliação;
- (d) comunicação de risco.

O conhecimento gerado a partir da pesquisa delineada pode informar políticas para construir, fortalecer e conectar comunidades de pesquisa de sustentabilidade nacionais, regionais e globais. Também pode promover colaborações com outras partes interessadas com interesse e capacidade de influenciar caminhos de desenvolvimento resilientes e sustentáveis para alcançar a saúde humana e planetária. (FUTURE EARTH, 2020).

Neste sentido, o crescimento econômico, associado ao aumento da renda, juntamente com mudanças fundamentais na forma como a sociedade está organizada, permitiu mudanças nos padrões de vida que, em geral, melhoraram a expectativa de vida, o estado de saúde, o alívio da pobreza e os cuidados de saúde. O crescimento econômico também levou à degradação ambiental com consequências adversas para a saúde da população. A transição econômica variou acentuadamente ao longo do tempo, com progressos diferenciados entre e dentro dos países. Exemplos incluem compostos que danificam o ozônio que aumentam a probabilidade de câncer de pele e catarata ocular e os impactos na saúde da poluição do ar, da água e dos oceanos (ECKERT, KOHLER, 2015).

Cada vez mais, as preocupações com a igualdade dentro e entre os países estão ofuscando as mudanças econômicas. Essas desigualdades podem levar à degradação dos sistemas de saúde e das leis e regulamentações ambientais e trabalhistas (DYE, 2014).

Deixar de integrar a relação entre economia e natureza e saúde na tomada de decisões pode levar a um estresse econômico severo em períodos de tempo cada vez mais longos. A gestão coletiva organizada dos bens comuns globais é essencial para o futuro do desenvolvimento e da sustentabilidade. Portanto, percebe-se que a saúde humana e do planeta estão intimamente interligadas com as transformações socioeconômicas e as mudanças ambientais e a Agenda 2030 prevê um forte compromisso político com a saúde pública e afirma que “[...] para promover a saúde e o bem-estar físico e mental e estender a expectativa de vida para todos, deve-se alcançar a cobertura universal de saúde e o acesso a cuidados de qualidade. Ninguém deve ser deixado para trás.” (UNITED NATIONS, 2021). Saúde e bem-estar para todos em todas as idades estão no centro do desenvolvimento sustentável – como determinantes e facilitadores dos ODS.

Por outro lado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, reconhece as doenças não transmissíveis (DCNTs) como um grande desafio de saúde pública. (UNITED NATIONS, 2021). Os ODS enfatizam que as DCNTs estão inter-relacionadas com o desenvolvimento global. A crescente importância das DCNTs na agenda de desenvolvimento foi validada pelas três reuniões de alto nível

da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre prevenção e controle de doenças não transmissíveis em 2011, 2014 e 2018. (WHO, 2020).

A partir da primeira reunião de alto nível da ONU em 2011, as DCNTs têm recebido cada vez mais atenção nos órgãos governamentais globais. Em 2014, houve uma segunda reunião de alto nível que validou a crescente importância de abordar a crescente carga de DCNTs. Em setembro de 2015, os compromissos das DCNTs, como a promoção da atividade física, saúde mental e bem-estar e a obtenção de cobertura universal de saúde, foram incluídos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (WHO, 2020).

Assim, as DCNTs foram incluídas no ODS 3, Saúde e bem-estar, para “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. Especificamente, a meta 3.4, que visa até 2030, “reduzir em um terço a mortalidade prematura por DCNTs via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar”. (STEIN et al., 2019). Ainda podemos salientar a meta 3.4.1, que visa a “redução da taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias”.

Contudo, dados de vários países mostram que apenas dois dos dez indicadores de progresso das DCNTs estão sendo atendidos por pelo menos metade dos 176 países que assinaram os ODS (UNITED NATIONS, 2021). Fatores de risco comportamentais estão intimamente ligados a outros determinantes sociais, como acesso desigual aos cuidados de saúde, pobreza, gênero, fatores alimentares e educação. A falta de exercício físico e a menor ingestão de frutas e vegetais, juntamente com hábitos alimentares pouco saudáveis, estão progredindo rapidamente, mesmo em populações urbanas pobres.” (STEIN et al., 2019). A poluição do ar, o aumento da temperatura global, os sistemas alimentares e outros fatores ambientais exacerbam os riscos de DCNTs e contribuem diretamente para a crescente carga de DCNTs. As iniquidades nas DCNT são comuns devido à exposição variada, estratificação social e vulnerabilidade diferencial (UNITED NATIONS, 2021).

O sucesso limitado nos últimos cinco anos em relação às metas dos ODS 2015–2030 levanta fortes preocupações. A Agenda 2030 é um poderoso mecanismo de responsabilização para o mundo (STEIN et al., 2019). Essas metas ambiciosas exigem ação dedicada dos países para garantir que recursos adequados sejam alocados às DCNTs, que as políticas e legislação relacionadas a DCNTs

sejam efetivamente implementadas e aplicadas e que os sistemas de vigilância e saúde tenham recursos suficientes para sua plena implementação. Muito mais precisa ser feito – e rapidamente – para trazer as mudanças transformadoras necessárias.

3. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: CONTEXTUALIZAÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas uma epidemia mundial por serem precursoras de incapacidades, associadas frequentemente à hospitalização, baixa qualidade de vida e risco de mortalidade.

De uma forma geral, são doenças que acometem grande parcela da população mundial, sendo classificadas como uma comorbidade preditora na piora do prognóstico e associadas a uma diminuição da qualidade e expectativa de vida da população, podendo atingir todos os indivíduos, porém grupos mais vulneráveis como idosos e indivíduos com baixa renda e escolaridade são mais susceptíveis a serem acometidos. Dentre as principais doenças estão: hipertensão arterial, diabetes *mellitus*, doenças cardiovasculares, neoplasias e doenças pulmonares obstrutivas crônicas (BRASIL, 2011; IBGE, 2013; WHO, 2011).

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as DCNTs são responsáveis por 71% das 57 milhões de mortes ocorridas globalmente em 2016 (WHO, 2018a). No Brasil, as DCNTs são igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes, com destaque para doenças cardiovasculares (28%), neoplasias (18%), doenças respiratórias (6%) e diabetes *mellitus* (5%) (WHO, 2018b).

No Brasil, desde 2006, é desenvolvida a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), com o objetivo de monitorar os principais fatores determinantes para o desenvolvimento de DCNT, que juntamente com outras ações, compõe o sistema de vigilância de fatores para desenvolvimento de DCNT. O VIGITEL foi implantado em 26 Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e toda essa pesquisa contribui para o planejamento de políticas para melhoria da qualidade de vida da população. A pesquisa agrupou os fatores de risco ou proteção para DCNT em temas que envolvem tabagismo, excesso de peso e obesidade, consumo alimentar, prática de

atividade física, consumo de bebida alcoólica, autoavaliação do estado de saúde, prevenção do câncer e morbidade referida (BRASIL, 2019).

O DM2 destaca-se por estar frequentemente associado a complicações que comprometem a capacidade funcional e, portanto, a qualidade de vida, representando um importante e crescente problema de saúde pública (PADILHA, 2017). Tem crescido exponencialmente, tendo em vista a globalização e outros processos atrelados, como a rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de excesso ponderal e de comportamento sedentário, além de crescimento e envelhecimento populacional e maior sobrevida dos indivíduos. Todos esses fatores aumentam os desfechos relacionados ao DM, como incidência, prevalência, mortalidade e morbidade (FLOR; CAMPOS, 2017).

A DM2 é uma única doença, mas envolve um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que manifesta em comum a hiperglicemia, que é resultado de algum defeito na ação da insulina, em sua secreção ou mesmo em ambos, ocasionando complicações após um longo período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017/2018). É uma condição na qual o organismo tem uma deficiência na produção, ou na utilização (resistência) da insulina endógena.

A insulina tem como principal função o favorecimento da entrada da glicose para as células do organismo para que sejam utilizadas como fonte de energia para variadas atividades celulares. Seu diagnóstico é acompanhado por hiperglicemia, tendo como base a hora da última refeição (SBEM, 2016).

Tavares et al. (2016) ressaltam que o DM compõe um grupo de doenças metabólicas associadas a complicações, disfunções e insuficiência de diferentes órgãos, podendo atingir, principalmente, os sistemas: oftalmológico, cardiovascular; renal e neurológico. O DM é categorizado em DM tipo 1, DM tipo 2, DM Gestacional e outros tipos específicos de DM (ADA, 2017).

O DM2, em particular, é altamente heterogêneo e uma classificação refinada poderia fornecer uma ferramenta poderosa para individualizar os regimes de tratamento e identificar indivíduos com risco aumentado de complicações.

A diferenciação entre o DM1 e o DM2 baseia-se nos achados clínicos. Os casos de DM1, em quase totalidade, apresentam sintomas clássicos, como poliúria, polidipsia e polifagia, enquanto pacientes com DM2 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e apresentarem sintomas inespecíficos, como tontura, dificuldade visual, astenia, câibras, vulvovaginites de repetição e disfunção erétil. A obesidade está presente em 80% dos casos. Nos casos em que houver dúvidas, o diagnóstico pode ser confirmado pela dosagem de autoanticorpos, ou ainda, em atendimentos SUS, mediante a dificuldade de realização deste exame, pode ser feito a dosagem de Peptideo C, um precursor de insulina, que tende a cair muito no caso de DM1.

O DM2 surge geralmente após 40 anos de idade, mas pode acometer crianças e adolescentes, principalmente pelo de estilo de vida. Está associado com: história familiar de DM2; obesidade; diagnóstico prévio de intolerância à glicose; diabetes gestacional ou macrosomia fetal; tabagismo; HAS e dislipidemia.

O diagnóstico laboratorial baseia-se nos seguintes achados: HbA1c (hemoglobina glicada) > ou igual a 6,5%; Glicemia Jejum > ou igual 126mg/dl; Glicemia de 2 h > ou igual a 200mg/dl durante o teste tolerância oral à glicose (TOTG) 75g.

Os valores da hemoglobina glicada (HbA1c) refletem a média da glicemia durante os últimos 2 a 3 meses, que é o tempo médio de sobrevivência das hemácias. Quanto maior a concentração da glicose plasmática e maior o período de contato, maior a porcentagem de HbA1c. Considera-se a HbA1c como padrão-ouro para o controle glicêmico.

Com o diagnóstico confirmado de DM2, são necessários alguns cuidados e precauções, envolvendo mudanças no estilo de vida e qualidade dos hábitos alimentares, consumindo alimentos com baixos teores glicêmicos e ricos em fibras, como os grãos integrais, legumes, hortaliças e frutas, que favorecem o metabolismo da glicose e da insulina (CECILIO, et al, 2015).

Conforme estudos de Thomazelli, Machado e Dolçan (2015), a não adesão às mudanças de estilo de vida e uso inadequado de medicamentos evoluem com complicações, sejam elas agudas ou crônicas, com impactos marcantes sobre o paciente e o sistema de saúde, gastos exorbitantes com tratamentos, internações prolongadas e recorrentes, incapacitações físicas e sociais, com perda de emprego e da produtividade dos indivíduos.

Em 2014, a OMS estimou que 422 milhões de adultos no mundo tinham DM2. Em 2012, o DM2 causou 1,5 milhões de mortes e estimou-se que a alta taxa de glicose no sangue foi a causa de mais 2,2 milhões de mortes, aumentando os riscos de doenças cardiovasculares e outras. Assim, são propostas ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doença com foco no autocuidado e modificação do estilo de vida, objetivando a redução das hospitalizações e seus agravantes, bem como dos custos e da mortalidade.

Um dado relevante nos diabéticos é a mortalidade. A Federação Internacional de Diabetes expôs que em 2015 aconteceram 247.500 mortes em adultos como resultado de diabetes. Mais da metade das mortes (130.700) ocorreu no Brasil. As complicações do DM2 são apontadas como as principais causas da morte na maioria dos países. Além disso, entre 1996 e 2007, observou-se incremento de 2,0% ao ano na mortalidade por esse agravo. Estudo publicado em 2018 mostrou que a taxa de mortalidade por DM2 seguiu crescente entre 2000 e 2015 (GARCES et al., 2018).

Segundo dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) de 2019, 463 milhões de pessoas, entre 20 a 79 anos, vivia com diabetes (9,3% de prevalência na população nesta faixa etária) e caso essas tendências persistam, em 2045 cerca de 700 milhões de pessoas estarão com diabetes. No Brasil, em 2015 esse número chegou a 16,8 milhões de diabéticos e sua estimativa para o ano de 2045 é de 26 milhões de brasileiros com a doença. Já os dados apresentados nos últimos dois anos do VIGITEL, de 2018 e 2019, aproximadamente 7% da população estão diabéticos (BRASIL, 2020; 2019; IDF, 2019). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 trouxe os dados da população diabética mostrando que 6,2% dos brasileiros com 18 anos de idade ou mais receberam

diagnóstico médico de diabetes. Em relação ao sexo, mulheres (7%) tiveram maior prevalência que os homens (5,4%) (SOCIDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).

Ainda de acordo com a SBD, o número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM2. Os principais fatores de riscos estão relacionados aos hábitos alimentares e estilo de vida da população (SOCIDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).

Nos países em desenvolvimento, há uma tendência ao aumento na frequência em todas as faixas etárias, especialmente nas mais jovens, cujo impacto negativo sobre a qualidade de vida e a carga da doença aos sistemas de saúde é bastante relevante (BRASIL, 2013).

Frente a tal cenário, observa-se as facetas relacionadas ao DM2, pois o seu crescente número de complicações, atrelados ao número de indivíduos com DM2, têm gerado resultados que colaboram significativamente para o aumento de hospitalizações (SANTOS, 2015). Estima-se que em 2040 tenhamos 642 milhões de pessoas com a doença. Assim, na maioria dos países, os gastos com diabetes poderão chegar entre 5% e 20% dos gastos totais com saúde, prejudicando um cenário econômico sustentável (IDF, 2015).

Para tanto são necessárias medidas urgentes para que se tenha melhoria da qualidade de vida e diminuição dessa patologia, que vem se alastrando e causando prejuízo na qualidade de vida, pessoal e profissional, complicações agressivas e irreversíveis, grandes índices de hospitalização, com prejuízos financeiros e psicológicos, e mortes. Corroborando com esse pensamento, Galdino (2014) diz ser necessário que a população esteja ciente dos fatores de risco e de predisposição do DM, bem como saiba identificar seu quadro clínico, para que adote medidas preventivas, bem como para diagnosticar precocemente a doença, minimizando riscos de complicações futuras.

3.1 O DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)

O DM tipo 2 é um problema de saúde pública que tem prioridade em âmbito global pela sua prevalência, morbidade, complicações crônicas e agudas, taxa de hospitalização e mortalidade (ISER et al., 2015). É uma condição médica crônica na qual os níveis de glicose se acumulam na corrente sanguínea, secundário à defeitos na ação ou na secreção de insulina pelo pâncreas quando encontra condições (obesidade, por exemplo) que limitam a eficácia de sua atividade. (PIETRANGELO, 2021).

O DM2 já é motivo de preocupação, os seus números são relevantes no que tange às condições de saúde humana. No mundo os números chegam a 415 milhões de pessoas e no Brasil os dados mostram 14.250.000 casos da doença (IDF, 2019).

Atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar entre os países que contabilizam o maior número de casos da doença, tendo sido diagnosticados por volta de 12 milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos com diabetes no país (FLOR; CAMPOS, 2017).

É uma doença de evolução lenta e progressiva, frequentemente acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial, requerendo tratamento intensivo e orientação adequada que permitam prevenir ou mesmo retardar as complicações agudas e crônicas advindas dela.

O DM2 é o tipo mais comum de diabetes. E sua alta incidência está associada aos erros alimentares e sedentarismo, evidentes no mundo atual, que culminam para um ganho de peso excessivo desproporcional para a altura, de forma que fisiologicamente a insulina produzida pelo pâncreas, encontra dificuldade em ter uma ação eficaz e que com o tempo, podem “fadigar” e evoluírem para falência na produção de insulina pelas células beta-pancreáticas e então, os pacientes, tornam-se insulino dependentes (IDF, 2019).

A etiologia do DM2 aponta que a predisposição genética e o estilo de vida, tais como o sedentarismo, consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, açúcares simples e industrializados, combinados ao estresse, estão correlacionados com o surgimento e a progressão do diabetes, independente do fator genético. Se o indivíduo possui uma predisposição genética a ter a doença, mas adota hábitos saudáveis durante todo o percurso da vida, o mesmo tende a não desenvolver o diabetes, por isso a importância de ações de promoção à saúde e prevenção de agravos no contexto social que se refere à patogenia do diabetes (SBD, 2019).

O DM2 corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM, ocasionando complicações a longo prazo. Essas complicações são categorizadas em agudas e crônicas, micro e macrovasculares (SBD, 2019-2020).

Os sintomas do DM2 muitas vezes demoram a se manifestar, e a busca pelo diagnóstico acontece quase sempre quando a doença já está instalada, por isso a importância de ficar atento aos fatores de risco, buscar hábitos saudáveis, reduzindo consumo de gorduras e açúcar, dar preferências a frutas, verduras e legumes, e praticar exercício físico regularmente.

Para diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus, podemos lançar mão de diferentes exames tais como:

- Glicemia de jejum: coleta de sangue periférico após jejum de pelo menos 8 horas;
- Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG): coleta de sangue periférico seguida pela ingestão de 75 gramas de glicose dissolvida e nova coleta após 2 horas da sobrecarga glicêmica.
- Hemoglobina glicada (HbA1c): relação dos níveis glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses. Sofre pouca influência da dieta do dia a dia e não depende de jejum para sua realização. A hemoglobina glicada é a glicose que se encontra ligada ao grupo amino terminal de forma estável. Entretanto, para o diagnóstico firmado de DM, há necessidade de repetição dos exames alterados, de preferência a mesma metodologia aplicada à primeira amostra. Exceção faz-se quando o paciente apresenta sinais e sintomas inequívocos de hiperglicemia tais como poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento, situação na qual o diagnóstico de diabetes já pode ser estabelecido se houver glicemia ao acaso com valores maiores ou iguais a 200 mg/dl (SBD, 2019- 2020).

Dentre as complicações agudas estão a hipoglicemia e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. As crônicas classificam-se em macro vasculares (doença da artéria coronária, doença vascular cerebral e doença vascular periférica), microvasculares (retinopatia e nefropatia) e complicações neuropáticas.

O impacto das complicações diabéticas na saúde populacional e individual é brutal, podendo ser resumida da seguinte maneira:

- A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira adquirida;
- A nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência renal crônica dialítica;
- A neuropatia diabética e as complicações vasculares em membros inferiores são a principal causa de amputação não traumática desses membros;
- A presença de DM2 descompensado aumenta em 2 a 6 vezes o risco de eventos cardiovasculares.

A doença aumenta o risco de morte por causa cardiovascular, mas também afeta outras condições contribuindo para o número crescente de mortalidade geral, pois diversas complicações microvasculares como lesões em pequenos nervos, redução da filtração renal e dificuldades visuais, advêm do desequilíbrio glicêmico e longo tempo de convívio com a doença (IDF, 2019).

É importante ressaltar que tais complicações, se forem monitoradas cuidadosamente pela equipe médica, mas principalmente com a disciplina de cuidados do paciente, podem ser controladas e adiadas, havendo menos prejuízo a saúde do paciente (BLACK et al., 2017).

Nesse sentido, Cortez et al. (2015) destacam que identificar os pacientes que não realizam autocuidado para uma manutenção dos níveis glicêmicos adequados, pode ser uma das estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde, que tem como finalidade proporcionar uma melhor qualidade de vida, aumentando assim a confiança entre o usuário e o profissional.

Segundo Amaral et al. (2019), o conhecimento do paciente diabético sobre a gravidade da doença ainda é insatisfatório, ou seja, indivíduos que possuem baixa escolaridade têm grandes chances de não valorizar as ações de prevenções, ocasionando várias complicações e dificultando um melhor tratamento. A falta de conhecimento acontece no momento das consultas, em que o profissional de saúde não analisa todo o contexto do paciente, e não repassa as orientações de forma clara e compreensiva, o que dificulta a qualidade do tratamento.

Amaral et al. (2019) relatam que outro ponto importante é que não se deve focar apenas no paciente com DM2, mas buscar apoio familiar, para garantir uma melhor adesão e conhecimento frente aos problemas enfrentados, contribuindo assim para a manutenção de hábitos saudáveis e resultados positivos. A participação familiar nesse caso é de grande importância para que o paciente conviva e aceite as limitações necessárias sendo considerada uma aliada para orientar os pacientes a realizarem os procedimentos corretos, possibilita um apoio emocional e incentiva a busca de orientações nas unidades básicas.

Diante da compreensão quanto ao DM2 e sua característica de ser uma doença provocada por diversos fatores e ser crônica, podemos entender que o seu tratamento também demanda diversas frentes e deve ser encarada como uma mudança no estilo de vida e não como um tratamento de curto prazo (CAROLAN, HOLMAN, FERRARI, 2014).

Das principais indicações de tratamento, podemos citar o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Este consiste principalmente em manter uma rotina de alimentação saudável e atividades físicas regulares, para isso é importante que ações cotidianas sejam adotadas (BLACK et al., 2017).

Atualmente, sabe-se que a glicemia de jejum é insuficiente para acompanhamento do controle glicêmico de pacientes com DM2, pois reflete apenas uma medida pontual, no momento da coleta de sangue. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2019) afirma que o automonitoramento domiciliar das glicemias, realizado com um glicosímetro e fita biossensora descartável, permite que os próprios pacientes identifiquem a glicemia capilar e corrijam rapidamente picos de hiperglicemia ou episódios de hipoglicemia, sendo, portanto, útil para avaliação do controle glicêmico de modo complementar à dosagem de HbA1c.

3.2 AUTOCUIDADO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS

A respeito do tratamento de doenças crônicas é um fato que o autocuidado, a adesão às terapias não medicamentosas, à hábitos de vidas saudáveis, aos recursos terapêuticos medicamentosos e o comprometimento do paciente em conhecer sobre sua doença são elementos que fazem toda a diferença na eficácia do tratamento. Considerando isso, profissionais de saúde tentam engajar os pacientes acompanhados num processo de promoção do autocuidado, onde são estimulados a assumir, consigo mesmo e com a equipe, compromissos de autocuidado e de empoderamento em relação a sua enfermidade (CARRIJO; RASERA, 2013).

Tendo isso em vista, muitos profissionais buscam orientar os pacientes sobre suas responsabilidades e compromissos em adequar seu ritmo de vida mediante o diagnóstico dessa patologia crônica. Sendo envolvidos no processo de responsabilizar-se pela própria saúde, os pacientes com DM, por exemplo, são constantemente chamados a responder seja pelo surgimento do adoecimento, seja pela falta de controle da glicemia ou ainda pelas complicações decorrentes da não adesão às formas de cuidado prescritas pelos profissionais de saúde (CARRIJO; RASERA, 2013).

Boa adesão terapêutica corrobora com bons índices glicêmicos e com metas laboratoriais atingidas. Para isso, considera-se padrão-ouro o uso da hemoglobina glicada (exame laboratorial) para avaliar o controle metabólico do paciente diabético. Sua quantificação permite estimar quão elevada esteve a glicemia nos 90-120 dias pregressos, haja vista a glicose sanguínea ligar-se de forma irreversível à hemoglobina ao longo de seu período de vida na hemácia. A depender da sociedade científica, diferentes alvos de HbA1c são descritos e para adultos as recomendações variam entre 6,5-7,0%.

Galvão e Vilela (2013) relatam que o autocuidado é considerado um componente integral da gestão das doenças crônicas e da preservação de um nível aceitável de funcionalidade. Permite à pessoa observar-se, reconhecer sintomas, determinar a agressividade da sintomatologia e escolher estratégias apropriadas para debelar esses sintomas, minimizando-os e maximizando a saúde. Assim, o autocuidado integra a capacidade de cuidar de si próprio, mas também o

desempenho de atividades indispensáveis para alcançar, manter ou promover uma saúde ótima.

Nesse sentido, Medeiros (2014) relata que o autocuidado faz com que os indivíduos se tornem mais independentes e responsáveis no seu dia a dia, além de promover a sua autoestima e promover a adesão ao tratamento (seja medicamentoso ou de modificação do estilo de vida). E quando falamos em autocuidado podemos também dizer que alimentação saudável e prática de atividade/exercício físico fazem parte do processo de se cuidar.

Compreendendo que o autocuidado é um conjunto de ações que o indivíduo realiza em benefício próprio, podemos entendê-lo como um comportamento que pode ser aprendido (MENDONÇA et al., 2017). Dessa forma pessoas com diabetes devem mobilizar-se para implementar atitudes que condizem com os cuidados indicados para a manutenção de sua saúde. Para alcançar esse objetivo, precisará de empenho na consolidação do que antecede a esse comportamento, ou seja, as mudanças cognitivas e os pensamentos em relação às atitudes cotidianas. Como medida de contribuição para o desenvolvimento do autocuidado, os profissionais de saúde são encorajados a desempenhar ações que objetivam a promoção do autocuidado (MENDES, 2012; MENDONÇA et al., 2017).

O autocuidado implica na execução de ações dirigidas pela e para a própria pessoa com a finalidade de satisfazer as necessidades e contribuir para a manutenção da vida, saúde e bem-estar (ORE, 1995). Na convivência com o diabetes, a rotina de autocuidado inclui adesão a uma alimentação saudável, à atividade física, ao monitoramento periódico da glicemia, à administração correta de medicamentos prescritos, ao cuidado adequado com os pés, além da capacidade de resolver conflitos e de lidar de forma positiva diante da presença de uma condição patológica crônica (ADA, 2019). Quando isso não ocorre, há um prejuízo na resposta fisiológica das doenças, na relação profissional-paciente e nos custos diretos e indiretos do tratamento.

A falta de adesão dos pacientes ao tratamento é um desafio frequentemente enfrentado no dia a dia dos profissionais de saúde. Essa não adesão estimula-os, assim, a buscarem estratégias de intervenção que visem minimizar essa situação (SART et al., 2012; FARIA et al, 2013).

Nesta direção, o tratamento do DM2 implica modificações no estilo de vida e tratamento farmacológico. E mudança no estilo de vida inclui reorganização dos hábitos alimentares, prática regular de atividade física, obtenção e/ou manutenção do peso adequado, suspensão do fumo, assim como baixo consumo de bebidas alcoólicas e vigilância para diminuir o estresse. Essa mudança exige suporte educativo e empatia de todos os integrantes da equipe multiprofissional durante todo o período de acompanhamento do paciente para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos (FORTALEZA, 2016).

Quando o autocuidado não é realizado com eficácia, a qualidade de vida será afetada diretamente, pois haverá repercussões físicas, econômicas e/ou sociais, resultando no afastamento do trabalho, e, até mesmo isolando-o socialmente (REZENDE NETO, SILVA, SILVA, 2015).

A fim de promover ações integradas de educação em saúde, minimizar os efeitos adversos do tratamento e garantir a adesão do paciente às medidas terapêuticas, o AMGC nos pacientes que utilizam insulina é uma ferramenta importante.

Segundo a OMS, qualidade de vida é a compreensão de cada indivíduo acerca de sua satisfação baseada nas suas carências, relacionado aos seus objetivos e expectativas, ou ainda, que estão impossibilitando a oportunidade de atingir a autorrealização e alcançar a felicidade, independente do seu estado físico de saúde ou das situações econômica, social e ambiental. (OMS, 1995).

Em se tratando de qualidade de vida relacionada à saúde, é a capacidade que o indivíduo tem em ter uma vida plena e ampliar suas potencialidades referente as repercussões que um processo de adoecimento reproduz na vida de um indivíduo (FARIA et al. 2013).

De acordo com Aguiar et al. (2008), a qualidade de vida de pessoas com DM2 é totalmente perturbada quando comparada com a de pessoas que não tem, e, quanto maior o número de complicações mais afetada será a mesma. É sabido que a DM2 pode ser causada por motivos como obesidade, sedentarismo, má alimentação, e, se não tratada poderá causar outras implicações na saúde. Com isso, a avaliação da qualidade de vida de pacientes diabéticos é muito mais complexa.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA GESTÃO, NA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS, CUSTO E EFETIVIDADE

É imperativo observar que uma boa administração resulta do gerenciamento adequado dos recursos financeiros disponíveis para o bem-estar da população. Nesse sentido, as políticas públicas aparecem como ações e programas desenvolvidos pelo Estado, para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis (LENZI, 2017). São, portanto, medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir efetivamente o bem-estar da população.

Segundo Lenzi (2017), toda política pública passa por um conjunto de etapas, até que seja colocada em prática. Essas etapas compreendem: (i) a identificação do problema; (ii) a formação da agenda (definição de prioridades); (iii) a formulação de alternativas (estudo, avaliação e escolha); (iv) a tomada de decisão; (v) a implementação (execução das ações); (vi) a avaliação (eficiência dos resultados e proposição de ajustes); e (vii) a extinção (encerramento da política pública).

Depois de estudadas e formuladas, as políticas públicas são incluídas no Plano Plurianual (PPA). Esse plano, que é previsto no artigo 165 da Constituição Federal, define quais são as metas e objetivos que devem ser cumpridos pelos governos em 4 anos.

De um modo geral, as políticas públicas são mecanismos de resposta do Estado aos problemas que emergem na sociedade. Sendo assim, as de saúde têm por função definir a resposta do Estado às necessidades de saúde da população, visando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo (LUCCHESE, 2004 apud FERRAZ, KRAICZYK, 2010). Naturalmente, as etapas pelas quais passam essas políticas compreendem um processo dinâmico em razão dos diferentes elementos sociais e institucionais envolvidos. Segundo Ferraz e Kraiczky (2010):

O processo de construção e consolidação dessas políticas deve ser compreendido em sua dinamicidade, dada não somente pelas transformações sociais que resultam na geração de novas necessidades de saúde, como também pelo fato de que a materialização das políticas somente acontece por meio da ação concreta de diversos atores sociais e de atividades institucionais (FERRAZ, KRAICZYK, 2010, p. 1-2).

No Brasil, a política pública de saúde tem como alicerce fundamental o SUS. O SUS representa o conjunto de ações e serviços de saúde, que são prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (MENDES, 2012). Sua criação é, certamente, considerada a mais bem-sucedida das reformas sociais discutidas e construídas na democracia brasileira e fruto de um amplo movimento político que envolveu profissionais da área de saúde, intelectuais e integrantes de movimentos sociais, na luta pela garantia de direitos básicos e coletivos (TAMADA, 2013).

O SUS tem amparo constitucional nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal de 1988, que afirmam ser o direito à saúde integral e dever do Estado, com responsabilidade de todas as esferas de poder. Na legislação infraconstitucional o SUS encontra amparo em duas leis orgânicas, a Lei n. 8.080/90 e a Lei n. 8.142/90.

A Lei n. 8.080/1990 dispõe acerca da universalidade, unicidade, descentralização, relevância pública, financiamento, entre outros. Busca ainda evidenciar as atribuições de cada um dos entes federativos, tratando inclusive sobre as transferências de recursos entre eles. Dentre os princípios que estão elencados na referida lei estão relacionados a universalidade (todos têm direito ao atendimento, independente de classe, raça ou nacionalidade), a equidade (atendimento aos cidadãos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados) e a integralidade (atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas). (BRASIL, 1990a).

Já a Lei n. 8.142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências (BRASIL, 1990b).

Na prática o sistema é unificado e regionalizado, mas possui responsabilidades distribuídas dentre os entes federativos e financiamento compartilhado. Conforme o artigo 197 da Constituição Federal, a regulamentação e a fiscalização dos serviços de saúde são de competência do poder público.

Portanto, de acordo com a explanação fica evidenciada a responsabilidade conjunta das três esferas de governo por monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar recursos orçamentários e financeiros, definir mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, realizar o planejamento de curto e médio prazo e promover a articulação de políticas de saúde, definir políticas de recursos humanos entre outras ações. Os gestores do SUS, portanto, possuem atribuição de executar a política pública de saúde de forma coletiva e integral a toda sociedade.

Em sentido mais restrito, gestão em saúde é a capacidade de lidar com os conflitos, de ofertar soluções plausíveis, diretrizes, quadros de referência para análise e ação das equipes nas organizações de saúde. Trata de um campo que tem por finalidade o bem-estar humano através da organização e guiado por finalidades (CORREA, 2012).

Gestão em saúde é um tema bastante discutido por profissionais, gestores e população em geral. A partir das mudanças geradas pelo movimento da Reforma Sanitária, que desencadearam a criação do sistema único de saúde, as principais transformações reivindicadas enfocavam na qualidade da gestão dos serviços que desembocaram no sistema de saúde brasileiro que se tem hoje, centrado na gestão descentralizada e participativa, buscando a responsabilização de gestores e profissionais pelos resultados (CORREA, 2012).

Segundo Tamada (2013), a gerência dos serviços de saúde é uma importante ferramenta para organização das demandas, pois feita com qualidade permite a tomada de ações que promovam uma assistência com eficiência, eficácia e efetividade, os “três Es” da gestão.

Eficiência, segundo Peter Drucker (dez. 1968), é fazer certo um processo qualquer, é fazer certo as coisas; e eficácia é fazer as coisas certas. Já segundo Leandro Vieira, ser eficiente é fazer mais com menos. Complementando essas ideias, podemos dizer: eficiência é o meio de fazer certo um processo correto de boa qualidade, em curto prazo, com o menor número de erros.

Segundo Chiavenato (2003, p. 155), “Eficácia é uma medida do alcance de resultados, enquanto eficiência é uma medida da utilização dos recursos nesse processo.” Isto é: Eficiência refere-se a “como fazer as coisas”, tem a ver com o uso racional de recursos e insumos.

Outro termo importante a ser mencionado e definido é a efetividade, que se relaciona com a capacidade de produzir efeitos/impactos a longo prazo, sendo por vezes relacionada à soma da eficiência e eficácia.

Segundo Chester Barnard (1968. p. 19-20), qualificamos um resultado como efetivo quando podemos verificar que o objetivo foi atingido (eficaz) da melhor maneira possível (eficiente), de modo a impactar positivamente a organização e o indivíduo.

Segundo André et al. (2013) o papel do gestor é ser articulador, que prepara, orienta, estimula e negocia, demonstrando, na prática, a importância da liderança de equipes. Nessa perspectiva, a visão do gestor deve ser mais abrangente, não pode descuidar das ações que possibilitem o fortalecimento da participação dos prestadores de serviços, trabalhadores da saúde, e usuários na definição e no acompanhamento das políticas de saúde.

Nesta seara, a saúde pública requer que o administrador maneje constantemente conflitos e negociações. Para a qualidade do processo de trabalho com foco na gestão, antecipar-se aos fatos é uma forma estratégica para avançar rumo à consolidação do SUS, com o objetivo de produzir mudanças nas práticas do cuidado e na forma de gerir. Atualmente a gestão pública tem estado envolta por reflexões que fazem referência ao modo de administrar e fazer a gestão do SUS de forma compartilhada dividindo a responsabilidade, sendo o alicerce para a formação de um conceito importante, denominada de cogestão (GIL et al., 2016).

De acordo com Gil et al. (2016), cogestão é:

Uma diretriz ética e política (que) tem como objetivo democratizar as relações na gestão de serviços; em nosso caso, de saúde. Para tanto, gestor e equipes devem ser solidários entre si e orientadas a ampliar sua capacidade de direção e contribuir para as questões e decisões importantes que incidem no cotidiano de trabalho. É um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, sendo, portanto, uma diretriz ética e política que visa democratizar as relações no campo da saúde para a realização dos objetivos da saúde.

O conceito de cogestão é oriundo da ideia de que o trabalho não pode ser mecanizado, com repetição de atos, como se fazia na tradição taylorista fordista, levando à alienação do trabalho, mais sim através de contribuições mútuas, onde os atores envolvidos buscam conhecer e integrar-se de forma solidária em todas as atividades em uma gestão participativa (GIL et al., 2016).

É rotineira a verificação de que a gestão em saúde ainda está firmada em métodos e estratégias tradicionais, adquiridas da teoria clássica da administração. Tal fato requer a necessidade da criação de novas formas de gestão na área de saúde (LORENZETH et al., 2014).

Sob tal enfoque, Tamada (2013, p.3) acrescenta que as “[...] organizações de saúde, independentemente do tamanho, são sempre complexas. Seus processos são padronizados por regras impostas pelo governo”, por isso, se faz necessário a existência de equipes especializadas e qualificadas, e principalmente uma gestão de saúde na área da pesquisa atuante, mantendo assim, as organizações de saúde em conformidade com a qualidade e principalmente com as leis que regem esta área. Mas, quais são as funções da Gestão em Saúde ou do gestor em saúde?

De acordo com Tamada (2013) e Silva et al. (2012), no que diz respeito as funções referentes ao campo empresarial/profissional, estão intrinsicamente ligadas às competências de um profissional gestor em saúde na prática, ou seja, são respectivamente, a capacidade de assumir a responsabilidade de todo o processo, supervisionando o funcionamento de uma determinada repartição de saúde, as quais, podem ser: posto, clínica, hospital ou até mesmo um asilo, que na execução de suas funções adquira informações da relação saúde-doença da sociedade, a qual, está inserido, assegurando com isso, médicos, medicamentos, enfermeiros e o pessoal competente, relevantes a esta sociedade, proporcionado a todos os funcionários treinamento e qualificação pertinente e constante, como também, se preocupando com durabilidade, manutenção e disponibilidade de todos os equipamentos que fazem parte desta organização, dentre outras funções, é o que corrobora Tamada (2013, p.4) alertando ainda que “[...] assim como não há um modelo de gestão ideal, uma receita única para o sucesso de qualquer organização, da mesma forma as organizações de saúde devem levar em conta sua história, missão, visão e valores, assim como a cultura organizacional”, para que com isso possam verdadeiramente e com flexibilidade implantar na organização de saúde as melhores práticas organizacionais.

Por outro lado, ainda sobre as políticas de saúde, os gestores dos sistemas de saúde de vários países, nas últimas décadas foram profundamente influenciados por políticas públicas de fortalecimento do papel de seus profissionais e usuários que desempenham grande pressão pela inclusão de novas tecnologias.

De um modo geral, o termo “tecnologia médica” pode ser usado para se referir aos procedimentos, equipamentos e processos pelos quais os cuidados médicos são prestados. Exemplos de mudanças na tecnologia incluem novos procedimentos médicos e cirúrgicos (p. registros e transmissão de informações, telemedicina).

O crescimento contínuo dos gastos em saúde, a produção cada vez maior de novas tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico das populações ocorridas nas duas últimas décadas, tem levado a necessidades diversificadas de atenção. Dessa forma, se faz social e politicamente necessário desenvolver mecanismos de articulação entre os setores envolvidos na produção, incorporação e na utilização de tecnologias nos sistemas de saúde (BRASIL, 2010, p. 9).

No contexto da Portaria n. 2.510/GM/2005, considera-se tecnologias em saúde: medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população (BRASIL, 2005).

No Brasil, o SUS, a Lei n. 8.080/90 garante a universalidade e a integralidade à saúde, permitindo à população maior acesso às redes de atenção. Contudo, acredita-se que os recursos existentes nem sempre são empregados de maneira mais eficaz e equitativa para que este objetivo seja atingido. Assim, como forma de garantir o princípio de integralidade, a introdução de novas tecnologias deve ser realizada no sentido de beneficiar a incorporação daquelas que forem eficazes e seguras, beneficiando a todos que necessitem (BRASIL, 2010).

Conforme Souza e Souza (2018), a Portaria n. 152 de 2006 foi promulgada com a finalidade de regular o fluxo de incorporação de tecnologias no SUS, que passou a se organizar a partir de ações articuladas entre a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo de competência da SAS a gestão do processo de incorporação de tecnologias, e da SCTIE, a gestão da avaliação das tecnologias de interesse para o SUS. Essa mesma portaria designou a Comissão para Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (Citec) com o escopo de dirigir o processo de incorporação de

tecnologias em consonância com as necessidades sociais em saúde e de gestão do SUS.

Anos mais tarde, a Lei n. 12.401/2011 e o Decreto n. 7.646/2011, que alterou a Lei n. 8.080/1990, designaram a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para substituir a Citec. A Conitec é um órgão da estrutura regulatória do Ministério da Saúde, que assessora na incorporação, exclusão ou alteração de novas tecnologias em saúde no SUS. Neste sentido, Souza e Souza (2018):

Dadas as competências da Conitec, seus membros são atores importantes do processo decisório de incorporação de tecnologias no SUS, uma vez que são responsáveis por analisar informações e tomar decisões relevantes, que dizem respeito à modernização e à inovação do sistema, à melhoria da qualidade e expectativa de vida da população

A introdução de tecnologias tem sido a principal responsável pelo aumento de custos dos sistemas nacionais de saúde, principalmente produtos industrializados, como os medicamentos. No SUS, o gasto anual com a compra de produtos e tecnologias para a saúde ultrapassa R\$ 20 bilhões (RODRIGUES FILHO, PEREIRA, 2021).

Por outro lado, as inovações tecnológicas melhoraram a qualidade do atendimento ao paciente, oferecendo acesso mais amplo aos seus registros médicos; adequação do atendimento aos horários dos pacientes; desenvolvendo procedimentos médicos, testes e estudos mais seguros; e usando a tecnologia para coletar dados de pacientes, analisá-los e aplicá-los de novas maneiras.

Os consumidores querem cuidados médicos que os ajudem a alcançar e manter uma boa saúde, e os avanços na tecnologia médica são percebidos como formas de promover esses objetivos. A demanda do consumidor é afetada pelo aumento da conscientização pública sobre a tecnologia médica por meio da mídia, da Internet e da publicidade direta ao consumidor.

Profissionais de gestão de saúde desempenham papéis importantes na implementação de novas tecnologias, pois devem pesar o custo dessas inovações em relação aos benefícios que a tecnologia traz ao atendimento ao paciente e aos ganhos operacionais. A combinação de avaliar esses avanços, criar planos de implementação e, finalmente, elaborar e colocar em prática os processos operacionais e o treinamento para acompanhar a nova tecnologia é uma especialidade em si. Os gerentes de saúde e a liderança organizacional

estabelecem prioridades estratégicas para garantir que todos os esforços de uma organização de saúde sejam direcionados para atingir metas e melhorar o atendimento e a satisfação do paciente.

Essas estratégias incluem registros eletrônicos de saúde, ferramentas de saúde pessoal, como aplicativos móveis, bem como a gama de ferramentas tecnológicas utilizadas para troca de informações em saúde, por meio de interfaces como computadores, tablets e telefones celulares.

Embora a expectativa de vida tenha melhorado significativamente no último século, o estilo de vida sedentária introduziu doenças crônicas, como diabetes, doença pulmonar obstrutiva, distúrbios de saúde mental e muito mais. Estas são doenças degenerativas de longo prazo que adicionam um ônus financeiro aos pacientes e ao sistema de saúde. A tecnologia certa permitirá aos médicos detectar e tratar/prevenir essas doenças mais cedo e reduzir a carga de altos custos a longo prazo.

Se as novas tecnologias aumentam os custos dos cuidados de saúde, quanta tecnologia é apropriada? Para julgar se o grau de difusão de tecnologias particulares ou de tecnologias em geral é apropriado, é necessário de algum padrão ou critério. Um deles baseia-se na proposição de que o objetivo da tecnologia médica é melhorar os resultados de saúde. Cada uso clínico de uma tecnologia utiliza alguns dos recursos de saúde limitados da sociedade e, idealmente, melhora os resultados de saúde. Quanto mais a sociedade gasta em cuidados de saúde, mais a saúde é melhorada.

O critério de alocação de recursos que decorre dessa formulação dos objetivos da sociedade é a relação custo-benefício: se uma nova tecnologia produz resultados de saúde a um custo unitário menor do que as tecnologias existentes, deve ser adotada; caso contrário, não deveria. O princípio é que as práticas clínicas com baixo custo por unidade de benefício à saúde devem ter prioridade sobre as práticas com maior custo por unidade. A análise de custo-efetividade tem sido amplamente utilizada para auxiliar na formulação de políticas e está ganhando aceitação na comunidade médica como um critério apropriado para alocação de recursos.

A análise de custo-benefício pode ajudar a informar decisões sobre como aplicar testes, terapias e intervenções preventivas e de saúde pública novos ou existentes, de modo que representem um uso criterioso dos recursos. Também pode ajudar a preencher lacunas nas evidências sobre o efeito estimado de tais intervenções na saúde pública em nível populacional e pode apoiar decisões de desinvestimento em intervenções mais antigas para as quais existem alternativas mais econômicas. A análise de custo-efetividade fornece uma estrutura para comparar o valor relativo de diferentes intervenções, juntamente com informações que podem ajudar os tomadores de decisão a selecionar alternativas e decidir quais atendem melhor às suas necessidades programáticas e financeiras.

Na busca da melhoria dos serviços públicos de saúde, o Ministério da Saúde vem atualizando-se e procurando ferramentas que possam auxiliar os gestores a chegarem num patamar de qualidade adequado. A criação de leis e outros instrumentos legais, como as portarias, são os primeiros passos dados após pesquisas que comprovem a eficácia da ferramenta de trabalho a ser adotada.

No entanto nem toda ferramenta imposta pelo Ministério é de fácil utilização, e é assim que aquela contínua busca por melhorias chega a soluções como a criação do Sistema de Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). É através do SIOPS que os Estados e Municípios apresentam ao Ministério, os dados referentes aos seus controles de receitas e despesas, possibilitando que este sistema informe, de forma clara e a quem interessar, a situação da saúde pública no País. O SIOPS também é uma das maneiras que o Ministério tem de fiscalizar e acompanhar de perto as movimentações financeiras dos estados e dos municípios, para que estes não deixem de cumprir com o que preconiza a legislação brasileira.

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE – CASA DO DIABÉTICO

A literatura discute constantemente as conquistas, dificuldades e perspectivas do SUS como política pública. Paim (2008) relata que o SUS é a representação de alguns aspectos da Reforma Sanitária na Constituição Brasileira de 1988, embora essa reforma não se restrinja ao SUS. Para o autor, o SUS

continua em construção não bastando apenas leis e normas. Enfrenta ainda um conjunto de desafios como:

[...] a instabilidade e insuficiência do financiamento, investimentos reduzidos, distribuição desigual dos recursos e da infraestrutura, acesso insuficiente, baixa eficácia, qualidade insatisfatória, ineficiência na gestão dos recursos, humanização deficiente, desrespeito ao cidadão, desatenção e maus-tratos. (PAIM, 2008, p. 111).

Por outro lado, torna-se importante destacar que em razão das condições históricas e de diretrizes como a descentralização da saúde, algumas experiências inovadoras tem ocorrido, notadamente no âmbito municipal, em áreas específicas. Muitas dessas experiências tem servido como referência para outros municípios do país, bem como a (re)formulação de políticas nacionais. Como por exemplo, pode-se destacar a Casa do Diabético, estabelecimento de saúde de média complexidade, com atendimento ambulatorial, direcionada para pacientes com doenças endocrinológicas, de gestão municipal, situada em município do interior do Estado de São Paulo.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

A efetividade da política pública de fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulino dependentes.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever a política pública de saúde sobre Diabetes *mellitus* tipo 2 no município de Franca- SP;
- Avaliar a efetividade no controle metabólico de pacientes com DM2 insulino dependentes que participam no programa de insumos.

6. MÉTODO

O desígnio do trabalho científico é a sistematização ordenada, metódica e objetiva de informações fragmentadas, seguida da identificação e assimilação de suas relações e sequencias repetitivas, com a intenção de descobrir respostas para determinada questão-problema (PRODANOV; FREITAS, 2009).

Com relação aos objetivos propostos para este trabalho, a pesquisa classifica-se em documental, analítica, observacional e transversal, com abordagem quantitativa por pretender expor características de uma determinada população e da relação entre o conhecimento e o comportamento relacionados ao DM2.

A pesquisa documental é um tipo de pesquisa das ciências sociais que utiliza fontes primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente. De acordo com Gil (2010), tomam como base documentos originais, ainda sem tratamento analítico. Para Minayo (2008), a pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos.

No campo da Epidemiologia, porém, ciência circunscrita ao campo da saúde que objetiva estudar a distribuição de eventos relacionados ao processo saúde-doença na população, a pesquisa documental de levantamento de prontuários médicos lida com dados considerados secundários (PEREIRA, 1995).

Os dados primários são coletados, especificamente, para o propósito do estudo. Os secundários são aqueles já existentes e reutilizados com um outro propósito, como é o caso dos prontuários médicos, dos atestados de óbito e das estatísticas de mortalidade, empregados em investigações. De forma geral, os dados primários viabilizam a melhor padronização da informação. Os dados secundários, por sua vez, apresentam a vantagem de estarem disponíveis para utilização imediata, o que significa economia de custos e de tempo (PEREIRA, 1995, pag. 68).

Para Block; Coutinho (2003, pag. 107), “pesquisa epidemiológica é empírica, baseada na coleta sistemática de informações sobre eventos ligados à saúde em uma população definida e na quantidade desses eventos”, e pode se utilizar de dados primários ou secundários, como é o caso daqueles provenientes de registros médicos.

No âmbito da Epidemiologia, os estudos classificam-se como descritivos ou analíticos, em relação ao propósito geral; como observacionais ou de intervenção, em relação ao modo de exposição das pessoas ao fator em foco; como longitudinais ou transversais, em relação ao tempo de observação; e como individuais ou coletivos, em relação à unidade de observação. O presente estudo classifica-se, portanto, como analítico, observacional, transversal e individual (PEREIRA, 1995).

Este estudo, então, é epidemiológico analítico, porque objetiva investigar associação entre dois eventos - a participação no Programa de Automonitoramento Glicêmico e o controle metabólico; é observacional, porque apenas observa um evento, sem manipulação dos fatos; é transversal, porque circunscrito a dois pontos no tempo – 2017 e 2019, sem acompanhamento longitudinal da evolução neste tempo; e é individual porque, embora apresente os dados de forma coletiva, parte da unidade de análise do indivíduo.

A pesquisa bibliográfica empreendida neste estudo foi responsável por reunir informações de livros e pesquisas acadêmicas na temática do DM2, políticas públicas na gestão e incorporação de tecnologias médicas e desenvolvimento sustentável através do uso das plataformas Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Periódicos Capes.

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como quantitativa, que segundo Flick (2013, p. 87) “Os estudos quantitativos em geral têm por objetivo testar uma suposição já anteriormente formulada na forma de uma hipótese.” Portanto, deverão ser avaliados as conexões entre as variáveis ou a identificação das causas de eventos específicos.

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, nas modalidades de coleta de informações, e no tratamento por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2011). Ela permite a realização de projeções e generalizações, viabilizando teste de hipóteses de forma precisa.

6.1 LOCAL DO ESTUDO

A pesquisa se desenvolveu em município do interior do Estado de São Paulo, Franca, considerado polo regional de saúde, com população de 358.359 mil habitantes com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 0,7810, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. É a 9ª cidade mais populosa do interior do estado de São Paulo e eleita a cidade brasileira com a melhor rede de saneamento básico e tratamento de água dentre todos os municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes.

É sede de região administrativa composta por 23 municípios, fazendo limite com os municípios paulistas de Batatais, Cristais Paulista, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente, Restinga e São José da Bela Vista e com os municípios mineiros de Claraval e Ibiraci.

O local de estudo foi a Casa do Diabético, que é um estabelecimento de saúde tipo Clínica Médica, Centro de Especialidades Médicas que presta atendimentos a pessoas portadoras de comorbidades endocrinológicas. A entidade é mantida pela Prefeitura Municipal do município em parceria com Lions Clube.

O local possui infraestrutura com recepção, sala de administração, onde são agendados os horários e controle de tarefas da unidade, e sala de reunião. Conta também com três consultórios médicos, sala de assistência social, triagem, salas de enfermagem e psicologia.

Conjuntamente, funciona a farmácia local, responsável pela dispensação dos medicamentos e insumos (glicosímetros e fitas) aos pacientes diabéticos que fazem o acompanhamento, mas também a todo e qualquer paciente da cidade de Franca, que esteja cadastrado e normatizado pelo Programa de Insumos da Prefeitura local. Para tanto, é necessário que se apresente o cartão SUS, comprovante de residência e receituário prescritos pelos médicos do SUS (BARBOSA et al., 2021).

Segundo Barbosa et al. (2021), a dispensação dos insumos é realizada pelo farmacêutico por meio de cadastro completo do paciente, história clínica, comorbidades e descrição da medicação utilizada, em termos de quantidade e qualidade. O controle da dispensação é feito pela coordenação responsável da unidade, na maior parte das vezes, pela enfermeira responsável.

A distribuição dos medicamentos é regulada pela Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), instrumento mestre para as ações de assistência farmacêutica no SUS. A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na RENAME é realizada pelo Ministério da Saúde, com auxílio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). A RENAME é um instrumento elaborado para atender aos princípios fundamentais do SUS, isto é, a universalidade, a equidade e a integralidade, configurando-se como a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para os tratamentos das doenças e agravos que acometem a população brasileira. Seus fundamentos estão estabelecidos em atos normativos pactuados entre as três esferas de gestão do SUS. Esse instrumento é construído a partir de uma avaliação que considera as informações de eficácia, efetividade, segurança, custo, disponibilidade, entre outros aspectos, obtidas a partir das melhores evidências científicas disponíveis (BRASIL, 2017).

A inclusão dos pacientes no Programa de Dispensação de Glicosímetros e Insumos para Automonitoramento da Glicemia Capilar (PAMGC) fica restrita à alguns profissionais de saúde que acabam ficando sobrecarregados, culminando com a dispensação abusiva de insumos, uma vez que os pacientes acreditam na obrigatoriedade e direito da oferta gratuita destes materiais.

A entidade conta com equipe multiprofissional, serviços e ações prestadas, distribuição de insumos e medicamentos, integra a rede de atenção em saúde com foco em referência e contrarreferência.

As consultas então são marcadas e programadas de acordo com a demanda da rede de atenção básica, ou seja, é um serviço secundário, considerado de referência, em que o paciente deve ser atendido em unidade básica de saúde antes de ser referenciado para atendimento especializado na Casa do Diabético.

O local também é referência no tratamento e acompanhamento de outras doenças endócrinas, como tireoidianas e hipofisárias, e segue a mesma conduta de cuidados aos pacientes não controlados ou que evoluíram devido às complicações das patologias (BARBOSA et al., 2021).

No geral, a Casa do Diabético atende mensalmente por volta de dois mil pacientes. Entretanto, não há como retratar devidamente o perfil dessa população e nem delimitar o perfil epidemiológico, faixa etária, clínico ou patológico. Isso ocorre por vários motivos, o sistema computacional disponibilizado não é eficiente, os arquivos com os dados dos pacientes não separam os atendimentos por descrição das patologias e os equívocos médicos durante as consultas, associado aos registros do CID com descrição errônea, excluindo assim a possibilidade de se realizar pesquisa quanti-qualitativa dos pacientes diabéticos e a patologia específica.

O prontuário médico utilizado na instituição é o Sistema Integrado de Gestão da Saúde (SIGS), que tem a função de centralizar as informações relevantes, seja de natureza epidemiológica e demográfica dos pacientes. Consta neste sistema o cadastro dos pacientes, categorizados por idade, sexo, tipo de DM (tipo 1 ou 2) e se recebem insumos (glicosímetro, fitas de glicosimetria, lancetas e outros) para manejo de sua doença. Entretanto, esses dados cadastrais são bastante falhos.

Portanto, são inúmeras as lacunas a serem preenchidas no âmbito da epidemiologia e caracterização da população geral e específica do local, prejudicando a geração de informação essencial para organização de programas em saúde e ações governamentais voltadas para atenção básica, visando uma melhor prevenção primária, responsável por precaver patologias teoricamente evitáveis. Dessa forma é necessário criar métodos eficazes para quantificar e qualificar o público usuário. Só assim, poderia se alcançar uma verdadeira promoção de saúde e prevenção de doença direcionada e mais eficaz, na qual os pacientes também deveriam ter uma participação mais ativa no processo saúde e doença, com um programa educacional voltado não só para grupos e reuniões, mas para um aprendizado mais elaborado e responsável, criando assim um reforço positivo no plano terapêutico individual.

Conforme Barbosa et al. (2021), outro fator a destacar é que a demanda de atendimentos é superior à capacidade oferecida pela instituição, ocasionando problemas no atendimento e no cuidado aos pacientes. Por outro lado, destaca-se a escassez de profissionais para preenchimento da equipe multidisciplinar, pois a política de recursos humanos oferecida pela secretaria municipal de saúde parece não atrair candidatos para esse serviço.

Neste sentido, a Casa do Diabético se torna bastante falha, sendo necessário maiores esforços no investimento em infraestrutura da Casa do Diabético, imprescindível no processo organizacional no cuidado ao paciente com diabetes *mellitus* tipo 2.

Na presente pesquisa, realizou-se coleta de dados de prontuários de pacientes – o SIGS (o que já denota, a confiabilidade do estudo, usando fontes de informações verdadeiras), que foram empregados na estatística descritiva, tabela e quadros para melhor interpretar os dados apurados pela pesquisa, na organização das informações fornecidas, detalhamento dos dados e cálculo para interpretação de coeficientes referentes ao fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulínodpendentes.

Este trabalho subsidiou novas discussões no campo das políticas públicas de saúde, com vista a melhorar e ampliar os serviços oferecidos pelas diretrizes aos pacientes diabéticos, uma vez que, encontramos ações de políticas públicas não executadas dentro do serviço público. Denota-se a necessidade de investimentos e interesses por partes dos poderes públicos e dos profissionais de saúde, que implicará em reflexo positivo para esses pacientes.

Trata-se de um estudo documental, ou seja, um estudo que utiliza fontes primárias de informações, recolhendo informações que ainda não receberam um tratamento científico.

A grande questão de um estudo documental está na capacidade do pesquisador analisar e interpretar os dados coletados, de forma coerente e verdadeira, alcançando respostas aos objetivos propostos pela pesquisa.

Outra questão colocada sobre o tipo de estudo pretendido é a pesquisa quantitativa, a qual utiliza técnicas e métodos estatísticos como meio principal para análise dos dados. O pesquisador restringe a sua busca à dados que sejam quantificáveis, sem quaisquer possibilidades de subjetividade em suas interpretações.

6.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO

Em consenso, as pesquisas sociais envolvem um universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-lo em sua totalidade. Por esta razão, Prodanov e Freitas (2009) definem amostra como parte da população ou do universo, selecionado de acordo com uma regra ou plano, por meio do qual estabelecemos ou estimamos as características deste universo e/ou população e através de uma pequena parte dos elementos (amostra) que compõe este universo, espera-se que ela seja representativa da população que se pretende pesquisar.

A população estudada foram os pacientes DM2 insulínod dependentes. Foram selecionados 106 prontuários de pacientes com DM2, sendo 57 pacientes DM2 insulínod dependente sem insumos e 51 prontuários de pacientes DM2 insulínod dependentes com insumos.

Como critérios de inclusão selecionou-se apenas os indivíduos que foram atendidos no período entre 2017 e 2019, devendo ser insulínod dependente, com idade maior ou igual 40 anos.

Uma vez que o público em estudo são pacientes com Diabetes *mellitus* tipo 2, insulínod dependentes, já direciona para um público adulto, com mais de 40 anos de idade.

A idade de início do diabetes tipo 2 é variável, embora seja mais frequente após os 40 anos de idade, com pico de incidência ao redor dos 60 anos. Estudos que aliam a obesidade à idade superior a 40 anos indicam este ponto de corte da idade como discriminatório entre os dois tipos de diabetes (HOTHER-NIELSEN et al., 1988).

Portanto, a idade de forma isolada parece não definir a classificação, mas se aliada a outras variáveis como obesidade podem sugerir o tipo de diabetes. Deve ser levado em conta que, embora a ocorrência de cetoacidose seja característica do estado de deficiência insulínica do tipo 1, o paciente tipo 2 pode apresentar este quadro na vigência de intercorrências graves como infecções ou episódios agudos da doença cerebrovascular, entretanto recebendo o diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicêmico (KITABCHI et al., 2001).

Diante disso, o estudo centra em investigar se o controle metabólico de pacientes DM2 inseridos no PAMGC é melhor que o controle metabólico de pacientes DM2 não incluídos no PAMGC.

PERGUNTA	HIPÓTESE	TESTE ESTATÍSTICO
As pessoas DM2 que recebem insumos para automonitoramento glicêmico têm melhor controle metabólico que as pessoas DM2 que não recebem os insumos para automonitoramento glicêmico?	O controle metabólico de pacientes DM2 inseridos do PAMGC é melhor que o controle metabólico de pacientes DM2 não inseridos no PAMGC.	Teste t independente (se paramétrico); Teste Qui Quadrado
Variável de desfecho 1 – controle metabólico, medido em HbA1c – variável quantitativa, escalar, contínua		
Variável de desfecho 2 – controle metabólico adequado ou inadequado – variável qualitativa, nominal, categórica.		
Variável preditora – receber insumos, fazer parte do PAMGC, respostas possíveis Sim ou Não – variável qualitativa, nominal, categórica		

6.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados ocorre após a definição clara e precisa do tema, ou problema, que se pretende investigar, da definição dos objetivos, da revisão bibliográfica, da identificação das variáveis e da opção sobre o tipo de estudo que se vai empreender (MARTINS, LINTZ (2000).

Prodanov e Freitas (2009) defendem que a coleta de dados é a etapa da pesquisa na qual o objetivo é obter informações da realidade para assim definir onde e como será realizada a investigação, determinando o tipo de pesquisa, o universo desta, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como estes elementos serão tabulados e analisados, ou seja, é a fase da pesquisa em que se reúne dados através de técnicas específicas.

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, mediante revisão e análise dos prontuários do paciente da Casa do Diabético, os quais reúnem dados de identificação do paciente, como idade, sexo, data de nascimento, valores de hemoglobina glicada (HbA1c), número de consultas. A coleta das informações para a análise refere-se ao período entre 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

6.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados em um estudo precisam ser sistematicamente analisados, de forma que se consiga detectar os padrões e tendências da pesquisa (POLIT; BECH; HUNGLER, 2004).

As possibilidades de análises para a presente pesquisa permitem como opção o uso do teste t student e o teste qui-quadrado.

O teste t de Student caracteriza um tipo de estatística inferencial, usado para determinar a existência ou não de diferença significativa entre as médias de dois grupos em alguma determinada característica.

O teste qui-quadrado, é usado para avaliar quantitativamente a relação entre categorias numa tabela cruzada ou de contingência, permitindo avaliar se existe uma associação entre duas variáveis categóricas.

6.5 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO

O Projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de estudo com seres humanos, de acordo com a Resolução, do Conselho Nacional de Saúde, que preconiza tratar o indivíduo com dignidade, respeitando a sua autonomia; comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos (beneficência); garantindo que danos previsíveis sejam evitados (não maleficência); certificando igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária, isto é, justiça e equidade (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1996).

Inicialmente, solicitamos por escrito autorização da direção da instituição. Em seguida o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca/Uni-Facef e aprovado, sob o Parecer número 5.401.118.


7. RESULTADOS

Durante o período entre 2017 e 2019, a Casa do Diabético realizou 20.504 atendimentos. Considerando que cada paciente realiza em média três retornos anuais, estes atendimentos correspondem a uma estimativa de 2.278 pacientes ao longo do período de estudo. Infelizmente, não foi possível obter a separação de atendimentos por especialidade médica, optando a presente pesquisa por usar todos os atendimentos para o cálculo amostral, e selecionar os casos pertinentes na escolha da amostra.

Neste contexto, cabe destacar que foi realizado um cálculo amostral por proporção. Segundo estudos de Barros (2019), no Brasil, dentre os pacientes atendidos com diagnóstico de diabetes, 90% são portadores do tipo 2, ou seja, valor considerado na proporção. Realizando, com o uso de 96% de nível de confiança e 5% de margem de erro, foi possível verificar uma amostra de 106 questionários, selecionados de forma aleatória por critério não probabilístico.

Dentre os casos analisados, a caracterização da amostra revelou que 63,21% são mulheres, como demonstra o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Caracterização da Amostra, por Sexo, na Casa do Diabético no período de 2017 a 2019



Fonte: A autora, 2022.

Já ao analisar a idade, é preciso considerar que a pesquisa aborda casos em pacientes acima dos 40 anos, neste sentido foram coletados casos com idade superior a esta, e separados em faixas etárias, conforme demonstrado na Tabela 1, para simplificar a demonstração. Cabe ainda destacar que a média de idade dentre os casos analisados é de 67 anos.


Tabela 1 – Número absoluto, percentual e percentual acumulado, por faixa etária, dos integrantes da amostra.

Faixas Etárias	Qde.	%	% acum
De 41 a 50 anos	8	7,55%	7,55%
De 51 a 60 anos	25	23,58%	31,13%
De 61 a 70 anos	33	31,13%	62,26%
De 71 a 80 anos	25	23,58%	85,85%
De 81 a 90 anos	14	13,21%	99,06%
Acima de 90 anos	1	0,94%	100,00%
Total	106	100,00%	100,00%

Fonte: A autora, 2022.

Para fins de análise do controle metabólico, procedeu-se à uma segunda classificação por faixas etárias, desta vez dicotômica, com corte em 64 anos completos (Tabela 1). Aqueles de 40 a 64 anos foram chamados “Adultos”, e a normalidade da HbA1c foi considerada na faixa de 6,5 a 7,0. Os maiores de 65 anos foram chamados “Idosos”, e a faixa de normalidade considerada foi mais ampla, variando de 6,5 a 8,5, conforme Diretrizes Brasileiras de Diabetes (2019-2020).


Gráfico 2 – Percentual de adultos e idosos na Amostra da Casa do Diabético, no período de 2017 a 2019.



Fonte: A autora, 2022.

Outra informação a ser considerada é que, dos 106 pacientes que compuseram a amostra, 57 (53,77%) estão inscritos no Programa de Automonitoramento de Glicemia, recebendo insumos para tal, e 49 (46,23%), não (Gráfico 3).


Gráfico 3 – Percentual de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 integrantes do Programa de Automonitoramento de Glicemia, pertencentes à Casa do Diabético, no período de 2017 a 2019.



Fonte: A autora, 2022.

No período estudado, cada paciente foi atendido uma quantidade variável de vezes. Para fins de padronização, optou-se por considerar a primeira medida de HbA1c em 2017 e a última medida em 2019. A prevalência de casos considerados com controle metabólico adequado foi menor que os casos com controle metabólico inadequado, em ambos os anos estudados (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Taxa de prevalência, para cada 100 pacientes, de adequabilidade no controle metabólico, respectivamente em 2017 e 2019.



Fonte: A autora, 2022.

O Gráfico 4 já mostra que a maior parte dos pacientes estudados não apresenta controle metabólico em conformidade com o preconizado pelas Diretrizes Brasileiras de Diabetes, revelando o que se observa também na prática clínica. A pergunta que resta responder é se há diferença no controle metabólico entre os integrantes do grupo que fazem parte do PAMGC e aqueles que não fazem parte do

PAMGC. A evidência qualitativa obtida na clínica sugere que não há diferença entre tais grupos, levando esta pesquisadora a questionar a efetividade do Programa.

Para responder a esta questão, foram procedidos testes estatísticos de comparação de médias em cada um dos anos (Test t independente), de comparação da média individual nos dois anos (Test t pareado) e, considerando apenas as variáveis categóricas, procedeu-se ainda ao teste do Qui-quadrado independente.

O teste de Kolmogorov-Smirnov revelou que as variáveis escalares Idade, HbA1c 2017 e HbA1c 2019 apresentam distribuição normal, bem como homogeneidade de variância ($p > 0,05$), de acordo com o Teste de Levene.

O teste t independente (Tabela 2) mostrou que, em média, em 2017 os pacientes inseridos no PAMGC apresentaram controle metabólico não tem diferença estatística aos pacientes não inseridos no Programa ($t(104)=0,54$; $p=0,957$). O mesmo se repetiu no ano de 2019, quando as médias de HbA1c de 8,9 e 8,7, dado o valor de $p > 0,05$ ($t(104)=0,491$; $p=0,625$).

Tabela 2 – Comparação de médias de HbA1c por inserção no Programa de Automonitoramento Glicêmico, em 2017 e em 2019.

INSERÇÃO NO PAMGC	HbA1c 2017			HbA1c 2019			P
	Média	Desvio padrão	Erro padrão	Média	Desvio padrão	Erro Padrão	
Inseridos	8,682	1,5782	0,2090	8,911	1,5204	0,2014	0,957
Não Inseridos	8,665	1,6725	0,2389	8,745	1,9502	0,2786	0,625

Fonte: A autora, 2022.

Já o teste t pareado compara se há diferença entre duas medidas dependentes, ou seja, duas medidas da mesma pessoa, em tempos diferentes.

Na amostra estudada, o teste t pareado mostrou que, em média, os valores apresentados de HbA1c em 2019 ($M=8,834$; $EP = 0,1676$) foram iguais aos de 2017 ($M=8,675$; $EP=0,1568$), $t(105)= -1,033$, $p=0,304$.

Uma outra forma de fazer a mesma análise é dada pelo teste Qui-quadrado de independência, que irá avaliar se há associação entre variáveis qualitativas. Para tanto, os valores absolutos de Hemoglobina glicada coletados diretamente dos prontuários médicos dos integrantes da amostra foram categorizados para uma variável nominal dicotômica, chamada Controle Metabólico. Este foi considerado Adequado ou Inadequado, de acordo com as faixas etárias Adulto e Idoso, conforme já apresentado no Gráfico 2.

O teste qui-quadrado de independência de Pearson (Tabela 3) mostrou que não há associação entre fazer parte do PAMGC e ter controle metabólico adequado, tanto em 2017, quanto em 2019.

Tabela 3 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e estar inserido no Programa de Automonitoramento Glicêmico, em 2017 e em 2019.

INSERÇÃO NO PAMGC	CONTROLE METABÓLICO 2017		CONTROLE METABÓLICO 2019	
	ADEQUADO	INADEQUADO	ADEQUADO	INADEQUADO
INSERIDO	12	45	15	42
NÃO-INSERIDO	18	31	12	37
χ^2 e Valor de p	χ^2 (1)=3,193; p=0,074		χ^2 (1)=0,046; p=0,830	

Fonte: A autora, 2022.

Associações de sexo com controle metabólico e automonitoramento resultaram não significativas; já a faixa etária, embora sem associação com o automonitoramento, resultou significativa quando em associação com o controle metabólico.

Tabela 4 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, em 2017.

FAIXA ETÁRIA		CONTROLE METABÓLICO 2017	
		ADEQUADO	INADEQUADO
ADULTO	Frequência observada	2	43
	Frequência esperada	12,7	32,3
	Resíduo ajustado	-4,7	4,7
IDOSO	Frequência observada	28	33
	Frequência esperada	17,3	43,7
	Resíduo ajustado	4,7	-4,7
χ^2 de Pearson; valor de p		χ^2 (1)=21.934; p<0,001	

Fonte: A autora, 2022.

O teste qui-quadrado de independência mostrou que os adultos da amostra são mais propensos a estar com controle metabólico inadequado, conforme se vê nas Tabelas 4 e 5, respectivamente para os anos de 2017 e 2019. Tal situação pode referir-se ao fato de a faixa de normalidade ser mais estreita para os menores

de 65 anos, ou ao fato dos adultos (40 a 64 anos) terem um autocuidado menor, quando comparado aos idosos (maiores de 65 anos).

Tabela 5 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, em 2019.

FAIXA ETÁRIA		CONTROLE METABÓLICO 2017	
		ADEQUADO	INADEQUADO
ADULTO	Frequência observada	4	41
	Frequência esperada	11,5	33,5
	Resíduo ajustado	-3,4	3,4
IDOSO	Frequência observada	23	38
	Frequência esperada	15,5	45,5
	Resíduo ajustado	3,4	-3,4
χ^2 de Pearson; valor de p		$\chi^2(1)=11.327$; p=0,001	

Fonte: A autora, 2022.

8. DISCUSSÃO

A pesquisa se alicerçou nos dados coletados dos prontuários de pacientes portadores de diabetes *mellitus* tipo 2 insulínod dependentes atendidos na Casa do Diabético da cidade de Franca -SP, no período de 2017 a 2019.

Os dados relacionados à maior ocorrência de DM2 em mulheres corroboram com os obtidos em outros estudos desenvolvidos com diabéticos em instituições de saúde. Mais recentemente, o estudo de Freitas e Neto (2017), apontou uma prevalência do sexo feminino (56,8%) em relação ao masculino (43,2%). No estudo realizado por Silva et al. (2016) em uma população idosa verificou-se também uma maior incidência da população feminina (63,7%) do que masculina (36,3%). O fato de as mulheres serem mais prevalentes no estudo pode ser explicado devido a maior procura desse gênero ao serviço de saúde, e também, por causa das mudanças metabólicas que ocorrem durante o climatério e a menopausa que aumenta a chance de desenvolver DM2.

Em relação à idade, foi possível observar no estudo que a mínima foi de 40 anos e a máxima acima de 90, com média de 67 anos. Esses dados assemelham-se aos encontrados no estudo multicêntrico de Malerbi e Franco (1992), realizado no Brasil, que demonstrou a importância do diabetes como

problema de saúde, relacionando-o à tendência progressiva do envelhecimento populacional no país, e ao estudo de prevalência do DM2, de Torquato et al. (2001), realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP. Em ambos os estudos foram constatados o aumento gradativo da frequência do DM2 após os 50 anos de vida.

A alta prevalência de DM2 na população acima de 50 anos, sugere que o processo de envelhecimento, pelo qual vem passando toda a população brasileira, possui associação positiva com o aumento da intolerância à glicose e o DM2, indicando que o aumento da idade é fator predisponente ao risco de manifestação dessa síndrome.

Sabe-se que o embasamento terapêutico para o tratamento do diabetes *mellitus* tipo 2 deve incluir não somente o uso de medicamentos que controlam a glicemia, mas também garantir mudança de estilo de vida e automonitoramento do paciente (BRASIL, 2007). Neste sentido, a cidade de Franca, além da Rede de Atenção Básica, para abordagem inicial de pacientes com DM2, conta com a Casa do Diabético, serviço ambulatorial de média complexidade, da gestão municipal e credenciado ao SUS, que visa garantir atendimento amplo e de qualidade aos pacientes diabéticos da cidade.

A rede básica de saúde presta um serviço indispensável à população, garantindo a primeira abordagem terapêutica e o acompanhamento da maioria dos casos, bem como referência para centros especializados (neste caso, a Casa do Diabético) de cuidado ao paciente diabético. Assim, na Casa do Diabético são discutidos o plano individualizado de cuidado, revisando-o periodicamente e reajustando-o de acordo com as circunstâncias, condições de saúde, desejos do paciente e até mesmo dos familiares, os quais possuem papel fundamental no cuidado integral do enfermo.

Segundo Barbosa et al. (2021), a equipe de saúde realiza o cadastro destes pacientes a fim de favorecer ações de vigilância e busca de faltosos, utilizando destes dados e informações de consultas prévias para avaliar a qualidade do cuidado prestado em sua unidade e para planejar ou reformular as ações em saúde, bem como certificar a adesão ao tratamento e responsabilidade do paciente.

O tratamento da DM2 necessita ser multidisciplinar, incluindo o monitoramento glicêmico e outros parâmetros clínicos, planejamento da atividade física e nutricional, envolvendo o paciente no planejamento de ações para que o tratamento venha a ter efetividade (MENDES, 2012).

Dentre as políticas públicas para o cuidado ao paciente com diabetes, está o PAMGC, que é gerenciado pela Casa do Diabético em Franca- SP, promove a distribuição de materiais como o glicosímetro e tiras reagentes para medida de glicemia capilar e lancetas para punção digital, aos indivíduos com DM2 e, insulinas. A automonitorização da DM2 permite a utilização dos resultados obtidos, para ajustes no tratamento, e a melhora no controle metabólico dos indivíduos, inseridos no programa de Dispensação de Glicosímetros e Insumos para o Automonitoramento da Glicemia Capilar. (BRASIL, 2007).

Como ações voltadas ao controle do DM2, Augusto et al. (2014), confirmam que o PAMGC:

“[...] proporciona aos indivíduos com DM o desenvolvimento de habilidades para autonomia e tomada de decisões para o alcance das metas de bom controle glicêmico, redução de complicações agudas e crônicas e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida”.

Diante disso, com o intuito de discutir a efetividade da política pública de fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulínodpendentes, a presente pesquisa identificou que pacientes diabéticos parecem não compreender a complexidade de sua patologia, a importância da sua contribuição para o sucesso terapêutico e a enorme contribuição dos insumos ofertados pelo SUS para que tal sucesso seja almejado.

Esses resultados corroboram com o estudo de Amaral et al. (2019), quando observaram que o conhecimento do paciente diabético sobre a gravidade da doença ainda é insatisfatório. Característica também descrita no trabalho de Grofft et al. (2011), que chamam a atenção para:

“[...] necessidade de ampliar as ações de educação em saúde para incentivar os pacientes a realizarem de forma consciente o tratamento do Diabetes, enfatizando os perigos de uma glicemia mal controlada, com explicações a respeito das principais complicações desta síndrome.”

Buscando avaliar o autocuidado de pessoas com DM2, Danielle et al. (2014) realizaram uma pesquisa que verificou que o conhecimento dos mesmos sobre os cuidados necessários para a manutenção da saúde e redução de complicações decorrentes da DM2 é carente, reforçando assim a necessidade e

importância da educação em saúde e do estímulo ao empoderamento e envolvimento do paciente.

Segundo Mendes (2012), diabéticos com baixo grau de aderência aos tratamentos propostos contribuem substancialmente ao agravamento da doença, morte e aumento dos custos dos serviços de saúde. Para evitar essas complicações é preciso manter a glicemia dentro dos valores de referência e monitorar o tratamento através das dosagens glicêmicas (ALVES et al., 2014).

Mudanças de estilo de vida, terapêutica adequada e automonitoramento glicêmico (registros de curva glicêmica e exames laboratoriais) fundamentam a qualidade da evolução do paciente com DM2 (DELAMATER, 2006). De tal forma, dentre os exames laboratoriais, a hemoglobina glicada é uma quantificação que permite estimar quão elevada esteve a glicemia nos 90 – 120 dias pregressos, haja vista que, sendo um exame laboratorial, analisa a glicose ligada a hemoglobina de forma irreversível no período de vida da hemácia.

Boa adesão terapêutica corrobora com bons índices glicêmicos e com metas laboratoriais atingidas. Para isso, considera-se padrão-ouro o uso da hemoglobina glicada para avaliar o controle metabólico do paciente diabético. Diante disso, ajuizamos para a pesquisa, a taxa de hemoglobina glicada dos pacientes DM2 insulínod dependentes pesquisados. Assim, percebemos que independente da aquisição ou não de insumos não houve controle metabólico, sustentando altos índices de hemoglobina glicada inadequada.

O estudo de Silva et al. (2016) mostrou que o correto controle dos níveis glicêmicos dos portadores de DM é capaz de retardar ou prevenir o aparecimento das complicações micro e macrovasculares relacionadas à doença, além de ser fundamental para a melhoria na qualidade de vida dos diabéticos.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de mudança nas políticas internas na Casa do Diabético, no que diz respeito à distribuição de insumos, para evitar gastos elevados, não programados e ineficazes, além de remeter ao gestor a responsabilidade da decisão de alocar recursos que, muitas vezes, contradiz o princípio da equidade em saúde e o acesso à assistência de qualidade, gerando prejuízos tanto para a Administração Pública como para os usuários desses serviços.

A partir desse estudo percebe-se que a atual política pública de saúde do município necessita de ferramentas, práticas e métodos de gestão de insumos eficientes, a fim de que seus custos e desperdícios sejam reduzidos.

A Casa do Diabético de Franca, apesar de ser dotada de estrutura física, equipe multiprofissional, distribuição insumos e medicamentos, com rede de atenção em saúde com foco em referência e contrarreferência, necessita ainda de atenção especial, pois observando os resultados, a população avaliada carece de informações cruciais para efetividade do seu tratamento e controle do diabetes (BARBOSA et al., 2021).

Dentre as dificuldades encontradas na pesquisa, vale ressaltar num primeiro momento, o acesso aos prontuários de pacientes com DM2, uma vez que não há possibilidade de chegar diretamente a estes casos, a informatização oferecida pelo sistema não agrupa as patologias por CIDs, sendo a única forma de acesso aos pacientes da unidade o seu MCV (número de registro do paciente no Sistema Único de Saúde municipal). Além desta informação, o cadastro de pacientes com diabetes *mellitus* tipo 2 que recebem insumos, há algum tempo não preenche aos critérios para sua aquisição, pois muitos estão incompletos o que dificultou a atualização de tais informações

Outra questão referente aos prontuários médicos, seria a seleção por sexo e idade, referentes a patologia em estudo. Na seleção dos dados percebemos que os registros de informações nos formulários cadastrais estavam incompletos e que existe um alto percentual de omissão de informações. A falha na escrituração dos dados comprova a importância de treinamento dos profissionais responsáveis pelo atendimento e cadastramento dos pacientes diabéticos, a fim de conscientizá-los para o fato de que as informações coletadas colaboram para o gerenciamento do SUS.

No prontuário do paciente temos o número de consultas médicas prévias e respectivas condutas terapêuticas abordadas. Porém, percebemos que a dispensação de medicações e insumos (glicosímetros e tiras) não ocorre apenas para pacientes em acompanhamento na Casa do Diabético, mas é oferecida para todo e qualquer paciente da cidade de Franca, desde que esteja cadastrado e normatizado pelo Programa de Insumos da Prefeitura da cidade, sendo obrigatória também a apresentação do cartão SUS, comprovante de residência e receita médica.

Outro ponto a destacar é a demanda populacional de atendimento, que é superior à capacidade administrativa do serviço, gerando assim dificuldades organizacionais e de atendimentos. Durante a avaliação para coleta de dados da pesquisa, verificamos aproximadamente dois mil pacientes cadastrados no local. Estatística esta que é totalmente global, sem delimitação entre o perfil epidemiológico, etário, clínico ou patológico, ou seja, não há como delimitar qual é o retrato da população em acompanhamento no serviço (SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. E.; BESSA FILHO, L. R.; 2021)

Isso acontece por diversos motivos, principalmente pelo próprio sistema de cadastro da prefeitura, o qual não consegue arquivar separadamente os atendimentos do local por descrição das patologias, associando registros de CIDs com descrição errada, excluindo assim a possibilidade de pesquisa numérica e qualitativa dos pacientes diabéticos e sua patologia específica.

Percebe-se que a Casa do Diabético, para chegar a um nível de atenção especializada ideal, deverá ter um olhar global de saúde, na qual os pacientes também devem ter uma participação mais ativa no processo saúde e doença, com um programa educacional voltado não só para grupos e reuniões, mas para um aprendizado abrangente e responsável, criando assim um reforço positivo no plano terapêutico individual.

Portanto, diante de todos os fatores que foram aqui apresentados, o monitoramento efetivo da glicemia capilar por parte dos pacientes portadores de DM2 insulino dependentes é um fator crítico e determinante no controle metabólico da doença e na redução do risco de complicações.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo discutir a efetividade da política pública de fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulino dependentes, atendidos na Casa do Diabético da cidade de Franca, onde foram coletados os dados para a pesquisa.

O DM2 é motivo de preocupação, os seus números são relevantes no que tange às condições de saúde humana. No mundo os números chegam a 415 milhões de pessoas e no Brasil os dados mostram 14.250.000 casos da doença (IDF, 2019).

Ainda de acordo com a SBD, o número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM2. Os principais fatores de riscos estão relacionados aos hábitos alimentares e estilo de vida da população (SOCIDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).

O DM2 abrange uma série de aspectos e contextos particulares, tornando o seu tratamento uma condição de complexidade que envolve uma terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa, sendo necessário a adoção de uma postura ativa do paciente no que tange ao seu empoderamento para implementar ações de autocuidado.

Para que a atenção às pessoas com DM2 seja realizada adequadamente são necessárias condições materiais e aporte tecnológico específicos para a organização do processo de trabalho e a efetivação do cuidado. O suprimento e a manutenção regular dos materiais e equipamentos necessários à execução do conjunto das ações voltadas ao controle do DM2, assim como o fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários ao tratamento do DM2, à aplicação de insulina e ao AMGC são considerados essenciais para garantir a continuidade do cuidado e para o alcance dos resultados terapêuticos. Nesse sentido Medeiros (2014), relata que o autocuidado faz com que os indivíduos com DM2 se tornem mais independentes e responsáveis no seu dia a dia, além de promover sua autoestima e adesão ao tratamento.

A Casa do Diabético tem um papel fundamental na atenção especializada não só de pacientes diabéticos, mas também sobre aqueles que possuem outras doenças endocrinológicas, no campo do tratamento, acompanhamento longitudinal e na prevenção de comorbidades e complicações destas patologias.

Contudo, há inúmeras lacunas a serem preenchidas no âmbito da epidemiologia e caracterização da população geral e específica do local, prejudicando as bases de dados essenciais para organização de programas em saúde e ações governamentais voltadas para atenção básica, visando uma melhor prevenção primária, responsável por precaver patologias teoricamente evitáveis (SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. E.; BESSA FILHO, L. R.; 2021)

Dessa forma é necessário criar métodos mais eficazes para quantificar e qualificar o público usuário. Só assim, poderia se alcançar uma verdadeira promoção de saúde e prevenção de doença direcionada e mais eficaz.

Apesar da distribuição de insumos pelo PAMGC aos indivíduos com DM2, o maior desafio enfrentado tem sido a falta de conhecimento e a baixa adesão dos pacientes ao tratamento de longo prazo, comum nas condições crônicas como o DM2.

De acordo com Aguiar et al. (2008), a qualidade de vida de pessoas com DM2 é totalmente perturbada quando comparada com a de pessoas que não tem, e, quanto maior o número de complicações mais afetada será a mesma, é sabido que a DM2 pode ser causada por motivos como obesidade, sedentarismo, má alimentação, e, se não tratada poderá causar outras implicações na saúde.

Quanto ao controle glicêmico, observou-se que a maioria da população do estudo estava com seus valores de HbA1c acima dos preconizados pela SBD, demonstrando assim um mau controle glicêmico.

Se o autocuidado não é realizado com eficácia, a qualidade de vida será afetada diretamente, pois haverá repercussões físicas, econômicas e/ou sociais, resultando no afastamento do trabalho, e, até mesmo isolando-o socialmente (REZENDE NETA, SILVA, SILVA, 2015).

Dessa forma, fica em evidência a necessidade de mudança nas políticas internas do município de Franca na distribuição de insumos aos portadores de DM2, pois independente da aquisição ou não de insumos, não houve efetividade no controle metabólico, com altos índices de hemoglobina glicada inadequada.

Considerando os resultados deste estudo, a importância e a relevância do autocuidado dos pacientes com DM2 e, ainda, que as políticas públicas são fundamentais para que o sucesso do tratamento seja alcançado, surgem algumas recomendações aos gestores:

- Organização da rede municipal de saúde com fortalecimento da atenção básica e desenvolvimento de competências de cuidado ao paciente diabético naquele nível de atenção;
- Prover o serviço com um sistema informatizado adequado para fácil manuseio para caracterização epidemiológica dos pacientes atendidos na Casa do Diabético;
- Ainda quanto ao sistema informatizado, permitir que os registros glicêmicos feitos pelos pacientes sejam registrados e acessados sob a forma de gráfico de curvas, para facilitar ao profissional a visualização e acompanhamento da estabilidade glicêmica ou não;

- Adequação quantitativa e qualitativa da equipe de profissionais que compõem a unidade, para que possam somar conhecimentos e embasar o conhecimento da doença, diabetes mellitus tipo 2 e assim esclarecer os pacientes atendidos;
- Um funcionário para atender às demandas do programa de insumos, registrando o ingresso do paciente no programa de acordo com o protocolo estabelecido, ofertando os insumos necessários, garantindo uma distribuição adequada.
- Prover a rede com articulação efetiva entre os pontos de atenção e estratégias de Educação Permanente em Saúde que favoreça o enfrentamento das dificuldades assistenciais e de gestão, com vistas ao atendimento das necessidades de saúde da população.

Toda a minha vivência na Casa do Diabético, a certeza da efetividade das políticas públicas de saúde, foram minha motivação para estudar cada detalhe desta pesquisa, certa de que existem várias alternativas para resolução destas lacunas e que estas são possíveis, garantindo melhorias na dinâmica de atendimento ambulatorial e conseqüentemente, bom controle metabólico para os pacientes.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, C. C. T. et al. Instrumentos de avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde no diabetes melito. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia Metabólica**, v. 52, n. 6, p. 931-939, 2008. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/abem/a/py3MYBYBv4M8KCFcKBj4WTwz/?lang=pt>> Acesso em: 30 out. 2021.

AKERMAN, M. **Saúde e desenvolvimento local**: princípios, conceitos, práticas e cooperação técnica. São Paulo: Hucitec, 2005.

AKERMAN, M.; RIGHI, L. B.; PASCHE, D. F et al. Saúde e desenvolvimento: que conexões? In. CAMPOS, G. W. S. et al. (Org.). **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo: Hucitec, 2012 (Saúde em debate ; v. 170).

ALENCASTRO, M. S. C. **Ética e meio ambiente**: construindo as bases para um futuro sustentável. Curitiba: Intersaberes, 2015.

AMARAL, R. T. et al. Conhecimento dos diabéticos sobre doença e autocuidado. **Revista de Enfermagem da UFPE**, v. 13, n. 2, p. 346-352, fev. 2019.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of Medical Care in Diabetes. **Diabetes Care**, v. 40, Sup 1, 2017.

ANDRÉ, A. M.; CIAMPONE, M. H.; SANTELLE, O. Tendências de gerenciamento de unidades de saúde de pessoas. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 1, pp. 158-163, 2013.

BARBOSA, I. E.; SILVA, F. C. P.; BESSA-FILHO, L. R. **Rede especializada de atenção à pessoa com Diabetes Mellitus na cidade de Franca – SP**. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Franca: Centro Universitário Municipal de Franca, 2021.

BARNARD, Chester I. **The functions of the executive**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968. p. 19-20.

BLACK, S.; MAITLAND, C.; HILBERS, J., et al. Diabetes literacy and informal social support: a qualitative study of patients at a diabetes centre. **Journal of Clinical Nursing**, v.26, n.1-2, p. 248-257, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27191540/>> Acesso em: 12 nov. 2021.

BLOCK, K. V; COUTINHO, E. S. F. Fundamentos da Pesquisa Epidemiológica. In: MEDRONHO, Roberto A. et al. (Org.). **Epidemiologia**. São Paulo: Atheneu, 2003. Pag. 107 a 114.

BRASIL. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso em: 11 out. 2021.

BRASIL. **Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre as formas de participação da população no SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm> Acesso em: 11 out. 2021.

BRASIL. **Portaria n. 2.510, de 19 de dezembro de 2005**. Institui Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único de Saúde - CPGT. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2510_19_12_2005.html> Acesso em: 26 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual técnico**. Promoção da saúde e prevenção de riscos doenças na saúde suplementar. 2. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não transmissíveis**: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos em Saúde).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças **Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Decreto n. 7.646, 21 de dezembro de 2011**. Dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7646.htm> Acesso em: 22 jan. 2022.

BRASIL. **Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011**. Altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12401.htm> Acesso em: 13 dez. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Estratégias para o Cuidado da pessoa com doença crônica Diabetes Mellitus. **Cadernos de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Saúde Brasil 2018: uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Vigitel Brasil 2019: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <http://www.crn1.org.br/wpcontent/uploads/2020/04/vigitel-brasil-2019-vigilancia-fatores-risco.pdf?x53725>. Acesso em: 23 jan. 2022.

CAROLAN, M.; HOLMAN, J.; FERRARI, M. Experiences of diabetes self-management: a focus group study among Australians with type 2 diabetes. **Journal of Clinical Nursing**, v.24, p.1011–1023, 2014.

CARRIJO R. C.; RASERA E. F. Como negociar a responsabilização em conversas sobre viver com diabetes. **Psicologia & Sociedade**, v. 25, n. 3, p. 653-663, 2013.

CECILIO, H. P. M., et al. Comportamentos e comorbidades associados às complicações microvasculares do diabetes. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 113-119, Apr. 2015.

CORREA, T. A. **Visão dos atuais gestores da saúde pública de cinco municípios da região celeiro sobre os desafios do acompanhamento das políticas públicas**. 2012. 92 f. Monografia (Especialização). Universidade federal do Rio Grande do Sul, 2012.

CORRÊA, K.; GOUVÊA, G. R.; SILVA, M. A. V. et al. Qualidade de vida e características dos pacientes diabéticos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 3, p. 921-930, 2017.

CORTEZ, D. N.; REIS, I. A.; SOUZA, D. A. S. et al. Complicações e o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 28, n. 3, p. 250-3, 2015.

DELAMATER, A. M. Improving patient adherence. **Clinical Diabetes**, v. 24, n. 2, p. 71-7, 2006.

ECO, U. **Como se faz uma tese em ciências humanas**. Lisboa: Presença, 1988.

EID, L. P.; LEOPOLDINO, S. A. D.; OLLER, G. A. S. A. et al. Factores relacionados con las actividades de autocuidado de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. **Escola Anna Nery**, v. 22, n. 4, e20180046, 2018.

FACHIN, M. G. **Direitos humanos e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Renovar, 2015.

FARIA H. T. G.; VERAS V. S., XAVIER A. T. F. et al. A. Qualidade de vida de pacientes com diabetes mellitus antes e após participação em Programa educativo. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**. v. 47, n. 2, p. 348-354, 2013.

FERRAZ, D.; KRAICZYK, J. Gênero e Políticas Públicas de Saúde – construindo respostas para o enfrentamento das desigualdades no âmbito do SUS. **Revista de Psicologia da UNESP**, v.1, p.70-82, 2010.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa**: um guia para iniciantes. Tradução de Magda Lopes. Porto Alegre: Penso, 2013.

FLOR, L. S.; CAMPOS, M. R. Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, n. 1, p. 16-29, mar. 2017.

FORTALEZA. Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. **Diretrizes clínicas**: diabetes mellitus. Fortaleza: SMS, 2016.

FRANCISCO, P. M. S. B.; BELON, A. P.; BARROS, M.B A. et al. Diabetes auto-referido em idosos: prevalência, fatores associados e práticas de controle. **Cadernos de Saúde Pública**; v.26, n.1, p.175-84, 2010.

FREITAS, R. M.; PEREIRA, V. B. V.; COTRIM, M. M. et al. Avaliação do perfil clínico e prática de atividades físicas em idosos diabéticos, cadastrados na Estratégia Saúde da Família. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. v.48, 2020.

GALDINO, Y. L. S. **Construção e validação de cartilha educativa para o autocuidado com os pés diabéticos**. 2014. 98 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2014.

GALVÃO. M. T. R. L. S.; VILELAS. J. M. S. O autocuidado em enfermagem: autogestão, automonitorização e gestão sintomática como conceitos relacionados. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 17, n. 1, p. 225-30, jan./mar., 2013. Disponível em: <<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/593>> Acesso em: 12 dez. 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GIL, C. R. R; LUIZ, I. C; GIL, M. C. R. **Gestão pública em saúde: a importância do planejamento na gestão do SUS**. São Luís: EDUFMA, 2016.

HAYNES, R. B. Determinants of compliance: the disease and the mechanics of treatment. In: HAYNES, R. B.; TAYLOR, D. W.; SACKETT, D. L. **Compliance in Health Care**. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, **Estimativas da população residente com data de referência 1 de julho de 2020**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama>> Acesso em: 13 dez. 2021.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **Diabetes Atlas**. 7th ed. 2015. Disponível em: <<https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/previous/files/7/IDF%20Diabetes%20Atlas%207th.pdf>> Acesso em: 10 jan. 2022.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **Diabetes Atlas**. 2019. Disponível em: <<https://diabetesatlas.org/>>. Acesso em: 22 jan. 2022.

ISER, B. P. M.; STOPA, S. R.; CHUEIRI, P. S. et al. Prevalência de diabetes autorreferido no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 24, n. 2, p. 305-314, 2015.

LENZI, T. O que são as políticas públicas? **Toda Política**. 2017. Disponível em: <<https://www.todapolitica.com/politicas-publicas/>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

LODI, J. B. Introdução à obra de Peter F. Drucker. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-75901968000400005>> Rev. Administração de empresas 8 (29); dez. 1968.

LORENZETTI, J.; LANZONI, G, M, M.; ASSUITI, L, F, C.; PIRES, D, E, P, P.; RAMOS, F, R, S. Gestão em saúde no Brasil: diálogos com gestores públicos e privados. **Texto contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 417-425, 2014.

MACEDO, J. L.; BRITO, A. N. M.; CARVALHO, S. L. et al. Eficácia do tratamento dietoterápico para pacientes com diabetes mellitus. **Research, Society and Development**. v. 9, n.1, 2020.

MARTINS, G. A.; LINTZ, A. **Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de curso**. São Paulo: Atlas: 2000.

MEDEIROS, L. M. **Cartilha de autocuidado para os pacientes diabéticos da USB Assis Brasil**. 2014. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

MENDES, E. V. **O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da Estratégia Saúde da Família**. Brasília: OPAS, 2012.

MENDES, Karina D. D.; SILVEIRA, Renata Cristian; GALVÃO, Cristina M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-64, 2008.

MENDONÇA, S. C. B.; ZANETTI, M. L.; SAWADA, N.O. et al. Construction and validation of the Selfcare Assessment Instrument for patients with type 2 diabetes mellitus. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 25, n. 90, e2890, 2017.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

OREM, D. E. **Nursing: Concepts of practice**. 4. ed. St. Louis: Mosley, 1995.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 21**. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: <<http://www.ebc.com.br/especiais/rio20/sobre/glossario>>. Acesso em: 15 fev. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York, 2015. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agenda2030.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization**. Social science and medicine. v.41, n.10, 1995, p.403-409.

ORTIZ, L. G. C.; CABRIALES, E. C. G.; GONZÁLES, J. G. G. et al. Self-Care Behaviors and Health Indicators in Adults with Type 2 Diabetes. **Revista Latinoamericana de Enfermagem**, v. 18, n. 4, p. 675-80, 2010.

PADILHA, A. P., et al. Manual de Cuidados às Pessoas Com Diabetes e Pé Diabético: Construção Por Scoping Study. **Texto contexto - enferm.**, Florianópolis, v. 26, n. 4, 2017.

PEREIRA, Maurício Gomes. **Epidemiologia: teoria e prática**. 5ª reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, 596 pag.

PIETRANGELO, A. **Understanding Type 2 Diabetes**. Oct. 2021. Disponível em: <<https://www.healthline.com/health/type-2-diabetes>> Acesso em: 10 jan. 2022.

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

PRODANOV, C. C; FREITAS, E. E. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2009.

REZENDE NETA, D. S.; SILVA, A. R. V.; SILVA, G. R. F. Adesão das pessoas com diabetes mellitus ao autocuidado com os pés. *Rev Bras Enferm.* v.68, n.1, p.111-6, jan-fev, 2015.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 2011.

RODRIGUES, Katia Fabiane; RIPPEL, Ricardo. Desenvolvimento sustentável e técnicas de mensuração. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, São Paulo, vol. 4, n. 3, p. 73-88, set./dez. 2015. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/9981>> Acesso em: 8 fev. 2022.

RODRIGUES FILHO, F. J.; PEREIRA, M. C. O perfil das tecnologias em saúde incorporadas no SUS de 2012 a 2019: quem são os principais demandantes? **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 130, p. 707-719, jul./set., 2021.

SARTI, T. D.; CAMPOS, C. E. A.; ZANDONADO, E. et al. Avaliação das ações de planejamento em saúde empreendidas por equipes de saúde da família. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 28, n. 3, p. 537-48, 2012.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. Tradução Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, D. S.; LATERZA, M. C.; MOREIRA, O. C. et al. Prevalência de diabetes mellitus em indivíduos atendidos pela estratégia saúde da família no município de Ubá-MG. **Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde**, Pelotas, v. 17, n. 3, p. 195-199, 2012.

SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. E.; BESSA FILHO, L. R.; Rede especializada de atenção à pessoa com diabetes mellitus na cidade de Franca- SP. **Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina, Uni- Facef**, 2021

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. **Tratado de enfermagem médico-cirúrgica**. Tradução de Brunner e Suddarth. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETE. **Consenso brasileiro sobre diabetes 2002: diagnóstico e classificação do Diabetes mellitus e tratamento do Diabetes mellitus do tipo 2**. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2003.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes**. 3. ed. São Paulo: A. A. S. Farmacêutica, 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Dados epidemiológicos do diabetes mellitus no Brasil**. Departamento de Epidemiologia, Econômica e Saúde Pública. 2018-2019. Disponível em: https://diabetes.org.br/wpcontent/uploads/2021/06/SBD-_Dados_Epidemiologicos_do_Diabetes_-_High_Fidelity.pdf Acesso em 09 dez. 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf>: Acesso em: 19 jan. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLIA. **Números de diabetes no mundo**. 15 abr. 2021. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br/numeros-do-diabetes-no-mundo/> Acesso em: 10 ago. 2021.

SOUZA, C. F.; GROSS, J. L.; GERCHMAN, F. et al. Pré-diabetes: diagnóstico, avaliação de complicações crônicas e tratamento. **Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia**, Porto Alegre, RS, v. 56, n. 5, p. 275-84, jul. 2012.

SOUZA, K. A. O.; SOUZA, L. E. P. F. Incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde: as racionalidades do processo de decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. esp., p. 48-60, out., 2018.

TAMADA, R. C. P. **Modelos de gestão em saúde: novas tendências, responsabilidades e desafios**. 2013.

TAVARES. T. A.; COSTA, L. S. F.; SALES, M. L. H. et al. Fatores de risco para ulceração e amputação de extremidades inferiores em portadores de diabetes mellitus. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v.29, n.2, p. 278-287, abr./jun., 2016.

THOMAZELLI. F. C. S.; MACHADO, C. B.; DOLÇAN, K. S. Análise do risco de pé diabético em um ambulatório interdisciplinar de diabetes. **Revista da AMRIGS**, Porto Alegre, v. 59, n. 1, p. 10-14, jan./mar. 2015.

VEIGA, J. E da. **Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI**. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.

WANG, X. On the Right to Sustainable Development: Foundation in Legal Philosophy and Legislative Proposals. In: MARKS, S. P. (Ed.). **Implementing the right to development: the role of international law**. Genebra: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.

WITTMANN, M. L.; DOTTO, D. M. R.; BOFF, V. A. **Desenvolvimento Regional: capital social, redes e planejamento**. Santa Cruz do Sul: Ed. EDUNISC, 2004.

WHO. **Global Action Plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020**. Geneva: World Health Organization, 2013.

WHO. **Global Health Estimates 2016**: deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2016. Geneva: WHO, 2018a.

WHO. **World Health Statistics 2018**: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: WHO, 2018b.

APÊNDICES

CASA DO DIABÉTICO DE FRANCA- SP

Número prontuário do paciente	Sexo paciente	Idade do Paciente	DM2 insulinodependente Não pertencente ao Programa de Insumos	DM2 insulinodependente pertencente ao programa de insumos	Data constatada no prontuário no período 2017- 2019	Valores de hemoglobina glicada (Hb A1c)

ANEXO



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Efetividade do automonitoramento do paciente com Diabetes Mellitus tipo 2, insulino dependente

Pesquisador: Thalita Leal Leite Pimenta

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 57971522.0.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.401.118

Apresentação do Projeto:

Trata-se de pesquisa documental, de caráter quantitativo, baseada na revisão e análise de prontuários de pacientes atendidos em estabelecimento de saúde de média complexidade, direcionado para pacientes com doenças endocrinológicas, de gestão municipal e credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), situada em município do interior do Estado de São Paulo.

Objetivo da Pesquisa:

O trabalho visa responder se as pessoas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que recebem insumos para automonitoramento glicêmico, têm melhor controle metabólico que as pessoas com DM2 que não recebem os insumos para automonitoramento glicêmico. Discutir a efetividade da política pública de fornecimento de insumos para auto-monitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulino-dependentes.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Como benefício, este trabalho subsidiará novas discussões no campo das políticas públicas de saúde, com vista a melhorar e ampliar os serviços oferecidos aos pacientes diabéticos, com reflexo positivo para esses.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa de importância em saúde coletiva, ao descrever e discutir a efetividade das políticas públicas de saúde sobre Diabetes mellitus tipo 2, em nível municipal.

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
Bairro: São José **CEP:** 14.403-430
UF: SP **Município:** FRANCA
Telefone: (16)3713-4630 **Fax:** (16)3713-4605 **E-mail:** comepe@facef.br

Continuação do Parecer: 5.401.118

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Solicita dispensa de TCLE, por tratar-se de pesquisa em prontuários médicos.

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

O Colegiado ratifica o parecer do Relator.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1929565.pdf	18/04/2022 14:15:34		Aceito
Outros	DeclaracaoAnuenciaSMSThalita.pdf	18/04/2022 14:14:55	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito
Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável	CartaApresentacaoThalita.pdf	18/04/2022 14:14:22	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	DispensaTCLEThalita.pdf	18/04/2022 14:13:44	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRostoThalita.pdf	18/04/2022 14:13:11	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito
Outros	MatrizColetaDadosThalita.docx	11/04/2022 12:02:42	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoPesquisaTHALITAPIMENTA.doc	11/04/2022 12:01:47	Thalita Leal Leite Pimenta	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400**Bairro:** São José**CEP:** 14.403-430**UF:** SP**Município:** FRANCA**Telefone:** (16)3713-4630**Fax:** (16)3713-4605**E-mail:** comep@facef.br



CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-
FACEF



Continuação do Parecer: 5.401.118

FRANCA, 11 de Maio de 2022

Assinado por:
Antonio Cezar Peron
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Bairro: São José

CEP: 14.403-430

UF: SP

Município: FRANCA

Telefone: (16)3713-4630

Fax: (16)3713-4605

E-mail: comep@facef.br

