

Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

PATRICIA BOMBICINO DAMIAN

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL:
avaliação Funcional como estratégia de
enfrentamento para o Desenvolvimento Social

**FRANCA
2025**

PATRICIA BOMBICINO DAMIAN

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL:
avaliação Funcional como estratégia de
enfrentamento para o Desenvolvimento Social

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi

FRANCA
2025

D165e Damian, Patricia Bombicino

Envelhecimento populacional: avaliação funcional como estratégia de enfrentamento para o desenvolvimento social. / Patricia Bombicino Damian. – Franca (SP): Uni-FACEF, 2025.

100f. il.

Orientadora: Profa. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Dissertação de Mestrado

1. Envelhecimento. 2. Capacidade funcional. 3. Desenvolvimento social.

Uni-FACEF

CDD: 304.645

PATRICIA BOMBICINO DAMIAN

**ENVELHECIMENTO POPULACIONAL:
Avaliação Funcional como estratégia de
enfrentamento para o Desenvolvimento Social**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientadora: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi

Franca, 28 de fevereiro de 2025.

Orientador(a): Lívia Maria Lopes Gazaffi
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca

Examinador(a): Mariana Funari Botelho de Faria
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo

Examinador(a): Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca

APRESENTAÇÃO

Desde que concluí minha formação médica (faculdade, dois anos de residência em Saúde da Família e dois anos de especialização em Geriatria) iniciei o trabalho de preceptora na universidade, no município de Franca-SP. Unindo a necessidade de me aprofundar na pesquisa científica, como modo de me capacitar a estar com estudantes, e o desejo de expandir meus conhecimentos no campo da geriatria, ingressei no programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF.

O tema deste estudo é o envelhecimento populacional e seus impactos no desenvolvimento social. Trata-se de um tema amplo e de relevância para atualidade, e em específico, na geriatria, por ser a área da medicina que estuda o envelhecimento e que tem muito a contribuir socialmente. Como geriatra, o foco do cuidado é a manutenção da funcionalidade, da independência e da autonomia da pessoa idosa e estes aspectos refletem também no Desenvolvimento Social, como será discutido ao longo desta dissertação.

As disciplinas cursadas durante este um ano e meio de mestrado foram essenciais para o desenvolvimento do projeto.

O mestrado em Desenvolvimento Regional é um campo de estudo multi e interdisciplinar, que contempla discussões das áreas de ciências humanas e sociais, além da saúde. Por ter formação em medicina, foi necessário expandir o conhecimento para essas áreas de forma a contemplar o objetivo desta dissertação, que é o de favorecer o desenvolvimento social através de políticas públicas e melhoria das condições de vida da população idosa.

A disciplina de Métodos de Pesquisa Quantitativa embasou a metodologia deste trabalho, que se trata de uma análise descritiva, com base quantitativa.

A disciplina de Políticas Públicas de Saúde e Desenvolvimento Regional contribuiu para eu me aprofundar mais nos preceitos que regem o SUS, as redes de atenção e a formação de políticas públicas em saúde.

A disciplina de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Regional contribuiu no sentido de conceituar a visão sistêmica dentro da área da saúde, assim como a importância da Atenção Primária.

A disciplina Cultura e Competências nas inter-relações com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi fundamental para o conhecimento das ODS e consequentemente, da década do Envelhecimento Saudável, que é a essência desta dissertação.

A disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional forneceu as bases para o entendimento e interpretação do que é uma política pública, como é construída e quais os seus objetivos.

A Disciplina de Direitos Humanos, Democracia e Inclusão Social também forneceu embasamento para a relevância desta pesquisa.

As disciplinas de Economia Regional e Urbana e Teorias do Desenvolvimento foram essenciais pois não há como falar sobre desenvolvimento sem entender a complexidade desse termo, assim como seus determinantes regionais, econômicos e sociais.

Por fim, as disciplinas de Seminários de Pesquisa e Didática de Ensino Superior contribuíram para a formação geral em docência, uma vez que já estou no ambiente acadêmico, em contato diário com alunos e pesquisa.

Dedico esta dissertação à memória da minha amada avó Nabia, cuja vida foi e é inspiração para todos os seus descendentes. Viveu até os 93 anos, mantendo sua beleza, personalidade e autonomia.

AGRADECIMENTOS

- Agradeço à minha orientadora, Livia Maria, que consegue aliar o conhecimento técnico à uma doçura única, tão inspiradora para a carreira de docente. Obrigada pelo seu apoio e paciência;
- À minha irmã Marcela, pelo suporte e amor que me permitiram concluir esta dissertação;
- Ao meu irmão João Gabriel, por ser farol nesta trilha acadêmica, sempre guiando e amparando;
- Aos professores e funcionários do PPGDR do Uni-FACEF, pelo apoio e aprendizado nesta caminhada.

*I could be handy, mending a fuse
When your lights have gone
You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings go for a ride
Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four*

The Beatles

RESUMO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. As consequências deste processo envolvem questões políticas, sociais e econômicas, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo que envelhece, gerando impactos substanciais nas questões ligadas ao Desenvolvimento, tanto no sentido econômico quanto social. A capacidade funcional do indivíduo que envelhece é um fator preponderante sobre esses impactos, podendo contribuir de maneira positiva à medida que o idoso independente é mais saudável, produtivo, com maior autonomia e qualidade de vida; como também de forma negativa, uma vez que a dependência funcional leva à maior morbimortalidade, necessidade de cuidados e custos sociais e em saúde. Diante disso, a OMS instituiu a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030) como iniciativa para promover o envelhecimento funcional e com qualidade de vida, em concordância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O presente estudo buscou avaliar a funcionalidade e o perfil sócio-epidemiológico de pacientes idosos acompanhados em um ambulatório acadêmico de geriatria do SUS e inferir, através da análise estatística, a validade dos resultados para esta amostra. Foram coletados dados de 73 prontuários de pacientes idosos (maiores de 60 anos), acompanhados num ambulatório de geriatria em Franca-SP, no período de 2021 a 2023. Os dados analisados foram: sexo, idade, escolaridade, renda, suporte social (com quem o paciente mora), número de medicações em uso, presença de quedas no último ano e avaliação funcional por Katz e Lawton. A análise estatística dos resultados foi realizada através do *software* R e Rstudio, que validou os dados encontrados e inferiu a tendência de progressão dos dados encontrados. A análise exploratória da amostra evidenciou que a maioria dos pacientes são do sexo feminino, com idades variando entre 75 a 89 anos e 5 a 10 anos de escolaridade. A ocorrência de quedas foi identificada em 21,92%. 52,05% dos pacientes residem com algum familiar e 38,36% possuem aposentadoria. Na avaliação funcional das atividades básicas de vida diária (escala de Katz), a maioria (65,76%) mostrou-se parcialmente dependente e, nas atividades instrumentais (escala de Lawton), 27,4% são totalmente dependentes. A análise inferencial dos dados mostrou uma tendência de aumento na idade e na polifarmácia, com a média de 79,64 anos e uso de 6,6 medicamentos respectivamente. Também evidenciou uma média de 4,14 pontos na escala de Katz, que representa uma dependência parcial, e uma média de 16,87 pontos na escala de Lawton - dependência moderada - com tendência a aumentar, ou seja, tornarem-se mais dependentes. A análise mostrou, assim, uma tendência no aumento da multimorbidade e da dependência funcional relacionadas ao aumento da idade e da polifarmácia. Além disso, evidenciou a necessidade do suporte familiar no cuidado, o que gera impactos na renda da família. A intervenção por meio de medidas multidisciplinares propostas pela ferramenta ICOPE é uma estratégia proposta pela OPAS, que vai ao encontro dos objetivos da Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030). Desta forma, será possível promover o Desenvolvimento Social, proporcionando qualidade de vida e manutenção da capacidade funcional dos idosos.

Palavras-chave: envelhecimento; capacidade funcional; desenvolvimento social.

ABSTRACT

The population aging is a world process phenomenon. This fact has implications in politics, society and economic issues, for the older person and for the community, affecting the Development process, both social and economic. As a matter of great importance in this discussion is the functional capacity of the older person, which can have a good impact in productivity, health, autonomy and quality of life if functionality is preserved; or the opposite, as the functional dependency leads to a greater morbimortality, needs of care and costs for social security and health systems. In an attempt to promote healthy aging around the world and improve the quality of life of older people and its community, the World Health Organization implements the Decade of Healthy Aging (2020-2030), aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations. The study aimed to evaluate the functionality and the socio epidemiological status of the elderly served at a geriatric outpatient public service and deduce, by statistical analyses, the validity of the results for this sample. Data from 73 medical records of elderly patients (60 years or more) served at a geriatric public outpatient service in Franca-SP were collected, from the period of 2021 to 2023. It analysed the variables: gender, age, education level, income, social support (with whom the patient lives), number of medications in use, presence of falls in the last year and functional capacity by Katz and Lawton. The statistical analyses were performed with software R and Rstudio, in which the data found were validated for the sample and the tendency of progression were inferred. The exploratory analysis of the sample revealed that most of the patients are female, with ages ranging from 75 to 89 years and 5 to 10 years of schooling. The occurrence of falls was identified in 21.92%. 52.05% of the patients live with a family member, and 38.36% are retired. In the functional assessment of basic daily living activities (Katz scale), the majority (65.76%) were partially dependent, and in instrumental activities (Lawton scale), 27.4% were totally dependent. The inferential analysis of the data showed a trend of increase in age and polypharmacy, with an average age of 79.64 years and the use of 6.6 medications, respectively. It also showed an average score of 4.14 on the Katz scale, indicating partial dependence, and an average of 16.87 points on the Lawton scale, which represents moderate dependence, with a tendency to increase, meaning they are becoming more dependent. The analysis thus showed a trend towards an increase in multimorbidity and functional dependence related to aging and polypharmacy. Furthermore, it highlighted the need for family support in caregiving, which impacts the family's income. The intervention through multidisciplinary measures proposed by the ICOPE tool is a strategy recommended by PAHO, which aligns with the goals of the Decade of Healthy Aging (2020-2030). Thus, it will be possible to promote Social Development, ensuring quality of life and maintaining the functional capacity of older adults.

Keywords: aging; functional capacity; social development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Proposta de caracterização do processo de envelhecimento	24
Figura 2	Principais domínios da capacidade intrínseca	47
Figura 3	Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011.	50
Figura 4	Divisão geográfica da RRAS 13 – Araraquara-Barretos-Franca-Ribeirão Preto.	50
Figura 5	Distribuição de probabilidades (Curva de densidade de probabilidade) livre e sem normalidade hipotética nos dados desta variável, e com as regiões críticas de aceitação e rejeição de H_0 para um teste bilateral.	59
Figura 6	Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes.	70
Figura 7	Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes.	70
Figura 8	Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes, com a distribuição normal.	71
Figura 9	Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste t-Student, para idade dos pacientes.	73
Figura 10	Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.	74
Figura 11	Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.	75
Figura 12	Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes, com a distribuição normal.	76
Figura 13	Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste t-Student, para o número de medicações utilizadas pelos pacientes.	78
Figura 14	Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Katz dos 71 pacientes.	80
Figura 15	Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Katz dos 71 pacientes.	80
Figura 16	Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às pontuações da escala Katz dos 71 pacientes, com a distribuição normal.	81
Figura 17	Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da escala Katz.	83

Figura 18	Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes.	84
Figura 19	Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes.	84
Figura 20	Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes, com a distribuição normal.	86
Figura 21	Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da escala Lawton.	88

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Distribuição da proporção da população residente segundo a faixa etária e período do ano, 1980/2022, Brasil	27
Gráfico 2	Taxa de analfabetismo no Brasil, em percentual, segundo grupos de idade e cor ou raça.	31
Gráfico 3	Brasil: Pirâmide etária - 2060	32
Gráfico 4	Distribuição do sexo dos 73 pacientes	61
Gráfico 5	Distribuição das idades dos 73 pacientes	62
Gráfico 6	Distribuição do Nível de Escolaridade dos 73 pacientes	63
Gráfico 7	Distribuição do número de quedas dos 73 pacientes	64
Gráfico 8	Distribuição do Suporte Social (com quem mora) dos 73 pacientes	64
Gráfico 9	Distribuição da renda familiar dos 73 pacientes	65
Gráfico 10	Distribuição do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes	66
Gráfico 11	Distribuição da Escala de Katz desta amostra de 73 pacientes	67
Gráfico 12	Distribuição da Escala de Lawton desta amostra dos 73 pacientes	68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Princípios norteadores para a Década do Envelhecimento Saudável	41
Quadro 2	Escala de Katz – Atividades de Vida Diária	44
Quadro 3	Escala de Lawton – Atividades Instrumentais da Vida Diária	44
Quadro 4	Decisão do teste de hipótese com base no erro tipo 1(α)	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Análise do Fator de Bayes, para a rejeição de H_0 .	58
Tabela 2	Análise descritiva das idades dos 73 pacientes	69
Tabela 3	Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para as idades de 73 pacientes	72
Tabela 4	Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média das idades $\bar{x}_{idades} = 79,64$ anos, possa ser diferente de zero.	72
Tabela 5	Análise descritiva do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes	74
Tabela 6	Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para o número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.	77
Tabela 7	Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média do número de medicações $\bar{x}_{medicação} = 6,66$ medicações, possa ser diferente de zero.	77
Tabela 8	Análise descritiva das pontuações da escala Katz nos 71 pacientes.	79
Tabela 9	Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala Katz nos 71 pacientes.	82
Tabela 10	Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Katz $Md_{Katz} = 5,00$ pontos, possa ser diferente de zero.	82
Tabela 11	Análise descritiva das pontuações da escala Lawton nos 69 pacientes.	84
Tabela 12	Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala Lawton nos 69 pacientes.	87
Tabela 13	Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Lawton $Md_{Lawton} = 16,00$ pontos, possa ser diferente de zero.	87

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO	22
2.1	ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, ATIVO E BEM-SUCEDIDO	23
2.2	DETERMINANTES DO ENVELHECIMENTO	24
2.3	ENVELHECIMENTO NO BRASIL	25
2.4	TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA	26
2.5	IMPACTOS E PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NO BRASIL	28
3	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO NO BRASIL	33
4	A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37
4.1	OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU E A DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	39
4.2	A AVALIAÇÃO FUNCIONAL COMO FOCO DE CUIDADO AO IDOSO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL	41
4.3	ATENÇÃO INTEGRADA PARA A PESSOA IDOSA (ICOPE) E O CONCEITO DE CAPACIDADE INTRÍNSECA	45
5	OBJETIVOS	48
5.1	OBJETIVO GERAL	48
5.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	48
6	MATERIAIS E MÉTODOS	49
6.1	DELINEAMENTO DO ESTUDO	49
6.2	CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DO ESTUDO	49
6.3	ASPECTOS ÉTICOS	51
6.4	METODOLOGIA APLICADA PARA ANÁLISE DOS DADOS DOS PRONTUÁRIOS	51
6.4.1	Estatística Descritiva	52
6.4.2	Teste de Hipóteses e Erro Tipo 1 em Testes de Hipóteses	54
6.4.3	Teste de Shapiro-Wilk	56

6.4.4	Teste T-Student	56
6.4.5	Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon para Localização	58
7	RESULTADOS E DISCUSSÃO	61
7.1	ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS COLETADOS EM PRONTUÁRIOS DE 73 PACIENTES	61
7.2	ANÁLISE DESCRITIVA E INFERENCIAL DAS VARIÁVEIS IDADE, NÚMERO DE MEDICAÇÕES UTILIZADAS E ESCALAS DE KATZ E LAWTON DESAGREGADAS EM SEUS 73 PACIENTES	69
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	90
	REFERÊNCIAS	92
	ANEXO	98

1 INTRODUÇÃO

A redução da natalidade e da mortalidade estão levando a uma desaceleração do crescimento populacional e envelhecimento progressivo no mundo. Este fenômeno é complexo e irreversível, sendo tema prioritário na agenda governamental e exigindo intervenções do Estado e da sociedade através de políticas públicas que contemplem as demandas dessa nova estrutura social. Para isto, faz-se necessário entender o processo de envelhecimento em si, suas particularidades no aspecto físico (biológico), psíquico e social (Corvelo Delboni *et al.*, 2020).

Considera-se pessoa idosa, segundo a Organização Mundial de Saúde, o indivíduo que tem 60 anos ou mais em países em desenvolvimento, e 65 anos ou mais em países desenvolvidos. A própria concepção, com base na faixa etária, evidencia que o processo de envelhecimento acontece de forma diferente em cada local, sofrendo interferências culturais, econômicas, sociais e políticas (Corvelo Delboni *et al.*, 2020). Embora ocorra no mundo todo, está evoluindo de forma mais rápida nos países em desenvolvimento. Dos 15 países com mais de 10 milhões de idosos, sete são países em desenvolvimento (UNFPA, 2012).

Dados do Fundo de Populações das Nações Unidas também indicam que em 2050 10% da população africana terá 60 anos ou mais, comparada com 24% na Ásia, 24% na Oceania, 25% na América Latina e Caribe, 27% na América do Norte e 34% na Europa (UNFPA, 2012).

O envelhecimento populacional é caracterizado por desigualdades sociais, com piores indicadores da situação de saúde associados à pobreza e baixa escolaridade (Costa; Macinko, 2022, p. 149), que são mais acentuados em países em desenvolvimento. A dependência funcional (limitação para a realização das atividades de vida diária) entre idosos com mais de 75 anos é bastante variável entre os países (Costa; Macinko, 2022, p. 154), o que também reflete as desigualdades em relação ao acesso à saúde, educação e recursos financeiros.

A feminização do envelhecimento é outro fenômeno observado globalmente. Atualmente, para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais em todo o mundo, há 84 homens. E para cada grupo de 100 mulheres com 80 anos ou mais, existem apenas 61 homens (UNFPA, 2012). O entendimento de como envelhecer

afeta homens e mulheres de forma diferente, pois as relações de gênero estruturam todo o curso da vida e impactam no acesso à recursos e serviços de saúde e social (UNFPA, 2012).

As implicações do processo de envelhecimento populacional perpassam todos os aspectos da sociedade e impactam diretamente no Desenvolvimento das Nações, seja no campo econômico ou social/humano. Compreender este impacto se faz necessário para garantir a saúde da população, por esta ser um aspecto central do envelhecimento - que é associado à redução das reservas fisiológicas e das capacidades individuais (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

No âmbito individual, o envelhecimento muitas vezes é acompanhado por doenças, multimorbidades e conseqüente perda de autonomia e independência, que levam à perda de qualidade de vida e sofrimento. Com a perda funcional, também ocorre a necessidade maior de cuidados, com sobrecarga familiar e do Estado na garantia destes cuidados (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

No âmbito da saúde, a perda funcional aumenta a demanda por serviços médicos (Costa; Macinko, 2022, p. 149), medicamentos e insumos, por sobreposição das doenças crônicas às doenças infecto-contagiosas e endemias já existentes.

No âmbito econômico, o idoso dependente não é capaz de gerar renda. Seus gastos com saúde e cuidados são muitas vezes elevados, o que faz com que familiares deixem de trabalhar formalmente para se dedicarem aos mesmos (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016). Na ausência de um sistema de seguridade social, essas questões levam ao empobrecimento repentino da família (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

Assim, constata-se que vidas mais longas necessitam de novas abordagens na questão da saúde, cuidado e economia, sendo um desafio para as políticas públicas transformar a transição demográfica em oportunidade (OPAS, 2022). A manutenção da capacidade funcional, devido seu impacto nos vários domínios da saúde, permite que os indivíduos vivam por mais tempo mantendo sua independência e autonomia para poderem fazer aquilo que julgam importante e vivam suas vidas de forma plena (OMS, 2015).

Diante das novas demandas da transição demográfica, a OMS, em concordância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, propõe a Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030. Trata-se de uma iniciativa global para melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e

comunidades (OPAS, 2022). Por esta iniciativa, define-se que o envelhecimento saudável é a capacidade de manter a habilidade funcional de modo a manter o bem-estar em idades avançadas (OPAS, 2022), e que a promoção do envelhecimento saudável é possível através de esforços coordenados entre os vários segmentos governamentais e não governamentais.

O aspecto que envolve a Saúde e Desenvolvimento Social no contexto do envelhecimento populacional é o propósito de estudo desta dissertação. O objetivo geral é avaliar o perfil funcional (através das escalas de Katz e Lawton) de uma amostra da população idosa do município de Franca, para gerar dados que possam levar a estratégias de enfrentamento do envelhecimento populacional neste território - com base nas propostas da Década do Envelhecimento Saudável. O objetivo específico é analisar o perfil sócio-epidemiológico desta amostra, com informações sobre idade, sexo, renda, suporte social, quantidade de medicações em uso e histórico de quedas no último ano - pois entende-se que essas variáveis se interrelacionam com a capacidade funcional e qualidade de vida e fazem parte da Avaliação geriátrica ampla (Brasil, 2010). Considerou-se como definição de idoso as pessoas com 60 anos ou mais (OPAS, 2023). Assim, a população estudada foi composta pelos idosos com mais de 60 anos atendidos em um ambulatório acadêmico de geriatria da cidade de Franca - SP. A metodologia utilizada foi uma abordagem descritiva e quantitativa através da coleta de dados do prontuário eletrônico destes pacientes, que passaram por atendimento médico no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 - este recorte de tempo se deu pois em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, os atendimentos foram suspensos.

O estudo foi organizado em 8 sessões. A primeira corresponde à introdução, enquanto as sete subsequentes tratam da fundamentação teórica.

Na segunda seção é apresentada uma introdução ao conceito de envelhecimento, suas bases teóricas e biológicas, além de abordar as nuances semânticas entre envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido e envelhecimento saudável. São discutidos os determinantes do processo de envelhecimento. Também traz informações sobre o envelhecimento no Brasil, incluindo a transição demográfica, a transição epidemiológica e os impactos desse processo no país, com dados do Censo de 2022.

A terceira seção discorre sobre as principais políticas públicas nacionais voltadas para o idoso, destacando a linha do tempo da criação destas políticas e suas conquistas sociais.

A quarta seção aborda a relação entre o processo de envelhecimento, a saúde e o desenvolvimento social, analisando as diferenças entre o desenvolvimento econômico e social, o conceito de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen e como o processo de envelhecimento afeta tanto a promoção do desenvolvimento social quanto a demanda deste para a manutenção da qualidade de vida. Também se aprofunda nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e na Década do Envelhecimento Saudável da OMS, refletindo sobre como essas iniciativas surgiram e o objetivo da OMS em promover o desenvolvimento social global por meio do envelhecimento saudável. A quarta sessão apresenta ainda o conceito de avaliação funcional e as principais escalas utilizadas em geriatria e gerontologia para essa avaliação na prática clínica do cuidado ao idoso, que se referem à avaliação das atividades básicas e instrumentais de vida diária. Por fim, traz a estratégia desenvolvida pela OMS para a plena execução da iniciativa da Década do Envelhecimento Saudável, denominada ICOPE - Atenção Integrada à Pessoa Idosa.

A linha de pesquisa contempla o Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, através da discussão das políticas nacionais e municipais voltadas ao idoso, entendendo que as mesmas impactam na qualidade de vida das pessoas e assim, no desenvolvimento social. Porém, leva em conta também o desenvolvimento regional pois avalia diferentes aspectos e sujeitos num determinado território, suas especificidades e indicadores, conforme a definição de Kist e Areosa (2014).

A quinta seção refere-se aos objetivos do estudo, que buscou gerar dados que embasem políticas públicas para a promoção do envelhecimento saudável.

A sexta seção refere-se à metodologia adotada, que se trata de um estudo descritivo, com base quantitativa, detalhando a estrutura analítica dos dados. Na sequência, a sétima seção apresenta e discute os resultados, seguida, finalmente, da oitava seção, que traz as considerações finais, resumindo o que foi identificado durante a pesquisa.

2 O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um processo comum a todos os seres vivos, embora não se tenha clareza sobre a dinâmica e a natureza do fenômeno. Em uma visão prioritariamente biogerontológica, é visto como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo à morte (Papaléo, 2022).

Outro conceito refere-se à funcionalidade, em que o envelhecimento pode ser definido pela redução da capacidade homeostática diante de eventos estressores ao organismo (Papaléo, 2022).

O processo de envelhecimento é heterogêneo, de modo que influências genéticas, socioeconômicas e culturais podem impactar na forma pela qual um indivíduo envelhece. Há discussões sobre quando passamos a envelhecer (se após à concepção, a terceira década de vida, ao final da vida). Como não possuímos marcadores biológicos que definam o início do envelhecimento, é difícil precisar a idade biológica que justifique o envelhecimento (Papaléo, 2022). Ainda assim, utiliza-se o critério cronológico na maioria das discussões que envolvem o envelhecimento, sejam científicas ou institucionais, considerando-se idosa a pessoa com mais de 65 anos (Papaléo, 2022). Entretanto, 60 anos é a idade adotada nos países em desenvolvimento e, por sua vez, no Brasil, conforme estabelecido legalmente pelo Estatuto do Idoso (Brasil, 2023). Apesar disso, no Censo de 2022 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considerou idosos pessoas acima de 65 anos, para fins de comparação com pesquisas internacionais (IBGE, 2023).

O conceito de idade funcional pode ser entendido como o grau de conservação do nível de capacidade adaptativa em comparação à cronológica, e está intimamente ligado à idade biológica. Porém, há que se considerar que a idade funcional é diretamente afetada pelas condições de vida do indivíduo e, em países em desenvolvimento, o envelhecimento funcional precede o cronológico (Papaléo, 2022).

No entanto, entender o processo de envelhecimento apenas pela ótica de perda de capacidades é um tanto simplista. Atualmente, dispomos cada vez mais

de recursos e conhecimento científico que nos levam a envelhecer de forma ativa e com qualidade de vida, preservando nossa autonomia e independência (Papaléo, 2022).

2.1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, ATIVO E BEM-SUCEDIDO

As discussões sobre o envelhecimento bem-sucedido remontam à década de 1980, quando este foi um dos principais temas do Congresso Anual da Sociedade Americana de Gerontologia, seguido pelo estudo publicado no periódico *Science - Human Aging: Usual and Successful Aging*. Nele, discute-se que os declínios relacionados ao envelhecimento decorrem da interação entre fatores extrínsecos não relacionados com doenças, como estilo de vida, fatores psicossociais e influências genéticas. Foi neste estudo que os autores Rowe e Kahn sugeriram a diferenciação entre envelhecimento normal e o envelhecimento bem-sucedido (em que o indivíduo teria perdas mínimas das funções fisiológicas). Para estes autores, classifica-se o envelhecimento bem-sucedido por meio de três critérios objetivos: a baixa probabilidade de doenças/incapacidades; altos níveis de desempenho físico e cognitivo, e engajamento ativo com a vida (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 435).

Outros dois autores - Paul e Margaret Baltes - apresentam um outro conceito de envelhecimento bem-sucedido, entendendo este como um processo adaptativo, com enfoque psicossocial. Desta forma, tivemos duas correntes de definição para o envelhecimento bem-sucedido: a que o caracteriza como um estado mental (satisfação com a vida, reserva psicológica e funcionamento social), e a que o caracteriza no aspecto biomédico, como a ausência de doenças ou incapacidades associadas ao bom funcionamento físico e cognitivo (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 436).

Não há um consenso na concepção de envelhecimento bem-sucedido, existindo uma variedade de termos para nomear este processo. Os mais usados são envelhecimento saudável, bem-sucedido e ativo. Do ponto de vista semântico, o Envelhecimento Saudável está mais relacionado ao estado de saúde e funcionalidade. Já o termo Envelhecimento Bem-sucedido tem um sentido mais amplo, que inclui fatores biomédicos, sociais e psicológicos. O Envelhecimento Ativo foi um conceito trazido pela OMS, em 2002, para instituir políticas voltadas à promoção da saúde,


participação e segurança da população idosa (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 436).

Em 2015, a OMS substituiu o termo "Envelhecimento Ativo" por "Envelhecimento Saudável" ao se referir às estratégias propostas para a década 2020-2030 (OMS, 2015).

2.2 DETERMINANTES DO ENVELHECIMENTO

De acordo com Speranza; Werle e Moreira (2022), no âmbito individual, o processo de envelhecimento é determinado em 25% pela carga genética e em 75% por fatores extrínsecos. Os autores trazem um esquema didático proposto por Papaléo para explicitar essas relações:

Figura 1 - Proposta de caracterização do processo de envelhecimento.



Fonte: Adaptada de Papaléo *et al.*, 2003.

É possível modificar fatores de risco genéticos que levam a condições crônicas através de mudança de estilo de vida e comportamento. Medidas de atividade física, alimentação saudável, abstinência de fumo e álcool, tratamento clínico e prevenção de doenças levam ao aumento da longevidade e qualidade de vida, mesmo nos indivíduos já idosos. Além dos benefícios individuais, essas medidas também

trazem bons resultados à saúde pública, à economia e à sociedade (Speranza; Werle; Moreira, 2022 p. 441).

Assim, propôs-se a Prescrição para Longevidade, dada a relevância dos impactos da mudança de estilo de vida para a melhoria da saúde. Esta prescrição visa alcançar o envelhecimento bem-sucedido por meio de 8 estratégias:

- A preservação da vitalidade mental
- O cultivo das relações pessoais
- O engajamento social e o senso de propósito
- A preservação do sono
- O manejo do estresse
- A atividade física regular
- A alimentação saudável
- A prática de prevenção de doenças

As chamadas Blue Zones são locais estudados por sua população longeva, nas quais os idosos têm uma vida robusta e saudável. São cinco as regiões assim conhecidas: Sardenha (Itália), Okinawa (Japão), Loma Linda (Califórnia), Nicoya (Costa Rica) e Ikaria (Grécia). Essas regiões têm características comuns: isolamento dos grandes centros, senso de pertencimento, tradição de veneração aos ancestrais e senso de propósito. A população compartilha um estilo de vida composto por uma dieta simples, forte integração social, grande envolvimento familiar, rotinas religiosas e atividade física regular e vigorosa, principalmente caminhadas (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 444).

Diante do exposto, é possível conceber o envelhecimento não do ponto de visto do declínio funcional, deterioração orgânica e dependência (conceito este relacionado à senilidade), mas sim, pela ótica da senescência, em que é possível desfrutar do ganho dos anos de vida com qualidade, saúde, independência e autonomia.

2.3 ENVELHECIMENTO NO BRASIL

A razão entre o grupo de pessoas de 65 anos ou mais em relação ao de 0 a 14 anos é chamado de Índice de Envelhecimento. Quanto maior o índice, mais envelhecida é a população. Em 2022, chegamos ao número de 55,2, indicando que,

para 100 crianças de 0 a 14 anos há 55,2 pessoas com 65 anos ou mais. Em 2010, esse índice era de 30,7 (IBGE, 2023). Este é o conceito de envelhecimento populacional.

Projeta-se que, até 2060, ocorrerá um aumento significativo da população idosa, passando de 9,7%, em 2004, para 33,7% em 2050 (Braga *et al.*, 2016). A base da pirâmide etária brasileira está se estreitando às custas da redução da fecundidade e dos nascimentos. O fato vem ocorrendo visivelmente desde os anos 1990, com a redução da população jovem e aumento da população adulta (IBGE, 2023). Na década de 1980, o país tinha 4% da população com 65 anos ou mais, número que chegou a 10,9% em 2022 (IBGE, 2023).

No Brasil, o impacto social do envelhecimento tende a ser mais importante que o biológico (Papaléo, 2022). Embora seja um fenômeno mundial, aqui o processo pode ser considerado mais complexo, pois o país ainda se depara com questões de desigualdade social, acesso à saúde (agora com aumento das doenças crônicas associadas ainda à alta prevalência de doenças infectocontagiosas), educação e saneamento básico. O aumento das doenças crônico-degenerativas acarreta maiores custos com a saúde e seguridade social (Braga *et al.*, 2016).

2.4 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA


A transição demográfica corresponde ao aumento da proporção de idosos em relação à população jovem. Este processo pode ser explicado por dois fatores: o aumento da expectativa de vida e a queda na fecundidade. O primeiro está relacionado às melhorias nas condições de vida - urbanização, saneamento básico, políticas públicas materno-infantis e vacinação. Já a queda da fecundidade relaciona-se à entrada da mulher no mercado de trabalho e à disseminação de métodos contraceptivos. Porém, o aumento da longevidade também contribui para esta transição e o seu impacto relaciona-se ao fato destes idosos chegaram à idade avançada com saúde ou não (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

Estima-se que a população com mais de 60 anos aumentará de 25 milhões para 50 milhões em 20 anos, representando mais de 21% da população. A população com mais de 80 anos chegará a quase 9 milhões (Gadelha *et al.*, 2022)

Segundo dados do Censo 2022, no país, o total de pessoas com 65 anos ou mais teve alta de 57,4% em relação ao ano de 2010, passando de 14.081.477

(7,4%) para 22.169.101 (10,9%), conforme apresentado no Gráfico 1. Considerando a população com 60 anos ou mais, o aumento foi de 56% em relação a 2010 (IBGE, 2023).

Gráfico 1 - Distribuição da proporção da população residente segundo a faixa etária e período de ano, 1980/2022, Brasil.



Extraído de: IBGE, Censo 2022; online.

Em relação ao envelhecimento por regiões do país, o Sul e o Sudeste apresentam as maiores proporções de idosos - 12,2% e 12,1% respectivamente. A região Norte é a mais jovem, seguida pelo Nordeste. O Centro-Oeste possui uma estrutura intermediária (IBGE, 2022).

A transição demográfica no país também reflete suas desigualdades regionais, pois embora o envelhecimento populacional seja uma tendência nacional, o processo está mais adiantado no Sul e Sudeste em decorrência da maior expectativa de vida e menor fecundidade nessas regiões (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 104).

No Estado de São Paulo, a taxa de crescimento anual da população acima de 60 anos quadruplicou no período de 1950 a 2022, com um aumento da proporção de idosos de 4,4% para 16,2% (SEADE, 2022). O índice de envelhecimento nesse estado, segundo dados do Censo 2022, é de 59,97 (IBGE, 2023). Já nos municípios, o índice é variado, chegando a ser superior a 100% nas cidades com menos de 10 mil habitantes (SEADE, 2022). A feminização do envelhecimento também é uma realidade no estado de São Paulo, em que a população idosa feminina, numericamente, supera em 32% a masculina (SEADE, 2023).

Já a transição epidemiológica descreve o padrão de doenças que se tornam predominantes em resposta às mudanças sociais. No Brasil, as principais causas de óbito atualmente são doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias. Essa transição é influenciada pelo envelhecimento da população, resultando no aumento de doenças crônicas e multimorbidade, em que várias doenças ocorrem simultaneamente em um indivíduo. Além disso, a transição epidemiológica é heterogênea nas diferentes regiões do país: no Sul e Sudeste, por exemplo, as mortes por Alzheimer e outras demências são mais comuns do que em outras regiões (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 107).

2.5 IMPACTOS E PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL

Embora a transição demográfica seja decorrente da maior expectativa de vida e menor taxa de fecundidade, a longevidade é um fator importante para este processo (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

Se por um lado, o aumento de longevidade é uma conquista da sociedade, também gera desafios, pois o envelhecimento populacional resultará em um aumento da demanda no sistema de bem-estar (especialmente no sistema de saúde), em um país onde a população ainda convive com dificuldades básicas, como acesso à alimentação, moradia, saneamento básico e cidadania (Gadelha *et al.*, 2022). O aumento das doenças crônicas que acompanham o processo de envelhecimento aprofundará a complexidade epidemiológica, pois as doenças transmissíveis, as causas externas e as emergências sanitárias continuarão a demandar do Sistema Único de Saúde (SUS) (Lima; Gadelha, 2021).

Outro fenômeno que se insere neste contexto é o da multimorbidade, no qual o indivíduo é acometido por mais de uma doença ao mesmo tempo. Isso gera um grande impacto na qualidade de vida em razão da interação dessas doenças e seus tratamentos e eleva o risco de mortalidade (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 107). A redução das capacidades individuais em decorrência da multimorbidade também leva a um aumento na razão de dependência: população com menos de 15 anos ou mais de 65 anos (população economicamente dependente) em relação à população de 15 a 64 anos de idade (população economicamente ativa) (IPEA, 2013).

Entre o período de 2012 a 2021, a razão de dependência de jovens passou de 34,4 para 29,9 crianças e adolescentes para cada 100 pessoas em idade potencialmente ativas. Já a razão de dependência dos idosos aumentou de 11,2 para 14,7 (Agência Brasil, 2012).

Os idosos representam o grupo com maior necessidade de cuidados de longo prazo, pois são mais acometidos por doenças crônicas que necessitam de cuidados especiais por gerarem dependência funcional (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).

Em relação à questão socioeconômica, os idosos, em geral, são mais pobres do que os adultos da mesma população. O Brasil, assim como os demais países da América Latina, enfrenta o processo de envelhecimento populacional em um contexto de pobreza elevada. Um aspecto a ser evidenciado, em nosso país, é que com a universalização da seguridade social, muitas famílias passam a contar com a renda do idoso para seu sustento e sobrevivência (Braga *et al.*, 2016).

Outra característica do processo de envelhecimento populacional é a urbanização, que acompanha o movimento da população geral (Braga *et al.*, 2016). Os grandes centros urbanos são marcados por sua impessoalidade, individualismo, violência, desigualdade social e valorização da população laboralmente ativa. O impacto deste processo se reflete diretamente na necessidade de adaptação das cidades às necessidades da população que envelhece. Como traz Correa (2016), “a velhice pode ser despotencializada quando suas possibilidades de circulação e construção de redes de sociabilidade encontram-se frágeis e limitadas pelo entorno social, que muitas vezes atribui ao idoso aposentado o lugar do espaço doméstico”.

A feminização do envelhecimento também é outro aspecto a ser considerado. Segundo dados do IBGE (2022), o Brasil possui 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Tal fato pode ser atribuído tanto a fatores biológicos quanto à


diferença de exposição aos fatores de risco de mortalidade (Papaléo, 2022). A razão de sexo - número de homens em relação ao grupo de 100 mulheres - foi de 94,2 segundo o Censo de 2022. Em 1980, essa razão era 98,7. Desde a infância até a fase adulta, a mortalidade entre os homens é maior, e com a redução da população de 0 a 14 anos e o aumento da de 65 ou mais anos, há um aumento da proporção de mulheres, pois estas vivem mais (IBGE, 2022). Isto ocorre em todas as grandes regiões do país.

As implicações deste fenômeno se refletem no âmbito social, pois grande parte das mulheres é viúva, vive só, não tem experiência de trabalho no mercado formal, são menos educadas e mais empobrecidas financeiramente (Braga *et al.*, 2016). Além disso, as mulheres idosas estão mais expostas a doenças crônico-degenerativas (Papaléo, 2022).

Por outro lado, há maior conectividade das mulheres com recursos sociais e interpessoais, que impactam na qualidade de vida e funcionam como proteção para o envelhecimento saudável. Elas são mais participativas em atividades relacionadas com as políticas de saúde, fóruns, conselhos e Universidade Aberta da Terceira Idade (Papaléo, 2022).

O analfabetismo é outra característica do envelhecimento populacional brasileiro. Embora em queda, ainda se percebe que quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção de analfabetos, chegando a 16% em pessoas com 60 anos ou mais. São pessoas que não tiveram acesso à educação na infância/juventude e permaneceram analfabetas. A taxa também é maior entre as mulheres, de 16,3%, enquanto a dos homens é de 15,7%, assim como é maior entre pretos ou pardos - 23,3% - em comparação aos brancos, 9,3% (IBGE, 2022).


Gráfico 2 - Taxa de analfabetismo no Brasil, em percentual, segundo grupos de idade e cor ou raça.



Fonte: IBGE. PNAD Contínua Educação, 2022; online.

Outro aspecto a ser discutido no processo de envelhecimento nacional é a questão racial. A população negra geral do país corresponde a 56% do total, segundo dados do IBGE (2022), e a parcela de idosos geral 15,8%. Porém, quando avaliamos a parcela da população negra entre os idosos, esta chega a 47,7% (Agência Brasil, 2023).

A pobreza e a sobre-mortalidade vivenciada por esta população correlaciona-se com a menor expectativa de vida e longevidade em relação à população branca (Papaléo, 2022). Este dado é mais um desafio a ser enfrentado pelo país, na busca pela justiça social, garantia de direitos e liberdades.

Gráfico 3 - Brasil: Pirâmide etária - 2060.

Fonte: IBGE, Brasil, projeção da população por sexo e grupos de idade, 2000-2060; online.

Diante das questões apresentadas, observa-se que, para atender às demandas sociais advindas do processo de envelhecimento populacional - e suas particularidades regionais, são necessárias políticas públicas de enfrentamento e organização social para o envelhecimento.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO NO BRASIL

A Política Nacional do Idoso (PNI) foi aprovada em 1994 pela Lei 8.842/1994. O objetivo é assegurar os direitos sociais do idoso, de forma equitativa, considerando suas necessidades sociais, físicas, econômicas e políticas. Ela define idoso como a pessoa acima de 60 anos, no Brasil (Pinheiro; Aersa, 2018).

A PNI criou condições de promoção de qualidade de vida e longevidade, tanto para os idosos já existentes, quanto para os que irão envelhecer, reafirmando os princípios constitucionais e garantindo a manutenção da autonomia, dignidade, direito à vida, integração e participação social (Braga *et al.*, 2016).

Em 2003, ocorreu a formulação do Estatuto do Idoso, com intensa participação de entidades de defesa dos interesses da população idosa. O Estatuto regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (Brasil, 2003). Veio em resposta à não efetivação das diretrizes propostas na PNI, principalmente pela mesma não ter estabelecido a quem caberia garantir juridicamente os direitos dos idosos. O Estatuto criou, então, o sistema de garantias de direitos da pessoa idosa e é composto por: Conselho do Idoso, SUS, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Vigilância em Saúde, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil.

Cabe citar que o Estatuto foi inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), especialmente no que se refere aos direitos fundamentais, tais como: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 2023, p. 10).

No setor Saúde, a Política Nacional de Saúde do Idoso foi elaborada em 1999 e destaca a perda funcional como o principal desafio para a saúde dessa população, visando garantir a manutenção da autonomia e independência dos idosos. Segundo o Ministério da Saúde (2006), a finalidade primordial desta política é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos idosos, por meio de ações coletivas e individuais de saúde.

A Portaria reconhecia o apoio informal e familiar como um aspecto fundamental para a saúde do idoso, sem desconsiderar o papel do Estado na

promoção, proteção e recuperação da saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as suas esferas (Brasil, 2006).

O aumento das doenças crônico-degenerativas associadas ao envelhecimento populacional gera despesas com serviços médicos e é um desafio para as autoridades sanitárias (Braga *et al.*, 2016). Portanto, o objetivo principal desta política pública foi promover o envelhecimento saudável.

Em 2006, a Política Nacional de Saúde do Idoso é revogada e passa a ser denominada Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), visando enfrentar as fragilidades do SUS, das famílias e dos idosos, além de promover o envelhecimento ativo, seguindo as diretrizes da ONU de 2002 (Alcântara *et al.*, 2016).

Também em 2006, é publicado o Pacto pela Saúde, que estabelece prioridades sanitárias nacionais, dividido em três componentes: Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão e Pacto pela Vida. Neste último, a saúde do idoso é uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas do governo (Jaccoud; Menezes, 2020¹).

O Pacto pela Vida, no componente Saúde do Idoso, traz as seguintes diretrizes (Brasil, 2006):

- a) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- b) atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
- c) estímulos às ações intersetoriais, visando à integridade da atenção;
- d) implantação de serviços de atenção domiciliar;
- e) acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco;
- f) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa;
- g) fortalecimento da participação social;
- h) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa;

¹ As outras 5 prioridades elencadas no Pacto pela Vida são: Controle do câncer de colo de útero e mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da resposta às doenças emergentes e endemias, Promoção da Saúde com ênfase na atividade física e alimentação saudável e Fortalecimento da Atenção Básica. Diretrizes Operacionais para os Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Ministério da Saúde, 2006.

- i) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;
- j) promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa;
- k) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

A execução das diretrizes da Política no SUS inclui a assistência pelas Equipes de Saúde da família, Hospitais Gerais e Centros de Referência à Saúde do Idoso (Braga *et al.*, 2016).

Outro setor com um arcabouço legal expressivo voltado à população da pessoa idosa é o da Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a PNI são apoiadas técnica e financeiramente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que promove serviços de proteção social e projetos executados nas três esferas do governo e entidades sociais voltadas ao atendimento da pessoa idosa, principalmente aquelas em maior condição de vulnerabilidade social. Constituem propostas deste Ministério (elaboradas pelos estados e municípios) os Centros e Grupos de Convivência, as Instituições de Longa Permanência, os Centros-Dia, as Casas-Lar, as Repúblicas e o Benefício de Prestação continuada (BPC) (Braga *et al.*, 2016).

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 houve um processo intenso de readequação das leis infraconstitucionais. Neste íterim, a Lei Orgânica da Seguridade Social nº 81.212, de 24 de julho de 1991, definiu que a seguridade compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade que visa assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social (Brasil, 1991).

No entanto, no que tange à aposentadoria e pensões, é sabido que ainda nos dias atuais o retorno não corresponde às contribuições pagas ao longo da vida. Com a diminuição dos rendimentos, muitos idosos precisam voltar ao mercado de trabalho (Braga *et al.*, 2016), o que pode impactar direta ou indiretamente sua funcionalidade e condição de saúde.

Para além da Seguridade Social, que envolve saúde, assistência social e previdência, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso também promovem o desenvolvimento de programas educacionais voltados para os idosos, visando facilitar o acesso à informação, promover a inclusão digital e, principalmente, apoiar a

criação de universidades abertas da terceira idade, tanto em instituições públicas de ensino superior quanto em instituições privadas (Braga *et al.*, 2016). Programas nas esferas de esporte, turismo e lazer específicos para a população idosa também são estimuladas pelo arcabouço normativo nacional e sua implementação varia de município a município.

A título de síntese, apresenta-se a Linha do tempo das principais Políticas Públicas voltadas ao Idoso:

- 1994 - Política Nacional da Pessoa Idosa (Lei 8.842/1994)
- 1999 - Política Nacional de Saúde do idoso (PNSI)
- 2003 - Formulação do Estatuto do Idoso
- 2006 - A PNSI é revogada, passando a ser chamada Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
- 2006 - Cria-se o Pacto pela Saúde, que contempla o Pacto pela Vida - em que o idoso é incluído entre as seis prioridades em saúde pelas 3 esferas de governo

4 A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Na concepção do autor e economista Celso Furtado, o desenvolvimento pode ser definido como um processo de mudança estrutural no qual a introdução de inovações transforma a base produtiva e tecnológica para garantir o atendimento das crescentes necessidades sociais (Gadelha; Costa, 2012, p. 15). Nessa prerrogativa, considera-se a relevância tanto do bem-estar da população quanto da politização das decisões econômicas referentes às tecnologias adotadas na sociedade.

Na perspectiva ampliada sobre desenvolvimento, a Saúde tem papel de destaque, pois estrutura o estado de bem-estar social (trata-se de uma necessidade humana fundamental), além de promover economia através da geração de riqueza, renda e empregos no país. Assim, a relação entre saúde e desenvolvimento é um processo dinâmico que envolve crescimento econômico, mudanças na estrutura produtiva e melhora no padrão de vida da população (Gadelha; Costa, 2012, p. 15).

A relação entre Desenvolvimento e Saúde envolve várias conexões e interações. Os autores Reis; Barbosa e Pimentel (2016, p. 91) avaliam que, se por um lado, uma pessoa mais saudável será capaz de trabalhar e gerar renda, o ambiente socioeconômico que favorece boas condições de renda e educação promove hábitos de vida saudável e acesso a serviços de saúde de qualidade.

Em relação ao envelhecimento, a mesma autora reflete que investir na melhoria da saúde e na promoção da longevidade pode ser uma estratégia de desenvolvimento capaz de reduzir a pobreza, com efeitos de crescimento em longo prazo dos países em desenvolvimento.

A saúde individual é um aspecto básico do Desenvolvimento Humano, assim, por extensão, a saúde coletiva é um elemento básico do Desenvolvimento Social (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 90).

Amartya Sen (2000), filósofo e economista indiano, argumenta que o desenvolvimento, para além do crescimento econômico, é um processo de ampliação das liberdades individuais. Ele redefine o conceito de desenvolvimento, deslocando o foco do aspecto econômico para o Desenvolvimento Humano, que é definido como a expansão das liberdades das pessoas em relação às suas capacidades e oportunidades, permitindo que elas escolham o tipo de vida que desejam (PNUD,

2013, p. 23). Assim, é fundamental reduzir as desigualdades sociais e proporcionar à população acesso à saúde, educação, trabalho, lazer e um ambiente de vida saudável para garantir a realização dessas liberdades (Sen, 2000).

Nesse contexto, o desenvolvimento só pode ser alcançado quando há valorização dos indivíduos e quando o bem-estar das gerações presentes e futuras é protegido. Em outras palavras, uma região só pode se desenvolver, conforme a proposição de Amartya Sen (2000), se as liberdades das pessoas que ali vivem forem garantidas. Este autor argumenta que a medida de desenvolvimento de um país não deve se limitar a indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB).

Em 1990, foi introduzido no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, com a colaboração de Amartya Sen (PNUD, 2013, p. 23). O IDH é uma maneira de medir o desenvolvimento de uma localidade ou país com base no bem-estar das pessoas, em suas capacidades e liberdades de escolha. Ele considera a renda e a riqueza como meios para as pessoas alcançarem a vida que desejam, em contraposição à visão econômica do desenvolvimento baseada apenas no PIB (PNUD, 2013, p. 23).

O IDH abrange três indicadores principais: longevidade (vida longa e saudável), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). Esses indicadores são essenciais para ampliar as liberdades das pessoas, pois determinam o bem-estar por meio de escolhas livres e informadas, fundamentadas em habilidades e conhecimentos adquiridos na ausência de privações das necessidades básicas (PNUD, 2013, p. 25).

Mais especificamente, na visão de Sen (2000), a liberdade também pode ser considerada como meio de evitar a morte prematura. Isso nos leva a compreender que o processo de envelhecimento populacional está relacionado ao desenvolvimento da sociedade na perspectiva do Desenvolvimento Humano. Considerando que o envelhecimento é uma consequência do avanço na qualidade de vida da população, é essencial garantir as liberdades individuais e coletivas dos idosos para atender às suas necessidades específicas.

'no caso específico do idoso, a dimensão de liberdade e consequentemente, o exercício da cidadania, depende da criação de condições favoráveis à manutenção de seu poder de decisão, escolha e deliberação. Tais condições serão efetivadas quando a sociedade perceber

que precisa mudar seu comportamento em relação ao envelhecimento (Braga, 2001, p. 7)'.

As doenças crônicas, as multimorbidades e as fragilidades representam importantes limitações para a qualidade de vida, afetando a capacidade de trabalho e a realização de objetivos pessoais, o que por sua vez impacta negativamente na independência e na felicidade dos idosos (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016). Pode-se inferir que tais condições privam os indivíduos de suas liberdades.

4.1 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU E A DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Contextualizados sobre o conceito de desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas (ONU) propõe os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 17 ODS da Agenda 2030. Busca-se concretizar um plano de ação de escopo mundial para a melhoria de vida das pessoas, minimizando desigualdades, garantindo liberdades e preservando o planeta para gerações futuras - garantindo também as liberdades das gerações que virão. "Para um desenvolvimento sustentável e para atingir os objetivos da Agenda 2030, as sociedades devem estar preparadas e assumir uma postura sensível às necessidades das populações idosas de hoje e do futuro (OPAS, 2020a)".

Neste cenário, a OPAS (Organização Pan Americana de Saúde - braço da OMS/ONU) cria a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), seguindo a Agenda 2030. Esta iniciativa compreende que o aumento da expectativa de vida é uma das grandes conquistas coletivas, pois reflete os avanços no desenvolvimento social, econômico e na saúde. Considera que este é um recurso valioso, pois proporciona a reflexão não apenas do que é ser uma pessoa idosa, mas também no planejamento de toda uma vida. Porém observa que não basta apenas aumentar os anos de vida, mas sim, acrescentar vida aos anos que virão (OPAS, 2020a).

A Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020, é a principal estratégia para construir uma sociedade para todas as idades. Esta iniciativa global reúne os esforços dos governos, da sociedade civil, das agências internacionais, das equipes profissionais, da academia, dos meios de comunicação social e do setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, das suas famílias e das suas comunidades. Baseia-se em orientações anteriores, como a Estratégia Global e o Plano de Ação da Organização

Mundial da Saúde sobre Envelhecimento e Saúde 2016-2020, a Declaração Política e o Plano de Ação das Nações Unidas de Madri sobre o Envelhecimento e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (OPAS, 2020a, p. 1).

Envelhecimento Saudável é a capacidade de desenvolver e manter a habilidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada (OPAS, 2020). Esta, por sua vez, é determinada pela capacidade intrínseca, que corresponde à combinação das capacidades individuais do indivíduo, associadas ao ambiente que ele vive e suas interações. Esse conceito envolve todo o curso de vida e é importante para todos - não apenas para aqueles que estão livres de doenças - e sofre impactos de vários fatores, como mudanças fisiológicas, estilo de vida e influência ambiental. Assim, o Envelhecimento Saudável está ligado aos recursos sociais e econômicos e às oportunidades disponíveis ao longo da vida, que podem influenciar as pessoas a tomarem decisões saudáveis (OPAS, 2020a, p. 2), e é impactado negativamente pelas falhas nas políticas públicas nas áreas de saúde, educação, emprego e renda, que se retroalimentam e se acumulam ao longo da vida.

De acordo com a OPAS (2020a), “pessoas idosas com saúde debilitada trabalham menos, ganham menos e se aposentam mais cedo; a cultura e a etnia são importantes moderadores da iniquidade, resultando em trajetórias de envelhecimento bastante diferentes”. Porém envelhecer de forma saudável pode ser uma realidade, através da melhoria em múltiplos níveis e múltiplos setores, e pela mudança do foco de que o envelhecimento saudável é a ausência de doenças para a promoção da habilidade funcional, que permite ao idoso ser e fazer aquilo que valoriza.

Por sua vez, as principais áreas de atuação da Década são:

- mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento;
- garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas;
- entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa;
- propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem (OPAS, 2020a).

Quadro 1 - Princípios norteadores para a Década do Envelhecimento Saudável.

Integrada e indivisível	Todas as partes interessadas participantes da implementação abordam todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma conjunta, não como uma lista de objetivos a partir da qual selecionam e escolhem.
Inclusiva	Envolve todos os segmentos da sociedade, independente de idade, gênero, etnia, capacidade, localização ou outras categorias sociais.
Parcerias com múltiplas partes interessadas	São mobilizadas parcerias com múltiplas partes interessadas para o compartilhamento de conhecimento, expertise, tecnologia e recursos.
Universal	Envolve todos os países, independentemente do nível de renda e do status de desenvolvimento, em um trabalho abrangente pelo desenvolvimento sustentável adaptado a cada contexto e população, conforme necessário.
Não deixa ninguém para trás	Aplicável a todas as pessoas, independente de quem sejam e onde estejam, tendo como alvo seus desafios e vulnerabilidade específicos.
Equidade	Defende oportunidades iguais e justas para o aproveitamento dos determinantes e facilitadores do envelhecimento saudável, incluindo status social e econômico, idade, gênero, local de nascimento ou residência, status migratório e nível de capacidade. Às vezes, isso pode demandar uma atenção desigual a alguns grupos populacionais, de modo a garantir o maior benefício aos membros menos favorecidos, mais vulneráveis e mais marginalizados da sociedade.
Solidariedade intergeracional	Proporciona coesão e uma troca interativa entre gerações, apoiando a saúde e o bem-estar de todas as pessoas.
Compromisso	Encoraja um trabalho de 10 anos e que adentre um prazo mais longo.
Sem danos	Empenha os países na proteção do bem-estar de todas as partes interessadas e na minimização de qualquer dano previsível a outros grupos.

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde, 2020a online.

4.2 A AVALIAÇÃO FUNCIONAL COMO FOCO DO CUIDADO AO IDOSO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL

Entende-se que o envelhecimento populacional pode ser considerado um reflexo do desenvolvimento social, com a melhora da expectativa de vida. Porém, partindo do conceito do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, apenas seremos livres se mantivermos nossa autonomia e independência (Sen, 2000, p.33).

Considerando que a natureza do processo de envelhecimento perpassa todos os aspectos da vida do indivíduo, desde o biológico ao social, a garantia da

manutenção das liberdades requer uma avaliação multidimensional e integrada da pessoa que envelhece (Papaléo, 2022).

Como citado anteriormente, a OMS afirma que o envelhecimento saudável é “o processo de desenvolver e manter a habilidade funcional que possibilita o bem-estar na idade avançada” (OPAS, 2020a).

Desta forma, o envelhecimento traz consigo a demanda por cuidados voltados à manutenção da funcionalidade do idoso. Ou seja, as Políticas Públicas necessitam entender as limitações que o envelhecimento pode trazer e propor ações que visem a avaliação funcional e busquem sua manutenção ao longo da vida (Peroni *et al.*, 2023).

O aumento da expectativa de vida não garante que as pessoas estejam vivendo com melhor saúde. A dependência funcional é atualmente uma das maiores dificuldades na assistência ao idoso, sobrecarregando família, Estado e comunidade. Além de cercear a qualidade de vida do indivíduo que envelhece (Peroni *et al.*, 2023).

Este envelhecimento da população traz consigo desafios, um deles é como responder a uma procura crescente por serviços de atenção a longo prazo num contexto de redução das redes de cuidado tradicional. Na prática, 10,5% das pessoas com 65 anos ou mais estão em situação de dependência funcional, e a porcentagem sobe para 29% entre os idosos com mais de 85 anos. Em termos absolutos, isto significa mais de 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos e com dificuldades para realizar atividades básicas da vida diária, sendo que este número pode chegar a mais de 6 milhões de pessoas até 2050 (Peroni *et al.*, 2023).

Galera e colaboradores (2022) trazem que 65% dos indivíduos entre 65 e 84 anos e 82% dos com mais de 85 anos são portadores de duas ou mais doenças crônicas, conceito este de multimorbidade. Assim, apresentam complexidade e vulnerabilidade, são mais suscetíveis à fragilização, internações e hospitalização, demandando maior assistência à saúde.

A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é a ferramenta usada por geriatras e gerontólogos para o acompanhamento desses pacientes complexos. Visa, de maneira multidimensional e interdisciplinar, realizar um diagnóstico global do indivíduo, determinar suas deficiências, incapacidades e desvantagens e planejar o cuidado. Prioriza o estado funcional e a qualidade de vida, utilizando instrumentos de avaliação (testes, índices e escalas) para facilitar a comunicação e comparação evolutiva (Brasil, 2007). A AGA é considerada a ferramenta padrão-ouro na avaliação

de idosos. Nesse contexto, a avaliação funcional do paciente com idade avançada é um dos parâmetros mais importantes (Galera *et al.*, 2022, p. 708).

Nos estudos clínicos em que se avalia a capacidade funcional e a qualidade de vida, a AGA identifica populações de risco, favorece investimento em saúde, qualidade de vida e bem-estar e, principalmente, permite o planejamento de ações e políticas de saúde (Galera *et al.*, 2022, p. 710).

Os parâmetros avaliados pela AGA são:

- equilíbrio, mobilidade e risco de quedas
- função cognitiva
- condições emocionais
- deficiências sensoriais
- capacidade funcional
- estado e risco nutricional
- condições socioambientais
- polifarmácia e medicações inapropriadas
- comorbidades e multimorbidade
- outros.

Entende-se por capacidade funcional a possibilidade de o indivíduo cuidar de si mesmo (Brasil, 2007) - sendo este o conceito utilizado nesta pesquisa.

A avaliação da funcionalidade, preconizada pela PNSI, determina tanto o comprometimento funcional do idoso quanto a sua necessidade de auxílio (Brasil, 2007). É realizada de forma sistematizada e objetiva através das escalas de Atividades Básicas de Vida Diária (ou escala de Katz) e de Atividades Instrumentais de Vida Diária (ou escala de Lawton), conforme os quadros 2 e 3 (Santos; Gaeta, 2012). Esta avaliação determina o grau de dependência e os tipos de cuidados que serão necessários com este indivíduo, além de como e por quem serão realizados (Brasil, 2007).

Abordagens que reforcem a recuperação, a adaptação e o desenvolvimento psicossocial devem ser o foco das políticas de saúde pública para promoção do envelhecimento saudável, e não apenas para o controle de doenças (OPAS, 2020a).

Quadro 2 – Escala de Katz – Atividades de Vida Diária.

Escala de Katz - Atividades Básicas			
<i>Atividade</i>	<i>Independente (1 ponto)</i>	<i>Dependente (0 pontos)</i>	<i>Pontos</i>
Banho	Não recebe ajuda ou somente recebe para 1 parte do corpo	Necessita supervisão ou ajuda	
Vestir-se	Pega as roupas e se veste sem qualquer ajuda, exceto amarrar sapatos	Necessita supervisão ou ajuda	
Higiene pessoal	Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se e retorna sem qualquer ajuda	Necessita supervisão ou ajuda	
Transferência	Consegue deitar na cama, sentar na cadeira e levantar sem ajuda (pode usar andador ou bengala)	Necessita supervisão ou ajuda	
Continência	Controla completamente urina e fezes	Necessita supervisão ou ajuda	
Alimentação	Come sem ajuda (exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão)	Necessita supervisão ou ajuda	
			Total:

Fonte: IPGG, 2015.

Pontuação: 6-5: independente; 4-3: dependência moderada; < 2: muito dependente.

Quadro 3 – Escala de Lawton – Atividades Instrumentais da Vida Diária.

Escala de Lawton- Atividades Instrumentais			
<i>Atividades</i>	<i>3 pontos Sem ajuda</i>	<i>2 pontos Ajuda parcial</i>	<i>1 ponto Não consegue</i>
Usar o telefone			
Ir à um lugar distante			
Fazer compras			
Preparar as próprias refeições			
Trabalhos domésticos			
Trabalhos manuais e reparos na casa			
Lavar e passar roupas			
Manuseio de medicação			
Cuidar das finanças			
			Total:

Fonte: IPGG, 2015; Adaptado de Lawton; Brody, 1969.

Pontuação: 9: totalmente dependente; 10 a 15: dependência grave; 16 a 20: dependência moderada; 21 a 25: dependência leve; 25 a 27: independência.

Como abordado previamente, no Brasil, contamos, desde 1999, com o estabelecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI). A PNSI já contemplava, mais de 20 anos antes da proposta da Década do Envelhecimento Saudável, o conceito de que saúde para o idoso está mais relacionado à sua autonomia e independência do que pela presença ou ausência de doença, e que a promoção do envelhecimento ativo, mantendo a capacidade funcional, é a meta de toda ação de saúde (Brasil, 2006).

A PNSI também leva em consideração em suas diretrizes a desigualdade socioeconômica e de gênero, o processo de feminização do envelhecimento e o ônus para a família e Estado, além do grau de dependência dos idosos. Reconhece que incapacidade funcional, limitações física, cognitiva e sensoriais não são consequências inevitáveis do envelhecimento e que são passíveis de prevenção. Além disso, estabelece que a implementação da avaliação funcional individual e coletiva é um instrumento gerencial imprescindível para determinar o risco funcional da população, pois, baseados na condição funcional, ações de atenção primária, de prevenção (primária, secundária e terciária) e de reabilitação poderão ser planejadas, para a recuperação da autonomia, prevenção de declínio e recuperação de saúde (Brasil, 2006).

4.3 ATENÇÃO INTEGRADA PARA A PESSOA IDOSA (ICOPE) E O CONCEITO DE CAPACIDADE INTRÍNSECA

Em 2017 a OMS lança o documento chamado Atenção Integrada para a Pessoa Idosa (ICOPE, sigla do inglês Integrated Care for Older People), que contempla diretrizes de intervenções na comunidade para manter a capacidade intrínseca. Esta, por sua vez, é definida como “a combinação das capacidades físicas e mentais (inclusive psicológicas) do indivíduo”. A habilidade funcional é a combinação e interação da capacidade intrínseca com o ambiente no qual a pessoa está inserida (OPAS, 2020b).

O ICOPE é uma ferramenta que visa atender às necessidades de saúde da população que envelhece. Através do atendimento integrado, melhora-se os desfechos em saúde e a eficiência do sistema. O instrumento é composto por roteiros

de atenção para o manejo das principais afecções que afetam a capacidade intrínseca: perda de mobilidade, má nutrição, deficiência visual, perda auditiva, declínio cognitivo e sintomas depressivos. Utiliza-se testes de triagem para avaliar estes quesitos e identificar idosos que já tiveram alguma perda. Esta triagem serve como uma porta de entrada para uma avaliação mais profunda das necessidades de saúde e social. Leva a um plano de atendimento personalizado para reverter, retardar ou impedir novas perdas de capacidades (OPAS, 2020b).


Desta forma, o ICOPE busca orientar e propor ações para os profissionais de saúde e assistência social, de modo a detectar e manejar a perda da capacidade intrínseca através da intervenção em nível comunitário, visando:

- atender às necessidades de saúde e de assistência social de forma integral;
- definir metas centradas na pessoa (avaliação das necessidades, preferências e objetivos individuais);
- apoiar o autocuidado;
- desenvolver um plano de cuidados que inclua múltiplas intervenções para o manejo das condições associadas à perda da capacidade intrínseca (serviços coordenados, voltados para o objetivo único de manter a capacidade intrínseca e a habilidade funcional e prestados o máximo possível por meio de atenção primária na comunidade);
- realizar triagem da perda de capacidade intrínseca e avaliar as necessidades de saúde e assistência social;
- dar apoio aos cuidadores; e
- desenvolver um plano de cuidados personalizado.

Como citado, muitas questões que determinam a capacidade intrínseca são modificáveis, como comportamentos e presença de doenças, o que justifica a ênfase na implementação de intervenções eficazes para a manutenção desta capacidade (Figura 2). Este é o foco e a justificativa do ICOPE.

Relacionando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 3 estabelece a cobertura universal de saúde e o ICOPE contempla este objetivo pois as necessidades de assistência social e à saúde dos idosos devem ser manejadas de forma integrada e continuada (OPAS, 2020b).

Figura 2 - Principais domínios da capacidade intrínseca.



Fonte: OPAS, 2020b; online.

Desta forma, estudar o processo de envelhecimento, bem como a avaliação da funcionalidade das pessoas idosas, torna-se relevante, uma vez que permite apresentar evidências científicas que sejam capazes de propiciar reflexões, discussões e quem sabe qualificar a ampliação de políticas públicas mais inclusivas, com foco na promoção da saúde, prevenção, assistência e reabilitação destes indivíduos.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar capacidade funcional e perfil socioepidemiológico das pessoas idosas atendidas em um Ambulatório Acadêmico de Geriatria no município de Franca-SP, como meio de fundamentar políticas públicas e estratégias que promovam o desenvolvimento social, através do envelhecimento saudável.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Identificar o perfil socioepidemiológico dos idosos acompanhados em um ambulatório de geriatria no município de Franca-SP, através da avaliação descritiva dos dados: sexo, idade, renda, suporte social, número de medicações em uso, número de quedas no último ano e capacidade funcional avaliada pelas escalas de Katz e Lawton.
- b) Inferir, através dos testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, se as médias ou medianas das variáveis idade, medicações em uso, escalas de Katz e Lawton são válidas para esta amostra.
- c) Com base nos dados coletados, discutir possíveis intervenções alinhadas com os princípios da Década do Envelhecimento Saudável.

6 MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa e inferencial por meio de fontes de dados secundárias, extraídas do prontuário eletrônico pertencente ao Sistema SIGS, do próprio município.

Para realização deste estudo, a amostra foi construída a partir de prontuários provenientes do ambulatório-escola que funciona na Casa do Diabetes, pelo fato deste local utilizar o sistema de prontuário eletrônico (sistema SIGS) municipal e pelo fato de se tratar de um ambulatório acadêmico, no qual a avaliação funcional, juntamente com a Avaliação Geriátrica Ampla, são habitualmente realizadas. Desta forma, foi possível padronizar os dados coletados, o que não pôde ser estendido para o ambulatório municipal. A população participante deste estudo foi composta por pessoas maiores de 60 anos que passaram por atendimento durante o período de 2021 a 2023 (período este escolhido pois, em 2020, os atendimentos foram prejudicados pela pandemia de Covid-19). Ao todo, foram analisados 73 prontuários. Foram excluídos os prontuários que, eventualmente, eram de pacientes com menos de 60 anos.

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DO ESTUDO

O município de Franca-SP está situado no interior do estado de São Paulo e conta com uma população de 352.536 pessoas. A expectativa de vida ao nascer é de 75,5 anos (IEPSDATA, 2021). Segundo o Censo 2022, a população idosa - com mais de 60 anos - representa 17% do total do município - 60.579 (IBGE, 2022), tendo crescido 19% nos últimos 20 anos. Franca se destaca no estado e no país, nos indicadores de longevidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto *per capita* com saúde, infraestrutura local instalada, entre outros; conforme informações geradas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). A cidade segue a tendência estadual e nacional do aumento do envelhecimento populacional, sendo que os impactos desse processo de envelhecimento se refletem em todos os

aspectos sociais - previdência, estrutura urbana, força laboral, e de maior importância para esta dissertação, na saúde.

O município pertence à Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 13, que se localiza na Macrorregião Nordeste do estado de São Paulo e é composta pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, abrangendo uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a DRS 8 (Franca) possui uma população estimada para 2017 de 683.157 (Franca, 2022).

Figura 3 - Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011.



Fonte: Franca, 2022; online.

Figura 4 - Divisão geográfica da RRAS 13 - Araraquara-Barretos-Franca-Ribeirão Preto.



Fonte: Franca, 2022; online.

A assistência ao idoso no SUS tem a atenção primária como porta de entrada, através das unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. Já o atendimento ambulatorial geriátrico especializado ocorre no Centro de Saúde, que contempla o Ambulatório de Geriatria Municipal, e dois outros ambulatórios de geriatria que são vinculados aos dois cursos de medicina da cidade: o ambulatório-escola de geriatria da Unifran, e o ambulatório-escola de geriatria do Uni-FACEF. O encaminhamento para estes ambulatórios é realizado a partir da atenção básica ou após internações na Santa Casa, para seguimento clínico. Nos ambulatórios-escola, por se tratarem de ambulatórios gerais, o pré-requisito para encaminhamento são pacientes acima de 60 anos. Já no ambulatório municipal, o requisito para encaminhar são investigação e/ou acompanhamento de quadros demenciais ou doença de Parkinson.

6.3 ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Municipal de Franca sob o número CAAE: 75983123.1.0000.5384, seguindo a Resolução 466/2012 que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, conforme apresentado no anexo.

6.4 METODOLOGIA APLICADA PARA ANÁLISE DOS DADOS DOS PRONTUÁRIOS

As variáveis escolhidas para análise estatística dos dados desta pesquisa foram:

- Variáveis sociais: sexo, idade, escolaridade, renda e suporte social (com quem o paciente reside)
- Variáveis epidemiológicas: número de quedas no último ano (referente ao atendimento), quantidade de medicações em uso e avaliação funcional por Katz e Lawton.

Em um primeiro momento, para todas estas variáveis agregadas foram construídos gráficos de setores (pizza) e barras, discriminando as quantidades e porcentagens de cada categoria analisada.

Em seguida, para as variáveis de Idades, Quantidade Medicamentos, Escala Katz e Lawton desagregadas em seus 73 pacientes, foram também construídos gráficos tipo histograma, boxplot e curva de densidade de probabilidade, para avaliação do comportamento da distribuição destas variáveis e cálculos de suas estatísticas descritivas. Posteriormente, foram aplicados os testes estatísticos de normalidade de Shapiro-Wilk (Shapiro; Wilk, 1965), para testar se os dados são normais ou não. Após, utilizou-se o teste t-Student paramétrico (quando há presença de normalidade dos dados) e o teste não paramétrico de postos sinalizados de Wilcoxon (Wilcoxon, 1992) para localização que considera a distribuição das variáveis livres (quando há presença de assimetria ou não normalidade dos dados), para investigar se há indicações de que as médias (teste t) e medianas (teste de Wilcoxon) encontradas em cada uma destas variáveis coletadas eram maiores, menores ou iguais a zero (Wilcoxon; Katti; Wilcox, 1970; Conover, 1999).

6.4.1 Estatística Descritiva

Foram calculadas as principais medidas descritivas para os dados das variáveis Idade, Quantidade de Medicamentos e Escala Katz e Lawton, com intuito de resumir e retirar maiores informações acerca de suas variabilidades. As medidas calculadas foram: média aritmética (\bar{x}), que é uma medida de tendência central que fornece um valor geral que equilibra a variabilidade de cada amostra analisada, fornecendo uma noção do comportamento de cada variável; mediana (M_d), que separa os primeiros 50% dos últimos 50% de cada variável ordenada em ordem crescente; moda (M_o), que é o valor que mais aparece (maior frequência) na variável; além de variância amostral (S^2), desvio padrão amostral (S) e coeficiente de variação (CV), que são medidas de variabilidade que indicam valores que fornecem a noção de variação de cada um destes conjuntos de dados. Assim, dado um conjunto de dados composto pelos elementos x_1, x_2, \dots, x_n , estas medidas podem ser calculadas pelas seguintes expressões algébricas:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i^n x_i}{n} : \text{média aritmética} \quad (1)$$

$$x_{moda} : \text{valor que apresenta maior frequência na amostra (aparece mais)} \quad (2)$$

$$M_o = x_{moda}$$

n : número de observações é ímpar

$$M_d = \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} \quad (3)$$

n : número de observações é par

$$M_d = x_{(\frac{n+1}{2})}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \underline{x})^2}{n - 1} : \text{variância amostral} \quad (4)$$

$$S = \sqrt{S^2} : \text{desvio padrão amostral} \quad (5)$$

$$CV = \left(\frac{S}{\underline{x}} \right) \cdot 100 : \text{coeficiente de variação amostral} \quad (6)$$

Em cada uma destas variáveis, também foi avaliado o coeficiente de assimetria de Person, que avalia o quanto a curva de densidade de probabilidade de uma variável é simétrica ou não, dado pela seguinte expressão:

$$AS = \frac{3(\underline{x} - M_d)}{S} \quad (7)$$

Assim se $AS > 0$, sabe-se que a curva de densidade de probabilidade de uma variável é positiva e viesada à direita; já se $AS < 0$, a curva de densidade de probabilidade será negativa e viesada à esquerda; e, se $AS = 0$, tem-se que a curva de densidade de probabilidade será simétrica (próxima à distribuição normal), com fortes indicativos de que $\underline{x} = M_d = M_o$.

Se $|AS| < 0,15$, indicará assimetria fraca na distribuição dos dados, e se $0,15 \leq |AS| \leq 1,00$, ocorrerá assimetria moderada, e se $|AS| > 1,00$ apresentará assimetria forte.

Foi avaliado também o coeficiente de Curtose de cada uma destas variáveis, que indica o achatamento da curva de uma variável, conforme a equação abaixo:

$$C = \frac{(Q_3 - Q_1)}{2(P_{90} - P_{10})} \quad (8)$$

Em que:

- Q_1 : primeiro quartil, que é o valor que separa os primeiros 25%, dos últimos 75% dos dados ordenados de uma variável;
- Q_3 : terceiro quartil, que é o valor que separa os primeiros 75%, dos últimos 25% dos dados ordenados de uma variável;
- P_{10} : décimo percentil, que é o valor que separa os primeiros 10%, dos últimos 90% dos dados ordenados de uma variável;
- P_{90} : nonagésimo percentil, que é o valor que separa os primeiros 10%, dos últimos 90% dos dados ordenados de uma variável.

E assim se $C < 0,263$, a curva de densidade de probabilidade será leptocurtica (com formato pontiagudo, pouco achatada); se $C = 0,263$, a curva de densidade de probabilidade será mesocurtica (moderadamente achatada, aparenta o comportamento da distribuição normal); e se $C > 0,263$ a curva de densidade de probabilidade será platicurtica (com um grande achatamento).

6.4.2 Testes de hipótese e Erro Tipo 1 em testes de hipótese

Há uma infinidade de testes estatísticos aplicados em amostras que apresentam o comportamento apenas aproximado das populações, em que os pesquisadores podem apresentar suas hipóteses de análise, e geralmente ocorrem da seguinte maneira simplista, em que H_0 poderá ser aceita ou rejeitada:

H_0 : realidade óbvia presente em uma pesquisa

H_1 : investigação distinta e proposta pelo pesquisador a partir da realidade óbvia

Assim, surgem os termos estatísticos:

α : probabilidade de erro tipo 1 de um teste ou o quanto se pode errar em um teste; nomeado também como nível de significância, já que nesses testes se trabalha com uma amostra diferente/aproximada da população;

$1 - \alpha$: nível de confiança de um teste ou o quanto se pode acertar em um teste.

Desta maneira, ao se iniciar um teste estatístico de hipóteses, estabelecem-se inicialmente os níveis de significância α (1%, 5% e 10%, níveis científicos comumente utilizados) e de confiança $1 - \alpha$ (99%, 95% e 90%).

Em seguida, após a aplicação de um determinado teste, calcula-se o valor do *p – valor*: probabilidade do erro de um teste estatístico, ou seja, o quanto se erra no teste aplicado. Este será comparado com α , e também com $1 - (p - valor)$, que corresponde ao quanto se acerta em um teste a ser comparado com $1 - \alpha$. Vale salientar que o *p – valor* é uma probabilidade encontrada de acordo com o tipo de estatística utilizada em cada teste.

O Quadro 4 demonstra como ocorre a decisão de um teste de hipótese.

Quadro 4: Decisão do teste de hipótese com base no erro do tipo 1 (α).

Realidade	Conclusão do Teste	
	Rejeitar H_0 :	Aceitar H_0 :
Real	Erro tipo I: α	Correto: $1 - \alpha$
Imposta (Verdadeira H_0)		
Teste Escolhido	$p - valor$	$1 - (p - valor)$

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Assim, na maioria dos testes estatísticos, podem ocorrer as seguintes situações inferenciais comparativas com relação aos valores do *p – valor* e de α :

- 1) Se o $p - valor \leq \alpha$, pode-se se dizer que se erra menos ou igual ($p - valor$) que o nível de significância (α) permitido e imposto inicialmente no teste, ou seja, se $1 - (p - valor) \geq 1 - \alpha$, pode-se se dizer que acerta-se mais ou igual ($1 - (p - valor)$) que o nível de confiança ($1 - \alpha$) imposto anteriormente. Quando ocorrem estes dois fatos simultaneamente rejeita-se H_0 ;
- 2) Já se o $p - valor > \alpha$, pode-se se dizer que se erra mais ($p - valor$) que o nível de significância (α) permitido e imposto inicialmente no teste, ou seja, se $1 - (p - valor) < 1 - \alpha$, pode-se se dizer que acerta-se menos ($1 - (p - valor)$) que o nível de confiança ($1 - \alpha$) imposto anteriormente. Quando ocorrem estes dois fatos simultaneamente aceita-se H_0 .

Este tipo de análise é utilizado diretamente nos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e nos testes t-Student (quando há presença de distribuição normal) e no teste de Wilcoxon de postos sinalizados para localização (quando não há presença de distribuição normal), para as variáveis de Idade, Quantidade Medicamentos e Escalas de Katz e de Lawton desagregadas em seus 73 pacientes.

6.4.3. Teste de Shapiro-Wilk

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk (1965) será aplicado nas variáveis de Idade, Quantidade Medicacões, Escala Katz e Lawton, a um nível de significância α de 10%. Desta forma pode-se comparar as seguintes hipóteses:

H_0 : Os dados das variáveis apresentam distribuição normal

H_1 : Os dados das variáveis não apresentam distribuição normal

A partir de cada uma das amostras atribuídas x_1, x_2, \dots, x_n independentes e ordenadas com $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, obtem-se:

1. Os desvios quadráticos $S^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}$;
2. Calculam-se $b = \sum_{i=1}^n a_{n-i+1}(x_{n-i+1} - x_i)$, sendo que a_{n-i+1} , são coeficientes tabelados de Shapiro-Wilk.

Assim, pode-se obter a estatística do teste, pela seguinte expressão:

$$W_{calculado} = \frac{b^2}{S^2} \quad (9)$$

Logo, se a estatística $W_{calculado} < W_\alpha$ aceita-se a hipótese H_0 referente à normalidade dos dados das variáveis (ou seja $p - valor > \alpha$, em que $p - valor$ representa o erro obtido no teste aplicado em cada amostra avaliada), e se $W_{calculado} \geq W_\alpha$ (ou seja $p - valor \geq \alpha$, em que $p - valor$ representa o erro obtido no teste aplicado em cada amostra avaliada) rejeita-se H_0 .

6.4.4. Teste t-Student

A partir das amostras das variáveis, e sendo suas observações consideradas como x_1, x_2, \dots, x_n independentes e ordenadas com $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, e que apresentam normalidade, e suas curvas de densidade de probabilidades (distribuições) simétricas, conforme avaliadas por meio do teste anterior de Shapiro-Wilk, será avaliado se há indicativo de que as médias são iguais ou maiores que zero nestas variáveis, ao nível de significância $\alpha = 10\%$, conforme as hipóteses expressas:

$$H_0: \mu_{\underline{x}} = 0$$

$$H_1: \mu_x \neq 0$$

Em que se espera que haja a rejeição de H_0 , mostrando que existe o indicativo ao nível de significância α (que corresponde a probabilidade de ocorrência do erro tipo I do teste que será comparado com o p -valor que representa a probabilidade de erro medida a cada teste aplicado em determinada amostra), que haja indício da possibilidade de existência do valor da média estimada das variáveis analisadas. Em outras palavras, se este fato ocorre, há uma evidência de que a estimativa de média e a tendência da distribuição, capturadas na variável em análise ocorre e pode ser validada ao nível de significância α . A estatística utilizada no teste t-Student, será dada pela seguinte equação.

$$t_{calculado} = \frac{(\underline{x} - \mu_0)}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad (10)$$

Em que:

\underline{x} : média aritmética, calculada a partir da amostra da variável em análise;

$\mu_0 = 0$: valor populacional, advindo da hipótese testada;

S : desvio padrão amostral;

n : número de observações da amostra.

Sabendo que $t_{tabelado} = t_{(n-1, \alpha)}$, e é o valor tabelado referente ao tamanho da amostra e o nível de significância adotado na distribuição de probabilidades t-Student, desta maneira tem-se que, se $|t_{calculado}| \geq |t_{tabelado}|$ ou p -valor $\geq \alpha$ rejeita-se H_0 , caso contrário aceita-se H_0 .

Com intuito de validar ainda mais os resultados estimados do teste t-Student, posteriormente foi utilizada a estatística do Fator de Bayes. Dado uma variável em análise, que apresenta vetor de dados nomeado de D , e as hipóteses de análise propostas no teste t-Student H_0 e H_1 , o Fator de Bayes é dado pela seguinte expressão.

$$B_{01} = \frac{P(D|H_0)}{P(D|H_1)} \quad (11)$$

Em que:

$P(D|H_0)$: probabilidade de ocorrência de D , dado que H_0 ocorre;

$P(D|H_1)$: probabilidade de ocorrência de D , dado que H_1 ocorre.

A partir da obtenção desta estatística, após o teste t-Student pode-se averiguar a força da rejeição de H_0 , conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1: Análise do Fator de Bayes, para a rejeição de H_0 .

$ \log(B_{01}) $	B_{01}	Evidências de Rejeição de H_0
0,00 a 0,50	1,00 a 3,20	Vale somente uma simples menção
0,50 a 1,00	3,20 a 10,00	Substancial
1,00 a 2,00	10,00 a 100,00	Forte
Maior que 2,00	Maior que 100,00	Decisiva

Fonte: Resultados da Pesquisa, de acordo com o trabalho de Kass e Raftery (1995).

6.4.5. Teste de postos sinalizados de Wilcoxon, para localização

A partir de cada uma das amostras, e sendo elas consideradas como x_1, x_2, \dots, x_n independentes e ordenadas com $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, e que não apresentam normalidade, com distribuições assimétricas, conforme avaliado por meio do teste anterior de Shapiro-Wilk, será avaliado se há indicativo de que as medianas são iguais ou maiores que zero nestas variáveis, ao nível de significância α de 10%, conforme as hipóteses expressas:

$$H_0: \mu_{M_d} = 0$$


$$H_1: \mu_{M_d} \neq 0$$

Em que se espera que haja a rejeição de H_0 , mostrando que existe o indicativo ao nível de significância α (que corresponde a probabilidade de ocorrência do erro tipo I do teste, que será comparado ao p -valor que representa a probabilidade de erro medida a cada teste aplicado em cada amostra), que haja possibilidade de existência do valor da mediana da variável analisada. Em outras palavras, se este fato ocorre, há um indicativo de que a estimativa da mediana e tendência da distribuição, capturadas na variável em análise ocorre e pode ser validada ao nível de significância α . A estatística utilizada no teste de Wilcoxon será dada pelos seguintes passos metodológicos (Wilcoxon, 1992).

1. Subtrair 0 de cada uma das observações de cada uma das amostras analisadas na variável analisada, obtendo a variável $d_i = x_i - 0$. E se algum $x_i = 0$, então ocorrerá $d_i = 0$, elimine esse d_i dos cálculos e reduza o n amostral, e siga com o esse processo;
2. Classifique o d_i utilizável do menor para o maior sem levar em conta o sinal de d_i , ou seja, avalia-se o valor absoluto $|d_i|$, nessa classificação (ranqueamento). Se dois ou mais $|d_i|$ são iguais deve-se atribuir a cada valor empatado a média das posições de classificação que os valores ocupam. Se por exemplo, os três menores valores $|d_i|$ são todos iguais, coloque-os nas posições de classificações 1, 2 e 3, e atribua a classificação $(1+2+3)/3 = 2$;
3. Atribua a cada classificação o sinal d_i que produz essa classificação;
4. Encontre as estatísticas T_+ e T_- , que correspondem a soma dos postos com sinais positivos e negativos, encontrados.

A Figura 5, mostra como seria o comportamento de dados hipotéticos com uma distribuição livre sem normalidade hipotética, e suas hipóteses em um teste bilateral com $H_0: \mu_{M_d} = 0$ e $H_1: \mu_{M_d} \neq 0$.

Figura 5 - Distribuição de probabilidades (Curva de densidade de probabilidade) livre e sem normalidade hipotética nos dados desta variável, e com as regiões críticas de aceitação e rejeição de H_0 para um teste bilateral.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

A estatística do teste é o T_+ ou T_- , dependendo da hipótese alternativa, assim, se a hipótese nula $H_0: \mu_{M_d} = 0$ será aceita a um certo nível de significância α pré-estabelecido, se o valor de $T_+ = T_-$, ou seja $T_+ < T_{(\frac{\alpha}{2}, n)}$ ou $T_- > -T_{(\frac{\alpha}{2}, n)}$ (ou seja

$p - valor > \frac{\alpha}{2}$, em que o $p - valor$ representa a probabilidade do erro obtido no teste aplicado em cada amostra de determinada variável), caso contrário H_0 será rejeitada (ou seja $p - valor \leq \frac{\alpha}{2}$). No presente estudo há interesse em obter-se a rejeição de H_0 , e se este fato ocorre, há um indicativo de que as estimativas de mediana e tendências da distribuição, capturadas na variável em análise ocorre e pode ser validada ao nível de significância α .

A aplicação destas técnicas de análise descritivas e inferenciais foram realizadas a partir da organização de planilhas eletrônicas no Excel em um primeiro momento, e posteriormente, com o uso do *software* estatístico R e Rstudio (R Core Team, 2005).


7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta sessão foi dividida em duas partes: na primeira, serão apresentados e discutidos os resultados da análise exploratória das variáveis agrupadas; na segunda, foram analisados descritivamente e inferencialmente as variáveis não agrupadas (desagregadas) de Idade, número de medicações em uso, e as escalas Katz e Lawton por meio da aplicação dos testes avaliados.

7.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS COLETADOS EM PRONTUÁRIOS DE 73 PACIENTES

Na avaliação dos prontuários de um total de 73 pacientes, avaliou-se o comportamento da variável Sexo, que pode ser descrito pelo Gráfico 4.

Gráfico 4 - Distribuição do sexo dos 73 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

Observa-se que a maioria dos pacientes são mulheres, compondo o estrato de 69,86%, restando 30,14% para homens, nesta amostra de pacientes. Embora, conforme descrito anteriormente, ocorra uma feminização do processo de envelhecimento (UNFPA, 2012), o fato de termos tido a maioria dos prontuários referente à pacientes do sexo feminino não pode ser relacionado diretamente com

este fenômeno, uma vez que há uma tendência maior de procura por atendimento médico por pessoas do sexo feminino (Rocha *et al.*, 2022) e por se tratar de uma amostra proveniente de um único serviço.

Em seguida foram analisadas as idades destes pacientes, como exposto no Gráfico 5.


Gráfico 5 - Distribuição das idades dos 73 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Verifica-se que a maior categoria está com as idades de 80 a 84 anos, representando 24,66%, e que também, a maior parte dos pacientes se distribuem nas categorias de 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, e 85 a 89 anos, representando as três categorias juntas 69,87% da amostra com idades de 75 a 89 anos. Desta forma, pode-se dizer, por esta amostra, que a expectativa de vida de 75 anos do município, segundo o IEPSDATA (2021), foi superada nos pacientes atendidos.

Posteriormente foi estudado o comportamento da variável Nível de Escolaridade destes pacientes, conforme indica o Gráfico 6.

Gráfico 6 - Distribuição do Nível de Escolaridade dos 73 pacientes.


Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nesta análise, 32,50% dos pacientes indicaram o nível de escolaridade variando de 0 a mais de 10 anos de estudo, sendo que destes, a maioria apresentou escolaridade de 5 a 10 anos. Porém, observa-se que 67,50% não informaram o nível de escolaridade. Tal viés pode ser interpretado pela pouca atenção à essa informação durante as consultas médicas, sendo algo a ser corrigido, devido ao impacto do tempo de estudo no processo de envelhecimento - quanto maior a escolaridade, menor a dependência funcional (IBGE, 2019); escolaridade elevada e intensa atividade intelectual também estão relacionadas à menor frequência de demência (Brasil, 2007).

A próxima variável analisada foi o número de quedas desta amostra de 73 pacientes idosos, o Gráfico 7 revela este comportamento.

A maioria dos pacientes (53,42%) não tiveram quedas no último ano, enquanto 21,92% disseram que apresentaram quedas, e 24,66% não souberam informar. Embora a maioria não tenha relatado a ocorrência de quedas no último ano, a porcentagem encontrada na pesquisa é congruente com a literatura, na qual a prevalência de quedas na população urbana foi de 25,1% (PIMENTEL *et al.*, 2018). Estes números podem ser considerados significativos, uma vez que as quedas estão associadas a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e institucionalização precoce (Brasil, 2007).


Gráfico 7 - Distribuição do número de quedas dos 73 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Já o comportamento da variável Suporte Social pode ser explicitado pelo Gráfico 8:

Gráfico 8 - Distribuição do Suporte Social (com quem mora), dos 73 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota: ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Este dado foi obtido questionando com quem o idoso mora, com o objetivo de inferir o suporte social. A maioria destes idosos (52,05%) relatou residirem com um familiar - entende-se que moram com algum parente próximo (filhos, netos,


irmãos). O “morar com alguém” pode sugerir necessidade de ajuda no autocuidado, que reflete em perda de capacidade funcional.

Outros 17,81% da amostra contam com o apoio do cônjuge. Esta informação nos sugere uma outra problemática: um idoso cuidando de outro idoso. No caso de cônjuges, as idades geralmente são próximas e o que se vê na prática são ambos com necessidades de cuidados em saúde, mas sempre um mais no papel de cuidador.

Já 9,59% da amostra relataram residirem sozinhos, o que sugere que sejam idosos mais independentes. Embora em 19,18% não haja informação sobre o suporte social, pode-se inferir que a minoria dos pacientes estudados é independente e autônoma.

Sobre a renda familiar informada, discriminou-se conforme exposto no Gráfico 9.

Gráfico 9 - Distribuição da renda familiar dos 73 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

A maioria dos pacientes (47,95%) não informou de onde vem sua renda. Em seguida, 38,36% possuem aposentadoria, 10,96% são pensionistas, e 2,74% ainda trabalham em sua velhice. Este dado também traz o viés da ausência de informação, que novamente, pode ser justificada pela não valorização da mesma na anamnese médica, embora ela seja relevante para o contexto de saúde. Dados do IEPSDATA (2023) apontam que idosos com mais de 75 anos com renda mais alta

apresentam condições de saúde similares a idosos 10 ou 15 anos mais novos pertencentes ao grupo de menor renda. A plataforma também traz que 99,2% dos idosos de menor renda que necessitam de auxílio nas atividades diárias contam apenas com seus familiares, que são seus principais responsáveis. Porém, a contratação de cuidadores formais é bem maior entre famílias com renda mais elevada, chegando a 69% (IEPSDATA, 2023). Entre o trabalho de cuidado informal, as mulheres são as mais responsabilizadas, o que afeta a inserção das mesmas no mercado de trabalho (IEPSDATA, 2023). Ser cuidador informal, por sua vez, também é associado à pobreza, pois gera dificuldade em manter um trabalho formal, com maior chance de trabalhar em tempo parcial, com redução na progressão da carreira, gerando assim um acúmulo de direitos previdenciários mais baixos (Nogueira, Brauna, 2022).

Em seguida averiguou-se a variável Número de medicações que estes pacientes fazem uso, conforme apresentado no Gráfico 10.

Gráfico 10 - Distribuição do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

A maior parte dos pacientes (50,67%) compõem o estrato de 6 a 10 medicações, em seguida vem os pacientes que usam menos que 6 e depois mais que 10 medicações. Entende-se por polifarmácia o uso de 5 ou mais medicações (Galera *et al.*, 2022). Desta forma, ficou evidente que a maioria dos pacientes do ambulatório possuem polifarmácia, o que se reflete diretamente na multimorbidade destes

pacientes e piores desfechos, como fragilidade, incapacidade, mortalidade e quedas (Galera *et al.*, 2022).

Sobre a avaliação funcional, foi analisada a escala Katz, dessa amostra de pacientes, conforme revela o Gráfico 11.


Gráfico 11 - Distribuição da Escala Katz desta amostra de 73 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

As pontuações na escala Katz, por estes pacientes, demonstraram que 65,76% dos pacientes apresentam pontuação entre 5 e 6, ou seja, apresentam independência em suas atividades básicas; em seguida, 27,40% pontuam entre 0 e 2, mostrando que são pacientes que apresentam muita dependência para suas atividades; seguido de 4,11% com pontuações entre 3 e 4, que apresentam dependência parcial para suas atividades; e, por final, para 2,74% dos pacientes não houve registro ou avaliação na escala. Por se tratar de uma importante escala de avaliação funcional, a ausência de dados ocorreu em uma minoria de prontuários. A escala de Katz, como descrita anteriormente, avalia a independência para atividades básicas, como tomar banho, vestir-se, realizar a própria higiene pessoal, alimentar-se sozinho, ter preservada a continência esfincteriana e ser capaz de transferir-se sozinha da cama e de cadeiras.

Já o comportamento da escala Lawton, dessa amostra com 73 pacientes, é indicado no Gráfico 12.

Gráfico 12 - Distribuição da Escala Lawton desta amostra de 73 pacientes.

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota: sigla NI: Não informado

A partir deste gráfico, observa-se que a maior parte dos pacientes 27,40% apresentam pontuação 9, ou seja, são totalmente dependentes. Em seguida, vem a pontuação de 26 a 27 com 17,81%, que indica pacientes independentes, seguido das pontuações de 16 a 20 com 16,44%, que revela pacientes com dependência moderada, seguido das pontuações de 21 a 25 com 15,07%, que revela pacientes com dependência leve, seguido das pontuações de 10 a 15 com 12,33% que indicam pacientes com dependência grave. Estes dados estão de acordo com os dados trazidos pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) (2019, p.67), em que 24,2% da população idosa precisava de ajuda para realizar atividades instrumentais.

Assim, os dados mostram que, na população estudada, a maioria dos pacientes é independente para autocuidado (escala de Katz), porém ao analisarmos a escala de Lawton (atividades instrumentais de vida diária), percebemos a falta de autonomia e independência para atividades complexas. Ou seja, mesmo com independência para autocuidados, a maioria dos pacientes necessita de auxílio em todas as outras áreas da vida.

7.2 ANÁLISE DESCRITIVA E INFERENCIAL DAS VARIÁVEIS IDADE, NÚMERO DE MEDICAÇÕES UTILIZADAS, ESCALA KATZ E LAWTON DESAGREGADAS EM SEUS 73 PACIENTES.

Nesta análise, buscou-se validar, para a amostra estudada, os dados apresentados e suas tendências futuras.

Para a variável idade dos 73 pacientes, foram calculadas suas principais estatísticas descritivas, conforme indica a Tabela 2.


Tabela 2 - Análise descritiva das idades dos 73 pacientes.

Estatística das Idades	Valores
Número de observações: n_{idades}	73
Mínimo: Min_{idades}	61 anos
Máximo: Max_{idades}	94 anos
Amplitude: AT_{idades}	33 anos
Média: \underline{x}_{idades}	79,64 anos
Variância: S^2_{idades}	55,26 anos ²
Desvio Padrão: S_{idades}	7,43 anos
Coeficiente de Variação: CV_{idades}	9,33 %

Fonte: Resultados da Pesquisa.


A idade média dos 73 pacientes que responderam aos prontuários foi de $\underline{x}_{idades} = 79,64$ anos, próximo aos 80 anos, com uma variação baixa dada pelo valor do coeficiente de variação baixo $CV_{idades} = 9,33\%$. A seguir, são apresentados os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e histograma também com sua curva de densidade de probabilidade, nas Figuras 6 e 7.

Figura 6 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 7 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

A partir da análise das Figuras 6 e 7, observa-se a curva de densidade/probabilidade das idades, que representa a distribuição da variável idade dos 73 pacientes, revelando uma leve assimetria à esquerda. Avaliou-se o

comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição normal, conforme a Figura 8.

Figura 8 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 pacientes, com a distribuição normal.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Verifica-se uma certa proximidade da distribuição das idades com a distribuição normal, com assimetria à esquerda, e moderada, e com leve achatamento, dado pelo coeficiente de curtose.

Em seguida, com intuito de avaliar se a distribuição das idades dos pacientes possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para as idades dos 73 pacientes.

Estatística W	p-valor
0,98	0,18
<i>H₀: os dados das idades apresentam normalidade</i>	
ou	
<i>H₁: os dados das idades não apresentam normalidade</i>	

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Desta forma, aceita-se H_0 , ao nível de significância $\alpha = 10\%$, logo há indícios de que estes dados apresentam normalidade, ou seja, possuem simetria como descrito anteriormente nas Figuras de 11 a 13. Em seguida, foi realizado o teste paramétrico de t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média das idades $\bar{x}_{idades} = 79,64$ anos, pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero, este teste está discriminado na Tabela 4 e Figura 9.


Tabela 4 - Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média das idades $\bar{x}_{idades} = 79,64$ anos, possa ser diferente de zero.

Estatística t	p-valor
91,54	2,94e-76
<i>H₀: $\mu_{\bar{x}_{idades}} = 0$</i>	
ou	
<i>H₁: $\mu_{\bar{x}_{idades}} \neq 0$</i>	

Fonte: Resultados da Pesquisa.

A Tabela 3, juntamente com a Figura 9, indicam que ocorre a rejeição de H_0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da média das idades $\bar{x}_{idades} = 79,64$ anos ao nível de significância de $\alpha = 10\%$, e que esta média poderá ser maior que este valor dado o comportamento de distribuição da variável idade dos pacientes. A estatística do Fator de Bayes, também indica que há fortes indícios e decisivos de rejeição de H_0 . De maneira resumida, a idade média dos pacientes é próxima aos 80 anos, e tem tendência a aumentar. Tal conclusão pode ser validada para a população em questão. Este dado é relevante pois o aumento da idade está relacionado à maior limitação funcional (IBGE, 2019).

Figura 9 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste t-Student, para idade dos pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.


Já para a variável número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes, também foram calculadas suas principais estatísticas descritivas, conforme demonstra a Tabela 5.

O número médio de medicações utilizadas pelos 73 pacientes foi de $\bar{x}_{medicações} = 6,66$ medicações, próximo a 7 medicações, com uma variação alta dada pelo valor do coeficiente de variação alto de $CV_{medicações} = 49,77\%$. A seguir são expostos os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e histograma, também com sua curva de densidade/probabilidade, nas Figuras 10 e 11.

Tabela 5 - Análise descritiva do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.


Estatística das Medicações	Valores
Número de observações: $n_{medicações}$	73
Mínimo: $Min_{medicações}$	0 medicações
Máximo: $Max_{medicações}$	14 medicações
Amplitude: $AT_{medicações}$	14 medicações
Média: $\bar{x}_{medicações}$	6,66 medicações
Variância: $S^2_{medicações}$	10,98 medicações ²
Desvio Padrão: $S_{medicações}$	3,31 medicações
Coeficiente de Variação: $CV_{medicações}$	49,77 %

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 10 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 11 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

As Figuras 10 e 11 apresentam a curva de densidade probabilidade do número de medicações, que também representa a distribuição da variável “número de medicações” dos 73 pacientes, demonstrando uma leve assimetria à direita. Avaliou-se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição normal, conforme a Figura 12.

Figura 12 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes, com a distribuição normal.

$\bar{X} = 6,66; M_o = 6,00; M_d = 6,00; S = 3,31; AS = 0,21; C = -0,53$



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Averigua-se uma certa proximidade da distribuição do número de medicações utilizadas com a distribuição normal, com assimetria à direita, e moderada, e com leve achatamento, dado pelo Coeficiente de Curtose.

Posteriormente, com intuito de avaliar se a distribuição do número de medicações utilizadas pelos pacientes possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para o número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes.

Estatística W	p-valor
0,98	0,16
<i>H₀: os dados do número medicações apresentam normalidade</i>	
ou	
<i>H₁: os dados o número medicações não apresentam normalidade</i>	

Fonte: Resultados da Pesquisa.


Assim, aceita-se H_0 , ao nível de significância $\alpha = 10\%$, logo há indícios de que estes dados apresentam normalidade, ou seja, possuem simetria como descrito anteriormente nas Figuras de 16 a 17. Em seguida foi realizado o teste paramétrico de t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média do número de medicações $\underline{x}_{medicacao} = 6,66$ medicações, pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero. Este teste está discriminado na Tabela 7 e Figura 13.

Tabela 7 - Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média do número de medicações $\underline{x}_{medicacao} = 6,66$ medicações, possa ser diferente de zero.

Estatística t	p-valor
17,17	2,94e-76
$H_0: \mu_{\underline{x}_{medicacao}} = 0$	
ou	
$H_1: \mu_{\underline{x}_{medicacao}} \neq 0$	

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 13 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste t-Student, para o número de medicações utilizadas pelos pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

A Tabela 7, juntamente com a Figura 13, indicam que ocorre a rejeição de H_0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da média do número de medicações $\underline{\chi}_{medicação} = 6,66$ medicações ao nível de significância de $\alpha = 10\%$, e que esta média poderá ser maior que este valor dado o comportamento de distribuição da variável número de medicações utilizadas pelos pacientes. A estatística do Fator de Bayes, também indica que há fortes indícios e decisivos de rejeição de H_0 . De maneira resumida o número médio de medicações utilizadas pelos pacientes é próximo de 7 medicações, e tem tendência a aumentar. Tal dado pode ser validado para a população em questão. Isto evidencia uma tendência de aumento na multimorbidade e, por sua vez, na dependência. O aumento das doenças crônicas não transmissíveis é responsável pelo maior consumo de medicações (PNS, 2019).

Em seguida, foram analisadas as pontuações da escala Katz dos 73 pacientes, e também foram calculadas as principais estatísticas descritivas, porém somente com 71 pacientes, pois 2 pacientes não informaram seus valores nesta escala. A tabela 8 discrimina estes resultados.


Tabela 8 - Análise descritiva das pontuações da escala Katz nos 71 pacientes.

Estatística da Escala Katz	Valores
Número de observações: n_{Katz}	71
Mínimo: Min_{Katz}	0 pontos
Máximo: Max_{Katz}	6 pontos
Amplitude: AT_{Katz}	6 pontos
Média: \underline{x}_{Katz}	4,14 pontos
Variância: S_{Katz}^2	5,21 pontos ²
Desvio Padrão: S_{Katz}	2,28 pontos
Coeficiente de Variação: CV_{Katz}	55,11 %

Fonte: Resultados da Pesquisa.


A pontuação média da escala Katz dos 71 pacientes que responderam aos prontuários foi de $\underline{x}_{Katz} = 4,14$ pontos (pacientes parcialmente dependentes), com uma variação alta dada pelo valor do coeficiente de variação alto de $CV_{Katz} = 55,11\%$. A seguir são expostos os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e histograma também com sua curva de densidade de probabilidade, nas figuras 14 e 15.

Figura 14 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Katz dos 71 pacientes.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 15 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente às pontuações da escala Katz dos 71 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

As figuras 14 e 15, demonstram a curva de densidade probabilidade das pontuações da escala Katz, que também representa a distribuição da variável pontuações da escala Katz dos 71 pacientes, demonstrando uma assimetria à

esquerda. Analisou-se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição normal, conforme a figura 16.

Figura 16 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às pontuações da escala Katz dos 71 pacientes, com a distribuição normal.

$$\bar{X} = 4,14; M_0 = 6,00; M_d = 5,00; S = 2,28; AS = -0,87; C = -0,94$$



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Verificou-se pouca proximidade da distribuição das pontuações da escala Katz com a distribuição normal, com assimetria à esquerda, e moderada, e com leve achatamento, dado pelo coeficiente de curtose.

Em seguida, com intuito de avaliar se a distribuição das pontuações da escala Katz possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a tabela 9.

Tabela 9 - Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala Katz nos 71 pacientes.

Estatística W	p-valor
0,74	8,35e-10

H₀: os dados das pontuações da escala Katz apresentam normalidade
ou
H₁: os dados das pontuações da escala Katz não apresentam normalidade

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Desta maneira, rejeita-se H_0 , ao nível de significância $\alpha = 10\%$, logo há indícios de que estes dados não apresentam normalidade, ou seja, possuem assimetria como descrito anteriormente nas Figuras de 19 a 21. Posteriormente foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Katz $Md_{Katz} = 5,00$ pontos (pacientes independentes), pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero, este teste está apresentado na Tabela 10 e Figura 17.

Tabela 10 - Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Katz $Md_{Katz} = 5,00$ pontos, possa ser diferente de zero.


Estatística T = V	p-valor
1891	5,00e-12

H₀: $\mu_{Md_{Katz}} = 0$
ou
H₁: $\mu_{Md_{Katz}} \neq 0$

Fonte: Resultados da Pesquisa.

A tabela 10, juntamente com a Figura 17, revelam que ocorre a rejeição de H_0 neste teste, demonstrando que há indicativo de validação da mediana do das pontuações da escala Katz $Md_{Katz} = 5,00$ pontos ao nível de significância de $\alpha = 10\%$, e que esta mediana poderá ser maior que este valor dado o comportamento de distribuição da variável pontuação da escala Katz nestes pacientes. De maneira resumida, a pontuação mediana na escala Katz utilizada pelos pacientes é 5,00, e tem tendência de aumentar.

Figura 17 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da escala Katz.



Fonte: Resultados da Pesquisa.


E, por final, foram analisadas as pontuações da escala Lawton dos 73 pacientes, e também foram calculadas as principais estatísticas descritivas, porém somente com 69 pacientes, pois 4 pacientes não informaram seus valores nesta escala. A Tabela 11 mostra estes resultados.

Tabela 11 - Análise descritiva das pontuações da escala Lawton nos 69 pacientes.

Estatística da Escala Katz	Valores
Número de observações: n_{Lawton}	71
Mínimo: Min_{Lawton}	9 pontos
Máximo: Max_{Lawton}	27 pontos
Amplitude: AT_{Lawton}	18 pontos
Média: \underline{x}_{Lawton}	16,87 pontos
Variância: S^2_{Lawton}	49,82 pontos ²
Desvio Padrão: S_{Lawton}	7,06 pontos
Coefficiente de Variação: CV_{Lawton}	41,84 %


Fonte: Resultados da Pesquisa.

A pontuação média da escala Lawton dos 69 pacientes que responderam aos prontuários foi de $\underline{x}_{Lawton} = 16,87$ pontos (pacientes com dependência moderada), com uma variação alta dada pelo valor do coeficiente de variação alto de $CV_{Lawton} = 41,84\%$. A seguir, são construídos os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e histograma também com sua curva de densidade de probabilidade, nas Figuras 17 e 18.

Figura 18 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes.

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Figura 19 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes.




Fonte: Resultados da Pesquisa.

As Figuras 17 e 18, demonstram a curva de densidade probabilidade das pontuações da escala Lawton, que também representa a distribuição da variável pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes, demonstrando uma assimetria à direita. Analisou-se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição normal, conforme a Figura 19.

Figura 20 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes, com a distribuição normal.

$\bar{X} = 16,87; M_0 = 9,00; M_d = 16,00; S = 7,06; AS = 0,25; C = -1,54$



Fonte: Resultados da Pesquisa.

Verificou-se pouca proximidade da distribuição das pontuações da escala Lawton com a distribuição normal, com assimetria à direita, e moderada, e com leve achatamento, dado pelo coeficiente de curtose.

Posteriormente, com intuito de avaliar se a distribuição das pontuações da escala Lawton possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a Tabela 12.

Tabela 12 - Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala Lawton nos 69 pacientes.


Estatística W	p-valor
0,85	6,19e-07
<i>H₀: os dados das pontuações da escala Lawton apresentam normalidade</i> ou <i>H₁: os dados das pontuações da escala Lawton não apresentam normalidade</i>	
Fonte: Resultados da Pesquisa.	

Assim, rejeita-se H_0 , ao nível de significância $\alpha = 10\%$, logo há indícios de que estes dados não apresentam normalidade, ou seja, possuem assimetria como descrito anteriormente nas Figuras de 17 a 19. Posteriormente foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Lawton $Md_{Lawton} = 16,00$ pontos (pacientes com dependência moderada), pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero, este teste está apresentado na Tabela 13 e Figura 20.

Tabela 13 - Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Lawton $Md_{Lawton} = 16,00$ pontos, possa ser diferente de zero.

Estatística T = V	p-valor
2415	4,36e-13
<i>H₀: $\mu_{Md_{Lawton}} = 0$</i> ou <i>H₁: $\mu_{Md_{Lawton}} \neq 0$</i>	
Fonte: Resultados da Pesquisa.	

Figura 21 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da escala Lawton.



Fonte: Resultados da Pesquisa.

A Tabela 13, juntamente com a Figura 20, indicam que ocorre a rejeição de H_0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da mediana do das pontuações da escala Lawton $Md_{\text{Lawton}} = 16,00$ pontos ao nível de significância de $\alpha = 10\%$, e que esta mediana poderá ser maior que este valor dado o comportamento de distribuição da variável pontuação da escala Lawton nestes pacientes. De maneira resumida a pontuação mediana na escala Lawton utilizada pelos pacientes é 16,00, e tem tendência de diminuir. Ou seja, a tendência é que estes pacientes se tornem cada vez mais dependentes.

Em resumo, a análise inferencial destas variáveis pôde validar, para a amostra estudada, a tendência do aumento da idade, do uso de mais medicações e de maior dependência por perda funcional. Embora na análise de Katz a curva tenha se deslocado à esquerda (ou seja, mais independente), isoladamente este fato não

pode ser considerado, pois, nos demais domínios, houve tendência de perda funcional e de fatores que levem a esta perda, como o aumento da polifarmácia.

A possibilidade de inferir o comportamento futuro destas variáveis nos permite programar e planejar ações. Conforme descrito anteriormente, a perda funcional associada ao processo de envelhecimento traz impactos individuais, sociais e econômicos. As políticas públicas já existentes voltadas à população idosa trazem em seu corpo a necessidade de avaliação e promoção da capacidade funcional, porém não discriminam instrumentos para isto. O ICOPE, ferramenta proposta pela OPAS, apresenta-se como uma estratégia prática, pois foi desenvolvido para ser aplicado na Atenção Primária. Esta estratégia apresenta cartilhas e metodologia para treinamento e suporte aos profissionais de saúde, estando alinhada com os Objetivos da Década do Envelhecimento Saudável (OPAS, 2020b).

Embora esta pesquisa tenha sido desenvolvida em um cenário de Atenção Secundária à Saúde (ambulatório de especialidade), ela pôde trazer dados objetivos sobre uma amostra da população idosa do município, o que permite traçar um perfil e propor medidas de enfrentamento para o envelhecimento e perda funcional das pessoas idosas.

Um outro ponto a ser considerado nesta dissertação refere-se à avaliação da Capacidade Intrínseca, preconizada no instrumento ICOPE. Este conceito, conforme trazido anteriormente, é relativamente novo (2017), não sendo ainda utilizado rotineiramente nos atendimentos e avaliação geriátrica. Porém, a capacidade intrínseca nada mais é do que a somatória das capacidades funcionais e mentais do indivíduo e suas interações com o ambiente em que vive (OPAS, 2020b), que aqui puderam ser exploradas através das variáveis analisadas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise exploratória desta amostra de 73 prontuários evidenciou que a maior parte dos pacientes atendidos são do sexo feminino, com a maioria das idades variando entre 75 a 89 anos e 5 a 10 anos de escolaridade. A ocorrência de quedas foi identificada em 21,92%, o que, representa um número significativo, dada a morbidade relacionada a este evento. 52,05% dos pacientes residem com algum familiar e 38,36% possuem aposentadoria, dados que sugerem uma maior dependência, tanto na questão do autocuidado, quanto no suporte financeiro. Na avaliação funcional das atividades básicas de vida diária (escala de Katz), a maioria (65,76%) mostrou-se parcialmente dependente, porém nas atividades instrumentais (escala de Lawton), 27,4% são totalmente dependentes.

A análise inferencial dos dados mostrou uma tendência de aumento na idade e na polifarmácia, com a média de 79,64 anos e uso de 6,6 medicamentos respectivamente. Também evidenciou uma média de 4,14 pontos na escala de Katz, que representa uma dependência parcial, e uma média de 16,87 pontos na escala de Lawton - dependência moderada - com tendência a aumentar, ou seja, tornarem-se mais dependentes.

Assim, considerando o desenvolvimento social como a garantia de liberdades e, entendendo esta como a manutenção da autonomia e independência do indivíduo, fica evidente a necessidade de elencar intervenções dadas as tendências apresentadas - como por exemplo, acesso à saúde e medidas de prevenção e controle de doenças crônicas; estímulo à atividade física e atividades de reabilitação motora e cognitiva; promoção de espaços de convivência, fortalecimento de vínculos sociais e atividades de lazer para esta população.

A década do Envelhecimento Saudável (2020-203) traz esse olhar e propõe o uso da ferramenta ICOPE para avaliação do idoso na Atenção Primária, com o objetivo de identificar fragilidades e promover o envelhecimento saudável, com a manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida. A implantação desta ferramenta iria ao encontro do cumprimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Como uma última consideração, embora não tenha sido um objetivo desta dissertação, evidenciou-se na revisão dos prontuários a ausência de informações relevantes ao cuidado ao idoso na anamnese médica, como o suporte social, a escolaridade do paciente e renda. Informações estas que norteiam e individualizam o cuidado. Assim, sugere-se reforçar a importância da avaliação psicossocial com os estudantes de medicina.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, A. O. et. al. **Política Nacional do Idoso - velhas e novas questões**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Ministério do Planejamento. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7253>. [acesso em: 24 de novembro de 2022].

BRAGA, P. M. V. **Envelhecimento, Ética e Cidadania**. O Neófito - Informativo Jurídico, 2001. Disponível em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/3.pdf [acesso em: 30 de janeiro de 2024].

BRAGA, S. F. M.; GUIMARAES, L. V. M.; SILVEIRA, R. B.; PINHEIRO, D. C. As políticas públicas para o idoso no Brasil: a cidadania no envelhecimento. **Rev. Diálogos Interdisciplinares**, v. 5, n. 3, 2016. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.edu.br/index.php/dialogos/article/view/171/338> [acesso em: 30 de janeiro de 2024].

BRASIL. **Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991. Lei Orgânica da Seguridade Social**. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Brasília, DF, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212rep.htm [acesso em: 30 de janeiro de 2024].

BRASIL. **Lei nº 8842, de 4 de janeiro de 1994**. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Brasília, DF, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm [acesso em: 29 de janeiro de 2025].

_____. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm [acesso em 2 de outubro de 2023].

BRASIL. Ministério da Saúde. **Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. [acesso em: 2 de outubro de 2023]

_____. **Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa**. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, nº 19. Brasília, DF, 2007. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abca19.pdf> [acesso em 2 de janeiro de 2025].

_____. **Guia de cuidado à pessoa Idosa**. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_cuidados_pessoa_idosa.pdf [acesso em 10 de fevereiro de 2024].

CONOVER, W. J. **Practical nonparametric statistics**. John Wiley & Sons, vol. 350, 1999.

CORREA, M. R. Envelhecer na cidade. **Rev. Espaço acadêmico**, v.16, n. 184, Dossiê Subjetividades e Cidades, ano XVI, setembro de 2016. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/32813> [acesso em: 30 de janeiro de 2024].

CORVELO DELBONI, M. C.; AREOSA, S. V. C.; ROHDE, J.; PONTE, A. S.; NASCIMENTO, N. C.; ANVERSA, A. C. Demografia e o envelhecimento em Portugal e no Brasil: Reflexões para o Desenvolvimento Regional. **Revista Sociais e Humanas**, v. 33, n. 3, 2020. DOI: 10.5902/2317175834555. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/34555>. [acesso em: 2 outubro 2023].

FRANCA, SP. Secretaria Municipal de Saúde. **Plano Municipal de Saúde 2022-2025**, 2022.

GALERA, C. G.; FREITAS, E. V.; COSTA, E. F. A.; GABRIELE, R. R. Avaliação Geriátrica Ampla. In: FREITAS, E. V.; PY, L. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**, 5ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022, p. 707-739.

GADELHA, C. A. G. A Saúde como opção estratégica para o desenvolvimento do Brasil. In: GADELHA, C. A. G.; GIMENEZ, D. M.; CASSIOLATO, J. E. (Coord.). **Saúde é desenvolvimento: o complexo econômico-industrial da saúde como opção estratégica nacional**. Rio de Janeiro: Fiocruz-CEE, 2022. p.12-31.

GADELHA, C. A. G et al. A Saúde é desenvolvimento. In: GADELHA, C. A. G.; GIMENEZ, D. M.; CASSIOLATO, J. E. (Coord.). **Saúde é desenvolvimento: o complexo econômico-industrial da saúde como opção estratégica nacional**. Rio de Janeiro: Fiocruz-CEE, 2022. p. 244-250.

GADELHA, C. A. G.; COSTA, L. S. Saúde e desenvolvimento no Brasil: avanços e desafios. **Rev Saúde Pública**, v. 46, (supl 1), p. 13-20, Dez 2012. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012005000062>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/tY88TFnwqxn5x8PgN3x8Pmc/> [acesso em 10 de fevereiro de 2024].

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**. Ciclos de vida. IBGE. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.pns.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/12/liv101846.pdf> [acesso em 17 de janeiro de 2025].

_____. **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos**. Brasília, DF, 2023. Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos#:~:text=J%C3%A1%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20de,sexo%2C%20do%20Censo%20Demogr%C3%A1fico%202022> [acesso em 30 de janeiro de 2024].

_____. **População cresce, mas número de pessoas com menos de 30 anos cai 5,4% de 2012 a 2021.** Agência de Notícias IBGE, 6 de setembro 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34438-populacao-cresce-mas-numero-de-pessoas-com-menos-de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

_____. **Em 2022, o analfabetismo cai, mas continua alto entre idosos, pretos e pardos no Nordeste.** Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37089-em-2022-analfabetismo-cai-mas-continua-mais-alto-entre-idosos-pretos-e-pardos-e-no-nordeste>. [acesso em: 30 de janeiro de 2024]

_____. **Novembro negro: a população idosa negra e o direito ao envelhecimento.** Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/novembro-negro-a-populacao-idosa-negra-e-o-direito-ao-envelhecimento#:~:text=Segundo%20os%20dados%20mais%20recentes,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20%C3%A9%20negra>. [acesso em: 30 de janeiro de 2024]

IEPSDATA. INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. **Visualização de Dados: Percentual da População com 65 anos ou mais em São Paulo em 2021.** 2021. Disponível em: https://iepsdata.org.br/visualizations?chart=1&indicator=pct_pop65m&state=S%C3%A3o%20Paulo&id_estado=35&year=em%202021&granularity=viz. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

IEPESDATA. INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. **Idosos de menor renda têm piores indicadores de saúde e menos acesso a cuidados médicos, aponta estudo do IEPS.** 2023. Atualizado em maio de 2024. Disponível em: <https://ieps.org.br/idosos-de-menor-renda-tem-piores-indicadores-de-saude-e-menos-acesso-a-cuidados-medicos-aponta-estudo-do-ieps/> [acesso em 17 de janeiro de 2025].

IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Índice de Desenvolvimento Humano no município de Franca-SP.** Rev. PNUD - O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. Série Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Atlas Brasil, 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-educacao> [acesso em 10 de fevereiro de 2024].

IPGG. INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. **Guia de Avaliação Funcional do Idoso.** 2ª ed. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde,

2015. 33p. Disponível em: <https://www.saude.sp.gov.br/resources/ipgg/guias-e-manuais/ipgg-avaliacaofuncionaldoidoso.pdf>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

JACCOUD, L.; MENESES, A. Coordenação e relações intergovernamentais no SUS- o Pacto pela Saúde e seu legado. In: JACCOUD, L. (Org.). **Coordenação e relações intergovernamentais nas políticas sociais brasileiras**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): Brasília, 2020, p. 215-250. DOI <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-005-9/cap7>. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10240/1/IntergSusPactoSaude_cap07.pdf [acesso em 10 de fevereiro de 2024].

KASS, R. E.; RAFTERY, A. E. Bayes factors. **Journal of the american statistical association**, v. 90, n. 430, p. 773-795, 1995.

KIST, R. B. B.; AREOSA, S. V. C. Envelhecer na perspectiva do envelhecimento satisfatório: o caso dos idosos do Vale do Rio Pardo. **REDES - Rev. Des. Regional**, Santa Cruz do Sul, v. 19, ed. especial, p. 65-78, 2014.

LAWTON, M. P.; BRODY, E. M. Assessment of older people; self-maintaining and instrumental activities of daily living. **Gerontology**, v. 9, n. 3, p. 179-186, 1969.

NOGUEIRA, J.; BRAUNA, M. **Documento orientador de políticas de apoio ao cuidador familiar no Brasil**. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Brasil, 2022.

OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde**. Genebra: OMS, 2015. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf?sequence=6. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE Cartilha da OPAS - **Década do Envelhecimento Saudável**. OPAS, 2020a. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52902/OPASWBRAFPL20120_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023]

_____. **Atenção Integrada para a Pessoa Idosa (ICOPE)**: orientações sobre a avaliação centrada na pessoa e roteiros para a atenção primária. Washington, DC: OPAS; 2020b. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51974/OPASFPLHL200004A_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

_____. **Portfólio**: Programas baseados em evidência para um cuidado integrado e centrado para a pessoa idosa na atenção primária à saúde. Washington, DC: OPAS; 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275725818>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

_____. **Contexto sociodemográfico e econômico do envelhecimento na América Latina**. Washington, DC: OPAS; 2023. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57778/9789275726839_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

PAPALÉO, M. **Estudo da Velhice- Histórico, definição de campo e termos básicos.** In: FREITAS, E.V.; PY, L. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**, 5ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022, p. 247-265.

PERONI, F. M. et al. **Envelhecimento e atenção à dependência no Brasil.** Banco Interamericano de Desenvolvimento, Divisão de Proteção Social y Saúde. Março 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18235/0004792>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

PIMENTEL, W. R.T.; PAGOTTO, V; STOPA, S.R; HOFFMAN, M.C.C.L; BOF de ANDRADE, F; SOUZA-JUNIOR, P.R.B; et al. Quedas entre idosos brasileiros residentes em áreas urbanas: ELSI-Brasil. **Rev Saude Publica**, v. 52, Supl 2, 12s., 2018. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2018052000635> [acesso em 17 de janeiro de 2025].

PINHEIRO, O. D.; AREOSA, S. V. C. A Importância de Políticas Públicas para Idosos. **Rev. Bras. de Assuntos Regionais e Urbanos (BARU)**, v. 4, n. 2, p. 183-193, jul./dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.18224/baru.v4i2.6724>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

PNUD. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório do desenvolvimento humano 2013. Ascensão do Sul: Progresso Humano num mundo diversificado.** Nova York, 2013. Disponível em: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2013portuguese.pdf>. [acesso em 2 de outubro de 2023].

R CORE TEAM: **A Language and Environment for Statistical Computing.** R Foundation for Statistical Computing, 2005. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

REIS, C.; BARBOSA, L. M. L. H.; PIMENTEL, V. P. O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva sistêmica da saúde. **BNDES Setorial**, n. 44, p. 87-124, 2016. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9955> [acesso em 11 de fevereiro 2024].

ROCHA, V. L. et al. Motivos que levam mulheres e homens a buscar as unidades básicas de saúde. **J. nurs. Health**, v. 12, n. 2, p. e2212220880, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/20880>. [acesso em 17 de janeiro de 2025].

SEADE. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Perspectivas da População Feminina Idosa para 2023.** Informações Demográficas, 2023. Disponível em: <https://informa.seade.gov.br/perspectivas-da-populacao-feminina-idosa-para-2023/>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

_____. Seade Informa: **Envelhecimento Demográfico Avança no Território Paulista.** São Paulo, julho 2022. Disponível em: <https://informa.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/8/2022/07/Seade-informa-envelhecimento-demografico-avanca-territorio-paulista.pdf>. [acesso em: 2 de outubro de 2023].

SANTOS, A. M.; GAETA, P. Avaliação Geriátrica Ampla. In: FALCÃO, L. F. R.; COSTA, L. H. D. **Manual de Geriatria**. Manual do Residente da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. São Paulo:Roca, 2012, p. 2-10.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, v. 52, p.591–611, 1965.

SPERANZA, A. C.; WERLE, B. M.; MOREIRA, V. G. Envelhecimento Saudável. In: FREITAS, E. V.; PY, L. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**, 5ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022, p.435-448.

UNFPA - Fundo de Populações das Nações Unidas. **Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafios. Resumo Executivo**. UNFPA e HelpAge International, 2012. Disponível em: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Portuguese-Exec-Summary_0.pdf [acesso em: 2 de outubro de 2023].

WILCOXON, F. Individual comparisons by ranking methods. In: **Breakthroughs in statistics: Methodology and distribution**, New York: Springer, 1992, p.196-202.

WILCOXON, F.; KATTI, S.; WILCOX, R. A. Critical values and probability levels for the Wilcoxon rank sum test and the Wilcoxon signed rank test. **Selected tables in mathematical statistics**, v.1, p.171-259, 1970.

ANEXO

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Envelhecimento populacional: avaliação funcional como estratégia de enfrentamento para o Desenvolvimento Social

Pesquisador: Patricia Bombicino Damian

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 75983123.1.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.554.283

Apresentação do Projeto:

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa por meio de fontes de dados secundárias, obtidas através de prontuários médicos de pacientes idosos, atendidos em um ambulatório escola de município do interior de São Paulo.

Objetivo da Pesquisa:

Descrever o perfil funcional das pessoas idosas acompanhados em um ambulatório escola de geriatria. Identificar o status sócio-epidemiológico da amostra de 100 pacientes idosos caracterizado pelo: suporte social, grau de escolaridade, renda, multimorbidade e polifarmácia. Propor um projeto de intervenção em saúde de acordo com os resultados obtidos

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Descritos adequadamente no corpo do texto.

Riscos mínimos relacionados com a confidencialidade..

Como benefício, a pesquisa fornecerá dados para melhor compreensão dos status socioepidemiológico e funcional dos idosos do município e promover políticas e ações públicas que contribuam com o envelhecimento saudável.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa importante para a área de saúde do idoso.

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
Bairro: São José **CEP:** 14.403-430
UF: SP **Município:** FRANCA
Telefone: (16)3713-4630 **Fax:** (16)3713-4605 **E-mail:** comep@facef.br



Continuação do Parecer: 6.554.283

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O autor solicitou dispensa do TCLE por tratar-se de pesquisa em dados secundários.

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

Projeto aprovado, pois contempla as Resoluções e Normativas da Conep.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2249988.pdf	22/11/2023 22:37:38		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoEnvelhecimento populacionalDesenvolvimentosocial.docx	22/11/2023 22:36:42	Patrícia Bombicino Damian	Aceito
Declaração de concordância	Anuenciaprefeitura.pdf	22/11/2023 22:19:58	Patrícia Bombicino Damian	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	solicitacaoassinada.pdf	21/11/2023 22:45:35	Patrícia Bombicino Damian	Aceito
Folha de Rosto	IMG_20231121_094235.pdf	21/11/2023 22:03:00	Patrícia Bombicino Damian	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

FRANCA, 05 de Dezembro de 2023

Assinado por:
Antonio Cezar Peron
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
Bairro: São José CEP: 14.403-430
UF: SP Município: FRANCA
Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br