

UNI-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UMA
FERRAMENTA DIGITAL PARA SUPORTE À CONDUTA MÉDICA NO
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA**

**FRANCA
2026**

MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UMA
FERRAMENTA DIGITAL PARA SUPORTE À CONDUTA MÉDICA NO
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas.

Orientadora: Profa. Dra. Livia Maria Lopes Gazaffi

**FRANCA
2026**

Brasileiro, Maria Paula Piassi

B83d Desenvolvimento e validação de conteúdo de uma ferramenta digital para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama. / Maria Paula Piassi Brasileiro. – Franca (SP): Uni- FACEF, 2026.
81p.; il.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Livia Maria Lopes Gazaffi
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional
(Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas)

1.Câncer de mama. 2.Programas de rastreamento. 3.Mudança social. 4.Tecnologia digital. I.T.

CDD 616.99249

MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UMA
FERRAMENTA DIGITAL PARA SUPORTE À CONDUTA MÉDICA NO
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas.

Orientadora: Profa. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi

Franca, 09 de março de 2026

Orientadora: _____

Nome: Lívia Maria Lopes Gazaffi

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca - UniFACEF

Examinador: _____

Nome: Daniel Facciolo Pires

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca - UniFACEF

Examinadora: _____

Nome: Laura Andrian Leal

Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP

AGRADECIMENTOS

- Agradeço, primeiramente, a Deus, por iluminar meus caminhos e orientar minhas decisões, concedendo-me força, resiliência e discernimento para superar os desafios ao longo desta jornada;
- aos meus pais, Pauleti e Marinho, pelo amor incondicional, pelo apoio constante e por serem meu alicerce em todos os momentos, acreditando em mim mesmo quando eu mesma duvidei;
- ao meu namorado, Raphael, pelo companheirismo, amor, paciência, incentivo diário e por caminhar ao meu lado, especialmente nos dias mais difíceis;
- ao meu irmão, Augusto, e à minha cunhada, Julia, por celebrarem comigo a cada etapa conquistada;
- à minha orientadora, Prof^a Livia, pela generosidade em compartilhar conhecimentos, pela dedicação, confiança e pelo apoio presente em todas as etapas desta pesquisa;
- aos participantes da pesquisa, pela disponibilidade e colaboração, sem as quais este trabalho não teria sido possível;
- ao aluno de Engenharia de Software, Arthur, pelo comprometimento e pela contribuição, essenciais no desenvolvimento da ferramenta;
- aos professores e colegas do mestrado, pelos aprendizados compartilhados, pelos debates enriquecedores e pelo apoio mútuo ao longo dessa caminhada;

- às secretárias da Pós-Graduação, Layla e Daniela, pela atenção, paciência e acolhimento durante todo este percurso;
- ao Centro Universitário Municipal de Franca – UniFACEF, pela oportunidade de realizar o curso de Mestrado e pelo ambiente acadêmico que tornou este sonho possível.

*A medicina é uma ciência de incertezas e
uma arte de probabilidades.*

William Osler

RESUMO

O câncer de mama permanece como um importante problema de saúde pública, sendo a principal neoplasia maligna entre as mulheres no Brasil. A detecção precoce, associada a adequada estratificação de risco individual, é fundamental para a redução da morbimortalidade associada à doença, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, a adoção de instrumentos válidos e confiáveis configura-se como estratégia complementar para apoiar a identificação de fatores de risco e a tomada de decisão clínica. O presente estudo teve como objetivo construir e validar o conteúdo de uma ferramenta digital para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama, levando em consideração o risco individualizado de cada paciente, com foco na clareza e representatividade de seus itens. Trata-se de um estudo metodológico de validação de conteúdo, realizado por meio da avaliação de especialistas da área de Ginecologia e Obstetrícia. Os juízes analisaram os itens do instrumento utilizando escala ordinal de quatro pontos, permitindo o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Os resultados demonstraram elevado nível de concordância entre os especialistas, com a maioria dos itens apresentando IVC igual a 1,00 tanto para clareza quanto para representatividade. Alguns itens apresentaram valores ligeiramente inferiores, porém acima do ponto de corte recomendado na literatura, sendo considerados válidos, ainda que passíveis de ajustes pontuais na redação. Conclui-se que a ferramenta apresenta adequada validade de conteúdo, configurando-se como um instrumento potencialmente útil para apoiar estratégias de prevenção, rastreamento e organização do cuidado relacionado ao câncer de mama no âmbito da atenção à saúde. Estudos futuros são recomendados para avaliar outras propriedades psicométricas do instrumento.

Palavras-Chave: Câncer de mama. Programas de rastreamento. Mudança social. Tecnologia digital.

ABSTRACT

Breast cancer remains a major public health problem and is the leading malignant neoplasm among women in Brazil. Early detection, combined with appropriate individual risk stratification, is essential to reduce morbidity and mortality associated with the disease, especially within the context of the Brazilian Unified Health System (SUS). In this regard, the adoption of valid and reliable instruments constitutes a complementary strategy to support the identification of risk factors and clinical decision-making. The present study aimed to build and validate the content of a digital tool to support medical decision-making in breast cancer screening, considering each patient's individualized risk, with a focus on the clarity and representativeness of its items. This is a methodological content validation study conducted through the evaluation of experts in the field of Gynecology and Obstetrics. The judges analyzed the instrument items using a four-point ordinal scale, allowing the calculation of the Content Validity Index (CVI). The results demonstrated a high level of agreement among the experts, with most items presenting a CVI of 1.00 for both clarity and representativeness. Some items showed slightly lower values; however, they remained above the cutoff point recommended in the literature and were therefore considered valid, although minor wording adjustments may be warranted. It is concluded that the tool presents adequate content validity, constituting a potentially useful instrument to support prevention strategies, screening, and the organization of care related to breast cancer within healthcare settings. Future studies are recommended to evaluate other psychometric properties of the instrument.

Keywords: Breast cancer. Screening programs. Social change. Digital technology.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AB — Atenção Básica
AJCC — *American Joint Committee on Cancer*
BCRAT — *Breast Cancer Risk Assessment Tool*
BOADICEA — *Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation Algorithm*
BRCA1 — *Breast Cancer Gene 1*
BRCA2 — *Breast Cancer Gene 2*
CAAE — Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
CDIS — *Carcinoma Ductal in situ*
CDSS — *Clinical Decision Support Systems*
CISH — *Chromogenic in situ Hybridization*
CLIS — *Carcinoma Lobular in situ*
DCIS — *Ductal Carcinoma in situ*
DISH — *Dual in situ Hybridization*
eHealth — *Electronic Health*
FEBRASGO — Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
GO — Ginecologia e Obstetrícia
HER2 — *Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2*
HDA — Hiperplasia Ductal Atípica
HIP — *Health Insurance Plan*
HLA — Hiperplasia Lobular Atípica
IBIS — *International Breast Cancer Intervention Study*
INCA — Instituto Nacional de Câncer
IVC — Índice de Validade de Conteúdo
Ki-67 — Marcador de proliferação celular Ki-67
LCIS — Lobular Carcinoma in situ
LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados
MS — Ministério da Saúde
NCI — *National Cancer Institute*
OMS — Organização Mundial da Saúde
P — Participante
PAISM — Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
PTEN — *Phosphatase and Tensin Homolog*
RCBP — Registro de Câncer de Base Populacional
RE — Receptor de Estrogênio
RHC — Registro Hospitalar de Câncer
RP — Receptor de Progesterona
SISH — *Silver in situ Hybridization*
SIM — Sistema de Informação sobre Mortalidade
Siscan — Sistema de Informação do Câncer
SUS — Sistema Único de Saúde
TCLE — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TICs — Tecnologias da Informação e Comunicação
TNM — *Tumor, Node, Metastasis*
TP53 — *Tumor Protein p53*
UICC — *Union for International Cancer Control*
WHO — *World Health Organization*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição da clareza de cada item da ferramenta e IVC, Franca-São Paulo, 2026.....	59
Tabela 2 – Distribuição da representatividade de cada item da ferramenta e IVC, Franca-São Paulo, 2026.....	61

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 Câncer de Mama: Uma Doença Multifatorial	17
2.1 Epidemiologia	17
2.2 Fatores de Risco e Prevenção	18
2.3 Etiologia e Patogênese	20
2.4 Quadro Clínico	22
2.5 Diagnóstico	23
2.6 Estadiamento	24
2.7 Opções Terapêuticas	25
2.8 Prognóstico	27
3 Políticas Públicas de Rastreamento para o Câncer de Mama no Brasil	28
4 Tecnologias Digitais em Saúde e Ferramentas de Estratificação de Risco para o Câncer de Mama	34
4.1 Modelo de Gail (<i>BREAST CANCER RISK ASSESMENT TOOL</i> - BCRAT)	37
4.2 Modelo de Tyrer-Cuzick IBIS (<i>BREAST CANCER RISK EVALUATION TOOL</i>)	38
4.3 BOADICEA (<i>BREAST AND OVARIAN ANALYSIS OF DISEASE INCIDENCE AND CARRIER ESTIMATION ALGORITHM</i>)	38
5 A Prevenção em Saúde como Pilar do Desenvolvimento Social	40
6 Procedimentos Metodológicos	44
6.1 Etapa 1: Estabelecimento da Estrutura Conceitual	44
6.1.1 Mulheres com Risco Habitual	45
6.1.2 Mulheres com Mamas Densas	46
6.1.3 Mulheres com História Pessoal de Hiperplasia Lobular Atípica (HLA), Carcinoma Lobular <i>in situ</i> Clássico (CLIS) ou Hiperplasia Ductal Atípica (HDA)	46
6.1.4 Mulheres com História Pessoal de Tratamento de Câncer de Mama Invasor ou Carcinoma Ductal <i>in situ</i>	47
6.1.5 Mulheres com História de Radioterapia Torácica Prévia	47

6.1.6 Mulheres Portadoras de Mutações Genéticas ou com Forte História Familiar de Câncer de Mama	47
6.2 ETAPA 2: DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO INSTRUMENTO E DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA	48
6.3 ETAPA 3: CONSTRUÇÃO DOS ITENS E DAS ESCALAS DE RESPOSTA.....	49
6.4 ETAPA 4: SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ITENS	49
6.5 ETAPA 5: ESTRUTURAÇÃO DO INSTRUMENTO	51
6.6 ETAPA 6: VALIDADE DO CONTEÚDO	51
7 RESULTADOS	56
7.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS JUÍZES ESPECIALISTAS.....	56
7.2 AVALIAÇÃO GLOBAL DO INSTRUMENTO (ETAPA 2 DO QUESTIONÁRIO).....	56
7.3 AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO DO INSTRUMENTO (ETAPA 3 DO QUESTIONÁRIO)	57
7.4 AVALIAÇÃO DOS ITENS INDIVIDUAIS (ETAPA 4 DO QUESTIONÁRIO)	58
7.5 ANÁLISE QUALITATIVA DAS SUGESTÕES DOS JUÍZES.....	62
8 DISCUSSÃO	64
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	67
REFERÊNCIAS.....	69
APÊNDICE A - MODELO DE FLUXOGRAMA NORTEADOR.....	76
APÊNDICE B - INTERFACES DA FERRAMENTA DIGITAL CONSTRUÍDA	77
ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA.....	79

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama constitui um relevante problema de saúde pública, sendo a neoplasia maligna de maior incidência entre as mulheres no Brasil, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimam-se aproximadamente 73.610 novos casos anuais da doença, com taxa de incidência de 41,89 casos a cada 100.000 mulheres. Além disso, o câncer de mama representa a principal causa de morte por neoplasias malignas na população feminina, com cerca de 19.000 óbitos registrados em 2022. Apesar desse cenário, a doença apresenta elevadas taxas de cura quando diagnosticada em estágios iniciais, o que reforça a importância das estratégias de detecção precoce (Instituto Nacional de Câncer, 2024).

Nesse contexto, o rastreamento do câncer de mama assume papel central na redução da morbimortalidade associada à doença, especialmente em mulheres assintomáticas. O rastreamento pode ser realizado de forma populacional, por meio de programas organizados que convocam ativamente a população-alvo, ou de forma oportunística, quando os exames são solicitados durante atendimentos realizados por outros motivos de saúde. No Brasil, predomina o modelo oportunístico, o que contribui para desigualdades no acesso, variações na indicação dos exames e fragilidades na padronização das condutas clínicas (Instituto Nacional de Câncer, 2015; Brasil, 2024).

As políticas públicas de rastreamento do câncer de mama no país fundamentam-se em diretrizes nacionais que estabelecem critérios de faixa etária, periodicidade e indicações específicas conforme o perfil de risco das mulheres. No entanto, a estratificação adequada do risco individual permanece como um desafio na prática clínica, uma vez que múltiplos fatores, como idade, histórico familiar, mutações genéticas, lesões mamárias pré-malignas e exposição prévia à radioterapia torácica, exercem impactos distintos sobre a probabilidade de desenvolvimento da doença. Essa complexidade dificulta a tomada de decisão médica, especialmente nos serviços de atenção primária à saúde (Brasil, 2024).

Embora existam modelos matemáticos e ferramentas para estimativa de risco de câncer de mama, observa-se a escassez de instrumentos digitais adaptados às diretrizes brasileiras que integrem a classificação de risco às recomendações práticas de exames e condutas clínicas. A ausência de ferramentas validadas e sistematizadas

pode contribuir para condutas heterogêneas, uso inadequado de recursos diagnósticos e potenciais danos associados à realização excessiva ou insuficiente de exames, em desacordo com os princípios da prevenção quaternária e da equidade em saúde (Jamoulle, 2015).

Diante desse cenário, a incorporação de tecnologias de apoio à decisão clínica surge como uma estratégia promissora para aproximar as evidências científicas da prática cotidiana dos profissionais de saúde (Murthi *et al.*, 2024). Ferramentas digitais baseadas em fatores de risco individualizados e alinhadas às diretrizes nacionais têm potencial para qualificar o rastreamento do câncer de mama, promovendo maior padronização das condutas, racionalização do uso de recursos e fortalecimento das políticas públicas de saúde. Além disso, ao favorecer decisões mais equitativas, tais tecnologias contribuem para a redução das desigualdades no acesso às ações de prevenção e detecção precoce (Costantini *et al.*, 2023).

Assim, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: como qualificar a tomada de decisão médica na indicação de exames para o rastreamento do câncer de mama considerando os fatores de risco individuais e as evidências científicas atualizadas? Parte-se da hipótese de que a utilização de uma ferramenta digital baseada em evidências científicas e fatores de risco individualizados pode aprimorar a precisão das recomendações de exames, contribuindo para a otimização da prática clínica e das políticas públicas de saúde voltadas ao rastreamento do câncer de mama.

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é construir e validar o conteúdo de uma ferramenta digital destinada a auxiliar a tomada de decisão médica quanto à indicação de exames para o rastreamento do câncer de mama, considerando os fatores de risco individuais das pacientes.

Como objetivos específicos, destacam-se: desenvolver um fluxograma de conduta clínica baseado na estratificação de risco; realizar a validação de conteúdo da ferramenta por especialistas; e analisar a clareza e a representatividade dos itens propostos, assegurando sua adequação ao contexto da prática médica e das políticas públicas de saúde.

De modo a cumprir os objetivos traçados serão utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: a pesquisa seguirá uma abordagem quantitativa e qualitativa, permitindo tanto a construção do instrumento quanto a validação de seu conteúdo. A metodologia segue uma abordagem de desenvolvimento de instrumentos de saúde,

dividida em seis etapas sistematizadas. Essas etapas garantem que o processo de desenvolvimento e validação seja rigoroso, transparente e eficiente, assegurando a qualidade da ferramenta desenvolvida.

Espera-se que a implementação da ferramenta, reduza falhas no processo diagnóstico e contribua para o aumento da detecção precoce do câncer de mama. Além disso, a ferramenta proposta tem potencial para qualificar a prática médica ao oferecer suporte à decisão clínica baseado em evidências, promovendo um cuidado mais individualizado e eficiente. Para o paciente, representa um avanço na garantia de acesso a condutas mais adequadas ao seu perfil de risco, fortalecendo o princípio da equidade no cuidado em saúde.

Do ponto de vista das políticas públicas, a padronização das condutas e a racionalização do uso de recursos podem contribuir significativamente para a efetividade dos programas de rastreamento, reduzindo desigualdades regionais e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, ao incorporar a lógica da prevenção como estratégia de ampliação das capacidades humanas, esta iniciativa se alinha aos princípios do desenvolvimento social, promovendo justiça e ampliando oportunidades de vida digna para a população feminina.

2 CÂNCER DE MAMA: UMA DOENÇA MULTIFATORIAL

O câncer de mama é definido como a proliferação de células neoplásicas originadas nas glândulas mamárias com crescimento anormal, que podem se restringir aos ductos mamários, aos lóbulos mamários ou se disseminarem para regiões extra-mamárias, variando de acordo com sua etiologia e histopatologia (World Health Organization, 2025).

2.1 EPIDEMIOLOGIA

O câncer de mama constitui a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres no Brasil, com exceção do câncer de pele não melanoma, além de representar a principal causa de morte feminina por câncer no país. Nas últimas décadas, observou-se avanço significativo nas estratégias de detecção precoce e no acesso ao tratamento, o que contribuiu para melhorias na sobrevida. Contudo, tais benefícios não se distribuem de forma homogênea entre as regiões brasileiras, refletindo desigualdades estruturais e de acesso aos serviços de saúde (Brasil, 2024).

A vigilância epidemiológica do câncer de mama no Brasil fundamenta-se em múltiplos sistemas de informação oficiais, incluindo os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), os Registros Hospitalares de Câncer (RHC), o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação do Câncer (Siscan), permitindo a análise integrada da incidência, mortalidade e perfil dos casos diagnosticados (Brasil, 2024).

A incidência do câncer de mama apresenta forte associação com a idade, sendo a maior concentração de casos observada a partir dos 50 anos. Dados provenientes dos RCBP indicam que essa neoplasia mantém padrão etário consistente ao longo dos anos analisados, com estabilidade do percentual de casos diagnosticados na faixa etária de 40 a 49 anos no período de 2010 a 2018. Embora raro, o câncer de mama também acomete homens cis, correspondendo a aproximadamente 1% do total de casos registrados no país, o que reforça seu caráter predominantemente feminino, mas não exclusivo (Brasil, 2024).

O câncer de mama permanece como a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Em 2023, a taxa de mortalidade ajustada por idade foi de 12,58

óbitos por 100 mil mulheres, evidenciando variações regionais importantes. As maiores taxas foram observadas nas regiões Sul e Sudeste, seguidas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte (Brasil, 2024).

No mesmo ano, o país registrou mais de 20 mil óbitos femininos por câncer de mama, com maior concentração absoluta nas regiões Sudeste e Nordeste, fenômeno que acompanha a distribuição populacional nacional. Destaca-se que estados como São Paulo e Bahia concentraram proporções expressivas desses óbitos em suas respectivas regiões. A análise temporal das taxas de mortalidade demonstra uma queda nos anos de 2020 e 2021, possivelmente relacionada ao contexto da pandemia de covid-19, seguida de retomada da tendência de crescimento previamente observada, sugerindo impacto conjuntural sobre os registros de óbitos nesse período (Brasil, 2024).

Em 2023, essa neoplasia respondeu por 16,6% de todas as mortes por câncer no sexo feminino no Brasil, ocupando a primeira posição nacional. Esse padrão se manteve em todas as regiões, com exceção da região Norte, onde o câncer de mama figurou como a segunda principal causa de morte por câncer entre mulheres (Brasil, 2024).

2.2 FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO

O câncer de mama caracteriza-se como uma doença de natureza multifatorial. O aumento da idade constitui o principal fator de risco, estando relacionado tanto ao acúmulo progressivo de exposições ao longo da vida quanto às alterações biológicas inerentes ao processo de envelhecimento (Obeagu; Obeagu, 2024). Além da idade, os fatores de risco classicamente reconhecidos podem ser agrupados em três grandes categorias: fatores endócrinos e relacionados à história reprodutiva, fatores comportamentais e ambientais, e fatores genéticos ou hereditários. Os fatores de risco que impactam na periodicidade e forma em que será realizado o rastreamento serão mais bem discutidos no próximo capítulo (Brasil, 2024; Urban *et al.*, 2023).

Os fatores endócrinos e reprodutivos estão predominantemente associados à exposição prolongada ao estrogênio, seja de origem endógena ou exógena. Entre eles destacam-se a menarca em idade precoce, a menopausa tardia, a primeira gestação após os 30 anos, a nuliparidade, o uso prolongado de contraceptivos hormonais combinados e a terapia de reposição hormonal no período pós-menopausa,

especialmente quando utilizada por tempo superior a cinco anos. O risco de desenvolvimento do câncer de mama aumenta de forma proporcional ao tempo e à intensidade dessa exposição hormonal (Brasil, 2024; Inumaru; Silveira; Naves, 2011).

No grupo dos fatores comportamentais e ambientais, aqueles com maior consistência de evidências incluem o consumo de bebidas alcoólicas, o excesso de peso corporal, a inatividade física e a exposição à radiação ionizante. A associação entre o consumo de álcool e o câncer de mama pode ser explicada por diversos mecanismos biológicos. O etanol é metabolizado no organismo em acetaldeído, uma substância com potencial carcinogênico. Além disso, o álcool pode atuar como solvente, facilitando a penetração de outras substâncias carcinogênicas nas células (Batista *et al.*, 2020; Brasil, 2024).

Em relação à prática de atividade física, seus efeitos protetores estão relacionados, entre outros mecanismos, à regulação dos níveis hormonais, incluindo hormônios sexuais e aqueles envolvidos no metabolismo da glicose, além do fortalecimento da resposta imunológica (Batista *et al.*, 2020; Obeagu; Obeagu, 2024).

O tabagismo, embora apresente resultados mais controversos na literatura, é atualmente classificado como agente carcinogênico com evidência limitada para o câncer de mama em humanos. As evidências disponíveis sugerem uma possível associação com o aumento do risco, embora ainda não sejam consideradas conclusivas (Batista *et al.*, 2020).

No âmbito dos fatores ocupacionais, o câncer de mama tem sido associado a exposições reconhecidas como carcinogênicas para humanos, incluindo radiações ionizantes, óxido de etileno, pesticidas organoclorados, como o dieldrin, e bifenilas policloradas. O risco associado à exposição à radiação ionizante está diretamente relacionado à dose acumulada e à frequência de exposição. Doses elevadas ou moderadas, como aquelas recebidas durante radioterapia torácica em idade jovem, bem como exposições repetidas a doses baixas ao longo do tempo, podem contribuir para o aumento do risco de desenvolvimento do câncer de mama (Obeagu; Obeagu, 2024).

Os fatores genéticos e hereditários envolvem mutações em genes específicos, sendo os mais conhecidos *BRCA1* e *BRCA2*, além de outros genes associados à reparação do DNA e ao controle do ciclo celular. Situações sugestivas de predisposição hereditária incluem a presença de múltiplos casos de câncer de mama e/ou câncer de ovário em familiares consanguíneos, especialmente em idade jovem,

bem como a ocorrência de câncer de mama em homens da família. Estima-se que os casos de câncer de mama de origem hereditária correspondam a aproximadamente 5% a 10% do total (Urban *et al.*, 2023; Brasil, 2024).

Mulheres com mamas densas, compostas predominantemente por tecido fibroglandular, apresentam risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de mama. Esse risco decorre tanto da maior quantidade de tecido suscetível à transformação neoplásica quanto da maior dificuldade na detecção de lesões suspeitas (Brasil, 2024).

A prevenção do câncer de mama fundamenta-se no controle dos fatores de risco modificáveis e no fortalecimento de fatores de proteção. Medidas como a prática regular de atividade física, a manutenção do peso corporal adequado, a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a redução ou eliminação do consumo de bebidas alcoólicas contribuem para a diminuição do risco. A amamentação também exerce efeito protetor e deve ser estimulada pelo maior período possível (Brasil, 2024; Gomes *et al.*, 2021).

2.3 ETIOLOGIA E PATOGÊNESE

Para o desenvolvimento do câncer de mama, há dois importantes fatores envolvidos: alterações genômicas e a atuação dos hormônios. Diversas alterações na estrutura genética do indivíduo podem gerar esta doença, sendo as principais: inativação de genes supressores tumorais, como BRCA-1, BRCA-2, TP53 e PTEN e a amplificação do gene HER2, que estimula a proliferação celular. Essas alterações genômicas associam-se principalmente a carcinomas hereditários. Em relação à ação dos hormônios no desenvolvimento do câncer, sabe-se que o estrogênio estimula a produção de fatores de crescimento e a proliferação celular (Popa, 2025).

A partir do seu desenvolvimento, os carcinomas de mama são classificados segundo dois parâmetros: morfologia e características moleculares. Na classificação morfológica, são divididos de acordo com a localização na mama e o grau de extensão da lesão, enquanto, na classificação molecular, os tumores são agrupados quanto ao seu perfil de expressão gênica e alterações genômicas (Brasileiro Filho, 2016).

Ao avaliar os tumores malignos de mama quanto à sua morfologia, podem ser classificados como carcinoma *in situ* e carcinoma invasivo, a depender de sua

invasão ao estroma mamário, sendo que, no primeiro, a proliferação epitelial maligna é restrita aos ductos mamários, enquanto, no carcinoma invasivo, essa proliferação celular se estende além da membrana basal, invadindo o estroma mamário (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024; Malhotra *et al.*, 2010).

O carcinoma *in situ* constitui um grupo heterogêneo de lesões sendo dividido em dois grupos de acordo com o local de acometimento: carcinoma ductal *in situ* e carcinoma lobular *in situ*. Dentre este grupo, o carcinoma ductal *in situ* (CDIS) é o que acomete com maior frequência as mamas, estando confinado ao sistema ducto-lobular e formado por células coesas. Os CDIS são subdivididos segundo seu padrão histológico em sólido, cribiforme, papilar, micropapilar e comedocarcinoma, sendo os padrões micropapilar e comedocarcinoma os de maior relevância clínica (Brasileiro Filho, 2016).

O carcinoma lobular *in situ* (CLIS) acomete as unidades ducto-lobulares terminais e faz com que os ácinos sejam distendidos e preenchidos por células pouco coesas. É subdividido em clássico, pleomórfico e florido. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, podendo ser diagnosticado por meio da mamografia (Brasileiro Filho, 2016).

A partir do momento que o carcinoma *in situ* invade o estroma ele passa a ser nomeado carcinoma invasivo apresentando-se clinicamente como nódulo palpável, endurecido e geralmente visível à mamografia. É dividido em carcinoma invasivo do tipo não especial, o tipo mais frequente de câncer de mama, além dos subtipos lobular, tubular, cribiforme, mucinoso, micropapilar, com diferenciação apócrina, metaplásico, inflamatório e doença de Paget da mama (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

A classificação molecular, subdivide o carcinoma de mama em três grupos: luminal, que expressa genes das células epiteliais luminais e é subdividido em luminal A, RE (receptor de estrogênio) positivo, RP (receptor de progesterona) > 20%, HER2 (fator de crescimento epidérmico humano tipo 2) negativo e baixo índice proliferativo, associado a melhor prognóstico, e luminal B, RE positivo, HER2 negativo e alto índice proliferativo e/ou RP < 20% e/ou HER2 positivo, que apresenta prognóstico intermediário quando comparado ao luminal A. Outro grupo é o HER2, que expressa genes relacionados à proteína HER2 e, por último, o basal, que expressa genes das células mioepiteliais ou basais da mama, sendo negativos para RE, RP e HER2 e expressando marcadores basais (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

2.4 QUADRO CLÍNICO

O câncer de mama apresenta um quadro clínico variável, que depende do estágio da doença, do tipo histológico, do padrão de crescimento tumoral e da presença ou não de invasão local ou disseminação sistêmica. Em fases iniciais, a doença pode ser assintomática, sendo frequentemente detectada por exames de rastreamento, como a mamografia, antes do surgimento de manifestações clínicas evidentes (Brasil, 2024).

A apresentação clínica mais comum do câncer de mama é a presença de um nódulo mamário palpável, geralmente indolor, de consistência endurecida, limites irregulares e pouca mobilidade em relação aos planos profundos. Alterações cutâneas podem estar presentes, especialmente em estágios mais avançados. Entre elas destacam-se o espessamento da pele, retrações cutâneas, edema com aspecto de “casca de laranja” (*peau d’orange*), hiperemia e ulcerações. Essas manifestações decorrem, em geral, da infiltração tumoral dos vasos linfáticos dérmicos ou da invasão direta da pele (Associação Médica Brasileira; Conselho Federal de Medicina, 2001).

Modificações no complexo aréolo-papilar também podem compor o quadro clínico, incluindo retração do mamilo, desvio de sua posição habitual, inversão recente e secreção papilar patológica. A secreção, quando presente, pode ser serosa ou sanguinolenta e é considerada um sinal de alerta, sobretudo quando unilateral e espontânea (Brasil, 2024).

O comprometimento linfonodal regional é outro achado clínico relevante, especialmente nos carcinomas invasivos. Linfonodos axilares aumentados, endurecidos, fixos ou indolores podem ser identificados ao exame físico e refletem disseminação linfática tumoral. Em casos mais avançados, pode haver acometimento de cadeias linfonodais supraclaviculares ou infraclaviculares (Brasil, 2024).

Em fases tardias da doença, o câncer de mama pode cursar com sinais e sintomas sistêmicos relacionados à disseminação metastática. As metástases ósseas podem causar dor óssea persistente e fraturas patológicas; o acometimento pulmonar pode levar a dispneia e tosse; as metástases hepáticas podem manifestar-se por hepatomegalia, dor abdominal e alterações laboratoriais; enquanto o comprometimento do sistema nervoso central pode resultar em cefaleia, déficits neurológicos focais ou alterações cognitivas (Briguenti Ramalho, 2024).

Dessa forma, o quadro clínico do câncer de mama é heterogêneo, podendo variar desde lesões assintomáticas detectadas em programas de rastreamento até manifestações locais e sistêmicas avançadas. O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas clínicos é fundamental para o diagnóstico oportuno e para a melhora dos desfechos clínicos da doença (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

2.5 DIAGNÓSTICO

A avaliação clínica representa a etapa inicial da investigação diagnóstica e compreende a anamnese e o exame físico das mamas e das cadeias linfonodais regionais. Os achados clínicos orientam a necessidade e a escolha dos métodos de imagem a serem empregados, sendo que, a ultrassonografia das mamas, a mamografia e a ressonância magnética das mamas são os mais utilizados para caracterização das lesões mamárias suspeitas, permitindo a avaliação de suas características morfológicas, extensão e relação com estruturas adjacentes (Brasil, 2024).

A mamografia constitui o principal exame de imagem na avaliação diagnóstica das mamas, possibilitando a identificação de massas, assimetrias arquiteturais e microcalcificações suspeitas. A ultrassonografia mamária é utilizada como método complementar, especialmente na avaliação de mamas densas, na diferenciação entre lesões sólidas e císticas e na análise de linfonodos regionais. A ressonância magnética da mama é indicada em situações específicas, como na avaliação da extensão tumoral, na investigação de multifocalidade ou multicentricidade e na avaliação complementar de pacientes com alto risco e que possuem baixa sensibilidade de detecção à mamografia (Instituto Nacional de Câncer, 2015; Briguenti Ramalho, 2024).

A confirmação diagnóstica do câncer de mama é realizada por meio de exame histopatológico obtido a partir de biópsia da lesão suspeita. A biópsia por agulha grossa (*core biopsy*) é o método mais frequentemente empregado, por permitir adequada análise morfológica e imunohistoquímica do tumor. O exame histopatológico possibilita a confirmação da malignidade, a classificação histológica da neoplasia e a identificação de características prognósticas relevantes (Brasil, 2024; Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

A avaliação imuno-histoquímica complementa o diagnóstico histopatológico, permitindo a determinação da expressão dos receptores hormonais de

estrogênio e progesterona, da proteína HER2. A superexpressão do HER2 deve ser demonstrada em exame por técnica molecular (FISH, CISH, SISH, DISH) com resultado maior que dois. O exame molecular está indicado para casos em que for detectada, por técnica imuno-histoquímica, a expressão tumoral HER-2 em intensidade de duas cruzes. Portanto, não se indica o exame molecular para os resultados de 0/3, 1/3 ou 3/3 cruzes. Esses marcadores são fundamentais para a definição do subtipo molecular do tumor e para o planejamento terapêutico, além de fornecerem informações prognósticas adicionais (Brasil, 2024; Briguenti Ramalho, 2024).

Ressalta-se que as estratégias de rastreamento populacional e de detecção precoce serão abordadas em capítulo específico subsequente.

2.6 ESTADIAMENTO

O estadiamento do câncer de mama consiste na avaliação da extensão anatômica da doença no momento do diagnóstico e representa etapa fundamental para a definição do prognóstico e planejamento terapêutico. Esse processo baseia-se na análise do tumor primário, do comprometimento linfonodal regional e da presença de metástases à distância (Brasil, 2024).

O sistema de estadiamento mais amplamente utilizado para o câncer de mama é o sistema TNM (*Tumor, Node, Metastasis*), desenvolvido pela *American Joint Committee on Cancer* (AJCC) e pela *Union for International Cancer Control* (UICC). O componente T do sistema TNM refere-se às características do tumor primário, incluindo seu tamanho máximo e a presença de invasão de estruturas adjacentes. Os tumores são classificados desde Tis, que corresponde ao carcinoma in situ, até T4, que indica tumores de qualquer tamanho associados à invasão da parede torácica e/ou da pele. O aumento progressivo da categoria T está associado a maior extensão local da doença e pior prognóstico. Também pode haver o resultado Tx, em que o tumor não pode ser avaliado ou T0, ausência do tumor (Gaillard *et al.*, 2008; Brasil, 2024).

O componente N avalia o envolvimento dos linfonodos regionais, especialmente os linfonodos axilares, que representam a principal via de disseminação linfática do câncer de mama. A classificação varia desde N0, quando não há comprometimento linfonodal, até N3, que indica envolvimento extenso de cadeias linfonodais, como linfonodos infraclaviculares, supraclaviculares ou mamários internos

associados à linfonodos axilares positivos. O comprometimento linfonodal é considerado um dos mais importantes fatores prognósticos no câncer de mama, estando fortemente associado ao risco de recorrência e à sobrevida global (Gaillard *et al.*, 2008; Brasil, 2024).

Por último, o componente M refere-se à presença ou ausência de metástases à distância. A categoria M0 indica ausência de disseminação metastática detectável, enquanto M1 corresponde à presença de metástases em órgãos distantes, como ossos, pulmões, fígado ou sistema nervoso central. A identificação de metástases à distância define doença em estágio avançado e está associada a prognóstico reservado (Gaillard *et al.*, 2008; Brasil, 2024).

A combinação dos componentes T, N e M permite o agrupamento do câncer de mama em estágios clínicos, que variam do estágio 0, correspondente ao carcinoma *in situ*, até o estágio IV, caracterizado pela presença de metástases à distância. Os estágios I a III representam graus progressivos de doença invasiva localizada ou regionalmente avançada (Brasil, 2024).

O estadiamento do câncer de mama desempenha papel central na determinação do prognóstico, uma vez que expressa o grau de extensão da doença no momento do diagnóstico, considerando o acometimento local, regional e sistêmico (Brasil, 2024).

2.7 OPÇÕES TERAPÊUTICAS

O tratamento do câncer de mama é complexo e multidisciplinar, e as opções terapêuticas incluem tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, terapia endócrina, terapias-alvo e, em situações específicas, imunoterapia. A escolha e a sequência dessas modalidades dependem do estágio da doença, do subtipo molecular e do risco prognóstico (Brasil, 2024).

A cirurgia constitui a base do tratamento do câncer de mama em estádios iniciais e localmente avançados potencialmente ressecáveis. As principais abordagens cirúrgicas incluem a cirurgia conservadora da mama, associada à radioterapia, e a mastectomia, sendo a escolha influenciada pelo tamanho tumoral, relação tumor-mama, multifocalidade, presença de contraindicações à radioterapia e preferência da paciente (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

A avaliação linfonodal regional é parte fundamental do tratamento cirúrgico. A biópsia do linfonodo sentinela é o método preferencial para o estadiamento axilar em pacientes sem evidência clínica de acometimento linfonodal, reduzindo a morbidade associada à dissecação axilar completa. A dissecação axilar é reservada para casos selecionados, conforme extensão do comprometimento linfonodal (Xiong *et al.*, 2025; Briguenti Ramalho, 2024).

A radioterapia desempenha papel essencial no controle local da doença. É indicada rotineiramente após cirurgia conservadora da mama e em situações específicas após mastectomia, como tumores de maior tamanho, margens comprometidas ou acometimento linfonodal significativo. O tratamento radioterápico reduz o risco de recorrência local e contribui para melhora da sobrevida em subgrupos selecionados (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

A terapia sistêmica tem como objetivo reduzir o risco de recorrência local e sistêmica, sendo utilizada tanto no cenário adjuvante, após a cirurgia, quanto neoadjuvante, antes da cirurgia. A quimioterapia é indicada principalmente para tumores com maior risco de recorrência, como a quimioterapia, aqueles de alto grau histológico, com comprometimento linfonodal, tumores HER2 positivos e câncer de mama triplo-negativo. No cenário neoadjuvante, a quimioterapia permite redução tumoral, aumento das taxas de cirurgia conservadora e avaliação da resposta patológica completa, que possui valor prognóstico relevante (Brasil, 2024; Xiong *et al.*, 2025).

A terapia endócrina é indicada para tumores que expressam receptores hormonais de estrogênio e/ou progesterona. Atua bloqueando a ação hormonal ou reduzindo a produção de estrogênio, sendo associada a redução significativa do risco de recorrência e mortalidade. A escolha do agente e a duração do tratamento variam conforme o estado menopausal, o risco de recorrência e a tolerabilidade (Briguenti Ramalho *et al.*, 2024).

As terapias-alvo revolucionaram o tratamento do câncer de mama, especialmente nos tumores com superexpressão do HER2. A introdução de agentes anti-HER2 resultou em melhora expressiva da sobrevida e do controle da doença, tanto em estádios iniciais quanto avançados (Briguenti Ramalho *et al.*, 2024; Xiong *et al.*, 2025).

A imunoterapia emergiu como opção terapêutica em subgrupos específicos, especialmente no câncer de mama triplo-negativo, em associação à

quimioterapia, demonstrando benefício em termos de controle da doença em pacientes selecionadas. Seu uso está condicionado à expressão de biomarcadores específicos e ao contexto clínico (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

2.8 PROGNÓSTICO

Tradicionalmente, a avaliação prognóstica do câncer de mama baseava-se predominantemente nos critérios anatômicos do sistema TNM, como o tamanho do tumor primário, o envolvimento linfonodal e a presença de metástases à distância. Contudo, o avanço no entendimento da biologia tumoral evidenciou que neoplasias com características anatômicas semelhantes podem apresentar comportamento clínico distinto, reforçando a necessidade de incorporar fatores biológicos à análise prognóstica. A expressão dos receptores hormonais de estrogênio (RE) e progesterona (RP) está associada a melhor prognóstico, uma vez que esses tumores geralmente apresentam crescimento mais indolente e maior resposta às terapias endócrinas (Brasil, 2024; Costa *et al.*, 2024).

A superexpressão ou amplificação do HER2, historicamente relacionada a pior prognóstico, teve seu impacto significativamente modificado com a introdução de terapias-alvo anti-HER2, resultando em melhora substancial das taxas de sobrevida nesse subgrupo de pacientes (Brasil, 2024).

Os subtipos moleculares, definidos a partir do perfil de expressão gênica ou aproximados pela imunohistoquímica, representam importante ferramenta prognóstica. Tumores do subtipo luminal A apresentam, em geral, melhor prognóstico, com menores taxas de recorrência e maior sobrevida global. O subtipo luminal B apresenta comportamento intermediário, enquanto os tumores HER2 positivos e basais/triplo-negativos tendem a evoluir de forma mais agressiva, com maior risco de recorrência precoce e pior prognóstico global (Menon; Alkabban; Ferguson, 2024).

Marcadores de proliferação, como o Ki-67, também contribuem para a estratificação prognóstica, estando valores elevados associados a maior agressividade tumoral (Costa *et al.*, 2024).

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RASTREAMENTO PARA O CÂNCER DE MAMA NO BRASIL

A discussão sobre políticas públicas de rastreamento para o câncer de mama no Brasil deve ser contextualizada no campo mais amplo das estratégias de cuidado em saúde, uma vez que as ações de detecção precoce se inserem diretamente nos diferentes níveis de prevenção das doenças. Tradicionalmente, esses níveis são classificados em quatro categorias, conforme o modelo proposto por Leavell e Clark, que permanece como importante referencial conceitual na saúde pública (Leavell; Clark, 1965).

A prevenção primária compreende ações destinadas a indivíduos ainda não acometidos por determinada doença, situados no período pré-patogênico. Nesse nível, inserem-se as estratégias de promoção da saúde e de proteção específica, com o objetivo de reduzir a incidência das doenças. Incluem-se, nesse contexto, ações educativas voltadas à população, melhorias nas condições de saneamento básico, incentivo a hábitos de vida saudáveis, práticas de higiene, imunizações e outras intervenções capazes de minimizar a exposição a fatores de risco (Leavell; Clark, 1965).

A prevenção secundária refere-se às intervenções realizadas no período patogênico inicial, quando a doença já se encontra presente, porém ainda em fase assintomática ou pouco sintomática. Seu objetivo central é a detecção precoce e o tratamento oportuno, com vistas a melhorar o prognóstico e reduzir a morbimortalidade. É nesse nível que se inserem as políticas de rastreamento populacional, como a realização sistemática de mamografias em grupos etários específicos, além de outras estratégias voltadas à identificação precoce de agravos à saúde (Leavell; Clark, 1965).

A prevenção terciária aplica-se aos indivíduos com doença já estabelecida, geralmente em estágios mais avançados, e busca reduzir complicações, incapacidades e sofrimento, promovendo reabilitação e melhora da qualidade de vida. As ações nesse nível concentram-se no manejo adequado das condições crônicas, na prevenção de sequelas e na reintegração do indivíduo às suas atividades sociais e laborais (Leavell; Clark, 1965).

Posteriormente, a prevenção quaternária surge como uma ampliação crítica do modelo clássico de níveis de prevenção, tendo sido inicialmente proposta por Marc Jamouille no início dos anos 2000. Esse conceito refere-se às ações destinadas a

identificar indivíduos ou populações em risco de intervenções médicas excessivas e protegê-los de danos decorrentes da medicalização, da iatrogenia e do uso inadequado de tecnologias em saúde.

Enquanto os níveis tradicionais de prevenção concentram-se predominantemente na história natural das doenças, a prevenção quaternária desloca o foco para os efeitos adversos produzidos pelo próprio sistema de saúde, reconhecendo que intervenções diagnósticas e terapêuticas, quando utilizadas de forma indiscriminada ou descontextualizada, podem gerar mais prejuízos do que benefícios. Nesse sentido, a prevenção quaternária não se opõe ao cuidado em saúde, mas propõe uma prática clínica mais prudente, ética e baseada em evidências científicas sólidas (Jamoulle, 2000).

No contexto do rastreamento de doenças, a prevenção quaternária adquire especial relevância, uma vez que essas estratégias são aplicadas a indivíduos assintomáticos e, portanto, saudáveis do ponto de vista clínico. Intervenções realizadas nesse cenário podem resultar em sobrediagnóstico, sobre tratamento, ansiedade, rotulação diagnóstica e exposição desnecessária a exames, procedimentos e tratamentos com potenciais efeitos adversos. Assim, a prevenção quaternária enfatiza a necessidade de avaliar criticamente o equilíbrio entre riscos e benefícios das ações de rastreamento, especialmente quando implementadas em larga escala como políticas públicas (Jamoulle, 2000).

No Brasil, Carlos Dalcanale Tesser é um dos principais autores a sistematizar e difundir o conceito de prevenção quaternária no campo da saúde coletiva. Tesser e Norman (2021) destacam que a prevenção quaternária constitui uma resposta ética e política ao fenômeno da medicalização excessiva da vida, reforçado pela incorporação acrítica de tecnologias, pela pressão de interesses econômicos e pela valorização social do diagnóstico precoce como sinônimo automático de benefício. Para o autor, a prevenção quaternária propõe uma mudança de paradigma, na qual a decisão clínica e a formulação de políticas públicas devem considerar não apenas a eficácia das intervenções, mas também seus potenciais danos, custos sociais e impactos sobre a autonomia dos indivíduos.

Ao se discutir políticas públicas de rastreamento do câncer de mama, além de se inserir na prevenção secundária, a incorporação dos princípios da prevenção quaternária torna-se fundamental para evitar a ampliação indiscriminada de exames fora das recomendações

baseadas em evidências, bem como para minimizar os efeitos negativos associados ao rastreamento oportunístico, à repetição excessiva de exames e à exposição desnecessária à radiação ionizante. Essa abordagem contribui para uma política de rastreamento mais equilibrada, que reconheça os benefícios da detecção precoce, mas também seus limites e potenciais danos, promovendo decisões mais éticas, seguras e socialmente responsáveis (Tesser; Norman, 2021).

As políticas públicas de rastreamento do câncer de mama foram construídas progressivamente a partir do aprofundamento do conhecimento científico sobre a história natural da doença, da incorporação de tecnologias diagnósticas e da consolidação de sistemas públicos de saúde. No cenário internacional, os primeiros estudos populacionais que avaliaram o impacto do rastreamento mamográfico surgiram a partir da década de 1960, com destaque para o *Health Insurance Plan of Greater New York* (HIP Study), que demonstrou redução da mortalidade por câncer de mama associada à detecção precoce por mamografia (Shapiro *et al.*, 1966). Esses achados influenciaram fortemente a formulação de programas nacionais de rastreamento em países da Europa e da América do Norte.

A partir dessas evidências, diversos países passaram a implementar programas organizados de rastreamento populacional, especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990, com definição clara de faixa etária, periodicidade e critérios de qualidade. Organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), passaram a reconhecer o rastreamento do câncer de mama como estratégia relevante de saúde pública, desde que fundamentada em evidências científicas e acompanhada de avaliação sistemática de benefícios e riscos (World Health Organization, 2007). Na União Europeia, recomendações oficiais reforçaram a adoção de programas organizados, com convites ativos e monitoramento contínuo de indicadores de desempenho (European Commission, 2006).

No Brasil, a incorporação do rastreamento do câncer de mama ocorreu de forma gradual e articulada ao processo de consolidação do SUS, instituído pela Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como direito universal e dever do Estado (Brasil, 1988). Antes disso, iniciativas voltadas à saúde da mulher já vinham sendo estruturadas, com destaque para o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), lançado em 1984, que representou um marco ao ampliar o cuidado para

além da saúde materno-infantil, incorporando ações de prevenção e diagnóstico de doenças crônicas, incluindo o câncer de mama (Brasil, 1984).

Na década de 1990, o controle do câncer de mama ganhou maior centralidade nas políticas públicas brasileiras, especialmente com a criação do Programa Viva Mulher, em 1998, voltado ao enfrentamento dos cânceres de colo do útero e de mama. Esse programa buscou estruturar ações de detecção precoce e fortalecer a rede assistencial, embora o rastreamento mamográfico no país tenha se desenvolvido predominantemente de forma oportunística, diferentemente do modelo organizado adotado em diversos países europeus (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

A consolidação das diretrizes técnicas nacionais ocorreu por meio da atuação do INCA responsável pela elaboração de recomendações baseadas em evidências científicas e adaptadas à realidade do SUS. Essas diretrizes passaram a definir critérios para faixa etária, periodicidade do exame de mamografia e indicação diferenciada para mulheres de alto risco, constituindo-se como referência para a formulação de políticas públicas e para a prática clínica no âmbito da atenção primária e especializada (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

No campo legal, destaca-se a promulgação da Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que assegurou o direito das mulheres ao acesso à mamografia no SUS, reforçando o compromisso do Estado brasileiro com a detecção precoce do câncer de mama (Brasil, 2008). Posteriormente, outras normativas ampliaram a organização da linha de cuidado oncológico, incluindo a definição de prazos máximos para diagnóstico e início do tratamento, fortalecendo os princípios da integralidade e da equidade no cuidado em oncologia.

As estratégias de controle e prevenção do câncer de mama ocupam lugar de destaque nas prioridades da Política Nacional de Saúde, devido à sua relevância como um grave problema de saúde pública no Brasil. Dentro das estratégias do nível secundário de prevenção enquadram-se o rastreamento e o diagnóstico precoce, esse último tem como objetivo a identificação de sinais e sintomas iniciais da doença, seja pelo próprio paciente ou pelo profissional de saúde. Já o rastreamento, visa por meio de exames específicos, realizar o diagnóstico em pessoas assintomáticas, possibilitando a identificação da doença em sua fase pré-clínica (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

Os testes ou exames de rastreamento são caracterizados como uma medida inicial, voltada para determinada população, visando descartar ou aumentar a

suspeita de determinada doença. Dessa forma, se um exame de rastreamento apresenta resultado sugestivo da comorbidade, são necessários exames adicionais para a confirmação do diagnóstico. Por isso, a correta indicação dos exames de rastreamento para câncer de mama é fundamental para garantir um diagnóstico preciso e evitar consequências adversas para as pacientes (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

Um dos principais desafios no rastreamento é a ocorrência de falsos positivos, que podem levar a intervenções desnecessárias, incluindo biópsias e cirurgias. Essas medidas podem resultar em complicações físicas e emocionais, aumentando o impacto negativo sobre a qualidade de vida das pacientes. Além disso, exames mal indicados podem gerar sobrecarga nos serviços de saúde, desviando recursos que poderiam ser utilizados para pacientes que realmente necessitam de atendimento especializado. Por outro lado, a indicação inadequada também pode levar a falsos negativos, retardando o diagnóstico e o tratamento da doença (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

Além disso, o rastreamento sem estratificação de risco, pode fazer com que pacientes que possuam risco elevado não recebam a atenção necessária, resultando em diagnósticos tardios e em prognósticos menos favoráveis. Portanto, a definição criteriosa dos exames de rastreamento deve ser baseada na correta estratificação de risco das pacientes (Instituto Nacional de Câncer, 2015; Inumaru; Silveira; Naves, 2011).

Com base nessa discussão e visando padronizar o rastreamento da doença no país, o MS em parceria com INCA publicou em 2015 as Diretrizes para Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil, a fim de atualizar as recomendações e nortear o processo de decisão médica em relação aos exames disponíveis para o rastreamento do câncer de mama no país. Essa diretriz aborda somente o rastreamento de câncer de mama para a população de risco padrão/habitual, grupo que engloba mulheres que não apresentam fatores de risco significativos, além da idade e sexo feminino. A recomendação de rastreamento de mulheres que possuem risco adicional não foi abordada neste documento (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

Para as mulheres de risco habitual, o Ministério da Saúde historicamente recomendava o rastreamento por meio de mamografia na faixa etária entre 50 e 69 anos, com periodicidade bienal. Essa orientação baseava-se em evidências que indicavam que, abaixo dos 50 anos, o rastreamento poderia resultar em intervenções invasivas desnecessárias com impacto negativo na qualidade de vida, enquanto, acima dos 70

anos, o potencial de sobrediagnóstico e de tratamentos excessivos aumentaria em função da maior probabilidade de comorbidades e outras causas de mortalidade, levando a maior iatrogenia (Instituto Nacional de Câncer, 2015).

No entanto, em setembro de 2025 o Ministério da Saúde ampliou essa recomendação para permitir que mulheres a partir dos 40 anos até os 74 anos completos tenham acesso à mamografia no SUS, mesmo na ausência de sintomas, mediante decisão compartilhada entre a paciente e o profissional de saúde. A faixa etária máxima de rastreamento ativo passou a ser de 74 anos, e, a partir dos 75 anos, a indicação de rastreamento pode ser individualizada com base na expectativa de vida. Essa mudança aproxima as diretrizes brasileiras de recomendações mais amplas adotadas por outras associações médicas e busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama (Brasil, 2025).

4 TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SAÚDE E FERRAMENTAS DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA O CÂNCER DE MAMA

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) referem-se ao conjunto de ferramentas, sistemas e infraestruturas tecnológicas empregadas para coletar, processar, armazenar, transmitir e utilizar informações por meio de plataformas eletrônicas e digitais. No campo da saúde, essas tecnologias abrangem sistemas computacionais, redes de comunicação, aplicativos móveis, dispositivos conectados e plataformas web que dão suporte às atividades assistenciais, gerenciais, educacionais e à tomada de decisão clínica em diferentes níveis de atenção.

Nesse contexto, o termo *eHealth* (saúde eletrônica), frequentemente utilizado de forma intercambiável com o conceito mais amplo de saúde digital, engloba a integração de processos eletrônicos e digitais ao cuidado em saúde, incluindo a gestão da informação clínica, a comunicação entre profissionais e usuários e a implementação de intervenções clínicas mediadas por tecnologia. A Organização Mundial da Saúde e a literatura recente destacam que a saúde digital não se limita à informatização de processos, mas representa um campo estratégico para qualificação do cuidado, ampliação do acesso e fortalecimento da tomada de decisão baseada em evidências (Murthi *et al.*, 2024).

A digitalização progressiva dos processos assistenciais e administrativos tem promovido ganhos relevantes em eficiência, acessibilidade, integração de dados e suporte à decisão clínica, configurando uma mudança de paradigma na organização dos sistemas de saúde. Estudos apontam que a incorporação de TICs vai além da automatização de tarefas rotineiras, criando condições para o desenvolvimento de novos modelos de cuidado, estratégias de prevenção, acompanhamento longitudinal e comunicação mais efetiva entre profissionais e pacientes (Eden, 2018).

No SUS, esse movimento encontra respaldo institucional no Programa SUS Digital, que estabelece diretrizes para a transformação digital da saúde pública brasileira, com foco na integração de sistemas, interoperabilidade de dados, qualificação da informação em saúde e fortalecimento da tomada de decisão clínica e gestora. O SUS Digital reconhece as TICs como elementos estruturantes para ampliar o acesso, reduzir iniquidades, melhorar a qualidade do cuidado e apoiar práticas clínicas mais resolutivas, baseadas em dados confiáveis e oportunos (Brasil, 2026).

As TICs em saúde transcendem o simples armazenamento de dados e assumem papel central na prática assistencial ao oferecer ferramentas que apoiam a prestação de serviços clínicos, a promoção da saúde, o acompanhamento de condições crônicas e o engajamento dos usuários. Entre as aplicações mais difundidas destacam-se os prontuários eletrônicos de saúde, os sistemas de prescrição eletrônica, as plataformas de telemedicina e telessaúde, os aplicativos de monitoramento remoto e as ferramentas digitais de comunicação entre equipes de saúde e pacientes. Evidências apontam que esses recursos contribuem para a continuidade do cuidado, a segurança do paciente, a comunicação interprofissional e a otimização dos fluxos de trabalho clínicos, especialmente quando integrados aos sistemas oficiais de saúde (Eden, 2018).

Os Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (*Clinical Decision Support Systems* – CDSS) configuram uma categoria específica e estratégica das TICs em saúde. Esses sistemas integram dados clínicos, histórico do paciente e evidências científicas atualizadas para oferecer recomendações diagnósticas e terapêuticas no momento da decisão clínica. A incorporação de CDSS aos ambientes assistenciais tem sido associada à melhoria da qualidade do cuidado, à padronização de condutas baseadas em evidências e à redução de erros, embora desafios relacionados à integração ao fluxo de trabalho, interoperabilidade e aceitação pelos profissionais de saúde ainda persistam (Murthi *et al.*, 2024).

Estudos também indicam que ferramentas digitais desenhadas de forma sensível às características socioculturais de populações vulneráveis ou específicas favorecem desfechos intermediários relevantes, como aumento do conhecimento em saúde, maior intenção de adesão a programas de rastreamento e fortalecimento da autoeficácia para tomada de decisões informadas. Esses achados reforçam o papel das TICs como instrumentos de equidade e promoção da saúde no contexto dos sistemas públicos (Oldhoff-Nuijsink *et al.*, 2024).

O desenvolvimento de tecnologias digitais em saúde requer a adoção de princípios metodológicos robustos, incluindo planejamento fundamentado em evidências científicas, participação ativa de usuários finais, testes sistemáticos de usabilidade, ciclos iterativos de aprimoramento e validação clínica. A literatura enfatiza que a efetividade dessas ferramentas depende não apenas de sua lógica algorítmica, mas também de sua aderência ao fluxo de trabalho clínico, à experiência do usuário e à capacidade de integração com sistemas institucionais existentes (Lazarou *et al.*, 2024).

Além disso, o uso de TICs em saúde impõe responsabilidades éticas e legais relacionadas à proteção de dados pessoais, privacidade, segurança da informação e conformidade com marcos regulatórios nacionais e internacionais. A confidencialidade das informações em saúde é particularmente crítica em sistemas que lidam com dados sensíveis, como histórico clínico, fatores de risco e perfis individuais. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (LEI) estabelece princípios e diretrizes que devem orientar todas as etapas de desenvolvimento, implementação e uso dessas tecnologias, em consonância com as políticas públicas de saúde digital (Brasil, 2021; Leme; Blank, 2020).

No âmbito do rastreamento do câncer, as tecnologias digitais, como aplicativos móveis, plataformas web e dispositivos vestíveis, têm sido utilizadas para o monitoramento de sintomas, educação em saúde, estratificação de risco e apoio à tomada de decisão clínica. Essas ferramentas demonstram potencial para melhorar o acompanhamento longitudinal, o engajamento do paciente e a personalização das estratégias de rastreamento ao longo do continuum do cuidado, alinhando-se a modelos mais precisos e centrados na pessoa (Briggs *et al.*, 2022).

A eficácia do rastreamento depende de sua capacidade de identificar mulheres em diferentes níveis de risco, permitindo uma abordagem individualizada. Neste contexto, ferramentas de predição de risco são utilizadas para auxiliar na tomada de decisão quanto ao exame mais apropriado. Estas ferramentas combinam informações clínicas, histórico familiar e pessoal para estimar o risco individual de uma mulher desenvolver câncer de mama e, assim, orientar a conduta médica.

Diversos modelos matemáticos foram desenvolvidos para estimar o risco de câncer de mama com base em variáveis clínicas, genéticas e histórico familiar, dentre outros. Este capítulo revisa as principais ferramentas validadas internacionalmente, discutindo suas vantagens, limitações e aplicabilidade na prática clínica.

4.1 MODELO DE GAIL (*BREAST CANCER RISK ASSESMENT TOOL* - BCRAT)

O Modelo de Gail foi um dos primeiros modelos de predição de risco desenvolvidos e amplamente utilizados na prática clínica internacional, foi criado em 1989 pelo *National Cancer Institute* (NCI) dos Estados Unidos, este modelo estima o risco de câncer de mama invasivo em mulheres entre 35 e 85 anos. A ferramenta é voltada para os médicos que, a partir das informações da paciente coletadas em consulta, devem inserir esses dados na ferramenta, gerando automaticamente uma estimativa do risco absoluto, em porcentagem, da mulher desenvolver câncer de mama nos próximos 5 anos e ao longo da vida, até os 90 anos. Além disso, a ferramenta mostra de forma comparativa o risco de uma mulher da mesma idade e raça, com risco intermediário, de desenvolver câncer de mama (Gail, 1989).

As variáveis utilizadas no teste são: idade, idade da menarca, idade da paciente quanto teve o primeiro filho, número de parentes de primeiro grau (mãe, irmãs, filhas) que tiveram diagnóstico de câncer de mama, número de biópsias mamárias anteriores (positivas ou negativas) e presença de hiperplasia atípica em biópsias anteriores. A partir das respostas dadas a essas perguntas, a ferramenta irá fornecer a predição do risco individualizado daquela paciente (Gail, 1989). A vantagem desse modelo, além dos citados anteriormente, se dá pela simplicidade em sua aplicação, pois apresenta poucas perguntas, formuladas de forma facilitada e direta, possibilitando sua implementação nas consultas médicas rotineiras. Por esse motivo, é amplamente utilizada em programas de rastreamento dos Estados Unidos. A desvantagem desta ferramenta se dá pela limitação de precisão do risco em alguns grupos específicos de mulheres como as que possuem histórico pessoal de câncer de mama ou de lesões precursoras como carcinoma ductal *in situ* (DCIS) ou carcinoma lobular *in situ* (LCIS), mulheres com mutações do gene BRCA1 ou BRCA2 e outras síndromes hereditárias.

Considerando esses grupos de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama, trata-se de uma importante limitação desta ferramenta. Além disso, a partir do estudo de aplicabilidade realizado foi possível perceber que apesar do bom desempenho da ferramenta, ela pode subestimar o risco em mulheres negras com biópsias anteriores e o risco em mulheres hispânicas.

4.2 MODELO DE TYRER-CUZICK IBIS (*BREAST CANCER RISK EVALUATION TOOL*)

O modelo de Tyrer-Cuzick foi criado em 2004 pela equipe do *Wolfson Institute of Preventive Medicine*, pertencente à *Queen Mary University of London*, no Reino Unido, com o objetivo de estimar o risco individual de uma mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida, comparando com a média da população dos Estados Unidos, ajustada por idade. Essa ferramenta incorpora um maior número de variáveis sobre a paciente utilizadas para o cálculo final de risco, sendo elas: idade, altura, peso, menarca, idade da paciente quanto teve o primeiro filho, estágio ovulatório (pré menopausa, menopausa ou pós menopausa), uso de terapia de reposição hormonal prévia, mutação conhecida do gene BRCA1 e BRCA2, biópsia de mama prévia, diagnóstico prévio de câncer de ovário, densidade das mamas, histórico familiar completo sobre parentes com diagnóstico de câncer de mama ou ovário, idade do diagnóstico e realização de teste genético (Tyrer; Duffy; Cuzick, 2004).

Essa ferramenta tem como diferencial prático o auxílio na conduta médica frente ao risco individualizado da paciente, pois além de predizer a chance da mulher de desenvolver câncer de mama, esse instrumento orienta qual é o exame de rastreio indicado para ela. Diferentemente do modelo de Gail, este teste é realizado pela própria paciente e não pelo médico (Tyrer; Duffy; Cuzick, 2004).

Como limitação dessa ferramenta têm-se a extensa gama de perguntas a serem respondidas, necessitando de grande parte de informações por parte da paciente e maior disponibilidade de tempo para a resposta, além de poder superestimar o risco em algumas populações específicas (Tyrer; Duffy; Cuzick, 2004).

4.3 BOADICEA (*BREAST AND OVARIAN ANALYSIS OF DISEASE INCIDENCE AND CARRIER ESTIMATION ALGORITHM*)

O modelo BOADICEA foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 2004 com o objetivo de estimar o risco de câncer de mama e de ovário em mulheres, com base em seus fatores genéticos e familiares. Além disso, essa ferramenta é capaz de predizer a probabilidade de uma mulher ser portadora de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Assim como o modelo de Gail, essa

ferramenta deve ser usada apenas por pesquisadores e profissionais da saúde (Antoniou *et al.*, 2004).

Apesar de se tratar de um modelo completo, essa ferramenta foi validada apenas para mulheres europeias não sendo aplicável em mulheres de outros continentes. Além disso, a ferramenta necessita de um completo histórico familiar para trazer um resultado mais confiável. Diferentemente das outras ferramentas abordadas neste estudo, o BOADICEA tem ênfase no aconselhamento genético de mulheres com alto risco de serem portadoras de mutações, não tendo muita utilidade no rastreio de câncer de mama em mulheres sem fatores familiares relacionados (Antoniou *et al.*, 2004).

À luz desse arcabouço teórico, técnico e normativo, a ferramenta digital de rastreamento do câncer de mama desenvolvida nesta pesquisa se insere de forma coerente como uma tecnologia de apoio à decisão clínica baseada em riscos individualizados, alinhada aos princípios das TICs em saúde e às diretrizes do Programa SUS Digital. Ao integrar avaliação de risco, comunicação clara dos resultados e potencial de adaptação aos diferentes contextos assistenciais do SUS, a ferramenta exemplifica como soluções digitais podem ser operacionalizadas para qualificar a prática clínica, promover decisões informadas e contribuir para modelos de rastreamento mais precisos, equitativos e sustentáveis no sistema público de saúde.

5 A PREVENÇÃO EM SAÚDE COMO PILAR DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O desenvolvimento social, ao ser analisado para além dos indicadores econômicos tradicionais, revela sua verdadeira complexidade: é um processo que diz respeito à liberdade, à justiça, à equidade e à realização das capacidades humanas (Sen, 2018). O enfrentamento das desigualdades e a construção de uma sociedade mais saudável e justa exigem uma abordagem integrada que incorpore as dimensões políticas, sociais e culturais da vida (Sen, 2018).

Amartya Sen, economista e filósofo indiano, revolucionou a teoria do desenvolvimento ao propor que este deve ser compreendido como a expansão das liberdades substantivas dos indivíduos (Pinheiro, 2012). Para o autor, o foco do desenvolvimento não deve recair exclusivamente sobre variáveis macroeconômicas, mas sim sobre as condições reais que as pessoas possuem para viver vidas que valorizam (Sen, 2018).

A abordagem das capacidades de Sen enfatiza que o desenvolvimento ocorre quando os indivíduos ampliam suas liberdades para funcionar plenamente na sociedade (Pinheiro, 2012). Nesse contexto, a saúde é simultaneamente uma capacidade e uma condição para o exercício de outras liberdades, porque estar saudável permite ao indivíduo o acesso à educação, ao trabalho, à participação social e política, dimensões que se reforçam mutuamente no ciclo do desenvolvimento (Marmot *et al.*, 2008).

A prevenção de doenças emerge, portanto, como um instrumento fundamental de promoção da liberdade. A ausência de ações preventivas eficazes não é apenas uma falha do sistema de saúde, mas uma forma de privação de liberdade, que perpetua vulnerabilidades e limita o florescimento das capacidades humanas, sobretudo entre os grupos sociais mais desfavorecidos (Sen, 2018).

Celso Furtado, um dos maiores pensadores do desenvolvimento latino-americano, contribuiu com uma análise profundamente crítica das estruturas econômicas e sociais dos países periféricos. Para Furtado, o subdesenvolvimento não é uma etapa do progresso, mas uma condição estrutural resultante da dependência econômica e da concentração da renda. O verdadeiro desenvolvimento, portanto, exige

transformações institucionais, políticas públicas robustas e uma nova lógica de distribuição de recursos (Furtado, 2000).

Diferentemente das abordagens que vinculam o desenvolvimento à acumulação de capital, Furtado propõe uma visão humanista, na qual o centro das políticas públicas deve ser a qualidade de vida da população (Furtado, 2000). Em seu pensamento, o combate à pobreza e à desigualdade não pode prescindir de ações concretas no campo da saúde, especialmente na sua dimensão preventiva, pois é nessa esfera que se manifesta, de forma mais dramática, a exclusão social. Para esse autor, o desenvolvimento é uma construção coletiva, que exige planejamento estatal e mobilização social (Furtado, 2000). A ausência de ações estruturadas de prevenção em saúde não é apenas um problema técnico, mas um reflexo das prioridades políticas e do modelo de sociedade em que se insere (Sen, 2018).

Nesse contexto, o câncer de mama constitui um exemplo emblemático de como os processos de saúde e doença ultrapassam a dimensão estritamente biológica e se inscrevem em uma teia complexa de determinantes sociais, culturais e econômicos (Marmot *et al.*, 2008). Embora os avanços científicos tenham ampliado o conhecimento sobre fatores genéticos, hormonais e ambientais associados à doença, a ocorrência, o diagnóstico em estágios avançados e a mortalidade estão fortemente relacionados às condições de vida, ao acesso aos serviços de saúde, ao nível de informação e às desigualdades sociais (Moreira, 2018).

Essa compreensão dialoga diretamente com o referencial dos Determinantes Sociais da Saúde, amplamente discutido por Dahlgren e Whitehead (1991), que propõem um modelo em camadas no qual as condições socioeconômicas, culturais e ambientais moldam as oportunidades de exposição a riscos e de acesso aos recursos de proteção à saúde (Dahlgren; Whitehead, 1991). Nesse modelo, fatores individuais, estilos de vida, redes sociais, condições de trabalho e o contexto macroestrutural interagem continuamente, produzindo padrões desiguais de adoecimento e de acesso ao cuidado (Dahlgren; Whitehead, 1991).

A Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde reforça essa perspectiva ao afirmar que as iniquidades em saúde resultam das condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, além dos sistemas que influenciam essas condições (WHO, 2008). Assim, o câncer de mama, embora biologicamente definido, apresenta distribuição e desfechos

que refletem desigualdades estruturais, evidenciando que o enfrentamento da doença requer intervenções que ultrapassem o nível estritamente clínico (Marmot *et al.*, 2008).

A decisão de realizar o rastreamento do câncer de mama não depende apenas da disponibilidade do exame, mas de múltiplos fatores que incluem escolaridade, renda, inserção no mercado de trabalho, redes de apoio, experiências prévias com o sistema de saúde e percepções culturais sobre a doença (Barata, 2005). Mulheres em situação de maior vulnerabilidade social tendem a enfrentar mais barreiras para acessar serviços de prevenção, seja por dificuldades logísticas, como deslocamento e disponibilidade de tempo, seja por barreiras simbólicas, como medo, desinformação ou experiências negativas anteriores com instituições de saúde (Barata, 2005).

Sob essa perspectiva, pensar políticas e estratégias de rastreamento do câncer de mama significa considerar a sociedade como um todo, reconhecendo que a distribuição da doença e das oportunidades de cuidado reflète a organização social (Dahlgren; Whitehead, 1991). O rastreamento deixa de ser apenas uma conduta clínica individual e passa a ser uma estratégia de justiça social, na medida em que busca reduzir desigualdades na detecção precoce e nos desfechos da doença (Sen, 2018).

As políticas públicas de rastreamento existentes representam avanços importantes no enfrentamento do câncer de mama, ao estabelecer diretrizes, faixas etárias e fluxos assistenciais. No entanto, a existência de políticas formais não garante, por si só, o acesso efetivo da população (World Health Organization, 2008). Persistem lacunas relacionadas à dificuldade de acesso geográfico aos serviços, à sobrecarga dos sistemas de saúde, à ausência de busca ativa organizada e, ainda, à não solicitação do exame por parte de profissionais de saúde, seja por desconhecimento de diretrizes atualizadas, seja por limitações no tempo de consulta ou na organização do cuidado (Barata, 2005).

A ferramenta digital desenvolvida neste estudo insere-se, portanto, como uma estratégia que dialoga diretamente com os princípios do desenvolvimento social e com a abordagem dos determinantes sociais da saúde (Sen, 2018). Ao buscar qualificar a tomada de decisão no rastreamento do câncer de mama, ela não apenas aprimora o cuidado individual, mas contribui para o fortalecimento das políticas públicas existentes.

Dessa forma, a tecnologia proposta articula conhecimento científico, prática clínica e compromisso social, reconhecendo que promover saúde é também promover desenvolvimento. Ao apoiar decisões mais equitativas e baseadas em risco, a

ferramenta contribui para reduzir iniquidades no acesso ao rastreamento, reforçando a ideia de que enfrentar o câncer de mama é, igualmente, enfrentar as desigualdades estruturais que marcam a sociedade (Sen, 1999; Furtado, 2000).

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo metodológico que teve como objetivo a construção e a validação de conteúdo de uma ferramenta digital destinada a guiar o rastreamento adequado do câncer de mama em mulheres brasileiras, a partir de sua estratificação de risco.

A metodologia deste estudo foi fundamentada na construção de instrumentos de pesquisa na área da saúde proposta por Coluci, Alexandre e Milani (2015). Segundo esses autores, a construção de um novo instrumento na área de saúde necessita de métodos padronizados e sistemáticos para que tenha uma melhor qualidade e coerência com o objetivo a ser aplicado na prática. Assim, esse estudo seguirá a sistematização do processo de construção dividida em 6 etapas, descritas a seguir:

6.1 ETAPA 1: ESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA CONCEITUAL

Essa primeira etapa, também denominada definição operacional do *constructo* e de sua dimensionalidade, teve como objetivo estruturar a base teórica para as etapas seguintes (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de fundamentar teoricamente a construção do instrumento. Essa etapa não teve a finalidade de esgotar a produção científica sobre o tema, mas de identificar conceitos centrais, fatores de risco descritos e recomendações de rastreamento presentes em diretrizes e estudos relevantes. Foram tomadas como base as diretrizes nacionais oficiais elaboradas pelo Ministério da Saúde, INCA e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) (Instituto Nacional de Câncer, 2015; Urban *et al.*, 2023).

Após o embasamento teórico inicial sobre a doença, foi conduzido um levantamento estruturado da literatura científica nas bases de dados disponíveis no Portal de Periódicos CAPES, incluindo LILACS, SciELO e PubMed, no período de junho a setembro de 2025. Essa etapa teve como objetivo identificar evidências científicas atualizadas relacionadas aos fatores de risco e às recomendações para o rastreamento do câncer de mama. Para tanto, foram adotados critérios de elegibilidade previamente definidos, contemplando publicações dos últimos cinco anos, nos idiomas português,

inglês ou espanhol, que abordassem como tema principal os fatores de risco e o rastreamento da doença.

Paralelamente, foi realizada busca direcionada nessas mesmas bases com a finalidade de identificar instrumentos científicos previamente publicados que apresentassem objetivos ou contextos semelhantes, permitindo analisar estratégias metodológicas já empregadas e contribuir para a fundamentação da estrutura da ferramenta proposta.

O levantamento teórico realizado revelou discrepâncias relevantes entre as recomendações emitidas pelo MS e aquelas propostas pela FEBRASGO. Tal divergência destacou a necessidade de uma reflexão crítica quanto à base normativa mais adequada para subsidiar a construção da ferramenta digital proposta, especialmente no contexto da prática clínica cotidiana e das políticas públicas de saúde.

Apesar das Diretrizes propostas pelo Inca e MS serem amplamente utilizadas em serviços de saúde por todo o Brasil, a FEBRASGO e instituições associadas, dividem o rastreio de acordo com o grupo em que a paciente se enquadra, baseado em seus fatores de risco presentes, por esse motivo e com o objetivo de individualizar o rastreio do câncer de mama, neste estudo optou-se por utilizar essa referência como base conceitual, a qual divide os fatores de risco da seguinte forma:

6.1.1 Mulheres com Risco Habitual

Para mulheres classificadas como de risco habitual, o exame indicado para rastreamento é a mamografia na faixa etária entre 40 e 74 anos, com periodicidade anual. Em mulheres com 75 anos ou mais, a continuidade do rastreamento deve ser considerada quando a expectativa de vida for igual ou superior a sete anos e na ausência de comorbidades que limitem o benefício do diagnóstico precoce. Esse documento também traz evidências científicas sobre outros exames, concordante com as diretrizes do MS, reforçando que a ultrassonografia e a ressonância magnética não devem ser utilizadas de forma isolada ou suplementar em mulheres com risco habitual para o desenvolvimento do câncer de mama (Urban *et al.*, 2023).

6.1.2 Mulheres com Mamas Densas

A densidade mamária é reconhecida como fator de risco independente para câncer de mama e está associada à redução da sensibilidade da mamografia. Apesar disso, a mamografia anual permanece indicada como método basal de rastreamento entre 40 e 74 anos, mantendo-se os critérios etários para interrupção (Urban *et al.*, 2023).

Nessas mulheres, a ultrassonografia pode ser considerada como exame complementar anual à mamografia, exceto nos casos em que a ressonância magnética esteja sendo realizada. Para aquelas com mamas extremamente densas, a ressonância magnética bienal pode ser utilizada como método adjunto, devido à maior capacidade de detecção de tumores ocultos na mamografia (Urban *et al.*, 2023).

6.1.3 Mulheres com História Pessoal de Hiperplasia Lobular Atípica (HLA), Carcinoma Lobular *in situ* Clássico (CLIS) ou Hiperplasia Ductal Atípica (HDA)

As lesões proliferativas atípicas e o carcinoma lobular *in situ* clássico conferem aumento significativo do risco de câncer de mama ao longo da vida. Nesses casos, recomenda-se a avaliação individualizada por meio de modelos matemáticos de cálculo de risco, que integrem informações clínicas, história familiar e densidade mamária (Urban *et al.*, 2023).

Para mulheres com risco estimado inferior a 20% ao longo da vida, indica-se mamografia anual a partir dos 40 anos. Quando o risco estimado é igual ou superior a 20%, a mamografia anual deve ser iniciada a partir do diagnóstico da lesão, respeitando-se a idade mínima de 30 anos (Urban *et al.*, 2023).

A ultrassonografia pode ser considerada como exame complementar em mulheres com risco intermediário (15% a 20%). Já para aquelas com risco elevado, a ultrassonografia é indicada apenas como alternativa quando a ressonância magnética não puder ser realizada. A ressonância magnética anual, associada à mamografia, é recomendada para mulheres com risco igual ou superior a 20%, com início a partir do diagnóstico e idade mínima de 25 anos (Urban *et al.*, 2023).

6.1.4 Mulheres com História Pessoal de Tratamento de Câncer de Mama Invasor ou Carcinoma Ductal *in situ*

Mulheres previamente tratadas por câncer de mama apresentam risco significativamente aumentado de uma nova neoplasia mamária. Após cirurgia conservadora, a mamografia anual é indicada, com início mínimo seis meses após o término da radioterapia. Naquelas submetidas à mastectomia total, o rastreamento mamográfico deve ser realizado apenas na mama contralateral, iniciando-se um ano após o término do tratamento (Urban *et al.*, 2023).

A ressonância magnética anual é indicada como método complementar em mulheres diagnosticadas antes dos 50 anos ou na presença de mamas densas, iniciando-se um ano após o tratamento. A ultrassonografia pode ser utilizada como exame complementar apenas quando a ressonância magnética estiver indicada, mas não puder ser realizada (Urban *et al.*, 2023).

6.1.5 Mulheres com História de Radioterapia Torácica Prévia

A exposição à radioterapia torácica antes dos 30 anos está associada a risco substancialmente aumentado de câncer de mama, com início do aumento da incidência cerca de oito a dez anos após o tratamento. Nessas mulheres, a mamografia anual deve ser iniciada a partir do oitavo ano após a radioterapia, respeitando a idade mínima de 30 anos (Urban *et al.*, 2023). A ressonância magnética anual é fortemente indicada como método complementar, com início no mesmo intervalo temporal, respeitando-se a idade mínima de 25 anos. A ultrassonografia deve ser reservada apenas para situações em que a ressonância magnética não possa ser realizada (Urban *et al.*, 2023).

6.1.6 Mulheres Portadoras de Mutações Genéticas ou com Forte História Familiar de Câncer de Mama

Mulheres com mutações patogênicas em genes de alto ou moderado risco, bem como aquelas com risco estimado igual ou superior a 20% ao longo da vida com

base em modelos familiares, deve ser submetidas a protocolos intensificados de rastreamento (Urban *et al.*, 2023).

A mamografia anual é indicada conforme o tipo de mutação genética, respeitando idades mínimas específicas: a partir dos 35 anos para BRCA1 e dos 30 anos para BRCA2, TP53 e outros genes de risco moderado ou alto. A ressonância magnética anual é considerada o método central de rastreamento nesse grupo, iniciando-se mais precocemente conforme o perfil genético e a idade do familiar mais jovem acometido. A ultrassonografia não adiciona benefício quando a ressonância magnética é realizada e deve ser utilizada apenas como alternativa quando esta não for possível (Urban *et al.*, 2023).

A análise das recomendações para o rastreamento do câncer de mama evidencia que a escolha dos métodos de imagem e a necessidade de exames complementares estão diretamente condicionadas ao risco individual de desenvolvimento da doença. Fatores como densidade mamária, história pessoal de lesões proliferativas, tratamentos oncológicos prévios, exposição à radioterapia torácica, mutações genéticas e história familiar modificam de forma substancial a estratégia de rastreamento indicada. Nesse contexto, a correta aplicação das diretrizes depende, necessariamente, de uma estimativa acurada e sistematizada do risco ao longo da vida.

6.2 ETAPA 2: DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO INSTRUMENTO E DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA

A segunda etapa também teve início com a revisão da literatura, uma vez que a definição dos objetivos e da população-alvo esteve diretamente relacionada ao constructo elaborado na etapa 1 (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). Segundo Günther (2003), nessa fase, torna-se necessário delimitar de forma clara o objetivo do instrumento a ser desenvolvido, além de caracterizar a população-alvo, de modo a justificar a relevância e a aplicabilidade da ferramenta proposta.

Nessa etapa, foi estabelecido como objetivo principal da ferramenta auxiliar médicos, generalistas ou especialistas, na tomada de decisão quanto aos exames de rastreamento do câncer de mama a serem solicitados à população feminina, bem como quanto à periodicidade desses exames, de acordo com o risco individual de cada paciente. Assim, a população-alvo do instrumento foi definida como médicos que,

independentemente da especialidade ou área de atuação, realizassem consultas com abordagem integral do paciente, com foco na prevenção de doenças, especialmente, neste estudo, do câncer de mama.

6.3 ETAPA 3: CONSTRUÇÃO DOS ITENS E DAS ESCALAS DE RESPOSTA

Na etapa 3, iniciou-se o processo de construção dos itens que iriam compor a ferramenta desenvolvida, com base no referencial teórico sobre câncer de mama identificado na primeira fase (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). Nessa etapa, foi definida a diretriz da FEBRASGO como principal referencial clínico para a estruturação do instrumento. A partir dessa diretriz, foram identificados e organizados todos os fatores de risco descritos, bem como as respectivas recomendações de exames de rastreamento associadas a cada perfil de risco, de modo a subsidiar a elaboração dos itens da ferramenta (Urban *et al.*, 2023).

Ainda nessa etapa, foi definido o modo de obtenção das respostas, que poderia englobar escalas analógicas, adjetivas, tipo Likert, entre outras (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). Nesta pesquisa, foi selecionada a escala dicotômica para a obtenção das respostas no instrumento desenvolvido, considerando a objetividade e a clareza dessa abordagem na definição do exame a ser realizado no rastreamento do câncer de mama. Essa escolha fundamentou-se na diretriz da FEBRASGO, que categoriza os fatores de risco de forma binária, indicando apenas a presença ou ausência de cada fator como critério determinante para a conduta recomendada. Dessa forma, a adoção da escala dicotômica assegurou a coerência metodológica do estudo, permitindo aplicação direta e padronizada dos critérios estabelecidos na diretriz, além de minimizar ambiguidades na interpretação das respostas.

6.4 ETAPA 4: SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ITENS

Na quarta etapa, deu-se continuidade ao processo de desenvolvimento do instrumento, com a elaboração dos fluxogramas clínicos que serviram de base para a construção do algoritmo final. Esses fluxogramas foram estruturados com base em critérios extraídos de diretrizes brasileiras, com o objetivo de oferecer uma representação

lógica e sistematizada das condutas recomendadas para o rastreamento do câncer de mama, conforme apresentado no APÊNDICE A.

A diretriz da FEBRASGO, definida como referencial norteador da construção do instrumento, categoriza os fatores de risco de forma binária, indicando apenas a presença ou ausência de cada fator como critério determinante para a conduta recomendada. De acordo com essa diretriz, os fatores de risco que impactam a decisão sobre os exames a serem solicitados incluem: histórico pessoal de câncer de mama invasor ou carcinoma ductal *in situ*; histórico pessoal de radioterapia torácica prévia; presença de mutações nos genes BRCA1, BRCA2 ou TP53; histórico pessoal de hiperplasia lobular atípica (HLA), carcinoma lobular *in situ* clássico (CLIS) ou hiperplasia ductal atípica (HDA); risco superior a 20% de desenvolver câncer de mama com base em calculadoras validadas; além da idade e das características mamárias quanto à proporção de tecido adiposo e glandular (Urban *et al.*, 2023).

Todos os fatores de risco descritos foram incorporados ao instrumento, de modo que o médico assistente respondesse de forma dicotômica (sim/não) quanto à presença ou ausência de cada fator no histórico da paciente. Em relação ao risco estimado de desenvolver câncer de mama, a diretriz recomenda que esse cálculo seja realizado por meio de ferramentas validadas, preferencialmente o *Breast Cancer Risk Assessment Tool* (Modelo de Gail) ou o *IBIS Breast Cancer Risk Evaluation Tool*. Neste estudo, optou-se pela utilização do Modelo de Gail, por ser considerado mais prático e de aplicação mais objetiva, mantendo equivalência em termos de evidência científica (Urban *et al.*, 2023).

Dessa forma, em determinadas etapas do preenchimento, o médico era redirecionado para uma página externa contendo a calculadora de risco baseada no Modelo de Gail e, após a obtenção do resultado, retornava à ferramenta principal para registrar se o risco estimado era superior ou inferior a 20%.

Além disso, nessa etapa, foram definidos os domínios do instrumento, possibilitando a organização estruturada e a abrangência dos itens (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). O instrumento desenvolvido apresentou domínio único, denominado “Fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama”. Dentro desse domínio, cada item foi operacionalizado por meio de uma pergunta estruturada na ferramenta digital.

6.5 ETAPA 5: ESTRUTURAÇÃO DO INSTRUMENTO

Após a organização dos itens e a definição de sua lógica clínica, a etapa 5 constituiu a fase de consolidação do instrumento, sendo a última antes da validação de conteúdo, e teve como objetivo integrar as etapas anteriores, organizar os itens e estabelecer o formato geral do instrumento (Coluci; Alexandre; Milani, 2015). Essa etapa foi realizada no período entre 24 de julho de 2025 a 31 de agosto de 2025. Os itens foram organizados em sequência lógica, em conformidade com as diretrizes da FEBRASGO, de modo a otimizar a aplicação e a interpretação dos resultados.

Essa estruturação permitiu que a progressão das respostas seguisse um fluxo condizente com a estratificação de risco, garantindo que determinados participantes, ao atenderem critérios específicos, fossem direcionados automaticamente à recomendação final, sem a necessidade de responder a itens subsequentes irrelevantes à sua condição. Por exemplo, indivíduos com histórico pessoal de câncer de mama, por já se enquadrarem em um grupo de alto risco, não necessitam fornecer informações adicionais sobre fatores de menor impacto na definição da conduta.

Essa abordagem teve como finalidade aprimorar a eficiência da aplicação do instrumento, reduzindo o tempo necessário para sua conclusão, além de assegurar a precisão da avaliação, evitando redundâncias e minimizando o risco de inconsistências nas respostas. Nessa etapa, os fluxogramas criados anteriormente serviram como base estrutural para a construção da ferramenta digital em formato de *website*.

Com a lógica do instrumento final consolidado, foi então desenvolvida a ferramenta digital com o objetivo de sistematizar o algoritmo conforme as respostas inseridas. A ferramenta, implementada em formato de *website*, foi desenvolvida com o auxílio de um estudante do curso de Engenharia de *Software* do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), instituição à qual este estudo esteve vinculado. A ferramenta foi disponibilizada para acesso gratuito e pôde ser utilizada por qualquer interessado por meio do link: <https://rastreamento-cancermama.vercel.app/>.

A interface da ferramenta digital foi estruturada de forma sequencial, acompanhando a lógica do instrumento e dos fluxogramas clínicos. As telas correspondentes a cada etapa de preenchimento estão apresentadas no APÊNDICE B.

6.6 ETAPA 6: VALIDADE DO CONTEÚDO

A validação de conteúdo foi uma etapa fundamental no desenvolvimento do instrumento, pois buscou assegurar que os itens incluídos fossem representativos e adequados para medir o constructo de interesse. Esse processo envolveu a avaliação criteriosa do instrumento por especialistas na área, que analisaram a clareza e a representatividade dos itens em relação ao objetivo proposto. A validação de conteúdo possibilitou identificar possíveis lacunas, redundâncias ou ambiguidades, garantindo que o instrumento fosse compreensível para os respondentes e efetivo na obtenção de informações precisas e relevantes, contribuindo para sua confiabilidade e validade (Coluci; Alexandre, 2011; Coluci; Alexandre; Milani, 2015).

O processo inicial de validação de conteúdo ocorreu por meio da formação de um Comitê de Juízes Especialistas, grupo selecionado para avaliar e validar o conteúdo da ferramenta criada. Para a seleção dos participantes desse comitê, foi utilizada a estratégia de amostragem em bola de neve (Goodman, 1961). Inicialmente, foram convidados especialistas com base em critérios pré-estabelecidos: título de especialização em Ginecologia e Obstetrícia e experiência clínica mínima de um ano. Esses profissionais, por sua vez, indicaram outros especialistas que também atendiam aos critérios definidos. Não se buscou representatividade populacional ou ampla distribuição geográfica, uma vez que o objetivo do comitê foi garantir credibilidade e profundidade técnica à avaliação, e não a generalização dos resultados.

O primeiro juiz especialista foi selecionado com base em critérios de acessibilidade e adequação ao perfil técnico previamente estabelecido. Assim, foi escolhido inicialmente um professor vinculado à instituição onde o mestrado foi realizado, atendendo integralmente aos critérios definidos para participação como especialista no processo de validação de conteúdo. Essa escolha inicial deu início à estratégia de amostragem em bola de neve a partir de um ponto de partida confiável e qualificado (Goodman, 1961).

Conforme (Coluci; Alexandre, 2011; Coluci; Alexandre; Milani, 2015), são recomendados de cinco a dez juízes para a validação adequada de instrumentos. Participaram desta pesquisa sete juízes especialistas, número considerado suficiente para a realização da validação de conteúdo.

Foi realizado convite formal via correio eletrônico a cada especialista, com esclarecimentos acerca do estudo, contextualização da pesquisa, solicitação de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e envio de formulário

com instruções para avaliação da validade de conteúdo. Nessa etapa, foi encaminhado aos juízes o instrumento em sua versão final, ou seja, a ferramenta de rastreamento do câncer de mama disponibilizada em formato de website. O período de coleta de respostas do questionário foi de 10 de novembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026.

Os juízes participaram de uma única fase de avaliação, dividida em quatro etapas, de forma individual e online, por meio de um formulário disponível no Google Forms. Na primeira etapa, responderam às perguntas de identificação, com o objetivo de caracterizar o perfil sociodemográfico e profissional dos avaliadores, sendo elas: idade, identidade de gênero, autodeclaração, maior titulação acadêmica, tempo de atuação como ginecologista e obstetra e atuação atual ou prévia como ginecologista e obstetra na atenção básica.

Na segunda etapa, realizaram a avaliação global do instrumento, considerando os seguintes descritores: título da ferramenta, *layout*, sequência lógica das perguntas, forma como as condutas eram apresentadas após cada resposta e clareza geral do conteúdo. Para cada um desses aspectos, o juiz atribuiu escores de 1 a 4, de acordo com escala tipo Likert, em que: 1 = não claro; 2 = pouco claro; 3 = claro; e 4 = muito claro. Para essa avaliação, definiu-se clareza como a formulação das perguntas de maneira objetiva, compreensível e sem ambiguidades.

Após a segunda etapa, foi verificada quantitativamente a concordância por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), calculado com escala Likert de quatro pontos. O IVC foi calculado pela razão entre o número de juízes que atribuíram escores 3 ou 4 e o número total de juízes. Os itens com pontuação baixa foram revisados ou excluídos, adotando-se como referência valores mínimos de concordância de 0,78 para itens individuais e, preferencialmente, superiores a 0,90 para o instrumento geral (Coluci; Alexandre, 2011; Coluci; Alexandre; Milani, 2015).

Na terceira etapa, os juízes avaliaram o domínio único da ferramenta quanto à clareza, representatividade e abrangência. Considerou-se como clareza, a formulação das perguntas de maneira objetiva e compreensível; representatividade, a capacidade do item de refletir adequadamente o constructo teórico avaliado; e abrangência, a contemplação ampla dos aspectos relevantes do constructo. As opções de resposta para cada pergunta foram “concordo” e “não concordo”.

Após a terceira etapa, foi calculada a porcentagem de concordância por meio da fórmula: número de participantes que concordaram dividido pelo número total

de participantes, multiplicado por 100, considerando-se adequada taxa superior a 90% (Coluci; Alexandre, 2011; Coluci; Alexandre; Milani, 2015).

Na quarta e última etapa, foram avaliados os itens contidos em cada pergunta da ferramenta quanto à sua clareza e representatividade. Para cada um desses critérios, o juiz atribuiu escores de 1 a 4, segundo escala tipo Likert, em que, para clareza: 1 = não claro; 2 = pouco claro; 3 = claro; 4 = muito claro; e, para representatividade: 1 = não representativo; 2 = pouco representativo; 3 = representativo; 4 = muito representativo. Nessa fase, o IVC foi novamente calculado, seguindo as mesmas recomendações e critérios de interpretação descritos na segunda etapa.

Além da análise quantitativa, o estudo contemplou também uma etapa qualitativa na validação de conteúdo do instrumento. Ao final de cada seção do questionário de avaliação, foi disponibilizado aos juízes um campo aberto destinado ao registro de sugestões e comentários. Nesse espaço, os especialistas puderam expressar suas percepções acerca da clareza, pertinência, organização e aplicabilidade dos itens, bem como propor reformulações, inclusões ou exclusões. Essa etapa possibilitou uma exploração mais aprofundada do conteúdo do instrumento, permitindo identificar aspectos não captados pelos indicadores quantitativos.

As contribuições podem ser examinadas por meio da Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin, entendida como um conjunto de técnicas sistemáticas e objetivas de descrição do conteúdo das mensagens, que visa à inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas comunicações (Bardin, 2011). Esse referencial metodológico possibilita a identificação de núcleos de sentido presentes nos discursos, favorecendo a interpretação estruturada das percepções dos participantes.

O processo analítico seguiu as três etapas clássicas descritas por Bardin (2011). A primeira etapa, denominada pré-análise, consistiu na organização do material, constituição do corpus e realização de leitura flutuante, com o objetivo de proporcionar um contato inicial e global com o conteúdo. Na etapa seguinte, de exploração do material, foram realizadas a codificação das unidades de registro e a categorização temática, por meio do agrupamento de elementos de sentido semelhantes. Por fim, na fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, procedeu-se à síntese dos achados, à identificação de padrões e à articulação dos resultados com o referencial

teórico do estudo, buscando atribuir significado às manifestações dos participantes (Bardin, 2011).

Para assegurar o anonimato dos juízes, cada participante foi identificado por um código alfanumérico, variando de P1 a P7. As sugestões e comentários foram transcritos literalmente, de modo a preservar a fidedignidade das falas e garantir a integridade do material analisado. Esse procedimento contribui para a transparência do processo analítico e para a manutenção da proximidade entre os dados empíricos e as interpretações realizadas, conforme preconiza a abordagem de análise de conteúdo (Bardin, 2011).

A pesquisa respeitou os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 10 de setembro de 2025 (CAAE nº 91708425.7.0000.5384; Parecer nº 7.831.528). (ANEXO A).

7 RESULTADOS

7.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS JUÍZES ESPECIALISTAS

Foram convidados a participar da pesquisa 20 profissionais, dos quais, 7 responderam ao questionário e participaram do processo de validação de conteúdo como juízes especialistas, todos médicos com formação e atuação na área de Ginecologia e Obstetrícia, e com experiência clínica de pelo menos um ano, conforme os critérios previamente estabelecidos na metodologia.

A idade dos participantes variou de 30 a 66 anos, com média aproximada de 47,3 anos, evidenciando a participação de profissionais em diferentes fases da carreira, desde especialistas mais jovens até profissionais com ampla experiência clínica.

Em relação à identidade de gênero, observou-se predominância do sexo feminino, com 5 juízas (71,4%) que se identificaram como mulheres cisgênero e dois juízes (28,6%) como homens cisgênero. Na avaliação da autodeclaração, 7 juízes (100%) se autodeclararam como branco.

Quanto à titulação acadêmica, verificou-se elevado nível de qualificação do comitê: 3 participantes (42,9%) possuíam doutorado, 2 participantes (28,6%) possuíam mestrado e 2 participantes (28,6%) tinham como maior titulação a residência médica em Ginecologia e Obstetrícia.

No que se refere ao tempo de atuação como ginecologista e obstetra, houve variação de 2 a 40 anos de experiência profissional, com média de aproximadamente 22,5 anos. Todos os 7 juízes (100%) afirmaram já ter atuado como Ginecologista na Atenção Básica.

7.2 AVALIAÇÃO GLOBAL DO INSTRUMENTO (ETAPA 2 DO QUESTIONÁRIO)

Na avaliação global do instrumento, os juízes analisaram cinco aspectos: título da ferramenta, *layout*, sequência lógica das perguntas, forma como as condutas são apresentadas após cada resposta e clareza geral do conteúdo.

O IVC foi calculado considerando a proporção de respostas 3 (claro) ou 4 (muito claro) em relação ao total de respostas.

Em relação ao título da ferramenta, 4 juízes (57,1%) o consideraram claro e 3 juízes (42,9%) consideraram muito claro.

Quanto ao *layout* da ferramenta, 3 juízes (42,9%) o consideraram claro e 4 juízes (57,1%) consideraram muito claro.

Sobre a sequência lógica das perguntas, 3 juízes (42,9%) o consideraram claro e 4 juízes (57,1%) consideraram muito claro.

Sendo assim, os resultados demonstram excelente validade de conteúdo para o título, *layout* e sequência lógica das perguntas, sendo que 100% dos juízes apresentaram respostas da escala Likert entre 3 e 4 levando a um IVC final de 1,00 para cada um dos pontos avaliados.

Quanto à clareza geral do conteúdo, 1 juiz o considerou pouco claro (14,3%), 4 juízes (57,1%) o consideraram claro e 2 juízes (28,6%) consideraram muito claro sendo que, 6 juízes apresentaram respostas da escala Likert entre 3 e 4 levando a um IVC final de 0,85, superior ao corte recomendado para definir o item como válido.

O item referente à forma como as condutas aparecem após cada resposta apresentou 2 respostas o considerando pouco claro (28,6%), 2 claro (28,6%) e 3 muito claro (42,9%). Com isso, 5 juízes apresentaram respostas da escala Likert entre 3 e 4 levando a um IVC final de 0,71, ligeiramente abaixo do recomendado. Esse achado sugere que parte dos juízes identificou necessidade de ajustes na forma de exibição das recomendações finais, possivelmente relacionados à organização visual, linguagem ou destaque das orientações clínicas. Esse resultado foi utilizado como subsídio para revisão estrutural da apresentação das condutas na ferramenta.

A avaliação qualitativa realizada nesta etapa, apresentou 2 respostas por meio da caixa de texto em branca com “Sugestões” sendo elas: “Aumentar a fonte das letras, no celular ficou de tamanho pequeno” e “Escrever as condutas em forma de fluxograma.”, sugestão dada por um dos juízes que classificou à forma como as condutas aparecem após cada resposta como pouco claro.

7.3 AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO DO INSTRUMENTO (ETAPA 3 DO QUESTIONÁRIO)

O domínio único do instrumento “Fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama” foi avaliado quanto à clareza, representatividade e abrangência, por meio de respostas dicotômicas (concordo/não concordo).

A porcentagem de concordância foi calculada dividindo-se o número de respostas “concordo” pelo total de juízes, multiplicado por 100. Todos os critérios avaliados no domínio apresentaram 100% de concordância, indicando que, para todos os juízes: o domínio está claramente definido, representa adequadamente o constructo teórico proposto e abrange de forma suficiente os principais aspectos relacionados aos fatores de risco para o câncer de mama.

Esse resultado reforça a coerência conceitual do instrumento e sua adequação ao objetivo de apoiar a estratificação de risco no rastreamento.

7.4 AVALIAÇÃO DOS ITENS INDIVIDUAIS (ETAPA 4 DO QUESTIONÁRIO)

Na quarta etapa, cada pergunta da ferramenta foi avaliada quanto à clareza e representatividade, também por meio de escala Likert de 4 pontos. O IVC foi novamente calculado considerando respostas 3 ou 4.

As perguntas analisadas correspondem aos itens que compõem o instrumento final da ferramenta e estão identificadas na Tabela 1 por numeração sequencial. A descrição completa de cada item é apresentada a seguir, para fins de legenda e compreensão dos resultados. A Tabela 1 apresenta a distribuição das respostas dos juízes especialistas quanto à clareza de cada item/pergunta da ferramenta, bem como o cálculo do IVC por item.

Tabela 1 - Distribuição da clareza de cada item e IVC, Franca, São Paulo, 2026

Perguntas	NC	PC	C	MC	Respostas 3 e 4	IVC
Pergunta 1 – Histórico pessoal de tratamento de câncer de mama invasor ou carcinoma ductal in situ?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 1.1 – Qual foi o tratamento realizado?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 2 – Histórico pessoal de radioterapia torácica prévia?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 3 – Portadora de mutação do gene BRCA1?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 4 – Portadora de mutação do gene BRCA2?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 5 – Portadora de mutação do gene TP53?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 6 – Histórico pessoal de hiperplasia lobular atípica (HLA), carcinoma lobular in situ clássico (CLIS) ou hiperplasia ductal atípica (HDA)?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 6.1 – Cálculo do risco de desenvolver câncer de mama (redirecionamento para ferramenta externa – Modelo de Gail): risco menor que 20% ou maior ou igual a 20%?	0	1	2	4	6	0,86
Pergunta 7 – Risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida (redirecionamento para ferramenta externa – Modelo de Gail)?	0	2	2	3	5	0,71
Pergunta 7.1 – Resultado do cálculo do risco pelo Modelo de Gail: risco menor que 20% ou maior ou igual a 20%?	0	1	2	4	6	0,86
Pergunta 8 – Idade entre 40 e 74 anos?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 8.1 – Como são as mamas da paciente?	0	3	2	2	4	0,57
Pergunta 9 – Idade maior que 75 anos?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 9.1 – Expectativa de vida maior que 7 anos?	0	2	1	4	5	0,71
Pergunta 9.2 – Idade menor que 40 anos?	0	0	2	5	7	1

NC: Não Claro; PC: Pouco Claro; C: Claro; MC: Muito Claro.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Observa-se que a maioria das perguntas apresentou predomínio das respostas “claro” e “muito claro”, resultando em $IVC \geq 0,78$, valor considerado adequado para validação de conteúdo. Alguns itens, entretanto, apresentaram IVC inferior ao ponto de corte recomendado (0,78), indicando necessidade de revisão textual para maior clareza. Esses itens foram: Pergunta 7, Pergunta 8.1 e Pergunta 9.1.

A Pergunta 7 "Risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida - redirecionamento para ferramenta externa modelo de GAIL" apresentou 2 respostas “pouco claro”, 2 “claro” e 3 “muito claro”, resultando em um $IVC = 0,71$.

A Pergunta 8.1 (subitem da pergunta anterior) "Como são as mamas da paciente apresentou 3 respostas “pouco claro”, 2 “claro” e 2 “muito claro”, resultando em um $IVC = 0,57$. Por último, a Pergunta 9.1 (subitem da pergunta anterior) "Expectativa de vida maior que 7 anos?" apresentou 2 respostas “pouco claro”, 1 “claro” e 4 “muito claro”, resultando em um $IVC = 0,71$.

Apesar de 3 itens da ferramenta apresentarem IVC inferior ao recomendado o IVC total do instrumento quanto à clareza, alcançou o ponto de corte de 0,9 pois a somatória dos valores de IVC de cada item, dividido pelo número total de itens (15), resultou em um IVC total de clareza = 0,91.

A Tabela 2 apresenta a distribuição das respostas dos juízes especialistas quanto à representatividade, para cada item/pergunta da ferramenta, bem como o cálculo do IVC por item.

Tabela 2 - Distribuição da representatividade de cada item e IVC, Franca, São Paulo, 2026

Perguntas	NR	PR	R	MR	Respostas 3 e 4	IVC
Pergunta 1 – Histórico pessoal de tratamento de câncer de mama invasor ou carcinoma ductal in situ?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 1.1 – Qual foi o tratamento realizado?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 2 – Histórico pessoal de radioterapia torácica prévia?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 3 – Portadora de mutação do gene BRCA1?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 4 – Portadora de mutação do gene BRCA2?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 5 – Portadora de mutação do gene TP53?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 6 – Histórico pessoal de hiperplasia lobular atípica (HLA), carcinoma lobular in situ clássico (CLIS) ou hiperplasia ductal atípica (HDA)?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 6.1 – Cálculo do risco de desenvolver câncer de mama (redirecionamento para ferramenta externa – Modelo de Gail): risco menor que 20% ou maior ou igual a 20%?	0	0	2	5	7	1
Pergunta 7 – Risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida (redirecionamento para ferramenta externa – Modelo de Gail)?	0	1	2	4	6	0,86
Pergunta 7.1 – Resultado do cálculo do risco pelo Modelo de Gail: risco menor que 20% ou maior ou igual a 20%?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 8 – Idade entre 40 e 74 anos?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 8.1 – Como são as mamas da paciente?	0	1	4	2	6	0,86
Pergunta 9 – Idade maior que 75 anos?	0	1	2	4	6	0,86
Pergunta 9.1 – Expectativa de vida maior que 7 anos?	0	0	3	4	7	1
Pergunta 9.2 – Idade menor que 40 anos?	0	0	3	4	7	1

NR: Não Representativo; PR: Pouco Representativo; R: Representativo; MR: Muito Representativo.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Todos os itens apresentaram IVC $\geq 0,78$ sendo considerado satisfatório sendo que, 3 perguntas alcançaram IVC = 0,86 e as outras alcançaram IVC = 1,00. Esse resultado indica que, segundo os especialistas, as perguntas incluídas na ferramenta são pertinentes e adequadas para representar os fatores de risco clínicos relevantes na tomada de decisão sobre o rastreamento do câncer de mama.

Quanto ao IVC total de representatividade do instrumento, alcançou-se o ponto de corte de 0,9 pois a somatória dos valores de IVC de cada item, dividido pelo número total de itens (15), resultou em um IVC total de representatividade = 0,97.

Dessa forma, o IVC total do instrumento, que se dá pela média do IVC de clareza com o IVC de representatividade, tem-se o valor de 0,94, acima do corte esperado para a validação do instrumento.

7.5 ANÁLISE QUALITATIVA DAS SUGESTÕES DOS JUÍZES

Conforme previsto na metodologia, foi proposta a realização de análise qualitativa das contribuições dos juízes à luz da Análise de Conteúdo de Bardin. Entretanto, durante a análise do material coletado, observou-se que o volume e a natureza das respostas obtidas nos campos abertos foram limitados, sendo majoritariamente voltados a ajustes pontuais de redação, clareza textual e aspectos formais do instrumento. Dessa forma, não foi possível proceder à categorização temática e à identificação de núcleos de sentido conforme preconiza a técnica de Bardin, uma vez que o conteúdo não apresentou densidade analítica suficiente para tal abordagem (Bardin, 2011).

Ainda assim, todas as sugestões foram examinadas individualmente e consideradas no processo de revisão do instrumento. As contribuições foram predominantemente relacionadas a aprimoramentos na formulação das perguntas, padronização da linguagem, clareza das instruções e melhorias na apresentação visual da ferramenta.

Observou-se que os participantes P1, P3, P5 e P6 não apresentaram sugestões adicionais ao instrumento. As observações registradas concentraram-se nos participantes P2, P4 e P7, sendo predominantemente relacionadas a ajustes de redação, padronização da linguagem e melhorias na clareza das perguntas.

O participante P2 sugeriu modificações na formulação de itens da etapa 4,

recomendando a inclusão do termo “Possui” no início das perguntas 1, 2 e 6, bem como a inserção de “É” no início das perguntas 3, 4 e 5. Ainda nessa etapa, propôs a reformulação da pergunta 8.1 para “Como são as mamas da paciente quanto à densidade mamográfica?”, além da padronização das opções de resposta para “Densas”, “Parcialmente densas” e “Lipossobstituídas” (P2).

O participante P4 apresentou sugestões relacionadas tanto à apresentação visual quanto à estrutura do conteúdo. Na etapa 2, recomendou “aumentar a fonte das letras, no celular ficou de tamanho pequeno” e “escrever as condutas em forma de fluxograma”. Já na etapa 4, sugeriu incluir “adendos com sugestão de análise” na pergunta 9.1 e propôs modificações estruturais mais amplas, como “anexar a ferramenta ao seu instrumento como parte do fluxograma (traduzir para português)” e “transportar o questionário para a sua ferramenta” (P4).

Por sua vez, o participante P7 também apresentou contribuições na etapa 4, sugerindo maior destaque visual na orientação “calcule o risco e volte para essa página” (pergunta 6) e propondo ajuste na redação da pergunta 8.1 para “Como são as mamas da paciente em relação à densidade?” (P7).

De modo geral, as contribuições qualitativas dos juízes foram consideradas pertinentes e resultaram em ajustes na redação das perguntas, na padronização da linguagem e em melhorias relacionadas à usabilidade e à clareza da interface da ferramenta. As sugestões apresentadas foram analisadas individualmente e incorporadas à versão final do instrumento. Apenas duas recomendações não puderam ser implementadas, a saber: “anexar a ferramenta ao seu instrumento como parte do fluxograma (traduzir para português)”, referente à pergunta 6.1, e “transportar o questionário para a sua ferramenta”, relacionada à pergunta 7.1. Essas propostas extrapolavam o escopo e as possibilidades técnicas da ferramenta digital desenvolvida no presente estudo, o que inviabilizou sua incorporação nesta versão.

Ainda assim, tais observações foram consideradas relevantes como apontamentos para aprimoramentos futuros. Dessa forma, embora a análise qualitativa não tenha possibilitado a construção de categorias temáticas formais, as contribuições dos juízes desempenharam papel importante no refinamento do conteúdo, da linguagem e da apresentação da ferramenta, favorecendo maior clareza, aplicabilidade clínica e adequação ao público-alvo.

8 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como problema de pesquisa a necessidade de construir e validar uma ferramenta digital capaz de auxiliar médicos na tomada de decisão sobre o rastreamento do câncer de mama de forma individualizada. Os resultados obtidos demonstram que o instrumento apresentou níveis satisfatórios de concordância entre os juízes, sustentando sua adequação em relação ao constructo proposto.

Os valores alcançados no Índice de Validade de Conteúdo indicam que os itens foram considerados pertinentes e representativos pelos especialistas, achado que se alinha às recomendações metodológicas descritas por (Coluci, Alexandre e Milani (2015) que apontam o IVC como estratégia central na avaliação da validade de conteúdo de instrumentos em saúde. Segundo as autoras, a análise por especialistas permite verificar se os itens contemplam adequadamente as dimensões do fenômeno investigado e se apresentam linguagem clara e apropriada ao público-alvo, sendo etapa essencial antes da aplicação prática do instrumento.

Da mesma forma, Coluci, Alexandre e Milani (2015) destacam que a validade de conteúdo está diretamente relacionada à capacidade dos itens representarem o domínio teórico que se pretende mensurar, reforçando a importância da avaliação criteriosa por juízes com experiência na área temática.

Os ajustes realizados a partir das sugestões dos avaliadores reforçam o caráter iterativo do processo de construção de instrumentos, conforme preconizado na literatura metodológica. Modificações na redação, padronização de termos e reorganização de perguntas contribuem para maior precisão semântica e redução de ambiguidades, aspectos fundamentais para a qualidade de instrumentos voltados à prática clínica (Coluci; Alexandre; Milani, 2015).

A clareza textual e a organização lógica dos itens são fatores que influenciam diretamente a interpretação das perguntas pelos usuários e, consequentemente, a confiabilidade das decisões apoiadas pelo instrumento. No que se refere à análise das contribuições qualitativas, a abordagem adotada manteve consonância com pressupostos de análises qualitativas descritivas, nas quais o foco recai sobre o conteúdo explícito das manifestações dos participantes.

Esse processo contribui para fortalecer a validade de conteúdo e oferece

respaldo para a aplicação futura da ferramenta em contextos assistenciais. Ao considerar o propósito do instrumento, voltado ao apoio à decisão no rastreamento do câncer de mama, os resultados também dialogam com a necessidade de estratégias que promovam decisões clínicas individualizadas. O rastreamento mamográfico envolve potenciais benefícios e riscos, e sua indicação deve levar em conta fatores clínicos, perfil de risco e preferências da paciente.

Nesse cenário, ferramentas estruturadas e validadas podem favorecer a organização das informações e apoiar o processo de decisão compartilhada, prática recomendada na assistência à saúde (Elwyn *et al.*, 2012). Além disso, diretrizes nacionais reforçam a importância de abordagens baseadas em risco e em evidências para qualificar a tomada de decisão no rastreamento do câncer de mama (Instituto Nacional de Câncer, 2015; Urban *et al.*, 2023).

Dessa forma, os achados deste estudo indicam que o processo de validação empregado foi metodologicamente consistente e fundamentado em referenciais reconhecidos na área de construção e validação de instrumentos. A articulação entre avaliação quantitativa por meio do IVC e a análise qualitativa das contribuições dos especialistas possibilitou o aprimoramento do conteúdo, da clareza e da aplicabilidade da ferramenta, fortalecendo sua base científica e seu potencial de utilização no contexto da prática clínica.

Outro ponto a ser considerado refere-se ao possível viés de desejabilidade ou de complacência do avaliador. Em estudos baseados em julgamento de especialistas, é descrito que os participantes podem tender a avaliações mais favoráveis, seja pelo reconhecimento da relevância do tema, seja pela valorização do esforço científico envolvido na construção do instrumento. Esse fenômeno relaciona-se a formas de viés de resposta, nas quais julgamentos podem ser influenciados por fatores sociais ou contextuais, contribuindo para níveis elevados de concordância mesmo diante de limitações sutis do instrumento (Polit; Beck, 2011).

Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de variações individuais na interpretação dos critérios de avaliação, como clareza, pertinência e relevância. Ainda que orientações padronizadas tenham sido fornecidas, tais conceitos podem ser compreendidos de maneira ligeiramente distinta entre os avaliadores, o que constitui uma limitação inerente a estudos baseados em julgamento subjetivo. Streiner, Norman e Cairney (2015) destacam que medidas fundamentadas em avaliações

humanas estão sujeitas a variações interpretativas, especialmente quando envolvem construtos abstratos, o que reforça a importância de reconhecer esse tipo de viés na interpretação dos resultados.

No que se refere à etapa qualitativa, a natureza dos campos abertos favorece respostas objetivas e pontuais, geralmente direcionadas a ajustes de redação ou forma, o que limita a exploração de percepções mais aprofundadas sobre o instrumento. A literatura em métodos qualitativos aponta que perguntas abertas em instrumentos estruturados tendem a gerar dados menos densos do que entrevistas ou grupos focais, restringindo a amplitude interpretativa possível (Braun; Clarke, 2006). Assim, a análise qualitativa concentrou-se em contribuições descritivas, voltadas principalmente ao aprimoramento técnico do conteúdo.

Por fim, destaca-se que a validação foi realizada exclusivamente por especialistas, não incluindo a etapa de avaliação com usuários finais em contexto real de utilização. A ausência dessa etapa pode estar associada a viés de perspectiva profissional, uma vez que especialistas tendem a avaliar o instrumento sob o ponto de vista técnico, que nem sempre reflete as condições práticas de uso na rotina assistencial. Polit e Beck (2011) ressaltam que a avaliação por usuários finais é etapa importante para ampliar a validade de instrumentos aplicados à prática clínica, permitindo identificar barreiras de uso, dificuldades operacionais e fatores contextuais que não emergem na avaliação exclusivamente técnica.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como propósito validar o conteúdo de uma ferramenta voltada à avaliação do risco para o desenvolvimento do câncer de mama, considerando a relevância epidemiológica da doença e a necessidade de instrumentos que qualifiquem as ações de prevenção e detecção precoce no sistema de saúde.

Os resultados obtidos evidenciaram alto grau de concordância entre os especialistas, tanto em relação à clareza quanto à representatividade dos itens avaliados. A maioria das perguntas apresentou Índice de Validade de Conteúdo igual a 1,00, reforçando a adequação do instrumento ao constructo proposto. Os itens que apresentaram valores de IVC inferiores foram considerados aceitáveis segundo a literatura, indicando apenas a necessidade de ajustes pontuais, sem comprometer a consistência global da ferramenta.

Dessa forma, a ferramenta validada demonstra potencial para contribuir com a prática profissional, auxiliando na identificação de fatores de risco para o câncer de mama e favorecendo a tomada de decisão clínica, especialmente no contexto da atenção primária e da organização das redes de cuidado. Além disso, o instrumento pode apoiar o planejamento de ações em saúde e subsidiar políticas públicas voltadas à saúde da mulher.

Como limitação do estudo, destaca-se a avaliação restrita à validade de conteúdo, não contemplando outras propriedades psicométricas, como confiabilidade e validade de constructo. Assim, recomenda-se a realização de estudos futuros que ampliem a avaliação do instrumento, bem como sua aplicação em diferentes contextos e populações.

Além disso, alguns aspectos metodológicos devem ser considerados na interpretação dos achados. A seleção dos juízes, realizada com base em critérios de expertise e disponibilidade, pode ter introduzido viés de participação, uma vez que o grupo avaliador pode apresentar formações, experiências e referenciais teóricos semelhantes. A literatura metodológica descreve que amostras intencionais de especialistas, embora adequadas para validação de conteúdo, podem reduzir a variabilidade de opiniões e limitar a diversidade de perspectivas, influenciando o padrão de respostas obtidas (Polit; Beck, 2011; Streiner; Norman; Cairney, 2015).

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o fortalecimento das estratégias de prevenção do câncer de mama e para o aprimoramento da qualidade do cuidado oferecido às mulheres, reafirmando a importância de instrumentos validados cientificamente no campo da saúde pública.

REFERÊNCIAS

ANTONIOU, A. C. *et al.* The BOADICEA model of genetic susceptibility to breast and ovarian cancer. **American Journal of Human Genetics**, Rockville, v. 75, n. 5, p. 1131–1140, 2004.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Câncer de mama: diagnóstico e tratamento**. São Paulo: AMB/CFM, 2001. Disponível em: https://amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/cancer-de-mama-diagnostico-e-tratamento.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.

BARATA, R. B. Epidemiologia social. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 7–17, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2005000100002>. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2005000100002>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BATISTA, G. V. *et al.* Breast cancer: risk factors and prevention methods. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 9, n. 12, p. e15191211077, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i12.11077. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/11077>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008**. Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama. Diário Oficial da União, Brasília, 30 abr. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do câncer de mama**: relatório preliminar. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2024/RRPCDTCncerdeMama_CP.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)**: bases de ação programática. Brasília: Ministério da Saúde, 1984. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_integral_saude_mulher.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção ao Câncer. Coordenação-Geral de Prevenção e Controle do Câncer. **Nota técnica nº 626/2025-CGCAN/DECAN/SAES/MS**: uniformização das informações relacionadas ao acesso ao exame de mamografia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2025/nota-tecnica-no-626-2025-cgcan-decan-saes-ms.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SUS digital**. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/sus-digital>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. Ministério do Esporte. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília: Ministério do Esporte, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASILEIRO FILHO, G. **Bogliolo**: patologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

BRIGGS, L. G. *et al.* Digital technologies in cancer care: a review from the clinician's perspective. **Journal of Comparative Effectiveness Research**, London, v. 11, n. 7, p. 533–544, 2022. DOI: <https://doi.org/10.2217/cer-2021-0263>. Disponível em: <https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/cer-2021-0263>. Acesso em: 16 fev. 2026.

BRIGUENTI RAMALHO, R. *et al.* Diagnóstico e tratamento do câncer de mama: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 8, p. 1040–1050, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n8p1040-1050. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/bjhs/article/view/2866>. Acesso em: 16 fev. 2026.

COLUCI, M. Z. O.; ALEXANDRE, N. M. C.; MILANI, D. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 925–936, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015203.04332013>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qTHcjt459YLYPM7Pt7Q7cSn/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 16 fev. 2026.

COLUCI, M. Z. O.; ALEXANDRE, N. M. C.; Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3061–3068, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000800006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/5vBh8PmW5g4Nqzx3r999vrn/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 16 fev. 2026.

COMISSÃO PARA OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (CDSS). **Redução das desigualdades no período de uma geração**: igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais. Relatório final. Lisboa: Organização Mundial da Saúde, 2010.

COSTA, R. E. A. R. da. *et al.* Sobrevida e fatores prognósticos em pacientes com câncer de mama: estudo de coorte. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 70, n. 4, e-154839, 2024. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2024v70n4.4839>. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/4839>. Acesso em: 16 fev. 2026.

COSTANTINI, L. *et al.* Use of digital technologies to support cancer screening in community health promotion interventions: scoping review. **Health Promotion International**, Eynsham, v. 38, n. 1, daac189, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1093/heapro/daac189>. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article-lookup/doi/10.1093/heapro/daac189>. Acesso em: 16 fev. 2026.

DAHLGREN, G.; WHITEHEAD, M. **Policies and strategies to promote social equity in health**. Stockholm: Institute for Futures Studies, 1991.

EDEN, J. *et al.* (org.). **Digital health: building a learning health system for the 21st century**. Washington, DC: National Academies Press, 2018. DOI: <https://doi.org/10.17226/25135>. Disponível em: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/25135/digital-health-building-a-learning-health-system-for-the-21st-century>. Acesso em: 16 fev. 2026.

ELWYN, G. *et al.* Shared decision making: a model for clinical practice. **Journal of General Internal Medicine**, Philadelphia, New York, v. 27, n. 10, p. 1361–1367, 2012. DOI: 10.1007/s11606-012-2077-6. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-012-2077-6>. Acesso em: 16 fev. 2026.

EUROPEAN COMMISSION. **European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis**. 4. ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.

FURTADO, C. **Introdução ao desenvolvimento**: enfoque histórico-estrutural. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

GAIL, M. H. *et al.* Projecting individualized probabilities of developing breast cancer for white females who are being examined annually. **Journal of the National Cancer Institute**, Bethesda, v. 81, n. 24, p. 1879-1886, 1989. DOI: 10.1093/jnci/81.24.1879. Disponível em: <https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/81/24/1879/1019887?redirectedFrom=fulltext&login=false>. Acesso em: 16 fev. 2026.

GAILLARD, F. *et al.* TNM staging system. **Radiopaedia.org**, 2008. DOI: <https://doi.org/10.53347/rID-2140>. Disponível em: <https://radiopaedia.org/articles/2140>. Acesso em: 16 fev. 2026.

GÜNTHER, H. **Como elaborar um questionário**. Planejamento de pesquisa nas ciências sociais, Brasília, DF: Universidade de Brasília, Laboratório de Psicologia Ambiental, 2003. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2026.

GOMES, R. C. A. et al. Estratégias de prevenção do câncer de mama: revisão integrativa. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**, Canoas, v. 9, n. 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18316/sdh.v9i3.7319>. Disponível em: http://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento. Acesso em: 16 fev. 2026.

GOODMAN, L. A. **Snowball Sampling**. The Annals of Mathematical Statistics, 1961.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **Controle do câncer de mama no Brasil: dados e números: 2024**. Rio de Janeiro: INCA, 2024. Disponível em: <https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/17002/1/Controle%20do%20c%C3%A2ncer%20de%20mamano%20Brasil%20-%20dados%20e%20n%C3%BAmeros%202024.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2015. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diretrizes-para-deteccao-precoce-do-cancer-de-mama-no-brasil>. Acesso em: 16 fev. 2026.

INUMARU, L. E.; SILVEIRA, E. A.; NAVES, M. M. V. Fatores de risco e de proteção para câncer de mama: uma revisão sistemática. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 7, p. 1259-1270, jul. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000700002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/ZbRRyNH4HRLXSbFNMms6RgM/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 16 fev. 2026.

JAMOULLE, M. **Information et informatisation en médecine générale**. 2000.

JAMOULLE, M. Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization. **International Journal of Health Policy and Management**, Kerman, v. 4, n. 2, p. 61–64, 2015. DOI: <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2015.24>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>. Acesso em: 16 fev. 2026.

LAZAROU, I. et al. Cancer patients' perspectives and requirements of digital health technologies: a scoping literature review. **Cancers** (Basel), v. 16, n. 13, 2293, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/cancers16132293>. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/cancers16132293>. Acesso em: 16 fev. 2026.

LEAVELL, H. R.; CLARK, E. G. **Preventive medicine for the doctor in his community: an epidemiologic approach**. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1965.

LEME, R. S.; BLANK, M. Lei Geral de Proteção de Dados e segurança da informação na área da saúde. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, Brasília, v. 9, n. 3, p. 210–224, 2020. DOI: 10.17566/ciads.v9i3.690. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/690..> Acesso em: 16 fev. 2026.

MALHOTRA, G. K. *et al.* Histological, molecular and functional subtypes of breast cancers. **Cancer Biology & Therapy**, Georgetown, v. 10, n. 10, p. 955–960, 2010. DOI: <https://doi.org/10.4161/cbt.10.10.13879>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/cbt.10.10.13879>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MARMOT, M. *et al.* Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. **The Lancet**, v. 372, n. 9650, p. 1661–1669, 2008. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61690-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61690-6). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673608616906>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MENON, G.; ALKABBAN, F. M.; FERGUSON, T. **Breast cancer**. In: STATPEARLS. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482286/>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MOREIRA, C. B. (org.). **Controle do câncer de mama**: documento de consenso. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 2018. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/controle-do-cancer-de-mama-documento-de-consenso>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MURTHI, S. *et al.* Evaluating EHR-integrated digital technologies for medication-related outcomes and health equity in hospitalised adults: a scoping review. **Journal of Medical Systems**, v. 48, n. 79, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10916-024-02097-5>. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10916-024-02097-5>. Acesso em: 16 fev. 2026.

OBEAGU, E. I.; OBEAGU, G. U. Breast cancer: a review of risk factors and diagnosis. **Medicine** (Baltimore), v. 103, n. 3, e36905, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000036905>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38241592/>. Acesso em: 16 fev. 2026.

OLDHOFF-NUIJSINK, C. *et al.* Digital tools to support informed decision making among screening invitees in a vulnerable position for population-based cancer screening: a scoping review. **International Journal of Medical Informatics**, v. 192, 105625, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105625>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505624002880>. Acesso em: 16 fev. 2026.

PINHEIRO, M. M. S. **As liberdades humanas como bases do desenvolvimento**: uma análise conceitual da abordagem das capacidades humanas de Amartya Sen. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2012. (Texto para Discussão, n. 1794). Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/989>. Acesso em: 16 fev. 2026.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. **Nursing research**: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

POPA, M. T. *et al.* Breast cancer: a heterogeneous pathology. Prognostic and predictive factors – a narrative review. **Chirurgia** (Bucur), v. 120, n. 1, p. 32–47, 2025. DOI: <https://doi.org/10.21614/chirurgia.3100>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40051316>. Acesso em: 16 fev. 2026.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SHAPIRO, S. *et al.* Evidence on screening for breast cancer from a randomized trial. **Cancer**, New York, v. 39, n. 6, p. 2772–2782, 1966. DOI: 10.1002/1097-0142(197706)39:6<2772::aid-cnrcr2820390665>3.0.co;2-k. Disponível em: [https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0142\(197706\)39:6%3C2772::AID-CNCR2820390665%3E3.0.CO;2-K](https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0142(197706)39:6%3C2772::AID-CNCR2820390665%3E3.0.CO;2-K). Acesso em: 16 fev. 2026.

STREINER, D. L.; NORMAN, G. R.; CAIRNEY, J. **Health measurement scales**: a practical guide to their development and use. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

TESSER, C. D.; NORMAN, A. H. Prevenção quaternária e medicalização: conceitos inseparáveis. **Interface** (Botucatu), v. 25, e210101, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.210101>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/7mkSdVRspSG34PnChDr8B9L/?lang=pt>. Acesso em: 16 fev. 2026.

TYRER, J.; DUFFY, S. W.; CUZICK, J. A breast cancer prediction model incorporating familial and personal risk factors. **Statistical Medicine**, Chinchester, v. 23, n. 7, p. 1111–1130, 2004. DOI: 10.1002/sim.1668. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.1668>. Acesso em: 16 fev. 2026.

URBAN, L. A. B. D. *et al.* Recomendações para o rastreamento do câncer de mama no Brasil do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Revista Femina - FEBRASGO**, v. 51, n. 7, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-3984.2023.0064>. Disponível em: <https://cbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Recomendacoes-do-Colegio.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2026.


WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Breast cancer**. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>. Acesso em: 16 fev. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Cancer control**: knowledge into action: WHO guide for effective programmes: early detection. Geneva: World Health Organization, 2008. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43743>. Acesso em: 16 fev. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Cancer control**: knowledge into action – WHO guide for effective programmes: early detection. Geneva: WHO, 2007. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43743/9241547338_eng.pdf?sequence. Acesso em: 16 fev. 2026.

XIONG, X. *et al.* Breast cancer: pathogenesis and treatments. **Signal Transduction and Targeted Therapy**, London, v. 10, 49, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02108-4>. Disponível em: <http://nature.com/articles/s41392-024-02108-4>. Acesso em: 16 fev. 2026.

APÊNDICE A - MODELO DE FLUXOGRAMA NORTEADOR



Criado pela autora

APÊNDICE B - INTERFACES DA FERRAMENTA DIGITAL CONSTRUÍDA

Ferramenta para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama

Esta ferramenta foi desenvolvida para auxiliar médicos na tomada de decisão sobre o rastreamento do câncer de mama, considerando fatores de risco individuais, histórico clínico e características da paciente. O uso deve ocorrer durante a consulta clínica, como instrumento complementar ao raciocínio médico. O resultado oferecido não substitui o julgamento clínico, mas contribui para uma decisão compartilhada e baseada em evidências.

Iniciar

Ao assinalar “sim”, é apresentada a conduta:

Ferramenta para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama

Em relação à sua paciente, responda ao questionário a seguir:

Pergunta 1

**Possui histórico pessoal de tratamento de câncer de mama invasor ou
carcinoma ductal in situ?**

Sim

Não

Disponível: <https://rastreamento-cancermama.vercel.app/>

Ao assinalar “sim”, é apresentada a conduta:

Ferramenta para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama

Em relação à sua paciente, responda ao questionário a seguir:

Conduta sugerida

Mamografia anualmente, com início no mínimo 6 meses após o término da Radioterapia.

Complementar com Ressonância Magnética anualmente, se diagnóstico antes dos 50 anos ou mamas densas.

*Se Ressonância Magnética indisponível, realizar Ultrassonografia anual.

[Voltar](#)

Ao assinalar “não”, a próxima pergunta é apresentada:

Ferramenta para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama

Em relação à sua paciente, responda ao questionário a seguir:

Pergunta 2

Possui histórico pessoal de radioterapia torácica prévia?

[Sim](#)

[Não](#)

As demais perguntas e condutas da ferramenta estão disponíveis para acesso em: <https://rastreamento-cancermama.vercel.app/>

ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-
FACEF



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Desenvolvimento e validação de conteúdo de uma ferramenta digital para suporte à conduta médica no rastreamento do câncer de mama

Pesquisador: MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 91708425.7.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.831.528

Apresentação do Projeto:

O Projeto conta com boa fundamentação teórica, bem como sua justificativa. É apresentado de forma clara e coerente onde seus objetivos condizem com a metodologia pretendida.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo apresenta-se de forma clara e está diretamente relacionado ao problema a ser investigado, define o que se pretende alcançar com a investigação e delimitando os raciocínios.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Garante que os benefícios são sempre superiores aos riscos, apresentam-se como mínimos. Estão apresentados de forma transparente aos participantes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O presente trabalho demonstra qualidade acadêmica, refletindo clareza na exposição, consistência teórica e relevância científica. Observa-se que todas as etapas foram conduzidas em consonância com os princípios éticos vigentes, assegurando o respeito à dignidade, aos direitos e ao bem-estar dos participantes envolvidos, bem como a integridade metodológica da pesquisa. A condução ética, aliada ao rigor científico, confere ao estudo credibilidade e legitimidade.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os termos apresentam-se de forma clara e atendem os critérios éticos.

**CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-
FACEF**



Continuação do Parecer: 7.831.528

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O trabalho apresenta-se como adequado às solicitações exigidas pelo CEP.

Considerações Finais a critério do CEP:

Projeto aprovado. O trabalho apresenta-se como adequado às solicitações exigidas pelo CEP.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2549889.pdf	29/08/2025 08:27:08		Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	29/08/2025 08:26:21	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito
Outros	termo_responsabilidade.pdf	29/08/2025 08:23:40	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito
Declaração de Pesquisadores	declaracao_pesquisador.pdf	29/08/2025 08:22:50	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	29/08/2025 08:21:54	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito
Folha de Rosto	Folha_rosto.pdf	29/08/2025 08:21:45	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.pdf	29/08/2025 08:17:54	MARIA PAULA PIASSI BRASILEIRO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

FRANCA, 10 de Setembro de 2025

Assinado por:
Antonio Cezar Peron
(Coordenador(a))