

Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LAGE

A PERCEPÇÃO DA SÍFILIS EM UMA AMOSTRA DE UNIVERSITÁRIOS DA
ÁREA DE SAÚDE DE UM DESENVOLVIDO CENTRO URBANO DO SUDESTE
BRASILEIRO

Franca

2026

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LAGE

**A PERCEPÇÃO DA SÍFILIS EM UMA AMOSTRA DE UNIVERSITÁRIOS DA
ÁREA DE SAÚDE DE UM DESENVOLVIDO CENTRO URBANO DO SUDESTE
BRASILEIRO**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre

Co-Orientadora: Prof. Dra. Livia Maria Lopes Gazaffi

Franca

2026

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LAGE

**A PERCEPÇÃO DA SÍFILIS EM UMA AMOSTRA DE UNIVERSITÁRIOS DA
ÁREA DE SAÚDE DE UM DESENVOLVIDO CENTRO URBANO DO SUDESTE
BRASILEIRO**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre

Co-Orientadora: Prof. Dra. Livia Maria Lopes Gazaffi

Franca, 18 de março de 2026

Orientador: _____

Nome: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF.

Examinadora: _____

Nome: Prof.^a. Dra. Maria de Fátima Aveiro Colares

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF.

Examinador: _____

Nome: Dra. Maria Amélia Zanon Ponce

Instituição: PPG em Enfermagem - FAMERP, S. J. do Rio Preto.

DEDICATÓRIA

À minha esposa e aos meus filhos, que compreenderam minhas ausências e transformaram renúncia em apoio. Cada noite de estudo, cada fim de semana dedicado à pesquisa, só foi possível porque o amor de vocês sustentou meus passos.

Aos meus pais, que, mesmo à distância, foram presença constante na formação dos meus valores e na convicção de que o conhecimento é a mais digna das construções e a única herança que ninguém pode tirar.

Àqueles que enfrentam a sífilis — muitas vezes em silêncio — para que este trabalho represente não apenas um título, mas um compromisso permanente com a informação, a prevenção e o cuidado.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pela saúde, força e perseverança ao longo desta jornada.

Ao meu orientador, professor Manoel Jorge pela orientação segura, pelas críticas construtivas e pela confiança depositada neste trabalho.

À minha Co-Orientadora, professora Lívia, pelo apoio de sempre e parceria na área da saúde.

Ao Uni-Facef, instituição onde atuo como docente, bem como aos alunos que participaram desta pesquisa. Sem a colaboração e disponibilidade de cada um, este estudo não seria possível.

À minha esposa e aos meus filhos, pela compreensão nas ausências, pelos fins de semana dedicados ao estudo e pelas noites em que precisei estar em aula. O apoio de vocês foi essencial para que eu chegasse até aqui

Aos meus pais, por sempre valorizarem a educação e incentivarem minha formação.

Aos colegas e professores do programa de mestrado, pelas trocas acadêmicas e crescimento conjunto.

Por fim, agradeço à cidade de Franca, que, a partir deste trabalho, passa a contar com um projeto de lei instituindo um dia de prevenção à sífilis.

Que esta pesquisa ultrapasse os muros da universidade e contribua de forma concreta para a saúde pública.

Sumário

RESUMO.....	7
ABSTRACT	8
INTRODUÇÃO	9
Fisiopatologia.....	12
Epidemiologia	13
Diagnóstico	14
Tratamento	15
Racional.....	16
Referencial Teórico.....	18
OBJETIVO GERAL	232
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	232
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	243
Tipo de estudo e participantes.....	243
Instrumentos	254
Aspectos Éticos	254
Análise de Dados.....	27
RESULTADOS	287
Perfil Sociodemográfico	287
Perfil Acadêmico	287
Escolhas e práticas sexuais.....	310
Sobre drogas e sífilis	343
Sobre o uso de álcool e outras drogas.....	343
Considerando os efeitos das drogas sobre a libido posso afirmar que:	365
Questionário sobre Sífilis.....	410
DISCUSSÃO	464
Conclusões	531
Limitações do estudo	541
Impactos da pesquisa.....	552
Referências	564
ANEXO I.....	707
ANEXO II.....	730

RESUMO

A sífilis é a única doença treponêmica sexualmente transmissível. No Brasil e no mundo, amparada pelo estigma que envolve essa aflição, a proliferação de infecções sexualmente transmissíveis tem sido historicamente associada a populações consideradas vulneráveis representadas por comunidades social, econômica, e culturalmente frágeis. No entanto, a rápida disseminação da sífilis ressalta a realidade de que essa doença transcende fronteiras geográficas, raciais e sociais. No Brasil, a incidência de casos de sífilis adquirida aumentou drasticamente, instalando-se como epidemia em 2016. Globalmente, os fatores subjacentes que contribuem para o ressurgimento da sífilis permanecem inadequadamente elucidados. Nos Estados Unidos e na Europa, esse aumento é atribuído a uma confluência de elementos, incluindo mudanças nos comportamentos sexuais, consumo de drogas estimulantes, encontros sexuais transacionais e relacionamentos caracterizados por múltiplos parceiros sexuais - conhecidos e anônimos - bem como a proliferação de redes sexuais facilitadas pela Internet. Dados análogos foram detectados no Brasil, indicando uma tendência de aumento correlacionada com uma variedade de fatores, incluindo características sociodemográficas. Diante dessas informações, o presente trabalho busca investigar os fatores subjacentes que contribuem para o aumento da incidência de infecções por sífilis na cidade de Franca (SP), um município caracterizado por padrões de saneamento comparáveis aos de outros centros urbanos bem desenvolvidos, mas simultaneamente exibindo uma acentuada concentração de riqueza em um estrato social estreito. O objetivo é discernir, dentro desse grupo demográfico que ostenta um nível superior de escolaridade, potenciais fatores causais que perpetuam e exacerbam a transmissão da enfermidade em um ambiente radicalmente diferente daquele originariamente ligados a doença.

Palavras-chave: saúde; sífilis; epidemiologia; educação, ambiente.

ABSTRACT

Syphilis is the sole sexually transmitted treponemal disease. Notwithstanding the stigma that surrounds this affliction, the proliferation of sexually transmitted infections has historically been linked to notions of promiscuity and marginalized communities. The swift dissemination of syphilis underscores the reality that this disease transcends geographical, racial, and social boundaries. In Brazil, the incidence of acquired syphilis cases has escalated dramatically, exhibiting a remarkable increase of 561%, with the most pronounced effects observed in the southern region of the nation. Given the precipitous escalation in the incidence of cases, compounded by the surge in congenital syphilis occurrences and the heightened detection rates of its maternal form, Brazil proclaimed a syphilis epidemic in 2016. Globally, the underlying factors contributing to the resurgence of syphilis remain inadequately elucidated. In the United States and Europe, this increase has been ascribed to a confluence of elements, including shifts in sexual behaviors, the consumption of stimulant drugs, transactional sexual encounters, and relationships characterized by multiple sexual partners—both known and anonymous—as well as the proliferation of sexual networks facilitated by the Internet. Analogous data were detected in Brazil, indicating an upward trend correlated with a variety of factors, including sociodemographic characteristics. In light of this information, the present study endeavors to investigate the underlying factors contributing to the rising incidence of syphilis infections in the city of Franca (SP)—a municipality characterized by sanitation standards comparable to those well-developed urban centers, yet simultaneously exhibiting a pronounced concentration of wealth within a narrow social stratum. The objective is to identify, within this demographic, which exhibits a heightened level of education, potential underlying factors that contribute to the continuity and intensification of the disease's transmission within the city.

Keywords: health; syphilis; epidemiology; education, environment.

INTRODUÇÃO

A sífilis continua a manifestar-se como uma questão global premente, com um aumento de aproximadamente 6,0 milhões de indivíduos infectados em 2015, projetando-se que esse número atinja 9,0 milhões de pessoas até 2025 (Rosset et al., 2025). Embora ainda se debata sobre sua origem geográfica, a sífilis é claramente descrita desde o século 15, assim como seu modo de transmissão, o sexual (Quétel, 1992). O primeiro surto registrado de uma doença venérea com a patologia da sífilis ocorreu em Nápoles, Itália, em 1494, um ano após o retorno de Cristóvão Colombo do Novo Mundo. Apesar de não ser transmitida exclusivamente por esta via; já que pode também ocorrer por transmissão vertical (sífilis congênita), e com uma alta taxa de mortalidade (Wozniak et al., 2023), e mais raramente, por transfusão de sangue ou acidente ocupacional (Stoltey; Cohen, 2015), admite-se que a sífilis é a única doença treponêmica sexualmente transmissível na medida em que todas estas outras condições estão relacionadas ao contato direto com um indivíduo infectado (De Melo et al., 2010). Seu agente, o *T. pallidum*, subespécie *pallidum*, é um parasita humano obrigatório, e não existem reservatórios desse organismo em animais ou no ambiente (Peeling, Hook, 2006).


Até meados do século XIX, admitia-se que sífilis e gonorréia eram manifestações da mesma doença. Em 1837 o venereologista francês Phillipe Ricord estabeleceu a especificidade das duas infecções (Dr. Ricord on Syphilis, 1872). Ricord também esteve entre os primeiros médicos a diferenciar a sífilis primária, secundária e tardia, os três estágios da infecção (M. Ricord on the Tertiary Forms of Syphilis, and Their Treatment, 1846). Sessenta anos depois, em abril de 1905, dois pesquisadores alemães, Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffmann, publicaram um artigo provisório (*Vorläufiger Bericht über das Vorkommen von Spirochaeten in sifilitischen Krankheitsprodukten und bei Papillomen*), informando a presença do agente, por eles então nomeado *Spirochaeta pallida*; posteriormente nomeado *Treponema pallidum*, na secreção de papilomas sífilíticos, trabalho este publicado na revista do Serviço Imperial de Saúde (*Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt*, XXII: 527-534; 1905) (Souza, 2005). Apesar do preconceito envolvendo os portadores, já que a

propagação de doenças sexualmente transmissíveis está historicamente ligada a promiscuidade e a populações consideradas vulneráveis, representadas por comunidades social, econômica, e culturalmente frágeis ([Armelagos; Zuckerman; Harper, 2012](#); [Pinto et al., 2014](#); [Coulibaly et al., 2017](#), [Nogueira et al., 2022](#)), a rápida expansão da sífilis mostrou que a doença conseguiu ultrapassar quaisquer limitações geográficas, raciais ou socioeconômicas, afetando inclusive personalidades notáveis ao longo da história. Dos escritores Dostoiévski e Oscar Wilde aos filósofos Nietzsche e Schopenhauer, além de boa parte da monarquia europeia ([Sefton, 2001](#); [Wright, 1971](#)), a sífilis contaminava a todos. Já no início do século 20, a infecção era, portanto, uma das principais causas de doenças neurológicas e cardiovasculares e um importante problema de saúde pública ([Singh; Romanowski, 1999](#)). A sífilis era vista como uma dimensão de um colapso maior nos valores que enfatizavam a santidade do lar, o papel doméstico das mulheres e o princípio da sexualidade estritamente marital ([Engelstein, 1986](#)).

Durante a primeira grande guerra, a preocupação com a sífilis havia atingido níveis sem precedentes. O recrutamento militar e os consequentes exames físicos revelaram altas taxas de infecção ([Miles; McBride, 1997](#)). Embora fosse amplamente reconhecido que os preservativos de látex, disponíveis desde o século XIX, preveniam a transmissão da sífilis, o exército recusou-se a fornecê-los às tropas ([Wagman, 2024](#)). Em 1928, Fleming descobriu a penicilina, que, em 1943, foi introduzida pela primeira vez como tratamento para sífilis, com melhorias substanciais no prognóstico ([Frith 2012](#)). Já na década de 1940, e com a implementação de esforços de prevenção, a doença tornou-se relativamente incomum ([Kilmarx; St Louis, 1995](#)). No entanto, epidemias periódicas têm sido frequentemente documentadas desde então, com picos registrados no início dos anos 90, seguido de uma redução gradual em sua prevalência nos anos de 1993 a 2000 ([Drusin, 1996](#)). Na virada do século XXI, surtos de sífilis começaram a ocorrer em diferentes sub-populações, especialmente em comunidades de homens que fazem sexo com homens ([Zheng et al., 2024](#)). As razões para esses surtos incluem mudanças nas normas sexuais e sociais, interações com a infecção por HIV cada vez mais prevalente ([Wa, 2004](#)), uso de substâncias

(Murali; Jayaraman, 2018), viagens e migração globais (Shiferaw, 2024), e subinvestimento em serviços de saúde pública (Santos et al., 2021).

As infecções sexualmente transmissíveis estão entre as doenças mais comuns em todo o mundo (Hughes; Sawleshwarkar, 2023; López de Munain, 2019; Mitjà et al., 2023). Dado o aumento abrupto no número de casos, acentuados pelo aumento na incidência de sífilis congênita e nas taxas de detecção de sífilis maternal (Caitano et al., 2022), o Brasil foi levado a declarar a existência de uma epidemia de sífilis no ano de 2016. De fato, dados mais recentes indicam que, ao longo da série histórica de 2014 a 2024, a taxa de detecção de sífilis no Brasil apresentou crescimento contínuo, saindo de 25,4 em 2014 chegando a 120,8 casos por 100.000 habitantes em 2024 (Figura 1).



Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 30/06/2025; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados extraídos em agosto de 2025; Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), dados extraídos em agosto de 2025.

Figura 1. Representação esquemática da ocorrência de casos de sífilis adquirida, durante a gestação, e congênita (<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-da-sifilis.pdf>).

Isso demonstra um aumento de 475,59%. No sudeste, esse aumento foi de 375,13%. O número de homens infectados em 2024 foi 1,6 vezes maior que as mulheres e taxa de crescimento também se concentra nesse grupo. A faixa etária mais acometida está entre 20-39 anos. Quanto a escolaridade, apenas 15,6% dos

casos eram em pessoas com ensino superior completo e quanto a raça, a maior parte era parda (42,9%). Apesar da magnitude da epidemia, os dados podem estar subestimados em virtude de subnotificação, o que compromete as ações de planejamento em saúde. Associa-se a isso também os efeitos da COVID-19 nos anos 2020-2021, que acentuou a redução da detecção de casos ([Ramos Jr, 2022](#)).

Fisiopatologia

Casos de sífilis venérea são adquiridos por do contato sexual direto, através das lesões de um indivíduo que possui sífilis primária ou secundária ativa, com a transmissão ocorrendo em aproximadamente metade desses contatos ([Talhari et al., 2025](#)). A sífilis pode ser transmitida verticalmente de uma mãe infectada para o feto pela passagem transplacentária dos treponemas. A transmissão por sangue, contato pessoal não sexual e inoculação direta acidental são modos de transmissão menos comuns. A maioria das pessoas com sífilis é assintomática, o que contribui para manter a cadeia de transmissão. Se não tratada, a doença pode evoluir para complicações sistêmicas graves, após vários anos da infecção inicial ([Kaur et al., 2023](#)). Após a inoculação, o *T. pallidum* subsp. *pallidum* se liga às células do hospedeiro e inicia a multiplicação. Uma lesão primária se desenvolve no local da inoculação 2–6 semanas após a infecção. Ela começa como uma pápula endurecida indolor, cuja superfície necrosa forma uma lesão ulcerada bem delimitada com base endurecida (cancro) que está cheia de treponemas ([French, 2007](#); [Lafond](#); [Lukehart, 2006](#)).

A transmissão da sífilis é maior nos estágios iniciais, progredindo do estágio primário (com período de incubação de duas a três semanas entre a inoculação de *T. pallidum* e o desenvolvimento de lesão, podendo variar de 9 até 90 dias) ao secundário, momento no qual a infecção se torna sistêmica e assintomática. As lesões secundárias geralmente desaparecem em algumas semanas, mas, apesar da ausência de sintomas clínicos, evidências sorológicas confirmam que os organismos ainda estão presentes. Do total de portadores, cerca de 35% desenvolverá manifestações tardias que incluem a neuro sífilis,

sífilis cardiovascular, e sífilis gomatosa (French, 2007a) (Figura 2). Durante a fase terciária, a transmissão por contato sexual não ocorre e a transmissão vertical ocorre raramente.

Estágios	Manifestações clínicas
Primária	Cancro duro (úlceras genitais) rico em treponemas, geralmente único e indolor, com borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo, localizado no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais do tegumento)
	Linfonodos regionais aumentados em tamanho e número
Secundária	Lesões cutâneo-mucosas (roséola, placas mucosas, sífilides papulosas, sífilides palmoplantares, condiloma plano, alopecia em clareira, madarose, rouquidão)
	Micropoliadenopatia
	Linfadenopatia generalizada
	Sinais constitucionais
	Quadros neurológicos, oculares, hepáticos
Latente recente (até um ano de duração)	Assintomática
Latente tardia (mais de um ano de duração)	Assintomática
Terciária	Cutâneas: lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo
	Ósseas: periostite, osteíte gomosa ou esclerosante, artrites, sinovites e nódulos just-articulares
	Cardiovasculares: estenose de coronárias, aortite e aneurisma da aorta, especialmente da porção torácica
	Neurológicas: meningite, gomas do cérebro ou da medula, atrofia do nervo óptico, lesão do sétimo par craniano, manifestações psiquiátricas, <i>tabes dorsalis</i> e quadros demenciais, como o da paralisia geral

Fonte: adaptado do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (2020).¹³

Figura 2. Manifestações clínicas e estágios da sífilis adquirida.

Epidemiologia

A sífilis é uma doença sistêmica que pode afetar qualquer órgão e que geralmente se manifesta inicialmente como uma úlcera genital, mas com manifestações multiformes (Ahmed et al., 2022). No Brasil, um estudo transversal, de âmbito nacional e multicêntrico (Kops et al., 2019), com indivíduos entre 16 e 25 anos de idade sexualmente ativos, mostrou uma porcentagem de quase 3% da amostra com a infecção. No que diz respeito a sífilis congênita, quase 20% das mães de crianças infectadas não tiveram consultas de pré-natal, sete vezes mais que a população geral. Além disso, verificou-se qualidade insuficiente do diagnóstico, manejo e tratamento da sífilis gestacional (Ramos Jr, 2022).

No estado de São Paulo, o incremento no número de casos chegou aos incríveis 387% para homens e 570% para mulheres, no período de 2011 a 2017 (Luppi et al., 2020). Quando se considera a sífilis adquirida pelo sexo feminino e sífilis em gestantes esse aumento chega a 417%. Os números para o bem desenvolvido e rico município paulista de Franca não são menos preocupantes, sendo observado um incremento de 512% no número de casos para o mesmo período (Luppi et al., 2020).

Diagnóstico

Para o diagnóstico de sífilis, é necessário combinar dados clínicos, resultados de testes diagnósticos, histórico de infecções anteriores e investigação de recente exposição sexual de risco. Os exames diretos e os testes imunológicos são métodos utilizados para auxiliar no diagnóstico da sífilis. Os exames diretos são aqueles em que se realiza a pesquisa ou detecção do *T. pallidum* em amostras biológicas, coletadas diretamente das lesões primárias e secundárias. Os testes imunológicos (treponêmicos e não treponêmicos) são os mais comuns na prática clínica para rastreamento de pessoas assintomáticas e diagnóstico de sintomáticas. Caracterizam-se pela pesquisa de anticorpos totais em amostras de sangue total, soro ou plasma (Avelleira; Bottino, 2006; Satyaputra et al., 2021) (Figura 3).

Com base na evolução tecnológica, novas políticas têm sido adotadas com o objetivo de ampliar o diagnóstico; entre as inovações propostas, está o diagnóstico por meio de Testes Rápidos, imunoensaios cromatográficos de execução simples, com resultados em até 30 minutos, realizados em ambiente não laboratorial com amostra de sangue total obtida por punção digital ou venosa e Fluido Oral (Clark; Grobelna, 2022). São testes de fácil execução, que não necessitam de infraestrutura laboratorial, podendo ser realizados por qualquer pessoa capacitada. Eles possuem grande utilidade na atenção primária em saúde, maternidades e locais de difícil acesso a laboratório e, por fornecerem resultados em até 30 minutos, eliminam o risco de perda do usuário pelo não retorno ao atendimento. O bom desempenho dos testes rápidos está diretamente

relacionado à capacitação dos profissionais e ao rigoroso cumprimento de todas as etapas preconizadas pelo fabricante.

Testes imunológicos	Tipos	Observações
Treponêmicos	Teste rápido (ex.: imunocromatográficos)	São os primeiros a se tornarem reagentes.
	Teste de imunofluorescência indireta - <i>fluorescent treponemal antibody-absorption</i> (FTA-Abs)	Permanecem reagentes na maioria dos casos de sífilis durante toda a vida, independentemente do tratamento.
	Ensaio imunoenzimático - <i>enzyme-linked immunosorbent assay</i> (ELISA) e suas variações, como os ensaios de quimioluminescência	São importantes para diagnóstico, mas não estão indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento.
	Testes de hemaglutinação - <i>Treponema Pallidum Haemagglutination Test</i> (TPHA) e de aglutinação de partículas - <i>T. pallidum particle agglutination assay</i> (TPPA); ensaios de micro-hemaglutinação - <i>micro-haemagglutination assay</i> (MHA-TP)	
Não treponêmicos	<i>Venereal disease research laboratory</i> (VDRL)	Tornam-se reagentes cerca de uma a três semanas após o aparecimento do cancro duro.
	<i>Rapid plasma reagin</i> (RPR)	O resultado final desses testes reagentes deve ser expresso em títulos, conforme a última diluição que apresentar reatividade (1:2, 1:4, 1:8 etc.).
	<i>Toluidine red unheated serum test</i> (TRUST)	
	<i>Unheated-serum reagin</i> (USR)	São importantes para diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento.

Fonte: adaptado do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020.¹³

Figura 3. Tipos de testes imunológicos utilizados na detecção de sífilis.

Tratamento

A eficácia da penicilina no tratamento da sífilis foi bem estabelecida ao longo de mais de 50 anos de experiência clínica (Kilmarx; St Louis, 1995; Frith 2012). Quase todas as recomendações de tratamento são baseadas em opiniões de especialistas, que foram reforçadas por séries de casos e ensaios clínicos. A reação de Jarisch-Herxheimer, uma reação febril aguda frequentemente acompanhada de cefaleia, mialgia e outros sintomas, geralmente ocorre nas primeiras 24 horas após qualquer terapia para sífilis, embora seja mais comum em pacientes com infecção por sífilis precoce (Dionne et al., 2025). Para pacientes alérgicos à penicilina, podem ser usados macrolídeos e cefalosporinas, com certas ressalvas (Mancini et al., 2021).

Apesar de contar com tratamento disponível desde o final da década de 1930 (Douglas, 2009) a sífilis ainda representa um problema de saúde pública mundial, de tendência epidêmica crescente, principalmente nos países em

desenvolvimento, fato que tende a se agravar devido ao aparecimento de mutações em genes do *T. Pallidum* como consequência da pressão de seleção devido ao uso excessivo de diversos antibióticos que não são a primeira linha de tratamento (Orbe-Orihuela et al., 2022). De forma geral, o esquema de tratamento segue o descrito na figura 4, abaixo.

Classificação clínica	Esquema terapêutico	Alternativa ^a (exceto para gestantes)	Seguimento
Sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução)	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de unidades internacionais (UI), intramuscular (IM), dose única (1,2 milhão em cada glúteo)	Doxiciclina 100mg, 12/12h, via oral (VO), por 15 dias	Teste não treponêmico trimestral até 12 meses de acompanhamento (em gestantes, o controle deve ser mensal)
Sífilis tardia: sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução) ou latente com duração ignorada e sífilis terciária	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM, 1 vez/semana (1,2 milhão em cada glúteo) por 3 semanas ^b Dose total: 7,2 milhões	Doxiciclina 100mg, 12/12h, VO, por 30 dias	Teste não treponêmico trimestral até 12 meses de acompanhamento (em gestantes, o controle deve ser mensal)
Neurossífilis	Benzilpenicilina potássica (cristalina), 3 a 4 milhões de UI, 4/4h, intravenosa (IV) ou por infusão contínua, totalizando 18-24 milhões por dia, por 14 dias	Ceftriaxona 2g, IV, 1x/dia, por 10-14 dias	Exame de líquido cefalorraquidiano de 6/6 meses até normalização

Fonte: adaptado do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020.¹³

Notas: a) A benzilpenicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento adequado das gestantes. Qualquer outro tratamento realizado durante a gestação, para fins de definição de caso e abordagem terapêutica de sífilis congênita, é considerado tratamento não adequado da mãe; por conseguinte, o recém-nascido será notificado como sífilis congênita e submetido à avaliação clínica e laboratorial; b) O intervalo entre doses não deve ultrapassar 14 dias. Caso isso ocorra, o esquema deve ser reiniciado.¹⁹

Figura 4. Classificação e esquema de tratamento para a sífilis.

Racional

Globalmente, as razões para o ressurgimento da sífilis ainda não são bem compreendidas. Nos Estados Unidos e na Europa este aumento tem sido atribuído a múltiplos fatores incluindo mudanças nas práticas sexuais, uso de drogas estimulantes (que reduzem o controle encefálico sobre o comportamento motivado), sexo transacional, relacionamento com múltiplos parceiros sexuais (conhecidos e anônimos), expansão das redes sexuais na internet e surgimento de aplicativos para encontrar parceiros, além do aumento no número de notificações devido a busca de cuidados por meio da adoção do rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) (Abara et al., 2016; Dalley, 2011; Dougan; Evans; Elford, 2007; Fenton; Imrie, 2005; Marcus et al., 2021; Schmidt et al., 2016). De forma similar, no Brasil, dados do Ministério da Saúde coletados no

período de 2012 a 2018 mostram um aumento na taxa de detecção de sífilis adquirida e em mulheres grávidas, assim como na taxa de incidência de sífilis congênita (Domingues et al., 2021), aumento este ligado a fatores como o acesso a testes rápidos, desinformação, queda no uso de preservativos, diminuição do uso de benzatina penicilina na atenção primária, escassez de medicamentos e limitação de acesso a diagnóstico e tratamento adequados na rede de atenção do SUS, o que torna inequívoca a persistência da sífilis como problema de saúde pública (Ramos Jr, 2022).

No Brasil, dentre outros fatores que contribuem para a alta incidência da sífilis podemos citar traços sociodemográficos, como o baixo nível socioeconômico e educacional, além da pouca capacidade de fornecimento cuidados pré-natais (Almeida et al., 2023; Neto; Gomes; Sobrinho, 2019). Mulheres pardas e jovens (20-29 anos) respondem por quase 49% de todas as ocorrências notificadas de sífilis em gestantes, grupo no qual foi constatada uma baixa adesão ao número recomendado de consultas durante o pré-natal (Fonseca et al., 2022; Saraceni et al., 2017). Entretanto, traços demográficos por si só podem não explicar o aumento quase geométrico nas notificações de sífilis no Brasil considerando que é na região sul, de população branca, situação socioeconômica confortável, e taxa de analfabetismo bem abaixo da taxa nacional, que se concentra o maior aumento nos números de sífilis adquirida (60%). A região nordeste, região pobre com maioria de pardos e negros, e com taxa de analfabetismo beirando dobro da nacional, apresenta o quarto menor índice, acima apenas da região sudeste (Santos et al., 2020). Como exemplo, as dimensões de vulnerabilidade na sífilis são reconhecidas também pela maior proporção da doença em mulheres, particularmente pardas/pretas. A prevalência de pelo menos uma IST em mulheres quilombolas foi estimada em 18,5% (sífilis, 4,3%), em contextos de baixa escolaridade e limitação de acesso a serviços de saúde (Ramos Jr, 2022). Vale ressaltar que, através do decreto nº 11494, de 17 de abril de 2023, o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente (CIEDDS), vem trabalhando para eliminar doenças determinadas socialmente e perpetuadas pela pobreza, pela fome e pelas inquietudes sociais (<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de->

[conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-da-sifilis.pdf](#)).

Embora frequentemente associada à pobreza e marginalização, os casos de sífilis em grandes e ricos centros urbanos vem crescendo também vertiginosamente. Entretanto, nesses bem desenvolvidos centros, a sífilis apresenta-se como um paradoxo na medida em que, embora essas regiões frequentemente disponham de uma infraestrutura de saúde sofisticada, também funcionam como epicentros de transmissão devido à elevada densidade demográfica, ao aumento da interação virtual devido à diversidade das redes sociais, o que ajuda a produzir comportamentos de risco. Este trabalho, portanto, tem como objetivo analisar essa discrepância a partir da busca por compreender as razões subjacentes ao incremento nas taxas de infecção por sífilis na cidade de Franca - São Paulo, uma cidade bem desenvolvida do sudeste brasileiro que compartilha níveis de saneamento análogos aos de outras cidades igualmente desenvolvidas (Índice de Desenvolvimento Humano = 0,78 para o ano de 2010) e que, apesar de apresentar uma acentuada concentração de renda em um restrito estrato social (Índice de Gini = 0,47), conta com uma população que ostenta um elevado nível de instrução acadêmica.

Referencial Teórico

Assumir uma posição científica sobre a saúde como um intrincado processo dinâmico exige a apresentação de um argumento consistente sobre sua complexidade; considerando que somos, ao mesmo tempo, seres biológicos, culturais, sociais e psíquicos. Portanto, uma discussão mais atual sobre a saúde como um processo complexo é fundamental para redefinir um objeto de estudo, seja ele qual for. A primeira, e mais necessária, das questões de entendimento é a ideia de que a saúde é um objeto que toma forma dentro da articulação dinâmica inerente de diversos tipos de fenômenos, exigindo, portanto, uma abordagem transdisciplinar (Breilh, 2008). No campo das doenças, suas causas muito frequentemente extrapolam o campo de aplicação clínica, sendo por isso necessária a utilização de certo tipo de conhecimento que vai além da identificação de sinais e sintomas para suas classificações. Essa forma de

compreender o fenômeno da doença nos permite reconhecer a face coletiva do continuum saúde-doença no indivíduo, e contribui para uma visão ampliada e não reducionista de seus determinantes (Filho, 1993).

Como um todo, a saúde é vista de forma diferente em duas práticas distintas, Saúde Pública e Saúde Coletiva. A Saúde Pública tem como foco, principalmente, o controle de doenças no nível social (Filho, 1989), utilizando conceitos de saúde e doença que são reduzidos a uma causa biológica, assim como individualizados. Como resultado a metodologia de intervenção se assume analítica e positivista, que tem os interesses do Estado como principal mote ideológico (Pereira de Souza et al., 2019). Por outro lado, há que se considerar que os limites entre o normal-patológico, entre saúde-doença, são estabelecidos pelas experiências de enfermidade em diferentes culturas, a partir dos modos como são narradas e dos rituais utilizados para reconstruir o mundo do sofrimento. Nesta perspectiva, a doença já não é mais uma coisa em si, e nem mesmo a representação dela, mas um objeto-real capaz de sintetizar múltiplos significados (Arreaza, 2012).

Young (1982), admitindo uma abordagem do adoecer face às relações sociais de produção, critica o modelo de doença citado anteriormente, argumentando que tal modelo considera o indivíduo como mero objeto de significados dos eventos, não relatando os modos pelos quais as relações sociais dão forma e “distribuem a doença”, admitindo que a distinção entre patologia e enfermidade apenas se mostra insuficiente para dar conta do processo social de adoecimento. No campo das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo a sífilis, a pesquisa em saúde aplicada visa compreender os fatores e padrões subjacentes às consequências negativas, bem como as formas mais eficazes de prevenir e mitigar sua disseminação. Esse tipo de pesquisa é tipicamente marcado por um foco nos aspectos biomédicos dessas doenças — incluindo os comportamentos de risco que levam a esses resultados — e na criação e avaliação de intervenções em saúde sexual destinadas a melhorar esses resultados (Edelman, 2018); certo tipo de individualismo preocupado principalmente com o foco na “causa dos casos” em vez de nas “causas da incidência”, o que permite abordar a distribuição desigual de doenças entre

populações (Rose, 1992). Observa-se então que as práticas médicas revelam um importante elemento político-ideológico que se estrutura em relações de poder que justificam uma distribuição socialmente desigual de doenças e tratamentos, bem como de suas consequências.

A não neutralidade do vínculo patologia-doença-enfermidade é entendida como um processo circular por meio do qual sinais biológicos e comportamentos desviantes são reconhecidos como sintomas, sinais e eventos socialmente significativos. Portanto, a relação saúde e doença constituída como um processo da coletividade, recupera o sentido do lugar das interfaces entre saúde e ambiente para uma abordagem ecossistêmica de promoção da saúde, buscando identificar em cada situação específica as relações entre condições de vida e saúde e seus determinantes socioculturais, históricos e ambientais inseridos em ecossistemas modificados pelo trabalho e atividades em geral dos indivíduos e grupos sociais (De Souza Minayo, 2002). Com base nesses pressupostos, a utilização da abordagem do processo dialético para o entendimento da determinação social da relação saúde-doença no contexto dos processos contraditórios do sistema de reprodução social, assim como no âmbito do devir dos nexos biopsicossociais dos sujeitos e seus coletivos cumpre um grande papel (Arreaza, 2012).

A consolidação da Saúde Coletiva como campo de estudo envolve a interpretação das transformações, especialmente aquelas em curso na sociedade latino-americana, para melhor compreender as doenças que afetam desproporcionalmente as comunidades de baixa renda.

Segundo Medeiros et al., (2012),

A Epidemiologia Social é essencial para o cumprimento do princípio da integralidade estabelecido no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, pois é capaz de conectar as dimensões singular, particular e estrutural relacionadas à realidade objetiva do indivíduo e da coletividade, contribuindo para a compreensão dos fenômenos e para o

planejamento de ações que possibilitem a transformação dos contextos de saúde. (p. 1520)

Por outro lado,

A Epidemiologia Crítica, por sua vez, além de se organizar em torno da determinação social e de uma visão dialética do continuum saúde-doença, tem como foco o ressurgimento do conceito de interculturalidade, que se refere à integração do indivíduo à homogeneidade interpretativa e social existente, numa perspectiva dialética e democrática, visando uma ação epidemiológica não mais centrada em fatores, sujeito unicultural e ação funcionalista. (p. 1522)

Considerando todos esses fundamentos, neste trabalho utilizaremos os princípios da epidemiologia crítica como estrutura conceitual de suporte epistemológico, na medida em que sua filosofia está fortemente organizada em volta da determinação social da saúde e da doença e, portanto, enraizada no Materialismo Histórico, o qual traz no seu cerne a noção de que a realidade objetiva é moldada tanto por sua dimensão particular quanto estrutural (Egry, 1996). No contexto da saúde coletiva, classes sociais constituem os sujeitos porque a distribuição desigual de classes e diferentes condições de vida têm efeitos variados sobre seus corpos. Dito de outra forma, a saúde dos trabalhadores depende de sua classe social. Portanto, é necessário entender todas essas influências por meio de variáveis operacionais capazes de identificar diversos grupos sociais em uma dada realidade, o que requer um método capaz de realizar tal abstração teórica. Como exemplo, no caso do capitalismo neoliberal, as classes podem ser capturadas pelas relações de produção capitalistas, enquanto em outras estruturas sociais, são capturadas por suas relações de produção características (Soares; Campos; Yonekura, 2013). Ao quantificar as condições materiais da reprodução social, o conhecimento da epidemiologia crítica torna-se relevante para os estudos de saúde coletiva, porque

auxilia na compreensão das manifestações desiguais do processo saúde-doença dos indivíduos. Por essa perspectiva, a epidemiologia, em suas abordagens social e crítica, é uma ciência essencial para fornecer e interpretar informações que possibilitem a análise de fenômenos no contexto político-econômico-social em um determinado tempo histórico.

OBJETIVO GERAL

Dadas as informações anteriores, o objetivo geral deste estudo visa o entendimento do nível de conhecimento da sífilis em uma amostra de estudantes de cursos de graduação de três áreas da saúde, Psicologia, Enfermagem, e Medicina, de uma instituição de ensino superior da cidade de Franca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Registrar o nível de conhecimento sobre sua forma de transmissão, sintomas, sequelas, tratamento.
2. Entender o nível de conhecimento dos participantes sobre os vários fatores que influenciam o aumento na probabilidade da infecção.
3. Analisar associação entre variáveis sociodemográficas, experiência acadêmica, e conhecimento sobre sífilis.
4. Desenvolver estratégias que levem a informação e prevenção da sífilis que permitam uma redução na taxa de infecções.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tipo de estudo e participantes

Este estudo se enquadra dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa exploratória realizada na região metropolitana da cidade de Franca, São Paulo, cidade localizada estrategicamente na região nordeste do estado. Além de se destacar como a “capital nacional do calçado”, Franca é a sede de uma região administrativa composta por 19 municípios, consolidando sua importância como polo de serviços, saúde e educação. Na área acadêmica de nível superior, se destaca o Centro Universitário municipal de Franca – UNIFACEF, uma autarquia municipal sem fins lucrativos, com 13 cursos de graduação (Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Letras, Matemática, Medicina, Psicologia e Sistemas de Informação). Conta também com um curso de pós graduação *stricto sensu* (mestrado em desenvolvimento regional), cursos *lato sensu* (MBA's e especializações), além de residência médica. Além disso, o UNI-FACEF tem uma parceria firmada com a Câmara dos Vereadores do município de Franca através do GEDE (Grupo de Estudos do Desenvolvimento Regional). No contexto desta colaboração, a academia e a comissão de vereadores da câmara se reúnem mensalmente com o propósito de discutir e elaborar estudos e ações em benefício da população francana.

Os participantes do estudo foram alunos regularmente matriculados em cursos da área da saúde. Foram inicialmente convidados para a pesquisa todos os 743 estudantes, matriculados nos cursos de medicina, enfermagem e psicologia. Deste total, 101 aceitaram participar do estudo. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a abril de 2025, através da aplicação de questionário auto aplicável (elaborado pelos pesquisadores) [\(ver tabelas 1e 2\)](#), com a seguinte pergunta norteadora: *Qual a percepção dos participantes acerca da sífilis, no que diz respeito aos fatores facilitadores, formas de transmissão, sintomas e tratamento?*

Instrumentos

Para este estudo, foram utilizados questionários do tipo sociodemográfico, do tipo *Likert* (Tabela 1), e um questionário objetivo (Tabela 2), cujas questões foram orientadas a atender os aspectos pontuados nos objetivos. Nos questionários foram abordadas questões relativas ao perfil sociodemográfico e acadêmico, assim como às escolhas e práticas sexuais dos participantes, o seu entendimento sobre a correlação entre o uso de drogas e a sífilis, além de indagações específicas de seu conhecimento sobre a infecção nos seus diversos aspectos. Os questionários foram distribuídos aos alunos dos cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem e Psicologia), após autorização dos respectivos departamentos, através de link da plataforma *Google Forms* (modalidade online), disponibilizados para as coordenações de cada curso.

Aspectos Éticos

O presente trabalho foi previamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF a fim de salvaguardar os preceitos éticos do estudo; em consonância à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado em 15.11.2024 (Parecer: 7.228.252) (ANEXO I). Após o aceite de participação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO II) o acesso aos questionários foi liberado. O sigilo e o anonimato da identidade dos participantes foram legalmente assegurados.

SOBRE DROGAS E SÍFILIS (%)

Considerando o uso de álcool e outras drogas	Concordo	Sem opinião	Discordo
1 Eu consumo álcool com frequência (pelo menos 1-3 vezes por semana)	25,81	3,23	70,96
2 Eu uso maconha com frequência (pelo menos 1 cigarro por semana)	7,61	2,17	90,22
3 Eu uso estimulantes sempre que bebo (MDMA, cocaína, outros)	2,17	3,26	94,57
4 Eu uso tabaco com frequência (pelo menos 1 cigarro por dia)	17,39	2,17	80,43
5 Eu sempre bebo quando fumo	5,43	1,09	93,48
6 Eu não uso drogas	67,33	2,97	29,70
Considerando os efeitos das drogas sobre a libido, posso afirmar que:	Concordo	Sem opinião	Discordo
7 Sempre que uso álcool, aumento meu desejo de buscar um parceiro sexual disponível	53,26	8,70	38,04
8 Quando uso estimulantes, sinto um desejo maior de buscar um parceiro sexual disponível	13,19	28,57	58,24
9 Quando uso maconha, tenho um desejo maior de buscar um parceiro sexual disponível	7,69	28,57	63,74
10 Eu não uso drogas	62,24	3,06	34,69

Tabela 1. A porcentagem das respostas dos participantes a dez itens foi dividida em dois grupos principais que avaliaram o entendimento dos participantes sobre o consumo de álcool e outras drogas, assim como sua compreensão do efeito das drogas psicoativas na libido. Os resultados estão apresentados como porcentagem do total de respostas.

Análise de Dados

Considerando que a medida é um limite quantitativo de uma determinada qualidade (Spirkin, 1975), neste estudo combinamos a análise de dados qualitativos com métodos empíricos quantitativos. Não obstante as limitações inerentes a todos os domínios da investigação científica, a síntese de dados qualitativos e metodologias quantitativas pode gerar um nível de rigor empírico que muitas vezes está ausente em investigações puramente teóricas (Tian, 2025). Foi utilizada como ferramenta de análise a proposta de interpretação qualitativa e quantitativa de dados de acordo com três fases, a saber: ordenação, classificação e análise final (Minayo; Deslandes; Gomes, 2007).

O tratamento dos dados, o que inclui análises e comparações mais específicas, foi realizado da seguinte forma. Escalas do tipo *Likert* foram analisadas como itens agregados sempre que possível. No geral, duas abordagens foram pensadas para análise de dados. Escalas com cinco ou mais itens representando questões semelhantes seriam combinadas em um único escore composto ou variável (escala agregada) e analisadas como dados intervalares com testes paramétricos, usando média e desvio padrão como medidas de tendência central sempre que a normalidade e a homoscedasticidade estivessem preservadas. Numa segunda abordagem, testes não paramétricos seriam usados para avaliar os dados. Portanto, as escalas seriam analisadas como um grupo. Dessa forma, independentemente do número de alternativas de resposta, as escalas seriam agrupadas, analisadas e apresentadas como três conjuntos de itens: os dois extremos, acima e abaixo da medida central seriam compactados em um, resultando então em 3 outras classes de resposta denominadas discordo, não tenho opinião, e concordo. Optamos, portanto, por empregar o último método mencionado. Nesse contexto, as comparações entre grupos independentes em uma tabela de contingência contendo pelo menos duas variáveis foram conduzidas por meio do teste do Chi-quadrado (χ^2). Sendo necessário analisar a fonte dos resultados significativos, o teste de resíduos ajustados de Pearson foi utilizado para determinar os valores de p . Em qualquer dos casos, para avaliação das diferenças e distribuição de frequências entre

variáveis, foi considerado um intervalo de confiança de 95%, para uma probabilidade de rejeição da H_0 igual ou menor que 5% ($\leq 0,05$).

RESULTADOS

Perfil Sociodemográfico

Considerando o perfil sociodemográfico, os participantes se apresentam principalmente com idade entre 18 e 29 anos (Figura 5, A). São solteiros em sua grande maioria (B), do sexo feminino (C), a maioria com renda familiar acima de 5 salários mínimos (D), com 50% dos participantes apresentado renda familiar acima de 10 salários ($\approx$ R\$ 18.000,00). Quase 80 por cento dos participantes se declararam brancos (E), com 50% deles se assumindo católicos (F).

Perfil Acadêmico

Pouco mais de 62% dos alunos participantes estão vinculados ao curso de medicina. Vinte e três por cento pertencem ao curso de Enfermagem, e aproximadamente 15% são alunos matriculados no curso de Psicologia (Figura 6, acima). Em sua grande maioria os participantes ($\sim$ 50%) cursam o primeiro ano de graduação (Figura 6, abaixo).




Figura 5. A figura mostra a representação esquemática das respostas dos participantes ao questionário sociodemográfico no que diz respeito a idade (A), estado civil (B), sexo (C), renda familiar (D), cor ou raça (E), e religião (F). As respostas estão apresentadas com porcentagem do total.




Figura 6. Frequência de respostas (%) dos participantes agrupadas de acordo com o curso (acima), e período atual (ano) do curso de graduação no qual estão matriculados (abaixo).

Escolhas e práticas sexuais

No campo pessoal, 73% dos participantes se declararam heterossexuais, 19% bissexuais, 6% homossexuais, e uma minoria, menor que 2%, outras orientações (Figura 7, A). No que diz respeito ao período da primeira relação sexual, aproximadamente 60% dos participantes informaram o período compreendido entre os 16 e 20 anos, com 21% informando que sua primeira relação sexual aconteceu antes dos 16 anos (B). Da mesma forma, quando considerada a vida sexual, 26% admitem ter uma vida sexual muito ativa (1 a 3 relações por semana), 39% uma vida sexual regular (1 a 3 relações no mês), e 15% admitem ter uma vida sexual pobre (1 a 3 relações no ano) (C); com 21% admitindo outras opções. No que diz respeito aos parceiros sexuais, 64% afirmam que esses são predominantemente regulares, e 14% admitem que seus parceiros são predominantemente irregulares. Vinte e dois por cento dos participantes admitiram outras possibilidades, que não as oferecidas (D). Finalmente, no que diz respeito à utilização de proteção durante as relações sexuais, 33% confessaram não a empregar, devido a se relacionarem apenas com um único parceiro. Trinta e seis por cento relataram utilizar proteção em todas as interações, enquanto 19% afirmaram fazê-lo apenas com novos parceiros. De maneira alarmante, 13% declararam não adotar qualquer forma de proteção durante suas relações sexuais (dados não informados).

Nesse contexto, para determinar se o tempo de experiência acadêmica se correlaciona com a consciência de utilização de proteção durante encontros sexuais, o grupo inicial foi subdividido em dois subgrupos distintos, designados como grupo "Iniciante", composto por estudantes em seu primeiro ano de graduação, e outro chamado de grupo "Treinado", composto por estudantes do quarto, quinto e sexto ano de graduação. Diferenças significativas foram identificadas entre os grupos ($\chi^2 = 31,30$, $p < 0,00001$). Uma análise subsequente utilizando o teste pós-hoc de Resíduos Ajustados de Pearson para elucidar diferenças entre grupos indicou que as respostas fornecidas pelo grupo "Iniciantes" foram as responsáveis por esse resultado ($\chi^2 = 3,18$, $p < 0,005$). No entanto, esse grupo também foi o que relatou a maior frequência de uso consistente de medidas protetivas durante encontros sexuais ($\chi^2 = 5,28$,

$p < 0,001$), em comparação com o grupo "Treinado". Apesar de apenas 21% dos participantes treinados admitirem o uso de proteção nas suas relações, esse resultado não é atribuível a uma escalada do comportamento de risco entre esses participantes, como evidenciado pela maior concordância com as afirmações "Uso somente com novos parceiros" ($\chi^2 = 5,40$, $p < 0,001$) e "Não uso porque tenho apenas um parceiro" ($\chi^2 = 5,40$, $p < 0,05$), em comparação com o grupo iniciante (Figura 7E).




Figura 7. A figura apresenta as respostas dos participantes a cinco perguntas sobre sua vida sexual, incluindo orientação sexual (A), o período em que tiveram sua primeira relação sexual (B), sua percepção sobre a intensidade de seus relacionamentos (C), os detalhes sobre seus parceiros sexuais (D), e se utilizam medidas de proteção durante seus encontros sexuais. Sobre a última afirmação, o teste Chi-quadrado (χ^2) indica que há evidências suficientes para concluir que a distribuição observada difere significativamente da distribuição esperada para grupos iniciantes e experientes, em um nível de significância inferior a 5%. Análises *post-hoc* foram realizadas com o teste de Resíduos Ajustados de Pearson.

Sobre drogas e sífilis

Sobre o uso de álcool e outras drogas

Com relação a frequência da ingestão de álcool etílico, 71% dos participantes discordam totalmente da afirmação “*uso álcool de forma frequente (1 a 3 vezes por semana)*”. No total, 26% dos indivíduos concordam com a afirmação (Figura 8, A). O uso de maconha foi relatado por pouco menos de 8% dos participantes com a absoluta maioria (90%) discordando totalmente da afirmação “*Faço uso de maconha de forma frequente (pelo menos 1 cigarro por semana)*” (B). O uso de estimulantes foi contestado por 95% dos indivíduos na situação “*Uso estimulantes sempre que bebo*” (C). Um padrão similar de respostas foi notado quando a droga em questão é o tabaco. Oitenta por cento das pessoas discordaram da afirmação “*Faço uso de tabaco de forma frequente - pelo menos 1 cigarro por dia*”, em oposição a 17% daqueles que concordaram com a assertiva (D). Da mesma forma, quase 94% dos participantes discordam da afirmação “*Quando fumo, bebo*”. Cinco por cento responderam concordar (E). Para a questão “*Não uso drogas*”, 67% relataram o não uso, em oposição a outros 30% que afirmaram o seu uso, na medida em que discordaram, total ou parcialmente da afirmação (F).




Figura 8. Frequência de respostas dos participantes considerando a ingestão de álcool etílico (A), o uso de maconha (B), tabaco (C), e estimulantes do sistema nervoso central (D). Em E, e F, estão apresentadas as respostas dos participantes relacionadas ao uso concomitante de álcool e tabaco, ou o não uso de drogas psicoativas, respectivamente.

Considerando os efeitos das drogas sobre a libido posso afirmar que:

As questões abaixo visam tentar entender o quanto os participantes estão conscientes sobre os efeitos das drogas no desejo sexual. À afirmação que relaciona a ingestão de álcool e o aumento do desejo sexual e consequente busca de um parceiro disponível, um pouco menos de 40% de pessoas manifestou discordância. Por outro lado, 53% dos participantes respondeu de forma positiva a esta asserção (Figura 9, A). Quando a assertiva se refere aos estimulantes do sistema nervoso central, mais da metade dos participantes demonstra discordância com a afirmação, em oposição a 13% que concordaram. O desconhecimento sobre os efeitos dos estimulantes sobre a libido atinge quase 29% dos indivíduos (B). Resultado bem similar foi obtido quando a droga em questão é a maconha (C). Sessenta e dois por cento dos indivíduos relataram não usar drogas. Em oposição a isto, 35% dos indivíduos discordaram desta afirmação (D).

Para investigar o padrão geral de consumo de drogas entre indivíduos iniciantes e treinados, suas respostas as afirmações sobre o álcool, maconha, e estimulantes foram consolidadas em um único tópico intitulado: “Eu uso drogas de forma frequente” (Figura 10, A). Os dados registrados indicam que as respostas de ambos os grupos foram notavelmente análogas, com mais de 80% dos participantes expressando discordância e quase 15% concordando com a afirmação mencionada. No entanto, ao focar exclusivamente nas respostas relacionadas ao consumo de álcool etílico, surge um padrão distinto de comportamento. Ao empregar o teste Chi-Quadrado para dados categóricos, determinamos uma associação significativa entre a experiência ao longo dos cursos de graduação e o consumo de álcool ($\chi^2 = 9,51$, $p < 0,05$). Indivíduos de primeiro ano apresentaram uma tendência menor a discordar da afirmação "Eu consumo álcool de forma frequente", como evidenciado pelos teste *post-hoc* de Pearson ($p < 0,006$) (B). Da mesma forma, eles demonstram uma inclinação aumentada a concordar com a afirmação "Eu não uso drogas" ($\chi^2 = 17,29$, $p < 0,00018$) quando comparados com seus equivalentes treinados ($p < 0,05$). Por outro lado, 46% dos participantes treinados discordam significativamente dessa afirmação ($p < 0,005$) (C).

Dado o impacto bem documentado das substâncias psicoativas na libido, já que a transmissão da sífilis é grandemente influenciada pela facilitação das interações sexuais engendrada pelo uso de drogas, as respostas ao álcool, estimulantes, e maconha, foram agrupados como um tópico em separado, nomeado: "Sempre que uso drogas, tenho aumentado meu desejo de buscar um parceiro sexual disponível." A análise da percepção dessa característica específica das drogas entre participantes iniciantes e treinados, mostrou uma dissonância significativa entre os dois grupos ($\chi^2 = 30,98$, $p < 0,0001$). O grupo Iniciantes apresentou um nível significativamente elevado de dissidência em relação a essa afirmação, em contraste com seus colegas treinados ($p < 0,0005$). Um grau considerável de ceticismo sobre essa questão foi expresso pelos indivíduos treinados ($p < 0,0005$) ([Figura 11](#)).

Considerando o efeito de drogas sobre a libido posso afirmar que:




Figura 9. Frequência de respostas dos participantes considerando a relação entre o uso de álcool etílico (A), estimulantes do sistema nervoso central (B), e maconha (C), no aumento da libido e consequente busca por um parceiro sexualmente disponível. Em D estão apresentadas as respostas dos participantes em relação à afirmativa não uso drogas. Os valores estão apresentados como porcentagem do total de respostas.




Figura 10. Afim de entender o padrão geral do uso de drogas pelos participantes, as respostas às afirmações A, B, e C, da figura 8, foram agrupadas em um tópico, e são apresentadas sob a afirmação “Eu uso drogas de forma frequente” (A). Em B, as respostas relacionadas ao uso álcool etílico são apresentadas isoladamente, para mostrar o peso do uso do álcool nos resultados apresentados em A. Em C estão agrupadas as respostas relacionadas a afirmação “Não uso drogas”. Para análise das diferenças entre grupos em uma tabela de contingência foi aplicado o teste Chi-quadrado (χ^2). Análises post-hoc foram realizadas com o teste de Resíduos Ajustados de Pearson. Os resultados indicam que há evidências suficientes para concluir que a distribuição observada difere significativamente da distribuição esperada para os grupos Iniciantes e Treinados em um nível de significância inferior a 5%.




Figura 11. A figura ilustra a frequência de respostas dos grupos Iniciantes e Treinados à proposição de que substâncias psicoativas possuem a capacidade de intensificar o desejo sexual e incitar a busca por um parceiro disponível. O teste Chi-quadrado (χ^2) indica que os padrões de resposta diferem significativamente entre os grupos, com uma probabilidade menor que 5% que este resultado se deva a um erro aleatório. Para esclarecer onde essas diferenças ocorrem, análises *a posteriori* foram realizadas com o teste dos Resíduos Ajustados de Pearson, para identificar quais células específicas na tabela de contingência mais contribuíram para o resultado geral para as diferenças encontradas.

Questionário sobre Sífilis

Os resultados referentes ao questionário sobre sífilis estão apresentados abaixo, na [tabela 2](#). Considerando o conhecimento da causa e modo de transmissão da sífilis, 87% consideraram verdadeira a afirmação que a sífilis é casada por uma bactéria, e que a principal forma de transmissão é a relação sexual desprotegida (93%). Noventa e um por cento identificaram como falsa a afirmação “*O sexo oral não transmite sífilis*”. Uma relação mais equilibrada foi encontrada na resposta a questão “*A sífilis pode ser transmitida por acidente ocupacional*”, com 62% afirmando com verdadeira a sentença, mostrando que existe certa dúvida nesta população sobre os riscos deste tipo de via de transmissão. Mais da metade dos indivíduos confirmaram a veracidade das afirmações “*No estágio inicial da doença, a transmissão tende a ser mais alta*” (73%) e “*Uma pessoa pode ter contraído sífilis semanas que os sintomas apareçam*” (100%). Foram por maioria declaradas falsas as afirmações “*Se uma gestante contrair sífilis, o bebê estará protegido no útero devido a placenta*” (83%), e “*Uma pessoa não pode contrair sífilis mais de uma vez*” (81%). Trinta e dois por cento das pessoas declararam falsa a afirmação “*Sífilis facilita a contaminação pelo HIV*”.

Considerando o conhecimento sobre os tipos de sífilis, sintomas e diagnóstico, à exceção das afirmações “*A titulação do VDRL é importante na conduta de um paciente com sífilis*”, que alcançou 98% de concordância (verdadeiro), e “*Existe sífilis primária, secundária, terciária e mista*”, com 78% de concordância (verdadeiro), todas as outras questões alcançaram discordância acima de 33, o que sugere dúvida dos participantes. De fato, 60% deles declararam ser verdadeira a falsa afirmação “*A forma clássica da doença se apresenta como úlcera genital dolorosa ao toque*”. Em contraste, 38% admitiram como falsa a afirmação verdadeira “*A úlcera genital pode desaparecer espontaneamente, mesmo sem tratamento*”. Sessenta e seis por cento dos participantes admitiram erroneamente que “*Um teste VDRL positivo é diagnóstico de sífilis*”.

Quatro questões orientaram a análise do conhecimento dos participantes sobre o tratamento da sífilis: “*O tratamento de escolha para sífilis envolve uso de*

penicilina benzatina”, “Independente do momento do diagnóstico, o tratamento da sífilis é o mesmo”, “Se não for tratado precocemente, o agente da sífilis entra em um estado de incubação, sem possibilidade de progressão para algo mais sério”, e “A sífilis não tem tratamento”. Do total de participantes que tomaram como falsa uma afirmação verdadeira, 11% desconhecem ser a penicilina o tratamento de escolha, 34% admitem ser verdadeira a afirmação que o tratamento é o mesmo, não importando o momento do diagnóstico, 23% asseveram que a sífilis não evolui para algo mais grave se não tratada, e 12% acham que a sífilis não tem tratamento. Quando o tema é prevenção, a quase totalidade dos indivíduos (96%) afirma acertadamente que a sífilis pode ser prevenida com o uso de preservativo. A grande maioria também acerta ao dizer que não existe vacina para a sífilis (86%), e acerta também ao tomar como verdadeira a afirmação de ser a sífilis uma doença de notificação compulsória (76%).

Embora não de forma majoritária, as respostas dos participantes foram congruentes com a compreensão estabelecida da sífilis. No entanto, certas discrepâncias surgiram, o que justificou um exame mais aprofundado. Como informado previamente, no intuito de estabelecer a influência da experiência acadêmica, nesse caso sobre o conhecimento da sífilis nos seus variados aspectos, os participantes foram também divididos em dois grupos, considerando seus respectivos períodos no seu curso de graduação, como definido anteriormente. A aplicação do teste do Chi-quadrado sobre os dados de ambos os grupos mostrou que as respostas destes se diferem estatisticamente no que diz respeito as afirmações “No estágio inicial da doença, a transmissão tende a ser mais alta” ($\chi^2 = 13,5798$; $p < 0,0005$); “A sífilis facilita a infecção por HIV” ($\chi^2 = 5,8824$; $p < 0,05$); “A forma clássica da doença se apresenta como úlcera genital dolorosa ao toque” ($\chi^2 = 28,6432$; $p = 0,0005$); “A úlcera genital pode desaparecer espontaneamente, mesmo sem tratamento” ($\chi^2 = 39,0455$; $p = 0,0005$); “Se não for tratado precocemente, o agente da sífilis entra em um estado de incubação, sem possibilidade de progressão para algo mais sério” ($\chi^2 = 8,0378$; $p = 0,005$), e “Existe uma vacina contra a sífilis” ($\chi^2 = 8,1395$; $p = 0,005$). Os resultados indicam que, ao longo da trajetória acadêmica, os participantes tendem a retificar as assertivas incorretas proferidas durante a fase inicial do curso.

Questionário sobre Sífilis

Causa e transmissão	Total (%)		Iniciantes (%)		Trained (%)		Chi-quadrado de Pearson	P
	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO		
1 A sífilis é causada por uma bactéria	87.50	12.50	87.00	13.00	88.00	12.00	$\chi^2 = 0.0457$	.83
2 Sexo oral não transmite sífilis	8.50	91.50	5.00	95.00	12.00	88.00	$\chi^2 = 3.1501$	.08
3 A principal forma de transmissão da sífilis é através de relações sexuais desprotegidas	93.50	6.50	95.00	5.00	92.00	8.00	$\chi^2 = 0.7404$	.39
4 A sífilis pode ser transmitida por meio de acidente ocupacional	62.50	37.50	64.00	36.00	61.00	39.00	$\chi^2 = 0.1920$	.66
5 No estágio inicial da doença, a transmissão tende a ser mais alta	73.50	26.50	62.00	38.00	85.00	15.00	$\chi^2 = 13.5798$	.0002
6 Uma pessoa pode ter contraído sífilis semanas antes que os sintomas apareçam	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	$\chi^2 = 0$	*
7 Se uma mulher grávida contrair sífilis, o bebê estará protegido no útero devido à placenta	16.50	83.50	21.00	79.00	12.00	88.00	$\chi^2 = 2.9396$	.09
8 Uma pessoa não pode contrair sífilis mais de uma vez	19.00	81.00	17.00	83.00	21.00	79.00	$\chi^2 = 0.5198$	.47
9 A sífilis facilita a infecção pelo HIV	68.00	32.00	60.00	40.00	76.00	24.00	$\chi^2 = 5.8824$	.0153
Tipos, Sintomas e Diagnósticos								
10 Existe sífilis primária, secundária, terciária e mista	78.50	24.50	73.00	27.00	78.00	22.00	$\chi^2 = 0.6758$	.41
11 A forma clássica da doença se apresenta como um úlcera genital dolorosa ao toque	60.50	39.50	79.00	21.00	42.00	58.00	$\chi^2 = 28.6432$	.00001
12 A úlcera genital pode desaparecer espontaneamente, mesmo sem tratamento	40.00	38.50	40.00	60.00	83.00	17.00	$\chi^2 = 39.0455$	.00001
13 Um teste VDRL positivo é um diagnóstico de sífilis	66.50	33.50	70.00	30.00	63.00	37.00	$\chi^2 = 1.0998$	.29
14 O título VDRL é importante na gestão de um paciente com sífilis	98.00	2.00	96.00	4.00	100.00	0.00	$\chi^2 = 1.8462$	.17
Tratamento								
15 O tratamento de escolha para a sífilis envolve o uso da penicilina benzatina	89.00	11.00	93.00	7.00	85.00	15.00	$\chi^2 = 3.2686$	.07
16 Independentemente do momento do diagnóstico, o o tratamento da sífilis é o mesmo	34.00	66.00	33.00	67.00	35.00	65.00	$\chi^2 = 0.0891$	.77
17 Se não for tratado precocemente, o agente da sífilis entra em um estado de incubação, sem possibilidade de progressão para algo mais sério	23.50	76.50	32.00	68.00	15.00	85.00	$\chi^2 = 8.0378$	.005
18 A sífilis não tem tratamento	12.00	88.00	16.00	84.00	8.00	92.00	$\chi^2 = 3.0303$	.08
Prevenção								
19 A sífilis é uma doença que pode ser prevenida com o uso de preservativo	96.50	3.50	93.00	7.00	100.00	0.00	$\chi^2 = 3.0303$	.08
20 Existe uma vacina contra a sífilis	14.00	86.00	21.00	79.00	7.00	93.00	$\chi^2 = 8.1395$	.004
21 A sífilis é uma doença de notificação obrigatória. Quer dizer, deve ser relatada às autoridades responsáveis	76.00	24.00	71.00	29.00	81.00	19.00	$\chi^2 = 2.7412$	.10

Tabela 2. A tabela mostra a distribuição das respostas dos participantes a 21 declarações do questionário de sífilis, agrupadas em quatro temas principais (Causa e transmissão; Tipos, sintomas e diagnósticos; Tratamento e Prevenção). Os participantes foram posteriormente divididos em dois grupos, considerando seu período de experiência de graduação (Iniciantes ou Treinados) para investigar se a distribuição das respostas diferia entre esses dois subgrupos. Para isto, foi utilizado o método de teste de hipótese do Chi-quadrado (χ^2). O teste de Resíduos Ajustados de Pearson foi utilizado para determinar diferenças entre grupos.




Figura 12. A figura apresenta os dados derivados das respostas a seis afirmações no questionário de sífilis que alcançaram significância estatística pelo teste Chi-Quadrado. Para investigar as origens dessas diferenças, foi utilizado o teste de escores post-hoc (Z) de resíduos ajustados após o teste de Chi-quadrado para identificar quais células específicas diferem significativamente dos valores esperados, considerando um nível de probabilidade de 5%.

DISCUSSÃO

No Brasil, a sífilis se apresenta como um grande problema de saúde pública. O aumento nos casos se deu em todas as formas de transmissão da doença, incluindo a sífilis congênita, a sífilis na gravidez e, principalmente, a sífilis adquirida ([Pinto et al., 2023](#)). E este não parece ser um problema nacional. De fato, a sífilis está distribuída em todo o mundo, sendo particularmente problemática nos países em desenvolvimento. Nestes locais ela se apresenta como uma das principais causas de úlceras genitais, com a maioria dos casos ocorrendo na África Subsaariana e no sudeste da Ásia ([Gerbase et al., 1998](#)). Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, somente na última década, foi detectado um aumento alarmante na transmissão de sífilis primária e secundária, com cerca de 176 000 casos notificados ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças – CDC ([Fatima et al., 2025](#)). Nos países europeus, em sequência a uma redução dos casos notificados (União Europeia/Espaço Económico Europeu), assim como em outros países considerados desenvolvidos, vários Estados-Membros da UE/EEE começaram a apresentar taxas mais elevadas entre os homens heteros, e entre uma grande proporção de homens que têm relações sexuais com homens (HSH), particularmente os HIV-positivos ([Spiteri et al., 2019](#)). As razões para esses surtos epidêmicos ocorrerem são várias, desde alterações nas normas sexuais e sociais ([Mendez-Lopez et al., 2022](#); [Pinho et al., 2024](#); [Westin et al., 2023](#); [Young; Fujimoto, 2021](#)), interações com infecção por HIV cada vez mais prevalente ([Lynn; Lightman, 2004](#)), abuso de substâncias ([Ernst; Martin, 1993](#); [Paradise; Friedman, 1993](#)), viagens e migração globais e subinvestimento em serviços de saúde pública ([Fenton et al., 2008](#)).

Originalmente, assim como em todas as infecções sexualmente transmissíveis, as trajetórias epidemiológicas da sífilis são diversas, sendo os determinantes sociais da epidemia de sífilis distintamente variados de acordo com os subgrupos demográficos, sociais e comportamentais específicos em que se manifestam. A grosso modo, podemos diferenciar os determinantes sociais da epidemiologia da sífilis de três formas: as populações gerais dos países em desenvolvimento, as populações minoritárias de baixo nível socioeconômico nos

países desenvolvidos e homens homossexuais (Fenton et al., 2008). Em qualquer dos casos, o impacto desproporcional da sífilis em populações minoritárias levou a investigações mais abrangentes sobre quais as condições sociais propícias à sua proliferação. No caso do presente trabalho, por outro lado, estamos falando de um aumento acentuado no número de casos de infecção por sífilis em uma cidade que em 2024 foi classificada pelo ranking IDGM como a segunda melhor cidade do Brasil para se viver (https://desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_geral.php), com população majoritariamente branca, alto IDH, elevado PIB, taxa de analfabetismo de 2% em crianças até 15 anos, com 14% dos habitantes com pelo menos um nível de graduação em ensino superior, e taxa de esgotamento sanitário de 98%, número comparável a cidades de países desenvolvidos. Portanto, torna-se necessário investigar as razões pelas quais uma cidade com elevado nível de desenvolvimento apresenta também um aumento acentuado no número de infecções por sífilis que, como dito anteriormente, é ainda considerada uma doença relacionada a pobreza, ao desemprego, e a minorias marginalizadas (Orbe-Orihuela, 2022, Pinho, 2024).

De acordo com as observações mencionadas, nossos achados indicam que a maioria dos participantes do estudo é predominantemente branca (mulheres em maioria), com idade entre 18 e 29 anos, solteiro/, católico/a, e oriundo/a de famílias de renda média e alta. No que diz respeito ao quesito raça/cor da pele, estes dados se diferenciam grandemente das variáveis sociodemográficas presentes na V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos(as) das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, (ANDIFES, 2018); 78% em nosso estudo contra 43% na pesquisa. Quase cinquenta por cento da amostra é composta por estudantes do primeiro ano de graduação, com sessenta e dois por cento matriculados em programas de medicina, vinte e três por cento em enfermagem e quinze por cento em psicologia. É dentro dessa amostra que nos empenhamos em examinar a extensão de seu conhecimento sobre a sífilis, abrangendo seus modos de transmissão, manifestações clínicas, intervenções terapêuticas e fatores contribuintes.

Ao examinar a resposta dos participantes sobre questões íntimas, incluindo orientação sexual, diversos aspectos merecem uma análise mais criteriosa. Notavelmente, a prevalência do início precoce da atividade sexual; predominantemente entre os 18 e 29 anos, assim como a estatística alarmante de que 15% dos entrevistados relataram a ausência de medidas de proteção durante suas relações sexuais, suscita preocupações significativas. Isso se torna inquietante especialmente considerando que esse grupo representa a maior parte da amostra utilizada em nosso estudo, com 90% dos estudantes com idade inferior a 29 anos, e metade destes pertencendo ao subgrupo que designamos como estudantes "Iniciantes". Ainda, é durante a adolescência que normalmente ocorre a primeira relação sexual ([Resnick et al., 1997](#)), o que acentua o risco da transmissão de ISTs, e também de gravidez não desejada ([Andersson-Ellstrom et al., 1996](#); [Coker et al., 1994](#)). Todos esses eventos aumentam a possibilidade de uma relação sexual desprotegida entre indivíduos que iniciam precocemente sua atividade sexual ([Coker et al., 1994](#); [O'Donnell et al., 2001](#)).

Assim como em estudos similares ([Carvalho; Araújo, 2020](#)), e considerando, como um todo, a amostra utilizada, nossos resultados apontam para um predomínio de um bom grau de conhecimento sobre a sífilis e questões relacionadas. Cumpre notar que vários estudos tem demonstrado ser a sífilis uma das ISTs mais frequentes no ambiente acadêmico ([Folasayo et al., 2017](#); [Fonte et al., 2018a](#); [Fonte et al., 2018b](#)). Acresce-se a isto que a entrada no mundo acadêmico pode ser considerada um fator transformador na expressão da sexualidade entre os adolescentes e jovens recém ingressos. Esta experiência propicia a exposição a novas vivências, inclusive aquelas nas quais estão associadas as bebidas alcoólicas e outras drogas psicoativas, experiências anteriormente proibidas ou restringidas na relação familiar ([Fonte et al., 2018b](#)), um grupo o qual não tem ainda um entendimento acadêmico substancial das causas e fatores contribuintes para as doenças sexuais, incluindo o impacto do efeito das drogas de abuso sobre o comportamento.

As drogas de abuso apresentam a capacidade de induzir alterações fisiológicas e psicológicas nos usuários ([Ciucă Anghel et al., 2023](#); [Linegh, 2024](#); [Newcomb; Locke, 2005](#)). Consequentemente, elas aumentam o risco de práticas

sexuais desprotegidas devido à sua propensão a inibir o controle do comportamento motivado, efeito amplamente documentado (Gladwin et al., 2011; Jentsch et al., 1998; McNally et al., 2023; Meyer; King; Ferrario, 2016). Portanto, a inibição *top-down* (Dalley et al., 2011) do controle motivacional pode potencialmente aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e sífilis, por facilitar o aparecimento de comportamentos de risco para doenças sexuais. Nesse contexto, as respostas dos participantes ao questionário "*Sobre Drogas e Sífilis*" tiveram como objetivo examinar suas percepções sobre os efeitos das drogas em relação à sua influência sobre o desejo e comportamento sexual. Os resultados mostram que, à medida que o nível de experiência acadêmica se eleva, os participantes também apresentam uma dissonância visível em relação ao seu conhecimento dos efeitos das drogas psicoativas no impulso sexual e no controle inibitório do comportamento, sendo os estudantes iniciantes os mais incrédulos, o que revela a falta de conhecimento desse grupo sobre uma das principais propriedades da maioria das drogas de abuso. Isso contrasta com as respostas dos participantes treinados, que mostram um baixo nível de discordância, um nível semelhante ao do grupo Iniciante, mas um nível elevado de desconhecimento sobre esse assunto.

No que diz respeito ao questionário sobre sífilis, as respostas refletem predominantemente os achados dos dados mencionados, especialmente quanto à precisão das respostas fornecidas tanto por participantes iniciantes quanto treinados. Como um todo, a grande maioria deles concorda corretamente com as afirmações relacionadas à etiologia, transmissão, classificações, sintomas, diagnósticos, tratamentos e medidas preventivas associadas à sífilis. No entanto, uma pequena parte continua endossando afirmações erradas ou refutando alegações verdadeiras, independentemente de os indivíduos serem iniciantes ou treinados, indicando que uma proporção dos estudantes de graduação em saúde ainda não tem conhecimento básico sobre sífilis. Como exemplo, 37% desconhecem que a sífilis pode ser transmitida por acidentes ocupacionais, ou que pode facilitar a transmissão do HIV (32%). Mais de 33% fazem afirmações erradas sobre os tipos de sintomas e critérios diagnósticos associados à sífilis, enquanto entre 12 e 34% não têm conhecimento sobre questões relacionadas ao

tratamento. Além disso, 24% não reconhecem que a sífilis é uma doença de notificação obrigatória, e 14% acreditam erroneamente que existe uma vacina para sífilis.

Assim como observado na América do Norte e na Europa, as razões que contribuem para o ressurgimento da sífilis no Brasil permanecem pouco compreendidas. Presume-se que uma multiplicidade de fatores comportamentais que sustentam a infecção, notadamente a prevalência de encontros sexuais não protegidos, desempenha um papel significativo (Hutto, 2001; Stoltey; Cohen, 2015; Westin et al., 2023). Além disso, sorodiscriminação (Khosropour et al., 2016), o uso de drogas psicoativas (Murali; Jayaraman, 2018), sexo transacional (Tuddenham; Hamill; Ghanem, 2022), e relações com múltiplos parceiros sexuais (Joffe et al., 1992), incluindo homens que fazem sexo com homens (Mayer, 2018), também são importantes. Alguns desses fatores foram abordados em nosso estudo, incluindo sexo desprotegido, uso de drogas e o comportamento inseguro de compartilhar múltiplos parceiros sexuais. Como mencionado anteriormente, nossos achados indicam uma lacuna substancial entre indivíduos iniciantes e treinados em seu conhecimento sobre os efeitos das drogas de abuso no comportamento e na infecção por sífilis, o que está positivamente correlacionado com a experiência acadêmica. No entanto, parece que o uso de drogas não é influenciado pelo conhecimento acadêmico, já que a proporção de participantes treinados que refutam a afirmação "Eu não uso drogas" é mais do que o dobro da de seus colegas iniciantes, com uma contribuição substancial do álcool para esse resultado. Além disso, um segmento dos participantes permanece desinformado sobre a infecção por sífilis, apesar de ter alcançado níveis mais avançados de educação. Portanto, o conhecimento fomentado pela educação acadêmica parece ser minado por outros fatores.

Nossos resultados indicam que, à medida que o nível de experiência acadêmica aumenta, também aumentam as dúvidas sobre o conhecimento que os participantes achavam possuir, tornando-os mais conscientes de como o uso de drogas pode dificultar a busca por comportamentos sexuais seguros. Essa consciência aumentada pode levar a uma avaliação mais crítica de suas escolhas e comportamentos, levando as pessoas a buscar estilos de vida mais saudáveis.

Consequentemente, fomentar discussões abertas sobre o uso de substâncias, assim como suas implicações, pode desempenhar um papel vital na promoção de práticas mais seguras entre os pares. Ao explorar o domínio da pesquisa sobre doenças sexuais, há um interesse significativo em descobrir os fatores subjacentes e padrões associados a desfechos adversos, bem como em identificar os métodos mais eficazes para sua prevenção e manejo. Isso se alinha a um enfoque biomédico em infecções sexualmente transmissíveis, o qual apresenta uma robusta justificativa para concentrar-se no comportamento sexual como uma patologia, além de aplicar interesses e construções de saúde pública de maneiras que não necessariamente se coadunam com as perspectivas das populações leigas (Edelman, 2018). Por isso, em nível social, para evitar um individualismo biomédico que foca na “causa dos casos”, em vez das “causas da incidência” (Rose, 1992), há uma necessidade contínua de educar indivíduos, especialmente jovens e adolescentes, sobre os riscos inerentes à relação sexual desprotegida e suas consequências, para informar sobre a importância do uso de métodos de barreira como preservativos (Aral, 2001), e ao mesmo tempo se afastar do foco na identificação de fatores de risco em nível individual (Wemrell et al., 2016).

Considerando as premissas da epidemiologia crítica, existe uma profunda relação dialética entre indivíduos e populações, de tal forma que cada uma das partes molda e, em igual medida, é moldada pela outra (Edelman, 2018). Dado que a estrutura social está na essência dos fenômenos de saúde e doença (Amzat; Razum, 2014), mais do que meramente denunciar e discutir o acentuado aumento de casos de sífilis em ambientes urbanos desenvolvidos, em contraste com a interpretação clássica do tema que associa a sífilis a contextos de pobreza e marginalização, reside a busca pelo entendimento das razões subjacentes ao porquê dessa ocorrência.

Entre várias suposições sobre a epidemia de sífilis, postula-se que as transformações comportamentais associadas à epidemia podem, em parte, derivar de um consenso predominante sobre a eficácia do tratamento como medida preventiva. Nesse contexto, os indivíduos começam a abraçar a ideia de que indetectável equivale a intransmissível. Além disso, a PrEP (Profilaxia Pré-

Exposição) modifica a necessidade de preservativos em relações sexuais sorodiscordantes com HIV ([Mendez-Lopez et al., 2022](#)). Assim, a questão não reside no comportamento sexual em si; portanto, não estamos falando de um problema biomédico, mas sim da forma como os indivíduos se envolvem em esforços para maximizar o prazer mascarando os riscos. Ao considerar a saúde sexual, apesar da definição da Organização Mundial da Saúde ([OMS, 2010](#)) ter permanecido predominantemente biomédica, ela é articulada de forma positiva e possui um foco mais amplo. Consequentemente, uma caracterização teórica abrangente e valiosa dos conceitos de saúde e doença também deve se envolver com as dimensões sociais em sua ampla dimensão ([Cohen; Wilson; Aiello, 2007](#)).

As práticas sexuais passaram por transformações significativas e houve uma escalada pronunciada na prevalência de comportamentos homossexuais e bissexuais, acompanhada por um aumento na frequência tanto de sexo oral quanto anal ([Aral; Ward, 2014](#)). Além disso, em alinhamento com nossos achados, dados de outros estudos reforçam o fenômeno da iniciação sexual ocorrendo em idades progressivamente mais jovens. Esse é um ponto importante a se considerar, já que, de forma importante, a acessibilidade ampla e imediata dos dispositivos digitais fez com que os jovens se conectassem cada vez mais às plataformas de mídia social ([Hollis; Livingstone; Sonuga-Barke, 2020](#)). Essas plataformas, além de facilitar a exploração de diversos espaços virtuais — alguns dos quais são impregnados de conteúdo sexual — também contribuem significativamente para a formação de suas identidades ([Houtrow et al., 2021](#)). Portanto, as atitudes e crenças dos jovens sobre sexo e sexualidade estão sendo formadas principalmente por meio das redes sociais, em vez da educação acadêmica formal, daquela fornecida por profissionais de saúde, ou a recebida no contexto familiar ([Houtrow et al., 2021](#)). Esse nível de ignorância sobre a verdade, ou falta de conhecimento, pode ter consequências graves. Em escala individual, a ausência de informações confiáveis sobre a manutenção da segurança pessoal, incluindo a segurança da saúde, pode levar a danos desnecessários ou à morte. Dito de outra forma, o conhecimento obtido pela experiência acerca da sífilis pelos estudantes universitários é frequentemente mitigado pelo contexto onde estes se inserem, a despeito da maior conscientização obtida ao longo dos níveis mais

elevados de educação. Apesar desta experiência estar correlacionada a um maior nível de aprendizagem, uma parcela destes estudantes continua a manter concepções errôneas sobre a sífilis apesar do conhecimento recebido, o que resulta em práticas sexuais não seguras, mesmo conscientes dos riscos envolvidos.

Conclusões

Portanto, como elucidado em nosso estudo, a aplicação do conhecimento acadêmico gera uma mitigação das influências contrafactuais ambientais. No entanto, considerando que é necessário um tempo substancial para alterar o profundo "efeito da verdade ilusória" (Udry; Barber, 2024) sobre comportamento e mente, uma geração de jovens persistentemente submetida a uma enxurrada de desinformação está em considerável risco. Isso é crucial de reconhecer, pois, em nível coletivo, a desinformação tem o poder de mudar atitudes e políticas sobre questões ecológicas, sociais e políticas. No máximo grau, pode colocar em risco populações inteiras em níveis nacional, regional e até global (Hopf et al., 2019). Apesar de ser um problema multifacetado e um dilema de saúde pública, essa pode ser uma das razões para a epidemia contemporânea de sífilis que, embora inicialmente afete apenas populações vulneráveis, comunidades de baixa renda e pessoas com acesso limitado à saúde, agora permeia todas as camadas sociais. É evidente que a vivência em sistema político-econômico neoliberal, caracterizado por um viés tecno-capitalista que sustenta toda uma máquina de consumo, incluindo o mercado farmacológico e pornográfico, gera a necessidade de uma conscientização crescente dos jovens sobre o perigo das ISTs, considerando a forte influência que esse modelo exerce sobre a construção de sua sexualidade e seu comportamento sexual. Infelizmente, uma quantidade considerável de estudos negligencia a influência desses fatores e perpetua a utilização de terminologias ambíguas como "comportamento de risco", que são mal definidas e frequentemente carregadas de estigmas (SCHMIDT; MARCUS, 2023) sem atentar para os determinantes sociais, políticos e estruturais que geram tais problemas.

Limitações do estudo

Apesar das inúmeras vantagens associadas às pesquisas online (Evans; Mathur, 2005), nosso estudo não está isento de limitações. A principal desvantagem está na estratégia de recrutamento, que prejudica os potenciais benefícios da interação pessoal durante a administração das respostas ao questionário. Esses elementos podem influenciar profundamente a qualidade dos dados devido ao seu impacto em fatores como precisão, completude, consistência, confiabilidade e pontualidade. Esses fatores podem ser avaliados por meio de parâmetros como taxas de resposta a questionários e itens, a precisão das respostas e a profundidade das informações (Bowling, 2005). Além disso, provavelmente existem outros determinantes da aquisição de sífilis que não estão incluídos em nossos modelos, como a influência de "homens que fazem sexo com homens" e vários fatores ambientais que não foram abordados na discussão. Esses possíveis vieses, que surgem em relatos de autoria onde os entrevistados omitem ou transmitem incorretamente suas opiniões sobre assuntos específicos e onde estigma, desejo e aceitação social e viés de lembrança podem exercer influência, subestimar ou exagerar as respostas dos participantes. O formato anônimo online da pesquisa pode ter mitigado alguns desses vieses.

No esforço de proteger sua própria forma de pensar, os indivíduos tendem a atribuir responsabilidade pelos eventos de uma forma que melhor reflita sua compreensão (Zuckerman, 1979). Essa é uma outra razão pela qual o estudo de temas mais delicados, incluindo discriminação, preconceito, estigmatização, sexualidade, e drogas pode se tornar problemático na medida em que, mesmo protegidos pela anonimidade, os indivíduos tendem a responder perguntas socialmente relevantes de acordo com aquilo que é socialmente aceitável. Esse, portanto, é um outro viés do presente estudo, na medida em que as respostas fornecidas, na maioria dos casos, dependem fortemente do que os entrevistados consideram moralmente oportuno e podem não refletir a essência do problema segundo sua perspectiva pessoal.

Impactos da pesquisa

Uma pesquisa sobre sífilis em Franca/SP, impactada pelo aumento acentuado no número de casos, pode gerar benefícios amplos e duradouros, fortalecendo as ações de vigilância em saúde, ampliando o acesso ao cuidado e, sobretudo, promovendo conhecimento, informação, saúde e dignidade à população local. Abaixo destacamos o que entendemos ser os impactos positivos do estudo.

1. Entendimento epidemiológico local (entender a doença, agente etiológico, quadro clínico, formas de transmissão, tratamentos disponíveis e os principais grupos vulneráveis)
2. Fortalecimento da atenção primária à saúde (treinamento da equipe de saúde das unidades básicas tanto na abordagem dos pacientes quanto na realização e interpretação de testes rápidos)
3. Formulação de campanhas de prevenção mais eficazes (com apoio da Prefeitura municipal, pensando em acessibilidade para que todos os dados cheguem à população geral)
4. Gestão e formulação de políticas públicas (também com apoio da Prefeitura Municipal de Franca. Nesse ponto já tivemos grande avanço. Em uma das reuniões do GEDE, foi apresentado um projeto de Lei Ordinária nº 152 pelos vereadores Daniel Bassi, Fransérgio Garcia e Leandro Patriota para a criação do Dia Municipal de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita e a Semana Municipal de Conscientização, instituindo a dia 19 de outubro como data comemorativa no âmbito do Município de Franca. O projeto de Lei foi aprovado pelos vereadores por unanimidade na 45ª Sessão Ordinária de 2025, datada de 11/11/2025)
5. Impacto acadêmico (através das conclusões do estudo, podemos melhorar a formação de profissionais que atuarão de fato com a sífilis, talvez com alterações e/ou fortalecimento do plano pedagógico voltado a infecções sexualmente transmissíveis)
6. Redução do estigma associado à doença (incentivar a busca pelos serviços de saúde e garantir o atendimento humano e digno, sem julgamentos)

Referências

ABARA, Winston E. *et al.* Syphilis Trends among Men Who Have Sex with Men in the United States and Western Europe: A Systematic Review of Trend Studies Published between 2004 and 2015. **PLoS ONE**, v. 11, n. 7, p. e0159309, 22 jul. 2016.

AHMED, Jaweed *et al.* Genital ulcer disease: A review. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 11, n. 8, p. 4255, ago. 2022.

ALMEIDA, Beatriz Caroline Pazzini de *et al.* Sífilis gestacional: epidemiologia, patogênese e manejo. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 23, n. 8, p. e13861, 17 ago. 2023.

AMZAT, Jimoh.; RAZUM, Oliver. Sociology and Health. **Medical Sociology in Africa**, p. 1–19, 28 fev. 2014.

ANDERSSON-ELLSTROM A.; FORSSMAN L.; MILSOM I. Age of sexual debut related to life-style and reproductive health factors in a group of Swedish teenage girls. **Acta Obstet Gynecol Scand** 1996; 75:484–9.

ARAL, Sevgi O.; WARD, Helen. Behavioral Convergence: Implications for Mathematical Models of Sexually Transmitted Infection Transmission. **The Journal of Infectious Diseases**, v. 210, n. suppl_2, p. S600–S604, 1 dez. 2014.

ARAL, Sevgi Okten. Sexually transmitted diseases: magnitude, determinants and consequences. **International Journal of STD & AIDS**, v. 12, n. 4, p. 211–215, abr. 2001.

ARMELAGOS, George J.; ZUCKERMAN, Molly K.; HARPER, Kristin N. The science behind pre-Columbian evidence of syphilis in Europe: research by documentary. **Evolutionary Anthropology**, v. 21, n. 2, p. 50–57, mar. 2012.

ARREAZA, Antonio Luis Vicente. Epidemiologia crítica: por uma práxis teórica do saber agir. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, p. 1001–1013, abr. 2012.

ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis. **V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES**. Brasília, DF: FONAPRACE; ANDIFES; 2018. <http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/V-Pesquisa-do-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-dos-Estudantes-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-das-Universidades-Federais-1.pdf>

AVELLEIRA, João Carlos Regazzi; BOTTINO, Giuliana. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 81, p. 111–126, mar. 2006.

BOWLING, Ann. Mode of questionnaire administration can have serious effects on data quality. **Journal of Public Health**, v. 27, n. 3, p. 281–291, set. 2005.

BREILH, Jaime. **Epidemiologia crítica: Ciência emancipadora e interculturalidade**. 1ª edição ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

CAITANO, Alexandre R. *et al.* Massive health education through technological mediation: Analyses and impacts on the syphilis epidemic in Brazil. **Frontiers in Public Health**, v. 10, p. 944213, 27 set. 2022.

CARVALHO R. X. D. C.; ARAÚJO T. M. E. Knowledge, attitudes and practices of university adolescents about syphilis: a cross-sectional study in the Northeast. **Rev Saude Publica**. 2020 Dec 4; 54:120. doi: 10.11606/s1518-8787.2020054002381.

CIUCĂ ANGHEL, Daniela-Mădălina et al. Understanding the Mechanisms of Action and Effects of Drugs of Abuse. **Molecules**, v. 28, n. 13, p. 4969, 24 jun. 2023.

CLARK, Michelle; GROBELNA, Aleksandra. Rapid Syphilis Testing. **Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health**, 2022.

COHEN, Justin M.; WILSON, Mark L.; AIELLO, Allison E. Analysis of social epidemiology research on infectious diseases: historical patterns and future

opportunities. **Journal of Epidemiology and Community Health**, v. 61, n. 12, p. 1021–1027, dez. 2007.

COKER A. L.; et al. Correlates and consequences of early initiation of sexual intercourse. **J Sch Health** 1994; 64:372–7.

COULIBALY I. G. S.; MORAIS J. C.; MARSIGLIA R. M. G.; MONTANARI P. M. Sexually transmitted diseases and the vulnerability of the population in the Alto Solimões region, in Amazonas, Brazil. **Saúde e Sociedade**. 2017;26(1):51-60. <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-12902017162948>.

DALLEY J. W.; EVERITT B. J.; ROBBINS T. W. Impulsivity, compulsivity, and top-down cognitive control. **Neuron**. 2011 Feb 24;69(4):680-94. doi: 10.1016/j.neuron.2011.01.020.

DE MELO, Fernando Lucas *et al.* Syphilis at the crossroad of phylogenetics and paleopathology. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 4, n. 1, p. e575, 5 jan. 2010.

DE SOUZA MINAYO, Maria Cecília. Enfoque ecossistêmico de saúde e qualidade de vida. **Saúde e ambiente sustentável**, 2002.

DIONNE JA, Zhu C, MEJIA-GALVIS J, WORKOWSKI K, BATTEIGER TA, DOMBROWSKI JC, MAYER KH, MCNEIL CJ, SEÑA AC, TAYLOR S, WIESENFELD HC, HAMILL MM, PERLOWSKI C, HOOK EW. Jarisch-Herxheimer reaction after benzathine penicillin G treatment in adults with early syphilis: secondary analysis of a randomized clinical trial. **JAMA Netw Open**. 2025 Feb 3;8(2):e2459490. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.59490.

DOMINGUES, Carmen Silvia Bruniera *et al.* Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections, 2020: congenital syphilis and child exposed to syphilis. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 54, p. e2020597, 17 maio 2021.

DOUGAN, Sarah; EVANS, Barry G.; ELFORD, Jonathan. Sexually Transmitted Infections in Western Europe Among HIV-Positive Men Who Have Sex With Men. **Sexually Transmitted Diseases**, v. 34, n. 10, p. 783, 2007.

DOUGLAS, John M. Penicillin treatment of syphilis: clearing away the shadow on the land. **JAMA**, v. 301, n. 7, p. 769–771, 18 fev. 2009.

DR. RICORD ON SYPHILIS. **The Lancet**, Volume 100, Issue 2555, 228 - 229

DRUSIN, L. M. Syphilis makes a comeback. **International journal of STD & AIDS**, v. 7, n. 1, p. 7–9, 1996.

EDELMAN, Natalie. Towards a critical epidemiology approach for applied sexual health research. **Journal of Health Psychology**, v. 23, n. 2, p. 161–174, 1 fev. 2018.

EGRY, Emiko Yoshikawa. Saúde coletiva: construindo um novo método em enfermagem. 1996.

ENGELSTEIN L. Syphilis, historical and actual: cultural geography of a disease. **Rev Infect Dis**. 1986 Nov-Dec;8(6):1036-48. doi: 10.1093/clinids/8.6.1036.

ERNST, A. A.; MARTIN, D. H. High syphilis rates among cocaine abusers identified in an emergency department. **Sexually Transmitted Diseases**, v. 20, n. 2, p. 66–69, 1993.

EVANS JR, Mathur A (2005), "The value of online surveys". Internet Research, Vol. 15 No. 2 pp. 195–219, doi: <https://doi.org/10.1108/10662240510590360>.

FATIMA, Zainab *et al.* Unraveling the resurgence of syphilis: a deep dive into the epidemic sweeping across the United States; a mini review. **Annals of Medicine and Surgery**, v. 87, n. 2, p. 641–649, 7 jan. 2025.

FENTON, Kevin A. *et al.* Infectious syphilis in high-income settings in the 21st century. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 8, n. 4, p. 244–253, 1 abr. 2008.

FENTON, Kevin A.; IMRIE, John. Increasing Rates of Sexually Transmitted Diseases in Homosexual Men in Western Europe and the United States: Why? **Infectious Disease Clinics of North America**, Sexually Transmitted Infections. v. 19, n. 2, p. 311–331, 1 jun. 2005.

FILHO, Almeida; DE, Naomar. A clínica, a epidemiologia e a epidemiologia clínica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 3, p. 35–53, 1993.

FILHO, Naomar De Almeida. **Epidemiologia Sem Números**. Rio de Janeiro: CAMPUS, 1989.

FOLASAYO A. T.; et al. Assessing the Knowledge Level, Attitudes, Risky Behaviors and Preventive Practices on Sexually Transmitted Diseases among University Students as Future Healthcare Providers in the Central Zone of Malaysia: A Cross-Sectional Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 14(2), 2017. 159. <https://doi.org/10.3390/ijerph14020159>

FONSECA, Luan dos Santos *et al.* Panorama nacional da adesão ao pré-natal: série histórica de 2009 a 2018 / National panorama of adherence to prenatal care: historical series from 2009 a 2018. **Journal of Nursing and Health**, v. 12, n. 1, 2022.

FONTE V. R. F.; et al. Jovens universitários e o conhecimento acerca das infecções sexualmente transmissíveis. **Esc Anna Nery**. 2018a ;22(2):e20170318. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2017-0318>

FONTE V. R. F.; et al. Conhecimento e percepção de risco em relação às infecções sexualmente transmissíveis entre jovens universitários. **Cogitare Enferm**. 2018b ;23(3):e55903. <https://doi.org/10.5380/ce.v23i3.55903>

FRENCH, Patrick. Syphilis. **BMJ - British Medical Journal**, v. 334, n. 7585, p. 143–147, 20 jan. 2007.

FRITH JA. Syphilis - its early history and treatment until penicillin, and the debate on its origins. *Journal of Military and Veterans' Health*, v. 20, p. 49, 2012.

GERBASE, A. C. *et al.* Global prevalence and incidence estimates of selected curable STDs. **Sexually Transmitted Infections**, v. 74 Suppl 1, p. S12-16, jun. 1998.

GLADWIN, Thomas E. *et al.* Addiction, adolescence, and the integration of control and motivation. **Developmental Cognitive Neuroscience**, Special Issue on Motivation. v. 1, n. 4, p. 364–376, 1 out. 2011.

HOLLIS, Chris; LIVINGSTONE, Sonia; SONUGA-BARKE, Edmund. Editorial: The role of digital technology in children and young people's mental health - a triple-edged sword? **Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines**, v. 61, n. 8, p. 837–841, ago. 2020.

HOPF, Henning *et al.* Fake science and the knowledge crisis: ignorance can be fatal. **Royal Society Open Science**, v. 6, n. 5, p. 190161, 1 maio 2019.

HOUTROW, Amy *et al.* Promoting Healthy Sexuality for Children and Adolescents with Disabilities. **Pediatrics**, v. 148, n. 1, p. e2021052043, jul. 2021.

HUGHES, Yasmin; SAWLESHWARKAR, Shailendra. Global Epidemiology of Selected Sexually Transmitted Infections. *In: Sexually Transmissible Oral Diseases*. [S.l.]: John Wiley & Sons, Ltd, 2023. p. 25–35.

HUTTO, Burton. Syphilis in Clinical Psychiatry: A Review. **Psychosomatics**, v. 42, n. 6, p. 453–460, 1 nov. 2001.

JENTSCH, J. D. *et al.* Prefrontal cortical involvement in phencyclidine-induced activation of the mesolimbic dopamine system: behavioral and neurochemical evidence. **Psychopharmacology**, v. 138, n. 1, p. 89–95, jul. 1998.

JOFFE, G. P. *et al.* Multiple partners and partner choice as risk factors for sexually transmitted disease among female college students. **Sexually Transmitted Diseases**, v. 19, n. 5, p. 272–278, 1992.

JR, Ramos; NOVAES, Alberto. Persistência da sífilis como desafio para a saúde pública no Brasil: o caminho é fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. PT069022, 16 maio 2022.

KAUR, Ravneet *et al.* Are we moving from symptomatic to asymptomatic syphilis: A retrospective analysis. **Indian journal of sexually transmitted diseases and AIDS**, v. 44, n. 1, p. 45–48, 2023.

KHOSROPOUR, Christine M. *et al.* Trends in serosorting and the association with HIV/STI risk over time among men who have sex with men. **Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes**, v. 72, n. 2, p. 189–197, 1 jun. 2016.

KILMARX, P. H.; ST LOUIS, M. E. The evolving epidemiology of syphilis. **American Journal of Public Health**, v. 85, n. 8 Pt 1, p. 1053–1054, ago. 1995.

KOPS, Natália Luiza *et al.* Self-reported syphilis and associated factors among Brazilian young adults: findings from a nationwide survey. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 23, p. 274–277, 24 out. 2019.

LAFOND, Rebecca E.; LUKEHART, Sheila A. Biological basis for syphilis. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 19, n. 1, p. 29–49, jan. 2006.

LINEGH, Xin. Exploring the Effects of Addiction on Physical and Mental Health. **Neuropsychiatry**, v. 14, n. 3, p. 1–2, 21 jun. 2024.

LÓPEZ DE MUNAIN, Josefina. Epidemiology and current control of sexually transmitted infections. The role of STI clinics. **Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica (English Ed.)**, v. 37, n. 1, p. 45–49, jan. 2019.

LUPPI, Carla Gianna *et al.* Sífilis no estado de São Paulo, Brasil, 2011–2017. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 23, p. e200103, 9 out. 2020.

LYNN, W. A.; LIGHTMAN, S. Syphilis and HIV: a dangerous combination. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 4, n. 7, p. 456–466, 1 jul. 2004.

MANCINI CM, WIMMER M, SCHULZ LT, ZHANG Y, FU X, POSTELNICK M, BHOWMICK T, LEE F, BLUMENTHAL KG. Association of Penicillin or

Cephalosporin Allergy Documentation and Antibiotic Use in Hospitalized Patients with Pneumonia. **J Allergy Clin Immunol Pract.** 2021 Aug;9(8):3060-3068.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.071.

MARCUS, Ulrich *et al.* Changes in the prevalence of self-reported sexually transmitted bacterial infections from 2010 and 2017 in two large European samples of men having sex with men—is it time to re-evaluate STI-screening as a control strategy? **PLOS ONE**, v. 16, n. 3, p. e0248582, 2021.

MARQUES DOS SANTOS, Marquiony *et al.* Trends of syphilis in Brazil: A growth portrait of the treponemic epidemic. **PloS One**, v. 15, n. 4, p. e0231029, 2020.

MAYER, Kenneth H. Old pathogen, new challenges: a narrative review of the multi-level drivers of syphilis increasing in American men who have sex with men. **Sexually transmitted diseases**, v. 45, n. 9, p. S38–S41, set. 2018.

MCNALLY, Gavan P. *et al.* Pathways to the persistence of drug use despite its adverse consequences. **Molecular Psychiatry**, v. 28, n. 6, p. 2228–2237, jun. 2023.

MEDEIROS, Adeli Regina Przybicien *et al.* [Epidemiology as a theoretical-methodological framework in the nurses' working process]. **Revista Da Escola De Enfermagem da USP**, v. 46, n. 6, p. 1519–1523, dez. 2012.

MENDEZ-LOPEZ, Ana *et al.* Social and behavioural determinants of syphilis: Modelling based on repeated cross-sectional surveys from 2010 and 2017 among 278,256 men who have sex with men in 31 European countries. **The Lancet Regional Health - Europe**, v. 22, p. 100483, 9 ago. 2022.

MEYER, Paul J.; KING, Christopher P.; FERRARIO, Carrie R. Motivational Processes Underlying Substance Abuse Disorder. **Current topics in behavioral neurosciences**, v. 27, p. 473–506, 2016.

MILES TP, MCBRIDE D. World War I origins of the syphilis epidemic among 20th century black Americans: a biohistorical analysis. *Soc Sci Med.* 1997 Jul;45(1):61-9. doi: 10.1016/s0277-9536(96)00316-4.

MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 26. ed. [S.l.]: Minayo, M. C. S., 2007.

MITJÀ, Oriol *et al.* Epidemiology and determinants of reemerging bacterial sexually transmitted infections (STIs) and emerging STIs in Europe. **The Lancet Regional Health – Europe**, v. 34, 1 nov. 2023.

M.RICORD on the Tertiary Forms of Syphilis, and Their Treatment. **Med Exam (Phila)**. 1846 Mar;2(15):204-208. PMID: 38120362; PMCID: PMC10286037.

MURALI, Vijaya; JAYARAMAN, Sabitha. Substance use disorders and sexually transmitted infections: A public health perspective. **B. J, Psych Advances**, v. 24, n. 3, p. 161–166, 2018.

NETO, Lafaiete de Godoi; GOMES, Leonardo Magalhães; SOBRINHO, Hermínio Maurício da Rocha. EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL E CONGÊNITA NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 2013 A 2018. **REVISTA BRASILEIRA MILITAR DE CIÊNCIAS**, v. 5, n. 13, 4 dez. 2019.

NEWCOMB, Michael D.; LOCKE, Thomas. Health, Social, and Psychological Consequences of Drug Use and Abuse. In: SLOBODA, Zili (Org.). *Epidemiology of Drug Abuse*. Boston, MA: Springer US, 2005. p. 45–59.

NOGUEIRA W. P.; NOGUEIRA M. F.; NOGUEIRA, J. A.; FREIRE M. E. M.; GIR E.; SILVA A. C. O. E. Syphilis in riverine communities: prevalence and associated factors. **Rev Esc Enferm USP**. 2022 Jan 7;56: e20210258. doi: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0258.

O'DONNELL B. L.; O'DONNELL C. R.; STUEVE A. Early sexual initiation and subsequent sex-related risks among urban minority youth: The Reach for Health Study. **Fam Plann Perspect** 2001; 33:268–75.

ORBE-ORIHUELA, Yaneth Citlalli *et al.* Syphilis as Re-Emerging Disease, Antibiotic Resistance, and Vulnerable Population: Global Systematic Review and Meta-Analysis. **Pathogens (Basel, Switzerland)**, v. 11, n. 12, p. 1546, 15 dez. 2022.

PARADISE, Lois J.; FRIEDMAN, Herman. Syphilis and Drugs of Abuse. *In*: FRIEDMAN, Herman; KLEIN, Thomas W.; SPECTER, Steven (Orgs.). **Drugs of Abuse, Immunity, and AIDS**. Boston, MA: Springer US, 1993. p. 81–87.

PEELING RW, MABEY D, KAMB ML, CHEN XS, RADOLF JD, BENZAKEN AS. Syphilis. **Nat Rev Dis Primers**. 2017 Oct 12; 3:17073. doi: 10.1038/nrdp.2017.73.

PEREIRA DE SOUZA, Isabel Figueiredo *et al*. História política e pensamento epidemiológico: Breilh e a economia política da saúde. **Revista Guillermo de Ockham**, v. 17, n. 1, p. 77–84, jun. 2019.

PINHO, Ellen Christiane Correa *et al*. Social and individual vulnerability factors associated with syphilis among populations living on islands in the Brazilian Amazon. **BMC Infectious Diseases**, v. 24, n. 1, p. 23, 2 jan. 2024.

PINTO VM, TANCREDI MV, DE ALENCAR HD, CAMOLESI E, HOLCMAN MM, GRECCO JP, GRANGEIRO A, GRECCO ET. Prevalence of syphilis and associated factors in homeless people of Sao Paulo, Brazil, using a Rapid Test. **Rev Bras Epidemiol**. 2014 Apr-Jun;17(2):341-54. doi: 10.1590/1809-4503201400020005eng.

PINTO, Rafael *et al*. Text mining analysis to understand the impact of online news on public health response: case of syphilis epidemic in Brazil. **Frontiers in Public Health**, v. 11, p. 1248121, 1 nov. 2023.

QUÉTEL, Professor Claude. **The History of Syphilis**. Tradução: Professor Judith Braddock; Tradução: Professor Brian Pike. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992.

RAMOS Jr; Alberto N. Persistência da sífilis como desafio para a saúde pública no Brasil: o caminho é fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. PT069022, 16 maio 2022.

RESNICK M., et al. Protecting adolescents from harm: findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. **JAMA** 1997; 278:823–32.

ROSE, Geoffrey. **The Strategy of Preventive Medicine**. Oxford England, New York: Oxford University Press, 1992.

ROSSET F, CELORIA V, DELMONTE S, MASTORINO L, SCIAMARRELLI N, BOSKOVIC S, RIBERO S, QUAGLINO P. The Epidemiology of Syphilis Worldwide in the Last Decade. **J Clin Med**. 2025 Jul 28;14(15):5308. doi: 10.3390/jcm14155308.

SANTOS, Marquiony Marques dos *et al*. Trends of syphilis in Brazil: A growth portrait of the treponemic epidemic. **PLOS ONE**, v. 15, n. 4, p. e0231029, 9 abr. 2020.

SANTOS MMD, ROSENDO TMSS, LOPES AKB, RONCALLI AG, LIMA KC. Weaknesses in primary health care favor the growth of acquired syphilis. **PLoS Negl Trop Dis**. 2021 Feb 5;15(2):e0009085. doi: 10.1371/journal.pntd.0009085. PMID: 33544722; PMCID: PMC7891733.

SARACENI, Valeria *et al*. Vigilância epidemiológica da transmissão vertical da sífilis: dados de seis unidades federativas no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 41, p. e44, 14 abr. 2017.

SATYAPUTRA, Ferris *et al*. The Laboratory Diagnosis of Syphilis. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 59, n. 10, p. e0010021, 20 set. 2021.

SCHMIDT, Axel J. *et al*. Illicit drug use among gay and bisexual men in 44 cities: Findings from the European MSM Internet Survey (EMIS). **The International Journal on Drug Policy**, v. 38, p. 4–12, dez. 2016.

SCHMIDT A. J.; MARCUS U. What's on the rise in Sexually Transmitted Infections? **Lancet Reg Health Eur**. 2023 Oct 26;34: 100764. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100764.

SEFTON, A. M. The Great Pox that was...syphilis. **Journal of Applied Microbiology**, v. 91, n. 4, p. 592–596, out. 2001.

SHIFERAW W, MARTIN BM, DEAN JA, MILLS D, LAU C, PATERSON D, KOH K, ERIKSSON L, FURUYA-KANAMORI L. A systematic review and meta-analysis of sexually transmitted infections and blood-borne viruses in travellers. **J Travel Med.** 2024 Jun 3;31(4): taae038. doi: 10.1093/jtm/taae038.

SINGH AE, ROMANOWSKI B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. **Clin Microbiol Rev.** 1999 Apr;12(2):187-209. doi: 10.1128/CMR.12.2.187.

SOARES, Cassia; CAMPOS, Celia; YONEKURA, Tatiana. Marxism as a theoretical and methodological framework in collective health: Implications for systematic review and synthesis of evidence. **Revista da Escola de Enfermagem da U S P**, v. 47, p. 1403–1409, 1 dez. 2013.

SOUZA, Elemir Macedo de. Há 100 anos, a descoberta do *Treponema pallidum*. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 80, p. 547–548, out. 2005.

SPIRKIN, A. Dialectical Materialism. *In*: BLAKELEY, T. J. (Org.). **Themes in Soviet Marxist Philosophy: Selected Articles from the 'Filosofskaja Enciklopedija'**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1975. p. 5–47.

SPITERI, G. *et al.* The resurgence of syphilis in high-income countries in the 2000s: a focus on Europe. **Epidemiology & Infection**, v. 147, p. e143, jan. 2019.

STOLTEY, Juliet E.; COHEN, Stephanie E. Syphilis transmission: a review of the current evidence. **Sexual Health**, v. 12, n. 2, p. 103–109, abr. 2015.

TIAN, Yanzhai. Historical materialism and cultural reconstruction: a new Marxist approach to the study of cultural history. **Mediterranean Archaeology and Archaeometry**, v. 25, n. 3, 25 mar. 2025.

TUDDENHAM, Susan; HAMILL, Matthew M.; GHANEM, Khalil G. Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted Infections: A Review. **JAMA**, v. 327, n. 2, p. 161–172, 11 jan. 2022.

UDRY, Jessica; BARBER, Sarah J. The illusory truth effect: A review of how repetition increases belief in misinformation. **Current Opinion in Psychology**, v. 56, p. 101736, abr. 2024.

WA L. Syphilis and HIV: a dangerous combination. **The Lancet Infectious Diseases**, Volume 4, Issue 7, 456 - 466.

WAGMAN J. A Cultural History of the Condom's Symbolic Meaning in American Visual Culture, 1941-1987 1. **Alizés: Revue angliciste de La Réunion**, 2024, Sex (Mis)Education in the English-Speaking World, 44, pp.17-32.

WEMRELL, Maria et al. Contemporary Epidemiology: A Review of Critical Discussions Within the Discipline and A Call for Further Dialogue with Social Theory. **Sociology Compass**, v. 10, n. 2, p. 153–171, 2016.

WESTIN, Mateus Rodrigues *et al.* Prevalence of syphilis and sexual behavior and practices among adolescents MSM and TrTGW in a Brazilian multi-center cohort for daily use of PrEP. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, p. e00118721, 2023.

WHO (2010) Developing sexual health programmes: A framework for action. Geneva: World Health Organization.

WOZNIAK, Phillip S. *et al.* The Mortality of Congenital Syphilis. **The Journal of Pediatrics**, v. 263, p. 113650, dez. 2023.

WRIGHT, A. D. Venereal disease and the great. **The British Journal of Venereal Diseases**, v. 47, n. 4, p. 295–306, ago. 1971.

YOUNG, Allan. The Anthropologies of Illness and Sickness. **Annual Review of Anthropology**, v. 11, p. 257–285, 1982.

YOUNG, Lindsay E.; FUJIMOTO, Kayo. The Co-evolution of online social networks and syphilis incidence among young black men who have sex with men. **Social Science & Medicine**, v. 272, p. 113764, 1 mar. 2021.

ZHENG Y, YE K, YING M, HE Y, YU Q, LAN L, XU W. Syphilis epidemic among men who have sex with men: A global systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and associated factors. **J Glob Health**. 2024 Jan 19;14:04004. doi: 10.7189/jogh.14.04004.

ANEXO I

CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-
FACEF



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Análise do nível de conhecimento de uma amostra da população universitária de franca sobre a sífilis, sua forma de transmissão, consequências, e fatores facilitadores

Pesquisador: MANOEL JORGE NOBRE DO ESPIRITO SANTO

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 83598224.3.0000.5384

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.228.252

Apresentação do Projeto:

Trata-se da segunda submissão do projeto. A avaliação desse item já fora realizada e mantém-se os mesmos dizeres.

Objetivo da Pesquisa:

Trata-se da segunda submissão do projeto. A avaliação desse item já fora realizada e mantém-se os mesmos dizeres.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Este item estava pendente na submissão anterior e fora corrigido nesta submissão.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se da segunda submissão do projeto. A avaliação desse item já fora realizada e mantém-se os mesmos dizeres.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Estão de acordo com o solicitado.

Recomendações:

As adequações solicitadas foram cumpridas no TCLE. No entanto, recomenda-se ainda, inseri-las no corpo do projeto ("riscos e benefícios"). Além disso, substituir o TCLE inicial no arquivo do projeto pelo novo TCLE que está com as adequações.

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 sala 11

Bairro: São José

CEP: 14.403-430

UF: SP

Município: FRANCA

Telefone: (16)3713-4691

E-mail: comepe@facef.br

**CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-
FACEF**



Continuação do Parecer: 7.228.252

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

Projeto aprovado. As adequações solicitadas foram cumpridas no TCLE. No entanto, recomenda-se ainda, inseri-las no corpo do projeto ("riscos e benefícios"). Além disso, substituir o TCLE inicial no arquivo do projeto pelo novo TCLE que está com as adequações.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2423167.pdf	17/10/2024 14:18:45		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoEtica.pdf	17/10/2024 14:16:45	MANOEL JORGE NOBRE DO ESPIRITO SANTO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	17/10/2024 14:16:27	MANOEL JORGE NOBRE DO ESPIRITO SANTO	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRostoAssinada.pdf	26/09/2024 14:20:45	MANOEL JORGE NOBRE DO ESPIRITO SANTO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

FRANCA, 15 de Novembro de 2024

Assinado por:
Antonio Cezar Peron
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 sala 11
Bairro: São José **CEP:** 14.403-430
UF: SP **Município:** FRANCA
Telefone: (16)3713-4691 **E-mail:** comepe@facef.br

ANEXO II

Centro Universitário Municipal de Franca
Uni-FACEF

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

1. Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar na pesquisa de campo referente ao Projeto de Pesquisa do Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional: *Análise do nível de conhecimento de uma amostra da população universitária de Franca sobre a sífilis, sua forma de transmissão, consequências, e fatores facilitadores*, do aluno Paulo Henrique Oliveira Lage, orientado pelo Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone: (16) 997631720 ou (16) 981340059 (WUP), e e-mail: mjnobre@gmail.com.
2. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
3. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, se destina a compor o Trabalho de Conclusão de Curso (dissertação de Mestrado) do aluno em epígrafe cujo objetivo é saber, na população estudada, que teoricamente tem um nível de instrução maior, quais seriam as possíveis causas da manutenção e aumento na transmissão da doença no município.
4. Minha colaboração se fará respondendo um questionário predefinido sobre o tema abordado e que servirá de dados para a análise da pesquisa.
5. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu orientador.
6. Apesar de este ser um estudo de risco mínimo, onde não serão realizadas intervenções ou modificações intencionais em variáveis fisiológicas, psicológicas ou sociais dos participantes da pesquisa, fui informado da natureza destes riscos, que incluem: possibilidade de constrangimento, cansaço ou aborrecimento ao responder os questionários, além de desconforto, alterações na autoestima provocadas pela evocação de memórias ou por reforços na conscientização sobre uma condição física ou psicológica restritiva ou incapacitante, medo, vergonha, quebra de sigilo e quebra de anonimato. Por outro lado, estou ciente de que os

dados coletados podem levar a proposição de medidas que levem informação a diferentes esferas da sociedade além da implementação de ações que visem a prevenção da doença no município.

7. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.
8. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Franca ____ de _____ de _____.

Assinatura do (a) Participante

Paulo Henrique Oliveira Lage
Pesquisador

Manoel Jorge Nobre
(Orientador)

Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF

Endereço para contato: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
Bairro São José – Franca/SP, CEP 14.403-430
Telefone: (16) 3713-4691
E-mail: comep@facef.br